
**CONSUMO DE DROGAS EN PACIENTES DE PRIMER INGRESO A
TRATAMIENTO EN CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL.
ENERO - JUNIO, 2010**

DATOS A NIVEL NACIONAL Y POR SEXO

Alma Delia Gutiérrez López
Marina Velázquez Altamirano

Centros de Integración Juvenil
Dirección de Investigación y Enseñanza
Subdirección de Investigación
Depto. de Investigación Clínica y Epidemiológica
México, 2011

Informe de Investigación 11-02a

DIRECTORIO

PRESIDENTE DEL PATRONATO NACIONAL

Dr. Jesús Kumate Rodríguez

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA

Sra. Kena Moreno

DIRECTORA GENERAL

Lic. Carmen Fernández Cáceres

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ADMINISTRACIÓN

L. C. Hugo Basurto Ojeda

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE OPERACIÓN Y PATRONATOS

Dr. José Ángel Prado García

DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA

Dr. Ricardo Sánchez Huesca

SUBDIRECTOR DE INVESTIGACIÓN

Mtro. David Bruno Díaz Negrete

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	4
MÉTODO.....	4
CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS.....	6
FACTORES ASOCIADOS A LA DEMANDA DE TRATAMIENTO.....	8
CONSUMO DE DROGAS.....	10
CUADROS.....	19
GLOSARIO	42

RESUMEN

El presente informe se realizó con base en registros clínicos de la entrevista inicial de 11,758 usuarios de sustancias psicoactivas que reportaron el consumo de al menos una droga ilícita y que acudieron por primera vez a tratamiento a Centros de Integración Juvenil entre enero y junio de 2010, con objeto de actualizar información sobre el perfil sociodemográfico, los factores asociados a la demanda de tratamiento y el patrón de consumo de sustancias psicoactivas, así como de contribuir con elementos útiles para retroalimentar la planeación, diseño y ajuste de los servicios institucionales de prevención y tratamiento del consumo de drogas.

Los datos permitieron observar una mayor proporción de hombres que demandan tratamiento, con una razón de 4.4 hombres por cada mujer. La edad media de ingreso a tratamiento fue de 23.4 años. En promedio, los hombres ingresan a tratamiento a una edad mayor que las mujeres (23.8 años hombres; 21.4 años mujeres). La edad promedio del inicio del consumo de tabaco se situó en general en los 14.5 años, la de alcohol en 14.7 años y la de drogas ilícitas en 16.5 años. En promedio, tanto los hombres como las mujeres inician el consumo de estas drogas a la misma edad (tabaco: hombres 14.5 años y mujeres 14.6 años; alcohol: tanto hombres como mujeres 14.7 años; drogas ilícitas: hombres 16.4 años, mujeres 16.9 años).

Las drogas de mayor consumo alguna vez en la vida fueron: alcohol (75.7%), tabaco (70.5%), marihuana (54.9%), cocaína en polvo blanco (35.9%), solventes y removedores (30.3%), crack (23.8%), pegamentos (12.2%), metanfetaminas (10.5%) y benzodiazepinas (10.3%). En cuanto al consumo en el mes previo al ingreso a tratamiento las sustancias más utilizadas fueron: tabaco (60.8%), alcohol (54.2%), marihuana (37.5%), solventes o removedores (15.4%), crack (9.1%) y cocaína en polvo blanco (8.1%). Las drogas de mayor impacto en el último año fueron: marihuana (27.0%), alcohol (17.2%), solventes y removedores (15.5%), crack (9.7%) y cocaína (5.5%).

En cuanto a los factores asociados a la demanda de tratamiento se observó que los usuarios de drogas acudieron principalmente por iniciativa propia (39.4%) y por condicionamiento o recomendación familiar (35.6%). Asimismo, solicitaron atención por el consumo de drogas ilícitas (84.6%), de alcohol (39.3%) y/o de tabaco (33.0%). 37.7% no habían tomado ninguna medida contra el problema (o han intentado interrumpir de manera voluntaria y sin apoyo el consumo (24.5%). Entre los problemas más frecuentemente asociados al consumo se reconocen los de tipo familiar (76.1%), los psicológicos (36.7%) (36.2%) y los de salud.

Cabe destacar que se observan diferencias entre los hombres y mujeres atendidos en Centros de Integración Juvenil, en cuanto a sus características sociodemográficas, los factores asociados a la demanda de tratamiento y su patrón de consumo.

INTRODUCCIÓN

El presente informe se desprende de la información obtenida mediante el Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas (SIECD) perteneciente a Centros de Integración Juvenil (CIJ), cuyo objetivo es proporcionar datos actualizados de las características sociodemográficas, de los factores asociados a la demanda de tratamiento y del patrón de consumo de sustancias de la población usuaria de los servicios de tratamiento institucionales, para apoyar el diseño, planeación y ajuste de los programas institucionales de prevención y atención curativa-rehabilitatoria.

El SIECD es producto de más de veinte años de trabajo, a lo largo de los cuales se ha logrado consolidar el seguimiento sistemático y oportuno de datos que, más allá de su aplicación en la toma de decisiones para el diseño y ajuste de servicios, ha contribuido de manera significativa al conocimiento de la forma y tendencias del uso de drogas en nuestro país, al proporcionar referentes sociodemográficos y del patrón de consumo de casos identificados en centros de tratamiento, además de ser una estrategia documental complementaria a los estudios y encuestas poblacionales.

MÉTODO

Diseño de estudio: Censo, estudio transversal, descriptivo, *ex post facto*.

Población: 11,758 usuarios de sustancias psicoactivas que reportaron el consumo intencional de al menos **una droga ilegal**, que acudieron por primera vez a solicitar tratamiento en CIJ entre enero y junio de 2010 en alguna de las unidades de atención curativa de CIJ (ver Cuadro 1) y que proporcionaron personalmente la información.¹

Fuente de información: Alguno de los dos formatos distintos de entrevista inicial (clave 8819-03) pertenecientes al expediente clínico, aplicado en la primera consulta por parte de los terapeutas responsables del ingreso de pacientes a tratamiento.

Variables de estudio: Las características sociodemográficas estudiadas comprenden: persona que proporciona la información, sexo, edad de ingreso a tratamiento, estado civil, escolaridad, ocupación y estrato social. Las variables de los factores asociados a la demanda de tratamiento: motivo(s) de consulta, condicionante(s) de la solicitud de tratamiento, antecedente(s) de acciones asumidas frente al uso de sustancias y problema(s) asociado(s) al mismo. Y las variables de patrón de consumo: edad de inicio, drogas consumidas en el primer año de consumo, drogas ilícitas consumidas en

¹ No se incluyen casos en los que la información fue proporcionada por la familia del usuario, así como los registros que fueron enviados de manera extemporánea a la Subdirección de Investigación de CIJ.

el primer año de consumo ilegal, tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de sustancias y el ingreso a tratamiento, consumo alguna vez en la vida, en el último año y en los últimos 30 días; drogas de preferencia y de mayor impacto en el último año, uso combinado de sustancias, tipo de consumo de drogas ilícitas, episodios de abuso y total de drogas consumidas.²

La información sobre el consumo de drogas se presenta categorizada en diez grupos de sustancias: tabaco, alcohol, cannabis, cocaína, inhalables, estimulantes, drogas alucinógenas y disociativas, depresores, opiáceos y otras sustancias de abuso.

Sin embargo, también se desagregan los diez grupos antes mencionados en 26 categorías de sustancias: tabaco; alcohol; marihuana y hachís; cocaína en presentación de polvo blanco, crack y otras presentaciones de cocaína; solventes y removedores, pegamentos, esmaltes y pinturas y otros inhalables; anfetaminas, metanfetaminas (*crystal, ICE, etc.*), MDMA (éxtasis) y metanfetaminas alucinógenas y otros estimulantes; LSD, plantas alucinógenas y derivados y otras drogas alucinógenas y disociativas; benzodiazepinas, *Rohypnol*[®] y otros depresores; heroína, opiáceos sintéticos, y opio y opioides; sustancias con utilidad médica y otras sustancias de abuso.

Procesamiento de datos. La información fue capturada por personal de la Dirección de Planeación de CIJ, mediante dos versiones del programa *Control de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas* (CIECD) desarrollado por la Subdirección de Investigación y el Departamento de Sistemas de CIJ para cada uno de los formatos utilizados de la entrevista inicial. La validación y procesamiento de datos se realizó en el Departamento de Investigación Clínica y Epidemiológica con base en 2 muestras aleatorias de casos correspondientes a enero – marzo y abril - junio, con un nivel de confianza de 95% y de error de 5%. Para el procesamiento estadístico se utilizó el programa SPSS v. 12.

Los resultados se presentan en porcentajes válidos, excluyendo casos “sin información” y aquéllos que no cumplieron las condiciones de análisis requeridas por cada variable estudiada, los resultados son tanto a nivel general como desglosados por hombres y mujeres.


² Véase Anexo.

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS³


Sexo. Los hombres representaron al 81.6% de los casos y las mujeres al 18.4%, lo que equivale a una razón de 4.4 hombres por cada mujer.

Persona que proporciona la información. El usuario acudió sólo a solicitar tratamiento en 48.9% de los casos (49.7% de los hombres y 45.4% de las mujeres), mientras que 51.1% lo hizo en compañía de familiares u otras personas (50.3% de los hombres vs. 54.6% de las mujeres).

Edad de ingreso a tratamiento. La edad promedio se situó en 23.4 años ($\sigma=10.2$ años); la mediana en 19 años y la moda en 15 años. La mitad de los casos (51.0%) ingresó entre los 15 y 24 años de edad.




Estado civil. 70.7% expresó estar soltero, 11.0% estar casado y 10.4% vivir en unión libre.




³ Cfr., Cuadros 1 a 8.

Escolaridad. 47.8% cursaba o había cursado algún grado de educación secundaria; 28.4%, al menos algún grado de bachillerato; 12.4%, al menos un año de educación primaria y 7.5%, uno o más años de estudios superiores.



Las mujeres cuentan con mayor escolaridad que los hombres

Ocupación. 34.9% desempeñaba alguna actividad laboral, 32.3% estudiaba y 25.2% estaba desempleado.




Mientras que un mayor porcentaje de mujeres se dedica a estudiar o a las labores del hogar; una mayor proporción de hombres trabaja o no cuenta con ocupación alguna

Estrato social. Según la percepción de los terapeutas, 62.0% de los pacientes corresponden al estrato medio bajo; 24.4%, al estrato bajo y 11.6%, al estrato medio alto.

Figura 5. Estrato social según sexo


Según la percepción de los terapeutas, los hombres que acuden a tratamiento presentan condiciones sociales más desfavorables que las mujeres



FACTORES ASOCIADOS A LA DEMANDA DE TRATAMIENTO⁴

Motivos de consulta. 39.6% de los casos reportó más de un motivo para acudir a tratamiento (uso de alcohol, tabaco o drogas), mientras que 2.1% de los casos no expresó ninguno. Conviene señalar que 84.6% acudió por consumo de drogas ilícitas; mientras que 39.3%, por el uso de bebidas alcohólicas y 33.0% por el uso de tabaco.

Figura 6. Motivos de consulta según sexo




Un menor porcentaje de mujeres acude por el consumo de drogas ilegales en comparación con los hombres

⁴ Cfr., Cuadros 9 a 12.


Condicionantes de la solicitud de tratamiento. 13.7% de los casos al solicitar tratamiento expresó dos o más condicionantes. Cabe señalar que 39.4% acudió *motu proprio* a tratamiento; 35.6%, por condicionamiento o recomendación familiar; 15.8%, por condicionamiento o recomendación escolar y 13.8%, por condicionamiento legal.

Figura 7. Condicionantes de la solicitud de tratamiento según sexo




Antecedentes de acciones contra el consumo de sustancias. Antes de acudir a tratamiento en CIJ, 24.5% de los casos expresó que había intentado interrumpir el consumo de drogas de manera voluntaria, pero sin apoyo. 12.9% dijo que previamente había estado internado en algún anexo, mientras que 9.0% había acudido a grupos de autoayuda. A diferencia, 37.7% expresó que hasta el momento de la solicitud de tratamiento no había tomado medida alguna en contra del consumo de sustancias; mientras que 10.6% de los casos reportó haber intentado al menos dos tipos distintos de acciones para abandonar el consumo de drogas.

Figura 8. Antecedentes de acciones contra el consumo de sustancias según sexo



Problemas asociados al consumo de sustancias. 76.1% señaló problemas de tipo familiar; 36.7%, psicológicos; 36.2%, de salud; 35.2%, escolares; 26.7%, legales; 23.3%, laborales; 17.2%, de conducta antisocial o delictiva y 13.7%, accidentes o lesiones. Cabe señalar que 74.8% de los casos mencionó dos o más problemas problema asociado al consumo de sustancias, en tanto que 3.3% no reportó ninguno.

Figura 9. Problemas asociados al consumo de sustancias según sexo





Las mujeres refieren más problemas de tipo escolar y psicológicos que los hombres; mientras que éstos presentan más problemas legales o de tipo laboral

CONSUMO DE DROGAS⁵

Edad de inicio del consumo de sustancias. La edad promedio de inicio del consumo de tabaco se situó en 14.5 años ($\sigma=3.5$ años), la mediana en 14 años y la moda en 15; mientras que la edad promedio de inicio del consumo de alcohol se situó en 14.7 años ($\sigma=3.2$ años) y la mediana y la moda en 15 años, respectivamente. Por su parte la edad promedio de inicio en el abuso de drogas ilícitas (incluyendo sustancias con utilidad médica utilizadas fuera de prescripción) fue de 16.5 años ($\sigma=5.2$ años), con mediana de 15 años y moda de 14 años. Cabe señalar que considerando el primer decil como indicador de las edades más tempranas reportadas como edad de inicio, puede apreciarse que el consumo de tabaco aparece más temprano (11 años) que el consumo de alcohol (12 años) y de drogas ilícitas (13 años).

⁵ Cfr., Cuadros 13 a 34.

Figura 10. Edad de inicio del consumo de sustancias según sexo


	 Años			 Años			Hombres y mujeres inician el consumo de sustancias casi a la misma edad
	Tabaco	Alcohol	Drogas ilícitas	Tabaco	Alcohol	Drogas ilícitas	
Promedio	14.5	14.7	16.4	14.6	14.7	16.9	
Desviación estándar	3.5	3.0	4.9	3.9	3.8	6.5	
Mediana	14	15	15	14	14	15	
Moda	15	15	15	13	13	14	

Drogas utilizadas en el primer año de consumo. Las sustancias principalmente utilizadas en este periodo fueron tabaco (56.0%) y alcohol (54.1%), seguidas por marihuana (21.2%), inhalables (solventes y removedores: 10.4%, y pegamentos: 3.3%) y cocaína (cocaína en polvo blanco: 3.1% y crack: 1.7%).


Considerando únicamente el consumo de drogas ilícitas, las sustancias más reportadas durante el primer año de consumo ilícito fueron: marihuana (60.2%); inhalables (solventes/removedores: 21.2%, pegamentos: 7.0% y esmaltes y pinturas: 3.3%) y cocaína (cocaína en polvo blanco: 15.3% y crack: 6.6%); en menor proporción se reportó el consumo de benzodiazepinas (3.0%) y metanfetaminas (2.2%).

Figura 11. Principales drogas de inicio del consumo según sexo

Uso de tabaco y alcohol como drogas de inicio





Principales drogas ilícitas consumidas durante el primer año de uso de este tipo de sustancias



Los hombres inician con mayor frecuencia el consumo de drogas ilegales con cannabis y cocaína, mientras que las mujeres lo hacen con cannabis e inhalables

Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de sustancias y el ingreso a tratamiento en CIJ. La media de tiempo transcurrido entre el inicio del uso de sustancias y la solicitud de tratamiento, cuando se trata de tabaco es de 9.3 años ($\sigma=9.7$ años), cuando se trata del uso de alcohol es de 9.2 años ($\sigma=9.5$ años) y en el caso del consumo de drogas ilícitas de 6.9 años ($\sigma=8.6$ años). Cabe señalar que más del 40% de los usuarios de tabaco, alcohol y drogas ilícitas dejó pasar entre uno y cinco años antes de acudir a solicitar tratamiento.


Figura 12. Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de sustancias y el ingreso a tratamiento en CIJ según sexo

	 Años			 Años		
	Tabaco	Alcohol	Drogas ilícitas	Tabaco	Alcohol	Drogas ilícitas
Promedio	9.7	9.7	7.5	7.4	7.1	4.5
Desviación estándar	9.8	9.6	8.8	9.2	8.8	7.1
Mediana	6	6	4	3	3	2
Moda	1	1	< 1	1	1	< 1

Los hombres dejaron pasar más tiempo que las mujeres para solicitar tratamiento

Tipo de consumo de drogas ilícitas. 50.1% de los casos fue diagnosticado con consumo funcional; 18.0%, con consumo disfuncional; 14.3%, con consumo social u ocasional; 12.5%, con consumo experimental y 5.2%, en remisión.

Figura 13. Tipo de consumo de drogas ilícitas según sexo




Las mujeres presentan patrones de consumo menos graves que los hombres

Total de drogas consumidas. El promedio de sustancias utilizadas alguna vez en la vida, incluyendo alcohol y tabaco, fue de 4.1 drogas (94.2% reportó el uso de dos o más sustancias); en el último año fue de 3.1 drogas (84.3% consumió dos o más sustancias)

y en los últimos 30 días fue de 2.1 drogas (64.4% reportó haber utilizado dos o más sustancias).

En cuanto al promedio de sustancias utilizadas, sin incluir alcohol y tabaco, alguna vez en la vida fue de 2.4 drogas (68.1 % reportó el uso de dos o más sustancias); en el último año fue de 1.6 drogas (38.4% consumió dos o más sustancias) y en los últimos 30 días fue de una droga (18.3% reportó haber utilizado dos o más sustancias).

Figura 14. Total de drogas consumidas según sexo



Las mujeres consumen menos drogas que los hombres


Consumo de drogas alguna vez en la vida.⁶ Las proporciones de consumo alguna vez en la vida de los diez grupos de sustancias fueron: alcohol, 86.8%; tabaco, 81.2%; cannabis, 72.4% (72.2% considerando únicamente marihuana); inhalables, 44.2%; cocaína, 45.4%; estimulantes, 17.6%; depresores, 14.7%; drogas alucinógenas y disociativas, 8.8%; opiáceos, 4.7% y otras sustancias de abuso, 2.7%.

En cuanto al uso de sustancias específicas (contenidas en alguno de los diez grupos antes mencionados) destaca el uso cocaína en forma de polvo blanco (35.9%), solventes y removedores (30.3%), crack (23.8%), pegamentos (12.2%), metanfetaminas (10.5%) y benzodiacepinas (10.3%). En menor proporción se registró el uso de éxtasis y metanfetaminas alucinógenas (5.8%), LSD (5.1%), plantas alucinógenas y derivados

⁶ Dado que la mayoría de los casos refirió haber utilizado dos o más sustancias —tanto en esta categoría como en las de uso en el último año y en los últimos 30 días, *infra*— la suma de porcentajes no es igual a 100.

(5.0%), esmaltes y pinturas (4.8%), *Rohypnol*[®] (3.7%), heroína (4.0%) y anfetamina (2.6%).

Figura 15. Consumo de drogas alguna vez en la vida según sexo




Las drogas más utilizadas alguna vez en la vida por hombres y mujeres fueron alcohol, tabaco, cannabis e inhalables; las mujeres reportan mayor consumo de inhalables que los hombres

Consumo de drogas en los últimos 12 meses. 96.9% de los casos reportó haber consumido alguna sustancia en el año previo a su ingreso a tratamiento en CIJ.

Las proporciones de consumo de los diez grupos de sustancias consumidas en este lapso fueron: alcohol, 75.7%; tabaco, 70.5%; cannabis, 55.0% (54.9% considerando únicamente marihuana); inhalables, 33.8%; cocaína, 29.3%; estimulantes, 11.1%; depresores, 8.7%; drogas alucinógenas y disociativas, 4.2%; opiáceos, 3.2% y otras sustancias de abuso, 1.4%.

En cuanto al consumo de sustancias específicas contenidas en alguno de los grupos anteriores destaca el uso de solventes y removedores (23.1%), cocaína en polvo blanco (19.3%) y crack (15.9%), seguidas por pegamentos (8.2%), metanfetaminas (6.7%), benzodiacepinas (6.5%), esmaltes y pinturas (3.8%), éxtasis y metanfetaminas alucinógenas (3.6%), heroína (2.8%) y LSD (2.8%).


Figura 16. Consumo de drogas en los últimos 12 meses según sexo



Las drogas más consumidas durante el último año por hombres y mujeres fueron alcohol, tabaco, cannabis e inhalables; las mujeres reportan mayor consumo de inhalables y benzodiacepinas que los hombres

Droga de preferencia en los últimos 12 meses. Entre las sustancias más frecuentemente referidas se encuentran: marihuana (30.6%), alcohol (20.6%), tabaco (13.9%) y solventes y removedores (11.7%). En menor medida se mencionaron: crack (6.7%), cocaína (3.8%) pegamentos (3.1%) y metanfetaminas (2.3%).

Figura 17. Droga de preferencia en los últimos 12 meses según sexo




Durante el último año los hombres prefirieron principalmente la cannabis; las mujeres, los inhalables

Droga de mayor impacto en los últimos 12 meses. Entre las sustancias a cuyo consumo los pacientes atribuyen los mayores daños en la salud, en el bienestar personal y familiar o en el desempeño escolar, laboral o social se señalaron: marihuana


(27.0%), alcohol (17.2%), solventes y removedores (15.5%) y crack (9.7%). En menor proporción se registró: tabaco (7.0%), cocaína (5.5%), pegamentos (4.4%) y metanfetaminas (3.6%).

Figura 18. Droga de mayor impacto en los últimos 12 meses según sexo



Uso combinado de drogas en los últimos 12 meses.⁷ 55.9% de los casos reportó el consumo de dos o más drogas (excluyendo el uso de tabaco) en un mismo día al menos en una ocasión en el transcurso del último año.

Figura 19. Uso combinado de droga en los últimos 12 meses según sexo



Consumo de drogas en los últimos 30 días. 89.2% de los casos reportaron consumo de sustancias en el mes anterior al ingreso a tratamiento.


Las proporciones de consumo de los diez grupos de sustancias consumidas en este lapso fueron: tabaco, 60.8%; alcohol, 54.2%; cannabis, 37.6% (37.5% considerando únicamente marihuana); inhalables, 22.5%; cocaína, 15.7%; estimulantes, 5.2%;

⁷ No se toman en cuenta 3,216 casos (27.4%) que no cumplieron los criterios de inclusión de esta variable; 26.6% de los hombres y 30.5% de las mujeres. (ver anexo).

depresores, 4.4%; opiáceos, 2.2%; drogas alucinógenas y disociativas, 0.9% y otras sustancias de abuso, 0.7%.

En cuanto al consumo de sustancias específicas de estos grupos destaca el uso de solventes/removedores (15.4%), crack (9.1%) y cocaína en polvo blanco (8.1%); en menor proporción se registró el uso de pegamentos (5.0%), benzodiacepinas (3.4%), metanfetaminas (3.3%), esmaltes y pinturas (2.3%) y heroína (2.0%).


Figura 20. Consumo de drogas en los últimos 30 días según sexo



La droga ilícita más utilizada por los hombres en los 30 días previos a la solicitud de tratamiento fue la cannabis; mientras que entre las mujeres fueron los inhalables

Frecuencia de episodios de abuso en los últimos 30 días. 40.9% de quienes reportaron consumo de tabaco en los últimos 30 días aceptó fumar seis o más cigarrillos diariamente. Así también, entre quienes consumieron alcohol una tercera parte (33.4%) reportó consumo abusivo una o dos veces por semana, otra tercera parte (33.3%) abusó del alcohol menos de una vez a la semana. Finalmente, 35.1% de los usuarios de drogas ilícitas durante el último mes reportó consumirlas todos los días, 27.6% menos de una vez a la semana y 22.8% una a dos veces a la semana.

Figura 21. Frecuencia de episodios de abuso en los últimos 30 días según sexo



Los hombres registran con mayor frecuencia episodios de abuso que las mujeres

CUADROS

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS USUARIOS DE DROGAS DE PRIMER INGRESO A TRATAMIENTO EN CIJ EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2010

Cuadro 1. Distribución de casos de primer ingreso a tratamiento por unidad de atención

Unidad de atención	Total de casos	%
Álvaro Obregón Norte	303	2.6
Álvaro Obregón Oriente	15	0.1
Azcapotzalco	265	2.3
Benito Juárez	139	1.2
Coyoacán	174	1.5
-----	-----	-----
Cuajimalpa	73	0.6
Cuauhtémoc Oriente	185	1.6
Cuauhtémoc Poniente	326	2.8
Chalco	190	1.6
Ecatepec	287	2.4
-----	-----	-----
Gustavo A. Madero Aragón	281	2.4
Gustavo A. Madero Norte	223	1.9
Gustavo A. Madero Oriente	56	0.5
Iztapalapa Oriente	585	5.0
Iztapalapa Poniente	222	1.9
-----	-----	-----
Miguel Hidalgo	180	1.5
Naucalpan	184	1.6
Nezahualcóyotl	333	2.8
Tlalnepantla	203	1.7
Tlalpan	198	1.7
-----	-----	-----
Venustiano Carranza	221	1.9
Xochimilco	31	0.3
UH Ecatepec	51	0.4
UH Iztapalapa	110	0.9
Unidad Móvil de tabaco I (PEMEX)	9	0.1
-----	-----	-----
Acapulco	106	0.9
Aguascalientes	92	0.8
Apodaca	44	0.4
Cancún	117	1.0
Cd. del Carmen	21	0.2
-----	-----	-----
Cd. Juárez Norte	91	0.8
Cd. Victoria	19	0.2
Celaya	149	1.3
Chihuahua	193	1.6
Chilpancingo	36	0.3

(Continúa)

Cuadro 1. Distribución de casos de primer ingreso a tratamiento por unidad de atención
(Continuación)

Unidad de atención	Total de casos	%
Colima	131	1.1
Cozumel	83	0.7
Cuernavaca	92	0.8
Culiacán	125	1.1
Culiacán Oriente	2	0.0

Durango	139	1.2
Escuinapa	8	0.1
Fresnillo Pinacoteca	30	0.3
Guadalajara	231	2.0
Guadalajara Sur	90	0.8

Guadalupe	162	1.4
Guamúchil	43	0.4
Guasave	47	0.4
Hermosillo	236	2.0
Ixtapa Zihuatanejo	37	0.3

La Paz	61	0.5
La Piedad	41	0.3
Laguna Coahuila	134	1.1
Laguna Durango	60	0.5
León	174	1.5

Los Cabos	27	0.2
Los Mochis	53	0.5
Manzanillo	66	0.6
Mazatlán	92	0.8
Mérida	101	0.9

Mexicali	143	1.2
Monterrey	171	1.5
Morelia	41	0.3
Nogales	65	0.6
Oaxaca	72	0.6

Pachuca	162	1.4
Playa del Carmen	10	0.1
Poza Rica	41	0.3
Puebla	180	1.5
Puerto Vallarta	99	0.8

(Continúa)

Cuadro 1. Distribución de casos de primer ingreso a tratamiento por unidad de atención
(Continuación)

Unidad de atención	Total de casos	%
Querétaro	112	1.0
Salamanca	63	0.5
Saltillo	156	1.3
San Luis Potosí	150	1.3
San Nicolás de los Garza	114	1.0

Tampico	87	0.7
Tapachula	18	0.2
Tecomán	47	0.4
Tehuacán	15	0.1
Tepic	51	0.4

Texcoco	99	0.8
Tijuana Guaycura	168	1.4
Tijuana Soler	177	1.5
Tlaquepaque	165	1.4
Toluca	189	1.6

Tuxtla Gutiérrez	73	0.6
Villahermosa	41	0.3
Xalapa	81	0.7
Zacatecas	86	0.7
Zamora	86	0.7

Zapopan Norte	208	1.8
UH Culiacán	54	0.5
UH Ixbalanqué	19	0.2
UH Jerez	53	0.5
UH Monterrey	63	0.5

UH Punta Diamante	80	0.7
UH Tijuana	89	0.8
UH Zapopan	76	0.6
UH Zapotlán el Grande	29	0.2
UTPPCH Cd. Juárez	148	1.3
Total	11,758	100.0

UH=Unidad de Hospitalización

UTPPCH=Unidad de Tratamiento a Personas con Problemas de Consumo de Heroína

Cuadro 2. Sexo

	Frec.	%	Razón H:M
Hombres	9,592	81.6	4.4:1
Mujeres	2,166	18.4	
Total	11,758	100.0	100.0

Cuadro 3. Persona que proporciona la información

	Nacional		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Usuario de drogas	5,750	48.9	4,766	49.7	984	45.4
Usuario de drogas y familiares u otras personas	6,008	51.1	4,826	50.3	1,182	54.6
Total	11,758	100.0	9,592	100.0	2,166	100.0

Cuadro 4. Edad de ingreso a tratamiento

	Nacional*			Hombres**			Mujeres***		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Hasta 9 años	2	0.0	0.0	2	0.0	0.0	0	0.0	0.0
10 a 14 años	1,668	14.2	14.3	1,164	12.1	12.2	504	23.3	23.3
15 a 19 años	4,288	36.5	36.6	3,421	35.7	35.9	867	40.0	40.2
20 a 24 años	1,686	14.3	14.4	1,437	15.0	15.1	249	11.5	11.5
25 a 29 años	1,266	10.8	10.8	1,112	11.6	11.7	154	7.1	7.1
30 a 34 años	992	8.4	8.5	879	9.2	9.2	113	5.2	5.2
35 a 39 años	727	6.2	6.2	650	6.8	6.8	77	3.6	3.6
40 a 44 años	500	4.3	4.3	418	4.4	4.4	82	3.8	3.8
45 años y más	571	4.9	4.9	458	4.8	4.8	113	5.2	5.2
<i>Sin información</i>	58	0.5	<i>Se omite</i>	51	0.5	<i>Se omite</i>	7	0.3	<i>Se omite</i>
Total	11,758	100.0	100.0	9,592	100.0	100.0	2,166	100.0	100.0

* $\mu = 23.4$; $\sigma = 10.2$; Med.=19; Mo.=15; Decil1 =14

** $\mu = 23.8$; $\sigma = 10.2$; Med.=20; Mo.=15; Decil1 =14

*** $\mu = 21.4$; $\sigma = 10.3$; Med.=17; Mo.=14; Decil1 =14

Cuadro 5. Estado civil

	Nacional			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Soltero	8,066	68.6	70.7	6,454	67.3	69.4	1,612	74.4	76.3
Casado	1,260	10.7	11.0	1,133	11.8	12.2	127	5.9	6.0
Unión libre	1,182	10.1	10.4	986	10.3	10.6	196	9.0	9.3
Separado	715	6.1	6.3	586	6.1	6.3	129	6.0	6.1
Divorciado	155	1.3	1.4	122	1.3	1.3	33	1.5	1.6
Viudo	36	0.3	0.3	20	0.2	0.2	16	0.7	0.8
<i>Sin información</i>	344	2.9	<i>Se omite</i>	291	3.0	<i>Se omite</i>	53	2.4	<i>Se omite</i>
Total	11,758	100.0	100.0	9,592	100.0	100.0	2,166	100.0	100.0

Cuadro 6. Escolaridad

	Nacional			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Ninguna (no sabe leer ni escribir)	41	0.3	0.4	33	0.3	0.3	8	0.4	0.4
Ninguna (sabe leer y escribir)	34	0.3	0.3	28	0.3	0.3	6	0.3	0.3
Primaria incompleta	499	4.2	4.3	430	4.5	4.5	69	3.2	3.2
Primaria completa	942	8.0	8.1	805	8.4	8.5	137	6.3	6.4
Secundaria incompleta	3,082	26.2	26.4	2,385	24.9	25.1	697	32.2	32.6
Secundaria completa	2,497	21.2	21.4	2,145	22.4	22.5	352	16.3	16.5
Estudios técnicos o comerciales incompletos	193	1.6	1.7	148	1.5	1.6	45	2.1	2.1
Estudios técnicos o comerciales completos	165	1.4	1.4	115	1.2	1.2	50	2.3	2.3
Bachillerato incompleto	2,270	19.3	19.5	1,861	19.4	19.5	409	18.9	19.1
Bachillerato completo	1,041	8.9	8.9	845	8.8	8.9	196	9.0	9.2
Estudios superiores incompletos	517	4.4	4.4	424	4.4	4.5	93	4.3	4.3
Estudios superiores completos	356	3.0	3.1	289	3.0	3.0	67	3.1	3.1
Estudios de posgrado incompletos	9	0.1	0.1	5	0.1	0.1	4	0.2	0.2
Estudios de posgrado completos	12	0.1	0.1	7	0.1	0.1	5	0.2	0.2
Sin información	100	0.9	Se omite	72	0.8	Se omite	28	1.3	Se omite
Total	11,758	100.0	100.0	9,592	100.0	100.0	2,166	100.0	100.0

Cuadro 7. Ocupación

	Nacional			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Desempleado/desocupado	2,948	25.1	25.2	2,517	26.2	26.4	431	19.9	20.0
Hogar	370	3.1	3.2	91	0.9	1.0	279	12.9	12.9
Estudia	3,770	32.1	32.3	2,792	29.1	29.3	978	45.2	45.4
Estudia y trabaja	489	4.2	4.2	417	4.3	4.4	72	3.3	3.3
Trabaja	4,084	34.7	34.9	3,700	38.6	38.8	384	17.7	17.8
Pensionado	27	0.2	0.2	15	0.2	0.2	12	0.6	0.6
Sin información	70	0.6	Se omite	60	0.6	Se omite	10	0.5	Se omite
Total	11,758	100.0	100.0	9,592	100.0	100.0	2,166	100.0	100.0

Cuadro 8. Estrato social

	Nacional			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Alto	80	0.7	0.7	64	0.7	0.7	16	0.7	0.8
Medio alto	1,327	11.3	11.6	1,082	11.3	11.6	245	11.3	11.6
Medio bajo	7,080	60.2	62.0	5,734	59.8	61.6	1,346	62.1	64.0
Bajo	2,791	23.7	24.4	2,319	24.2	24.9	472	21.8	22.4
Pobreza extrema o marginación	140	1.2	1.2	115	1.2	1.2	25	1.2	1.2
<i>Sin información</i>	340	2.9	<i>Se omite</i>	278	2.9	<i>Se omite</i>	62	2.9	<i>Se omite</i>
Total	11,758	100.0	100.0	9,592	100.0	100.0	2,166	100.0	100.0

FACTORES ASOCIADOS A LA DEMANDA DE TRATAMIENTO EN PACIENTES DE PRIMER INGRESO A TRATAMIENTO EN CIJ EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2010

Cuadro 9. Motivos de consulta

	Nacional		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Consumo de drogas ilícitas	9,948	84.6	8,192	85.4	1,756	81.1
Consumo de bebidas alcohólicas	4,618	39.3	3,774	39.3	844	39.0
Consumo de tabaco	3,881	33.0	3,126	32.6	755	34.9
Otro motivo	189	1.6	152	1.6	37	1.7
<i>Ningún motivo específico reportado</i>	248	2.1	190	2.0	58	2.7
<i>Usuarios que reportaron dos o más motivos de consulta</i>	4,652	39.6	3,798	39.5	854	39.4

Cuadro 10. Condicionantes de la solicitud de tratamiento

	Nacional		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Por propia iniciativa	4,632	39.4	3,755	39.1	877	40.5
Por condicionamiento o recomendación familiar	4,185	35.6	3,404	35.5	781	36.1
Por recomendación de pares	265	2.3	196	2.0	69	3.2
Por condicionamiento o recomendación escolar	1,854	15.8	1,371	14.3	483	22.3
Por condicionamiento legal	1,618	13.8	1,464	15.3	154	7.1
Por condicionamiento o recomendación laboral	244	2.1	234	2.4	10	0.5
Por indicación médica	366	3.1	290	3.0	76	3.5
Otros condicionante de solicitud de tratamiento	181	1.5	149	1.6	32	1.5
<i>Ningún condicionante reportado</i>	157	1.3	126	1.3	31	1.4
<i>Pacientes que reportaron dos o más condicionantes de la solicitud de tratamiento</i>	1,604	13.7	1,291	13.5	313	14.5

Cuadro 11. Antecedentes de acciones contra el consumo de sustancias

	Nacional		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Juramento	709	6.0	631	6.6	78	3.6
Grupo de autoayuda	1,059	9.0	928	9.7	131	6.0
Internamiento en anexo	1,514	12.9	1,355	14.1	159	7.3
Intervención de emergencia	95	0.8	74	0.8	21	1.0
Programa de mantenimiento	97	0.8	78	0.8	19	0.9
Tratamiento médico no especializado	123	1.0	105	1.1	18	0.8
Tratamiento psiquiátrico o psicoterapéutico ambulatorio	730	6.2	599	6.2	131	6.0
Tratamiento psiquiátrico o psicoterapéutico residencial	278	2.4	221	2.3	57	2.6
Medicina tradicional o alternativa	126	1.1	103	1.1	23	1.1
Intento de interrupción voluntaria del consumo, sin apoyo	2,880	24.5	2,404	25.1	476	22.0
Otras acciones	1,486	12.6	1,172	12.2	314	14.5
<i>Ninguna acción previa reportada</i>	<i>4,432</i>	<i>37.7</i>	<i>3,457</i>	<i>36.0</i>	<i>975</i>	<i>45.0</i>
<i>Pacientes que reportaron dos o más acciones contra el consumo de sustancias antes de solicitar tratamiento en CIJ</i>	<i>1,243</i>	<i>10.6</i>	<i>1,074</i>	<i>11.2</i>	<i>169</i>	<i>7.8</i>

Cuadro 12. Problemas asociados al consumo de sustancias

	Nacional		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Problemas de salud	4,259	36.2	3,490	36.4	769	35.5
Accidentes o lesiones	1,608	13.7	1,369	14.3	239	11.0
Problemas familiares	8,948	76.1	7,286	76.0	1,662	76.7
Problemas escolares	4,141	35.2	3,190	33.3	951	43.9
Problemas laborales	2,739	23.3	2,476	25.8	263	12.1
Problemas psicológicos	4,314	36.7	3,445	35.9	869	40.1
Problemas legales	3,143	26.7	2,855	29.8	288	13.3
Conducta antisocial o delictiva	2,019	17.2	1,812	18.9	207	9.6
Otros problemas	442	3.8	370	3.9	72	3.3
<i>Ningún problema asociado reportado</i>	<i>390</i>	<i>3.3</i>	<i>310</i>	<i>3.2</i>	<i>80</i>	<i>3.7</i>
<i>Pacientes que reportaron dos o más problemas asociados</i>	<i>8,781</i>	<i>74.8</i>	<i>7,203</i>	<i>75.1</i>	<i>1,578</i>	<i>72.8</i>

**CARACTERÍSTICAS DEL CONSUMO DE DROGAS EN PACIENTES DE PRIMER INGRESO A
TRATAMIENTO EN CIJ EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2010**

Cuadro 13. Edad de inicio del consumo de Tabaco

	Nacional*			Hombres**			Mujeres***		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Hasta 9 años	374	3.2	3.9	321	3.3	4.1	53	2.4	3.1
10 a 14 años	4,923	41.9	51.7	3,969	41.4	50.7	954	44.0	56.1
15 a 19 años	3,709	31.5	38.9	3,118	32.5	39.9	591	27.3	34.7
20 a 24 años	340	2.9	3.6	283	3.0	3.6	57	2.6	3.3
25 a 29 años	102	0.9	1.1	77	0.8	1.0	25	1.2	1.5
30 a 34 años	38	0.3	0.4	26	0.3	0.3	12	0.6	0.7
35 a 39 años	19	0.2	0.2	12	0.1	0.2	7	0.3	0.4
40 a 44 años	9	0.1	0.1	9	0.1	0.1	0	0.0	0.0
45 años y más	9	0.1	0.1	6	0.1	0.1	3	0.1	0.2
No consumió	2,207	18.8	Se omite	1,748	18.2	Se omite	459	21.2	Se omite
Sin información	28	0.2	Se omite	23	0.2	Se omite	5	0.2	Se omite
Total	11,758	100.0	100.0	9,592	100.0	100.0	2,166	100.0	100.0

* $\mu= 14.5$; $\sigma = 3.5$; Med.=14; Mo.=15; Decil1 =11

** $\mu= 14.5$; $\sigma = 3.5$; Med.=14; Mo.=15; Decil1 =11

*** $\mu= 14.6$; $\sigma = 3.9$; Med.=14; Mo.=13; Decil1 =11

Cuadro 14. Edad de inicio del consumo de Alcohol.

	Nacional*			Hombres**			Mujeres***		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Hasta 9 años	344	2.9	3.4	290	3.0	3.5	54	2.5	3.0
10 a 14 años	4,669	39.7	45.9	3,713	38.7	44.5	956	44.1	52.5
15 a 19 años	4,662	39.6	45.9	3,953	41.2	47.4	709	32.7	38.9
20 a 24 años	350	3.0	3.4	297	3.1	3.6	53	2.4	2.9
25 a 29 años	95	0.8	0.9	70	0.7	0.8	25	1.2	1.4
30 a 34 años	25	0.2	0.2	14	0.1	0.2	11	0.5	0.6
35 a 39 años	13	0.1	0.1	5	0.1	0.1	8	0.4	0.4
40 a 44 años	5	0.0	0.0	2	0.0	0.0	3	0.1	0.2
45 años y más	3	0.0	0.0	1	0.0	0.0	2	0.1	0.1
No consumió	1,553	13.2	Se omite	1,216	12.7	Se omite	337	15.6	Se omite
Sin información	39	0.3	Se omite	31	0.3	Se omite	8	0.4	Se omite
Total	11,758	100.0	100.0	9,592	100.0	100.0	2,166	100.0	100.0

* $\mu= 14.7$; $\sigma = 3.2$; Med.=15; Mo.=15; Decil1 =12

** $\mu= 14.7$; $\sigma = 3.0$; Med.=15; Mo.=15; Decil1 =12

*** $\mu= 14.7$; $\sigma = 3.8$; Med.=14; Mo.=13; Decil1 =12

Cuadro 15. Edad de inicio del consumo de Drogas ilícitas.

	Nacional*			Hombres**			Mujeres***		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Hasta 9 años	109	0.9	0.9	107	1.1	1.1	2	0.1	0.1
10 a 14 años	4,417	37.6	37.7	3,478	36.3	36.3	939	43.4	43.5
15 a 19 años	5,537	47.1	47.2	4,654	48.5	48.6	883	40.8	40.9
20 a 24 años	889	7.6	7.6	748	7.8	7.8	141	6.5	6.5
25 a 29 años	356	3.0	3.0	285	3.0	3.0	71	3.3	3.3
30 a 34 años	191	1.6	1.6	151	1.6	1.6	40	1.8	1.9
35 a 39 años	104	0.9	0.9	65	0.7	0.7	39	1.8	1.8
40 a 44 años	64	0.5	0.5	49	0.5	0.5	15	0.7	0.7
45 años y más	61	0.5	0.5	32	0.3	0.3	29	1.3	1.3
<i>Sin información</i>	30	0.3	<i>Se omite</i>	23	0.2	<i>Se omite</i>	7	0.3	<i>Se omite</i>
Total	11,758	100.0	100.0	9,592	100.0	100.0	2,166	100.0	100.0

* $\mu = 16.5$; $\sigma = 5.2$; Med.=15; Mo.=14; Decil1 =13

** $\mu = 16.4$; $\sigma = 4.9$; Med.=15; Mo.=15; Decil1 =13

*** $\mu = 16.9$; $\sigma = 6.5$; Med.=15; Mo.=14; Decil1 =13

Cuadro 16. Drogas utilizadas durante el primer año de consumo

	Nacional		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Tabaco	6,585	56.0	5,392	56.2	1,193	55.1
Alcohol	6,364	54.1	5,134	53.5	1,230	56.8
Cannabis	2,478	21.1	2,157	22.5	321	14.8
Mariguana	2,471	21.0	2,150	22.4	321	14.8
Hachís	15	0.1	13	0.1	2	0.1
Cocaína	531	4.5	433	4.5	98	4.5
Polvo blanco	367	3.1	294	3.1	73	3.4
Crack	198	1.7	166	1.7	32	1.5
Otra presentación	5	0.0	4	0.0	1	0.0
Inhalables	1,791	15.2	1,330	13.9	461	21.3
Solventes o removedores	1,221	10.4	906	9.4	315	14.5
Pegamentos	390	3.3	285	3.0	105	4.8
Esmaltes o pinturas	193	1.6	149	1.6	44	2.0
Otros	81	0.7	62	0.6	19	0.9
Depresores	174	1.5	103	1.1	71	3.3
Benzodiacepinas	126	1.1	69	0.7	57	2.6
Rohypnol®	31	0.3	27	0.3	4	0.2
Otros	25	0.2	13	0.1	12	0.6
Estimulantes	29	0.2	24	0.3	5	0.2
Anfetamina	29	0.2	24	0.3	5	0.2
Metanfetaminas	66	0.6	50	0.5	16	0.7
Éxtasis (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas	36	0.3	25	0.3	11	0.5
Otros	13	0.1	8	0.1	5	0.2
Drogas alucinógenas y disociativas	29	0.2	22	0.2	7	0.3
LSD	11	0.1	8	0.1	3	0.1
Plantas alucinógenas y derivados	17	0.1	13	0.1	4	0.2
Otras	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Opiáceos	32	0.3	24	0.3	8	0.4
Heroína	26	0.2	21	0.2	5	0.2
Opiáceos Sintéticos	2	0.0	1	0.0	1	0.0
Opio y otros opiáceos	4	0.0	2	0.0	2	0.1
Otras sustancias de abuso	21	0.2	13	0.1	8	0.4
Con utilidad médica	13	0.1	5	0.1	8	0.4
Otras	8	0.1	8	0.1	0	0.0

Cuadro 17. Drogas ilícitas utilizadas durante el primer año de consumo de este tipo de sustancias

	Nacional		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Cannabis	7,091	60.3	6,067	63.3	1,024	47.3
Mariguana	7,077	60.2	6,055	63.1	1,022	47.2
Hachís	63	0.5	58	0.6	5	0.2
Cocaína	2,376	20.2	1,990	20.7	386	17.8
Polvo blanco	1,804	15.3	1,497	15.6	307	14.2
Crack	773	6.6	664	6.9	109	5.0
Otra presentación	16	0.1	14	0.1	2	0.1
Inhalables	3,628	30.9	2,777	29.0	851	39.3
Solventes o removedores	2,490	21.2	1,905	19.9	585	27.0
Pegamentos	821	7.0	643	6.7	178	8.2
Esmaltes o pinturas	391	3.3	299	3.1	92	4.2
Otros	177	1.5	139	1.4	38	1.8
Depresores	494	4.2	304	3.2	190	8.8
Benzodiazepinas	356	3.0	212	2.2	144	6.6
<i>Rohypnol</i> [®]	77	0.7	64	0.7	13	0.6
Otros	76	0.6	41	0.4	35	1.6
Estimulantes	116	1.0	96	1.0	20	0.9
Anfetamina	116	1.0	96	1.0	20	0.9
Metanfetaminas	254	2.2	178	1.9	76	3.5
Éxtasis (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas	137	1.2	79	0.8	58	2.7
Otros	47	0.4	38	0.4	9	0.4
Drogas alucinógenas y disociativas	124	1.1	103	1.1	21	1.0
LSD	59	0.5	48	0.5	11	0.5
Plantas alucinógenas y derivados	65	0.6	55	0.6	10	0.5
Otras	9	0.1	7	0.1	2	0.1
Opiáceos	73	0.6	57	0.6	16	0.7
Heroína	57	0.5	50	0.5	7	0.3
Opiáceos Sintéticos	11	0.1	5	0.1	6	0.3
Opio y otros opiáceos	6	0.1	3	0.0	3	0.1
Otras sustancias de abuso	77	0.7	51	0.5	26	1.2
Con utilidad médica	31	0.3	13	0.1	18	0.8
Otras	47	0.4	38	0.4	9	0.4

Cuadro 18. Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de Tabaco y el ingreso a tratamiento en CIJ

	Nacional*			Hombres**			Mujeres***		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
< de un año	689	5.9	7.3	517	5.4	6.6	172	7.9	10.1
1 a 5 años	4,121	35.0	43.5	3,241	33.8	41.6	880	40.6	51.8
6 a 10 años	1,523	13.0	16.1	1,288	13.4	16.5	235	10.8	13.8
11 a 15 años	1,048	8.9	11.1	905	9.4	11.6	143	6.6	8.4
16 a 20 años	781	6.6	8.2	689	7.2	8.9	92	4.2	5.4
21 a 25 años	510	4.3	5.4	454	4.7	5.8	56	2.6	3.3
26 o más años	809	6.9	8.5	689	7.2	8.9	120	5.5	7.1
No consumió	2,207	18.8	Se omite	1,748	18.2	Se omite	459	21.2	Se omite
Sin información	70	0.6	Se omite	61	0.6	Se omite	9	0.4	Se omite
Total	11,758	100.0	100.0	9,592	100.0	100.0	2,166	100.0	100.0

* $\mu= 9.3$; $\sigma = 9.7$; Med.=5; Mo.=1; Decil1 =1

** $\mu= 9.7$; $\sigma = 9.8$; Med.=6; Mo.=1; Decil1 =1

*** $\mu= 7.4$; $\sigma = 9.2$; Med.=3; Mo.=1; Decil1 = < un año

Cuadro 19. Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de Alcohol y el ingreso a tratamiento en CIJ

	Nacional*			Hombres**			Mujeres***		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
< de un año	692	5.9	6.8	483	5.0	5.8	209	9.6	11.5
1 a 5 años	4,382	37.3	43.3	3,445	35.9	41.5	937	43.3	51.6
6 a 10 años	1,690	14.4	16.7	1,438	15.0	17.3	252	11.6	13.9
11 a 15 años	1,135	9.7	11.2	979	10.2	11.8	156	7.2	8.6
16 a 20 años	855	7.3	8.4	765	8.0	9.2	90	4.2	5.0
21 a 25 años	586	5.0	5.8	531	5.5	6.4	55	2.5	3.0
26 o más años	783	6.7	7.7	665	6.9	8.0	118	5.4	6.5
No consumió	1,553	13.2	Se omite	1,216	12.7	Se omite	337	15.6	Se omite
Sin información	82	0.7	Se omite	70	0.7	Se omite	12	0.6	Se omite
Total	11,758	100.0	100.0	9,592	100.0	100.0	2,166	100.0	100.0

* $\mu= 9.2$; $\sigma = 9.5$; Med.=5; Mo.=1; Decil1 =1

** $\mu= 9.7$; $\sigma = 9.6$; Med.=6; Mo.=1; Decil1 =1

*** $\mu= 7.1$; $\sigma = 8.8$; Med.=3; Mo.=1; Decil1 = < un año

Cuadro 20. Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de Drogas ilícitas y el ingreso a tratamiento en CIJ

	Nacional*			Hombres**			Mujeres***		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
< de un año	2,293	19.5	19.6	1,676	17.5	17.6	617	28.5	28.7
1 a 5 años	4,861	41.3	41.7	3,834	40.0	40.3	1,027	47.4	47.7
6 a 10 años	1,629	13.9	14.0	1,419	14.8	14.9	210	9.7	9.8
11 a 15 años	1,102	9.4	9.4	987	10.3	10.4	115	5.3	5.3
16 a 20 años	733	6.2	6.3	662	6.9	7.0	71	3.3	3.3
21 a 25 años	467	4.0	4.0	414	4.3	4.3	53	2.4	2.5
26 o más años	586	5.0	5.0	527	5.5	5.5	59	2.7	2.7
<i>Sin información</i>	87	0.7	<i>Se omite</i>	73	0.8	<i>Se omite</i>	14	0.6	<i>Se omite</i>
Total	11,758	100.0	100.0	9,592	100.0	100.0	2,166	100.0	100.0

* $\mu= 6.9$; $\sigma = 8.6$; Med.=3; Mo.= < un año ; Decil1 =< un año
 ** $\mu= 7.5$; $\sigma = 8.8$; Med.=4; Mo.= < un año ; Decil1 =< un año
 *** $\mu= 4.5$; $\sigma = 7.1$; Med.=2; Mo.= < un año ; Decil1 =< un año

Cuadro 21. Tipo de consumo de drogas ilícitas

	Nacional			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Experimental	1,411	12.0	12.5	1,000	10.4	10.8	411	19.0	19.7
Social u ocasional	1,615	13.7	14.3	1,229	12.8	13.3	386	17.8	18.5
Funcional	5,680	48.3	50.1	4,767	49.7	51.5	913	42.2	43.9
Disfuncional	2,042	17.4	18.0	1,754	18.3	19.0	288	13.3	13.8
En remisión	585	5.0	5.2	501	5.2	5.4	84	3.9	4.0
<i>Sin información</i>	425	3.6	<i>Se omite</i>	341	3.6	<i>Se omite</i>	84	3.9	<i>Se omite</i>
Total	11,758	100.0	100.0	9,592	100.0	100.0	2,166	100.0	100.0

**Cuadro 22. Total de drogas consumidas alguna vez en la vida.
(Incluye el consumo de tabaco o alcohol)**

	Nacional*		Hombres**		Mujeres***	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
1 sustancia	680	5.8	502	5.2	178	8.2
2 sustancias	1,234	10.5	961	10.0	273	12.6
3 sustancias	3,613	30.7	2,833	29.5	780	36.0
4 sustancias	2,439	20.7	2,018	21.0	421	19.4
5 sustancias	1,535	13.1	1,303	13.6	232	10.7
6 sustancias	906	7.7	780	8.1	126	5.8
7 sustancias	604	5.1	534	5.6	70	3.2
8 sustancias	339	2.9	299	3.1	40	1.8
9 sustancias	200	1.7	173	1.8	27	1.2
10 sustancias	97	0.8	89	0.9	8	0.4
11-16 sustancias	111	0.9	100	1.1	11	0.5
Total	11,758	100.0	9,592	100.0	2,166	100.0

* $\mu = 4.1$; $\sigma = 2.0$; Med.=4; Mo.=3; Decil1 =2

** $\mu = 4.2$; $\sigma = 2.0$; Med.=4; Mo.=3; Decil1 =2

*** $\mu = 3.7$; $\sigma = 1.8$; Med.=3; Mo.=3; Decil1 =2

**Cuadro 23. Total de drogas ilícitas consumidas alguna vez en la vida
(No incluye el consumo de tabaco o alcohol)**

	Nacional*		Hombres**		Mujeres***	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
1 sustancia	4,921	41.9	3,788	39.5	1,133	52.3
2 sustancias	2,783	23.7	2,301	24.0	482	22.3
3 sustancias	1,646	14.0	1,396	14.6	250	11.5
4 sustancias	979	8.3	843	8.8	136	6.3
5 sustancias	642	5.5	565	5.9	77	3.6
6 sustancias	357	3.0	315	3.3	42	1.9
7 sustancias	214	1.8	189	2.0	25	1.2
8 sustancias	105	0.9	95	1.0	10	0.5
9 sustancias	60	0.5	54	0.6	6	0.3
10 sustancias	24	0.2	20	0.2	4	0.2
11-14 sustancias	27	0.2	26	0.3	1	0.0
Total	11,758	100.0	9,592	100.0	2,166	100.0

* $\mu = 2.4$; $\sigma = 1.8$; Med.=2; Mo.=1; Decil1 =1

** $\mu = 2.5$; $\sigma = 1.8$; Med.=2; Mo.=1; Decil1 =1

*** $\mu = 2.0$; $\sigma = 1.5$; Med.=1; Mo.=1; Decil1 =1

Cuadro 24. Consumo de drogas alguna vez en la vida por sustancia

	Nacional		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Tabaco	9,550	81.2	7,843	81.8	1,707	78.8
Alcohol	10,204	86.8	8,375	87.3	1,829	84.4
Cannabis	8,509	72.4	7,267	75.8	1,242	57.3
Mariguana	8,492	72.2	7,253	75.6	1,239	57.2
Hachís	228	1.9	198	2.1	30	1.4
Cocaína	5,335	45.4	4,627	48.2	708	32.7
Polvo blanco	4,222	35.9	3,635	37.9	587	27.1
Crack	2,795	23.8	2,490	26.0	305	14.1
Otra presentación	70	0.6	57	0.6	13	0.6
Inhalables	5,197	44.2	4,187	43.7	1,010	46.6
Solventes o removedores	3,562	30.3	2,865	29.9	697	32.2
Pegamentos	1,430	12.2	1,194	12.4	236	10.9
Esmaltes o pinturas	569	4.8	453	4.7	116	5.4
Otros	344	2.9	287	3.0	57	2.6
Depresores	1,725	14.7	1,399	14.6	326	15.1
Benzodiacepinas	1,214	10.3	972	10.1	242	11.2
<i>Rohypnol</i> [®]	438	3.7	401	4.2	37	1.7
Otros	240	2.0	180	1.9	60	2.8
Estimulantes	2,072	17.6	1,690	17.6	382	17.6
Anfetamina	311	2.6	256	2.7	55	2.5
Metanfetaminas	1,236	10.5	1,036	10.8	200	9.2
Éxtasis (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas	684	5.8	522	5.4	162	7.5
Otros	118	1.0	100	1.0	18	0.8
Drogas alucinógenas y disociativas	1,037	8.8	896	9.3	141	6.5
LSD	595	5.1	503	5.2	92	4.2
Plantas alucinógenas y derivados	592	5.0	530	5.5	62	2.9
Otras	100	0.9	89	0.9	11	0.5
Opiáceos	551	4.7	473	4.9	78	3.6
Heroína	469	4.0	413	4.3	56	2.6
Opiáceos Sintéticos	64	0.5	45	0.5	19	0.9
Opio y otros opiáceos	72	0.6	58	0.6	14	0.6
Otras sustancias de abuso	269	2.3	191	2.0	78	3.6
Con utilidad médica	110	0.9	68	0.7	42	1.9
Otras	169	1.4	128	1.3	41	1.9

**Cuadro 25. Total de drogas consumidas en el último año
(Incluye el consumo de tabaco o alcohol)**

	Nacional*		Hombres**		Mujeres***	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Ninguna	361	3.1	304	3.2	57	2.6
1 sustancia	1,487	12.6	1,158	12.1	329	15.2
2 sustancias	2,543	21.6	2,038	21.2	505	23.3
3 sustancias	3,640	31.0	2,950	30.8	690	31.9
4 sustancias	1,878	16.0	1,574	16.4	304	14.0
5 sustancias	1,001	8.5	847	8.8	154	7.1
6 sustancias	405	3.4	343	3.6	62	2.9
7 sustancias	218	1.9	184	1.9	34	1.6
8 sustancias	127	1.1	109	1.1	18	0.8
9 sustancias	59	0.5	52	0.5	7	0.3
10 sustancias	20	0.2	16	0.2	4	0.2
11-14 sustancias	19	0.1	17	0.1	2	0.1
Total	11,758	100.0	9,592	100.0	2,166	100.0

* $\mu= 3.1$; $\sigma = 1.7$; Med.=3; Mo.=3; Decil1 =1

** $\mu= 3.1$; $\sigma = 1.7$; Med.=3; Mo.=3; Decil1 =1

*** $\mu= 2.9$; $\sigma = 1.6$; Med.=3; Mo.=3; Decil1 =1

**Cuadro 26. Total de drogas ilícitas consumidas en el último año
(No incluye el consumo de tabaco o alcohol)**

	Nacional*		Hombres**		Mujeres***	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Ninguna	1,576	13.4	1,264	13.2	312	14.4
1 sustancia	5,672	48.2	4,540	47.3	1,132	52.3
2 sustancias	2,361	20.1	1,967	20.5	394	18.2
3 sustancias	1,171	10.0	987	10.3	184	8.5
4 sustancias	493	4.2	419	4.4	74	3.4
5 sustancias	236	2.0	199	2.1	37	1.7
6 sustancias	137	1.2	119	1.2	18	0.8
7 sustancias	70	0.6	61	0.6	9	0.4
8 sustancias	22	0.2	18	0.2	4	0.2
9 sustancias	11	0.1	10	0.1	1	0.0
10 sustancias	3	0.0	2	0.0	1	0.0
11-12 sustancias	6	0.0	63	0.0	0	0.0
Total	11,758	100.0	9,592	100.0	2,166	100.0

* $\mu= 1.6$; $\sigma = 1.3$; Med.=1; Mo.=1; Decil1 =ninguna

** $\mu= 1.6$; $\sigma = 1.4$; Med.=1; Mo.=1; Decil1 =ninguna

*** $\mu= 1.5$; $\sigma = 1.2$; Med.=1; Mo.=1; Decil1 =ninguna

Cuadro 27. Consumo de drogas en los últimos 12 meses por sustancia

	Nacional		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Tabaco	8,290	70.5	6,800	70.9	1,490	68.8
Alcohol	8,904	75.7	7,295	76.1	1,609	74.3
Cannabis	6,466	55.0	5,555	57.9	911	42.1
Mariguana	6,450	54.9	5,542	57.8	908	41.9
Hachís	136	1.2	119	1.2	17	0.8
Cocaína	3,444	29.3	2,984	31.1	460	21.2
Polvo blanco	2,274	19.3	1,933	20.2	341	15.7
Crack	1,868	15.9	1,657	17.3	211	9.7
Otra presentación	40	0.3	32	0.3	8	0.4
Inhalables	3,969	33.8	3,093	32.2	876	40.4
Solventes o removedores	2,711	23.1	2,104	21.9	607	28.0
Pegamentos	964	8.2	774	8.1	190	8.8
Esmaltes o pinturas	451	3.8	353	3.7	98	4.5
Otros	196	1.7	157	1.6	39	1.8
Depresores	1,023	8.7	788	8.2	235	10.8
Benzodiacepinas	768	6.5	582	6.1	186	8.6
Rohypnol®	161	1.4	146	1.5	15	0.7
Otros	141	1.2	101	1.1	40	1.8
Estimulantes	1,307	11.1	1,034	10.8	273	12.6
Anfetamina	167	1.4	137	1.4	30	1.4
Metanfetaminas	792	6.7	644	6.7	148	6.8
Éxtasis (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas	422	3.6	307	3.2	115	5.3
Otros	52	0.4	39	0.4	13	0.6
Drogas alucinógenas y disociativas	494	4.2	414	4.3	80	3.7
LSD	327	2.8	271	2.8	56	2.6
Plantas alucinógenas y derivados	215	1.8	188	2.0	27	1.2
Otras	35	0.3	29	0.3	6	0.3
Opiáceos	377	3.2	319	3.3	58	2.7
Heroína	327	2.8	285	3.0	42	1.9
Opiáceos Sintéticos	41	0.3	31	0.3	10	0.5
Opio y Otros opiáceos	34	0.3	26	0.3	8	0.4
Otras sustancias de abuso	170	1.4	112	1.2	58	2.7
Con utilidad médica	72	0.6	39	0.4	33	1.5
Otras	101	0.9	74	0.8	27	1.2

Cuadro 28. Droga de preferencia en los últimos 12 meses, según menciones

	Nacional			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Tabaco	1,434	12.2	13.9	1,107	11.5	13.1	327	15.1	17.5
Alcohol	2,120	18.0	20.6	1,706	17.8	20.3	414	19.1	22.2
Cannabis	3,145	26.8	30.6	2,853	29.8	33.9	292	13.5	15.7
Mariguana	3,139	26.7	30.5	2,847	29.7	33.8	292	13.5	15.7
Hachís	6	0.1	0.1	6	0.1	0.1	0	0.0	0.0
Cocaína	1,094	9.3	10.5	945	9.8	11.2	149	6.8	8.1
Polvo blanco	396	3.4	3.8	333	3.5	4.0	63	2.9	3.4
Crack	694	5.9	6.7	609	6.3	7.2	85	3.9	4.6
Otra presentación	4	0.0	0.0	3	0.0	0.0	1	0.0	0.1
Inhalables	1,791	15.2	17.4	1,293	13.4	15.4	498	23.1	26.6
Solventes o removedores	1,200	10.2	11.7	858	8.9	10.2	342	15.8	18.3
Pegamentos	320	2.7	3.1	234	2.4	2.8	86	4.0	4.6
Esmaltes o pinturas	163	1.4	1.6	118	1.2	1.4	45	2.1	2.4
Otros	108	0.9	1.0	83	0.9	1.0	25	1.2	1.3
Depresores	131	1.1	1.2	78	0.7	0.9	53	2.4	2.9
Benzodiacepinas	104	0.9	1.0	62	0.6	0.7	42	1.9	2.3
Rohypnol®	4	0.0	0.0	3	0.0	0.0	1	0.0	0.1
Otros	23	0.2	0.2	13	0.1	0.2	10	0.5	0.5
Estimulantes	316	2.7	3.0	224	2.3	2.7	92	4.2	4.9
Anfetamina	25	0.2	0.2	22	0.2	0.3	3	0.1	0.2
Metanfetaminas	233	2.0	2.3	175	1.8	2.1	58	2.7	3.1
Éxtasis (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas	46	0.4	0.4	19	0.2	0.2	27	1.2	1.4
Otros	12	0.1	0.1	8	0.1	0.1	4	0.2	0.2
Drogas alucinógenas y disociativas	22	0.2	0.2	18	0.2	0.2	4	0.1	0.3
LSD	14	0.1	0.1	12	0.1	0.1	2	0.1	0.1
Plantas alucinógenas y derivados	6	0.1	0.1	5	0.1	0.1	1	0.0	0.1
Otras	2	0.0	0.0	1	0.0	0.0	1	0.0	0.1
Opiáceos	217	1.9	2.1	186	1.9	2.2	31	1.4	1.7
Heroína	197	1.7	1.9	173	1.8	2.1	24	1.1	1.3
Opiáceos Sintéticos	13	0.1	0.1	9	0.1	0.1	4	0.2	0.2
Opio y Otros opiáceos	7	0.1	0.1	4	0.0	0.0	3	0.1	0.2
Otras sustancias de abuso	16	0.2	0.2	11	0.1	0.1	5	0.2	0.3
Con utilidad médica	9	0.1	0.1	4	0.0	0.0	5	0.2	0.3
Otras	7	0.1	0.1	7	0.1	0.1	0	0.0	0.0
<i>No aplica</i>	361	3.1	<i>Se omite</i>	304	3.2	<i>Se omite</i>	57	2.6	<i>Se omite</i>
<i>Sin Información</i>	1,111	9.4	<i>Se omite</i>	867	9.0	<i>Se omite</i>	244	11.3	<i>Se omite</i>
Total	11,758	100.0	100.0	9,592	100.0	100.0	2,166	100.0	100.0

Cuadro 29. Droga de mayor impacto en los últimos 12 meses, según menciones

	Nacional			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Tabaco	716	6.1	7.0	562	5.9	6.7	154	7.1	8.3
Alcohol	1,747	14.9	17.2	1,391	14.5	16.7	356	16.4	19.2
Cannabis	2,753	23.5	27.1	2,447	25.5	29.3	306	14.1	16.5
Marihuana	2,747	23.4	27.0	2,443	25.5	29.3	304	14.0	16.4
Hachís	6	0.1	0.1	4	0.0	0.0	2	0.1	0.1
Cocaína	1,544	13.1	15.2	1,350	14.1	16.2	194	9.0	10.5
Polvo blanco	555	4.7	5.5	466	4.9	5.6	89	4.1	4.8
Crack	984	8.4	9.7	881	9.2	10.6	103	4.8	5.6
Otra presentación	5	0.0	0.0	3	0.0	0.0	2	0.1	0.1
Inhalables	2,387	20.3	23.5	1,783	18.6	21.4	604	27.9	32.6
Solventes o removedores	1,579	13.4	15.5	1,182	12.3	14.2	397	18.3	21.4
Pegamentos	444	3.8	4.4	330	3.4	4.0	114	5.3	6.1
Esmaltes o pinturas	223	1.9	2.2	159	1.7	1.9	64	3.0	3.5
Otros	141	1.2	1.4	112	1.2	1.3	29	1.3	1.6
Depresores	217	1.8	2.1	138	1.5	1.6	79	3.6	4.3
Benzodiacepinas	177	1.5	1.7	111	1.2	1.3	66	3.0	3.6
Rohypnol®	11	0.1	0.1	9	0.1	0.1	2	0.1	0.1
Otros	29	0.2	0.3	18	0.2	0.2	11	0.5	0.6
Estimulantes	502	4.2	4.9	391	4.1	4.6	111	5.1	6.0
Anfetamina	38	0.3	0.4	32	0.3	0.4	6	0.3	0.3
Metanfetaminas	366	3.1	3.6	295	3.1	3.5	71	3.3	3.8
Éxtasis (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas	76	0.6	0.7	45	0.5	0.5	31	1.4	1.7
Otros	22	0.2	0.2	19	0.2	0.2	3	0.1	0.2
Drogas alucinógenas y disociativas	64	0.6	0.6	57	0.6	0.6	7	0.3	0.4
LSD	42	0.4	0.4	37	0.4	0.4	5	0.2	0.3
Plantas alucinógenas y derivados	18	0.2	0.2	18	0.2	0.2	0	0.0	0.0
Otras	4	0.0	0.0	2	0.0	0.0	2	0.1	0.1
Opiáceos	229	2.0	2.2	194	2.0	2.3	35	1.5	2.0
Heroína	208	1.8	2.0	181	1.9	2.2	27	1.2	1.5
Opiáceos Sintéticos	14	0.1	0.1	9	0.1	0.1	5	0.2	0.3
Opio y Otros opiáceos	7	0.1	0.1	4	0.0	0.0	3	0.1	0.2
Otras sustancias de abuso	23	0.2	0.2	15	0.2	0.2	8	0.4	0.4
Con utilidad médica	13	0.1	0.1	5	0.1	0.1	8	0.4	0.4
Otras	10	0.1	0.1	10	0.1	0.1	0	0.0	0.0
<i>No aplica</i>	361	3.1	<i>Se omite</i>	304	3.2	<i>Se omite</i>	57	2.6	<i>Se omite</i>
<i>Sin Información</i>	1,215	10.3	<i>Se omite</i>	960	10.0	<i>Se omite</i>	255	11.8	<i>Se omite</i>
Total	11,758	100.0	100.0	9,592	100.0	100.0	2,166	100.0	100.0

**Cuadro 30. Uso combinado de drogas en los últimos 12 meses
(No incluye tabaco)**

	Nacional			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Si combinó drogas	4,777	40.6	55.9	4,087	42.6	58.1	690	31.9	45.8
No combinó drogas	3,765	32.0	44.1	2,950	30.8	41.9	815	37.6	54.2
<i>No aplica</i>	<i>3,216</i>	<i>27.4</i>	<i>Se omite</i>	<i>2,555</i>	<i>26.6</i>	<i>Se omite</i>	<i>661</i>	<i>30.5</i>	<i>Se omite</i>
Total	11,758	100.0	100.0	9,592	100.0	100.0	2,166	100.0	100.0

**Cuadro 31. Total de drogas consumidas en los últimos 30 días
(Incluye el consumo de tabaco o alcohol)**

	Nacional*		Hombres**		Mujeres***	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Ninguna	1,270	10.8	1,005	10.5	265	12.2
1 sustancia	2,918	24.8	2,275	23.7	643	29.7
2 sustancias	3,377	28.7	2,750	28.7	627	28.9
3 sustancias	2,767	23.5	2,331	24.3	436	20.1
4 sustancias	943	8.0	819	8.5	124	5.7
5 sustancias	307	2.6	269	2.8	38	1.8
6 sustancias	104	0.9	84	0.9	20	0.9
7 sustancias	47	0.4	39	0.4	8	0.4
8 sustancias	17	0.1	14	0.1	3	0.1
9 sustancias	6	0.1	5	0.1	1	0.0
10 sustancias	1	0.0	0	0.0	1	0.0
11 sustancias	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Total	11,758	100.0	9,592	100.0	2,166	100.0

* $\mu = 2.1$; $\sigma = 1.3$; Med.=2; Mo.=2; Decil1 =ninguna
 ** $\mu = 2.1$; $\sigma = 1.3$; Med.=2; Mo.=2; Decil1 =ninguna
 *** $\mu = 1.9$; $\sigma = 1.3$; Med.=2; Mo.=1; Decil1 =ninguna

**Cuadro 32. Total de drogas ilícitas consumidas en los últimos 30 días
(No incluye el consumo de tabaco o alcohol)**

	Nacional*		Hombres**		Mujeres***	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Ninguna	3,998	34.0	3,163	33.0	835	38.6
1 sustancia	5,608	47.7	4,589	47.8	1,019	47.0
2 sustancias	1,503	12.8	1,285	13.4	218	10.1
3 sustancias	423	3.6	366	3.8	57	2.6
4 sustancias	142	1.2	120	1.3	22	1.0
5 sustancias	54	0.5	44	0.5	10	0.5
6 sustancias	19	0.2	16	0.2	3	0.1
7 sustancias	9	0.1	8	0.1	1	0.0
8 sustancias	0	0.0	0	0.0	0	0.0
9 sustancias	2	0.0	1	0.0	1	0.0
Total	11,758	100.0	9,592	100.0	2,166	100.0

* $\mu= 0.9$; $\sigma = 0.9$; Med.=1; Mo.=1; Decil1 =ninguna

** $\mu= 1.0$; $\sigma = 0.9$; Med.=1; Mo.=1; Decil1 =ninguna

*** $\mu= 0.9$; $\sigma = 0.9$; Med.=1; Mo.=1; Decil1 =ninguna

Cuadro 33. Consumo de drogas en los últimos 30 días por sustancia

	Nacional		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Tabaco	7,151	60.8	5,927	61.8	1,224	56.5
Alcohol	6,377	54.2	5,289	55.1	1,088	50.2
Cannabis	4,416	37.6	3,922	40.9	494	22.8
Mariguana	4,404	37.5	3,912	40.8	492	22.7
Hachís	56	0.5	51	0.5	5	0.2
Cocaína	1,845	15.7	1,619	16.9	226	10.4
Polvo blanco	948	8.1	805	8.4	143	6.6
Crack	1,072	9.1	961	10.0	111	5.1
Otra presentación	21	0.2	16	0.2	5	0.2
Inhalables	2,646	22.5	2,028	21.1	618	28.5
Solventes o removedores	1,811	15.4	1,380	14.4	431	19.9
Pegamentos	584	5.0	465	4.8	119	5.5
Esmaltes o pinturas	274	2.3	202	2.1	72	3.3
Otros	95	0.8	77	0.8	18	0.8
Depresores	518	4.4	372	3.9	146	6.7
Benzodiacepinas	404	3.4	286	3.0	118	5.4
Rohypnol®	63	0.5	53	0.6	10	0.5
Otros	68	0.6	49	0.5	19	0.9
Estimulantes	613	5.2	462	4.8	151	7.0
Anfetamina	61	0.5	47	0.5	14	0.6
Metanfetaminas	389	3.3	305	3.2	84	3.9
Éxtasis (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas	163	1.4	110	1.1	53	2.4
Otros	27	0.2	19	0.2	8	0.4
Drogas alucinógenas y disociativas	109	0.9	92	1.0	17	0.8
LSD	85	0.7	72	0.8	13	0.6
Plantas alucinógenas y derivados	22	0.2	20	0.2	2	0.1
Otras	10	0.1	6	0.1	4	0.2
Opiáceos	262	2.2	224	2.3	38	1.8
Heroína	230	2.0	202	2.1	28	1.3
Opiáceos Sintéticos	31	0.3	24	0.3	7	0.3
Opio y Otros opiáceos	13	0.1	8	0.1	5	0.2
Otras sustancias de abuso	83	0.7	48	0.5	35	1.6
Con utilidad médica	44	0.4	21	0.2	23	1.1
Otras	41	0.3	27	0.3	14	0.6

Cuadro 34. Frecuencia de episodios de abuso del consumo de Tabaco¹ en los últimos 30 días

	Nacional			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Ni una vez	2,175	18.5	30.9	1,787	18.6	30.6	388	17.9	32.2
< de 1 vez a la semana	764	6.5	10.8	644	6.7	11.0	120	5.5	10.0
1 o 2 veces a la semana	775	6.6	11.0	641	6.7	11.0	134	6.2	11.1
Cada tercer día	451	3.8	6.4	375	3.9	6.4	76	3.5	6.3
Diario	2,881	24.5	40.9	2,395	25.0	41.0	486	22.4	40.4
No consumió en los últimos 30 días	4,607	39.2	Se omite	3,665	38.2	Se omite	942	43.5	Se omite
Sin información	105	0.9	Se omite	85	0.9	Se omite	20	0.9	Se omite
Total	11,758	100.0	100.0	9,592	100.0	100.0	2,166	100.0	100.0

¹ Consumo de seis o más cigarrillos en un solo día.

Cuadro 35. Frecuencia de episodios de abuso del consumo de Alcohol¹ en los últimos 30 días

	Nacional			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Ni una vez	1,111	9.4	17.7	867	9.0	16.7	244	11.3	22.8
< de 1 vez a la semana	2,086	17.7	33.3	1,721	17.9	33.1	365	16.9	34.2
1 o 2 veces a la semana	2,095	17.8	33.4	1,781	18.6	34.2	314	14.5	29.4
Cada tercer día	517	4.4	8.2	432	4.5	8.3	85	3.9	8.0
Diario	461	3.9	7.4	401	4.2	7.7	60	2.8	5.6
No consumió en los últimos 30 días	5,381	45.8	Se omite	4,303	44.9	Se omite	1,078	49.8	Se omite
Sin información	107	0.9	Se omite	87	0.9	Se omite	20	0.9	Se omite
Total	11,758	100.0	100.0	9,592	100.0	100.0	2,166	100.0	100.0

¹ Consumo de más de cuatro copas en un día para los hombres y de más de tres copas en un día para las mujeres.

Cuadro 36. Frecuencia de episodios de abuso del consumo de drogas ilícitas¹ en los últimos 30 días

	Nacional			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
< de 1 vez a la semana	1,684	14.3	27.9	1,283	13.4	25.4	401	18.5	40.3
1 o 2 veces a la semana	1,380	11.7	22.8	1,157	12.1	22.9	223	10.3	22.4
Cada tercer día	855	7.3	14.2	733	7.6	14.5	122	5.6	12.3
Diario	2,121	18.0	35.1	1,872	19.5	37.1	249	11.5	25.0
No consumió en los últimos 30 días	3,998	34.0	Se omite	3,163	33.0	Se omite	835	38.6	Se omite
Sin información	1,720	14.6	Se omite	1,384	14.4	Se omite	336	15.5	Se omite
Total	11,758	100.0	100.0	9,592	100.0	100.0	2,166	100.0	100.0

¹ Consumo de cualquier dosis.

GLOSARIO

A continuación se definen algunas de las variables de estudio:

Drogas utilizadas durante el primer año de consumo: Sustancias que el usuario refirió haber utilizado a la misma edad reportada como edad de inicio del consumo. Incluye el uso de tabaco, alcohol, cannabis. etc.

Drogas ilícitas utilizadas durante el primer año de consumo ilícito: Drogas ilegales que el usuario refirió haber utilizado a la misma edad reportada como edad de inicio del consumo de este tipo de sustancias. Excluye el uso de tabaco y alcohol.

Droga de mayor impacto en los últimos 12 meses: Sustancia que el propio usuario de drogas solicitante de tratamiento refiere como la que más problemas le ha ocasionado en los ámbitos de salud, personal, familiar, escolar, laboral o social, en el transcurso del último año.

Droga de preferencia en los últimos 12 meses: Sustancia que el propio usuario solicitante de tratamiento ha elegido o preferido consumir en el transcurso del último año.

Estrato social: Estimación que hace el terapeuta, según su percepción, del estrato al que pertenece el usuario de drogas, considerando aspectos como lugar de residencia, escolaridad, empleo y características manifiestas como higiene y aliño, calidad del vestido, expresión verbal y vocabulario, etc.

Tipo de consumo de drogas ilícitas: Características de consumo de sustancias ilegales según motivo, frecuencia y problemas asociados. No incluye el uso de alcohol y/o tabaco y se clasifica como: experimental, social u ocasional, funcional, disfuncional y en remisión.

Total de drogas consumidas: Número de drogas consumidas (se incluyen las 26 sustancias de seguimiento) en las siguientes categorías: alguna vez en la vida, en el último año y en los últimos 30 días.

Uso combinado de drogas en los últimos 12 meses: Consumo de dos o más sustancias (incluyendo alcohol y cualquier droga ilícita o de uso médico, utilizada sin prescripción, pero excluyendo tabaco) en el transcurso de un mismo día, en el año previo a la solicitud de tratamiento en CIJ.