
**CONSUMO DE DROGAS EN PACIENTES DE PRIMER INGRESO A
TRATAMIENTO EN CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL.
ENERO - JUNIO, 2011**

DATOS A NIVEL NACIONAL Y POR SEXO

Marina Velázquez Altamirano
Alma Delia Gutiérrez López
Luis Daniel Nute Méndez

Centros de Integración Juvenil
Dirección de Investigación y Enseñanza
Subdirección de Investigación
Depto. de Investigación Clínica y Epidemiológica
México, 2012

Informe de Investigación 12-02a

DIRECTORIO

PRESIDENTE HONORARIO VITALICIO

Dr. Jesús Kumate Rodríguez

PRESIDENTE DEL PATRONATO NACIONAL

Dr. Julio Sotelo Morales

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA

Sra. Kena Moreno

DIRECTORA GENERAL

Lic. Carmen Fernández Cáceres

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN

Encargado Provisional

Lic. Iván Rubén Retiz Márquez

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE OPERACIÓN Y PATRONATOS

Dr. José Ángel Prado García

DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA

Dr. Ricardo Sánchez Huesca

SUBDIRECTOR DE INVESTIGACIÓN

Mtro. David Bruno Díaz Negrete

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	4
MÉTODO.....	4
CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS.....	6
FACTORES ASOCIADOS A LA DEMANDA DE TRATAMIENTO.....	8
CONSUMO DE DROGAS.....	11
CUADROS.....	20
GLOSARIO.....	44

RESUMEN

El presente informe se realizó con base en registros clínicos de la entrevista inicial de 12,367 usuarios de sustancias psicoactivas que reportaron el consumo de al menos una droga ilícita y que acudieron por primera vez a tratamiento a Centros de Integración Juvenil entre Enero y Junio de 2011. Con este estudio se busca actualizar información sobre el perfil sociodemográfico de los usuarios, los factores asociados a la demanda de tratamiento y el patrón de consumo de sustancias psicoactivas, así como contribuir con elementos útiles para retroalimentar la planeación, diseño y ajuste de los servicios institucionales de prevención y tratamiento del consumo de drogas.

Los datos permitieron observar una mayor proporción de hombres que demandan tratamiento, con una razón de 4.3 hombres por cada mujer. La edad media de ingreso a tratamiento fue de 22.6 años, En promedio, los hombres ingresan a tratamiento a una edad mayor que las mujeres (23.2 años hombres; 20.4 años mujeres). La edad promedio del inicio del consumo de tabaco se situó en general en los 14.3 años, la de alcohol en 14.5 años y la de drogas ilícitas en 16.1 años. En promedio, tanto los hombres como las mujeres inician el consumo de estas drogas a la misma edad (tabaco: hombres 14.3 años y mujeres 14.4 años; alcohol: hombres 14.5 años, mujeres 14.4 años; drogas ilícitas: hombres 16.1 años y mujeres 16.3 años).

Las drogas de mayor consumo alguna vez en la vida fueron alcohol (88.8%), tabaco (85.0%), marihuana (76.6%), inhalables (45.1%), cocaína/crack (44.3%), benzodiazepinas (14.4%) y metanfetaminas (11.3%). En cuanto al consumo en el mes previo al ingreso a tratamiento, las sustancias más utilizadas fueron tabaco (63.1%), alcohol (56.6%), marihuana (39.8%), inhalables (21.4%) y cocaína/crack (15.4%). Las sustancias de mayor impacto fueron marihuana (30.5%), alcohol (16.6%), inhalables (21.5%) y cocaína/crack (13.6%).

En cuanto a los factores asociados a la demanda de tratamiento se observó que los usuarios de drogas acudieron principalmente condicionamiento o recomendación familiar (41.6%) o por iniciativa propia (39.2%); que buscan atención por el consumo de drogas ilícitas (84.2%), alcohol (41.4%) y/o tabaco (36.6%); que no han tomado ninguna medida contra el problema (29.7%) o que han intentado interrumpir de manera voluntaria y sin apoyo el consumo (28.8%); y que entre los problemas más frecuentemente asociados al consumo se reconocen los de tipo familiar (77.6%), los de salud (38.3%), los escolares (36.9%) y los psicológicos (36.0%).

Cabe destacar que se observan diferencias entre los hombres y mujeres atendidos en Centros de Integración Juvenil, en cuanto a sus características sociodemográficas, los factores asociados a la demanda de tratamiento y su patrón de consumo.

INTRODUCCIÓN

El presente informe se elabora a partir de la información obtenida mediante el Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas (SIECD) de Centros de Integración Juvenil (CIJ), cuyo objetivo es proporcionar datos actualizados de las características sociodemográficas, de los factores asociados a la demanda de tratamiento y del patrón de consumo de sustancias de la población usuaria de los servicios de tratamiento institucionales, para apoyar el diseño, planeación y ajuste de los programas institucionales de prevención y atención curativa-rehabilitatoria.

El SIECD es producto de más de veinte años de trabajo, a lo largo de los cuales se ha logrado consolidar el seguimiento sistemático y oportuno de datos que, más allá de su aplicación en la toma de decisiones para el diseño y ajuste de servicios, ha contribuido de manera significativa al conocimiento de la forma y tendencias del uso de drogas en nuestro país, al proporcionar referentes identificados en centros de tratamiento, además de ser una estrategia documental complementaria a los estudios y encuestas poblacionales.

MÉTODO

Diseño de estudio: Censo, estudio transversal, descriptivo, *ex post facto*.

Población: 12,367 usuarios de sustancias psicoactivas que reportaron el consumo intencional de al menos una droga ilegal, que acudieron por primera vez a solicitar tratamiento en CIJ entre Enero y Junio de 2011 en alguna de las unidades de atención curativa de CIJ (ver Cuadro 1) y que proporcionaron personalmente la información.¹

Fuente de información: Entrevista Inicial (en alguno de los dos formatos utilizados durante el periodo que comprende el estudio y que forman parte del expediente clínico), aplicada en la primera consulta por parte de los terapeutas responsables del ingreso de pacientes a tratamiento.

Variables de estudio: Las características sociodemográficas estudiadas comprenden: persona que proporciona la información, sexo, edad de ingreso a tratamiento, estado civil, escolaridad, ocupación y estrato social. Las variables de los factores asociados a la demanda de tratamiento: motivo(s) de consulta, condicionante(s) de la solicitud de tratamiento, antecedente(s) de acciones asumidas frente al uso de sustancias y problema(s) asociado(s) al mismo. Y las variables de patrón de consumo: edad de inicio, tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de sustancias y el ingreso a tratamiento, consumo alguna vez en la vida, en el último año y en los últimos 30 días; drogas de

¹ No se incluyen casos de pacientes que habían sido entrevistados en CIJ anteriormente, donde la información fue proporcionada por familiares del usuario, así como los registros que fueron enviados de manera extemporánea a la Subdirección de Investigación de CIJ.

preferencia y de mayor impacto en el último año, uso combinado de sustancias, tipo de consumo de drogas ilícitas, episodios de abuso y total de drogas consumidas.

Es importante señalar que en el caso de la información que se presenta en la sección *Factores Asociados a la Demanda del Tratamiento*, los datos corresponden a los registrados en la entrevista inicial en formato de papel debido a que no se cuenta con dicha información en el formato de entrevista inicial del expediente clínico electrónico.

La información sobre el consumo de drogas se presenta categorizada en diez grupos de sustancias: tabaco, alcohol, cannabis, cocaína, inhalables, depresores, estimulantes, drogas alucinógenas y disociativas, opiáceos y otras sustancias de abuso.

Sin embargo, también se desagregan los diez grupos antes mencionados en 26 categorías de sustancias: tabaco; alcohol; marihuana y hachís; cocaína en presentación de polvo blanco, crack y otras presentaciones de cocaína; solventes y removedores, pegamentos, esmaltes y pinturas y otros inhalables; benzodiacepinas, *Rohypnol*[®] y otros depresores; anfetaminas, metanfetaminas (*crystal, ICE, etc.*), MDMA (éxtasis) y metanfetaminas alucinógenas y otros estimulantes; LSD, plantas alucinógenas y derivados y otras drogas alucinógenas y disociativas; heroína, opiáceos sintéticos, y opio y opioides; sustancias con utilidad médica y otras sustancias de abuso.

Procesamiento de datos. La información obtenida a través del formato físico de Entrevista Inicial fue capturada por integrantes del equipo de la Dirección de Planeación de CIJ, por capturistas externos y de servicio social, mediante el programa *Control de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas* (CIECD) desarrollado por la Subdirección de Investigación y el Departamento de Sistemas de CIJ. La validación y procesamiento de datos se realizó en el Departamento de Investigación Clínica y Epidemiológica con base en una muestra aleatoria de casos correspondientes al periodo de estudio, con un nivel de confianza de 95% y de error de 5%. La información obtenida a través del expediente clínico electrónico fue capturada por los terapeutas responsables de realizar la entrevista inicial. Para el procesamiento estadístico se utilizó el programa SPSS v. 15.

Los resultados se presentan tanto en forma general como desglosada por sexo y en porcentajes válidos, excluyendo casos “sin información” así como a aquellos que no cumplieron con las condiciones requeridas para el análisis en cada variable de estudio.

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS²

Sexo. Los hombres representaron al 81.3% de los casos y las mujeres al 18.7%, lo que corresponde a una razón de 4.3 hombres por cada mujer.

Persona que proporciona la información. 44.8% de los casos acudió sólo (45.8% de los hombres y 40.3% de las mujeres), mientras que 55.2% lo hizo en compañía de familiares u otras personas (54.2% de los hombres y 59.7% de las mujeres).

Edad de ingreso a tratamiento. La edad promedio se situó en 22.6 años ($\sigma=10.0$ años); la mediana en 18 años y la moda en 15 años. Poco más de la tercera parte de los de los casos (38.9%) ingresó entre los 15 y 19 años de edad.


Figura 1. Edad de ingreso según sexo

	Años	Años
Promedio	23.2	20.4
Desviación estándar	10.0	9.5
Mediana	19	17
Moda	15	14

Los hombres ingresan a tratamiento a mayor edad


Estado civil. 71.3% dijo ser soltero, 11.0% vivía en unión libre y 10.2% era casado.

Figura 2. Estado civil según sexo




² Cfr., Cuadros 1 a 8.

Escolaridad. 49.4% cursaba o había cursado algún grado de educación secundaria; 28.9%, al menos algún grado de bachillerato; 11.2%, al menos un año de educación primaria y 7.2%, uno o más años de estudios superiores.




Ocupación. 33.8% desempeñaba alguna actividad laboral, 33.5% estudiaba y 24.5% estaba desempleado.




Mientras que un mayor porcentaje de mujeres se dedica a estudiar o a las labores del hogar; una mayor proporción de hombres trabaja o no cuenta con ocupación alguna

Estrato social. Según la percepción de los terapeutas, 62.1% de los pacientes corresponden al estrato medio bajo; 25.7%, al estrato bajo y 10.7%, al estrato medio alto.



FACTORES ASOCIADOS A LA DEMANDA DE TRATAMIENTO³

Motivos de consulta. 42.3% de los casos reportó más de un motivo para acudir a tratamiento (uso de alcohol, tabaco o drogas), mientras que 1.7% de los casos no expresó ninguno. Conviene señalar que 84.2% acudió por consumo de drogas ilícitas; mientras que 41.4%, por el uso de bebidas alcohólicas y 36.6% por el uso de tabaco.




³ Se excluyen 1,929 casos que proporcionaron la información a través del Expediente Clínico Electrónico. Cfr., Cuadros 9 a 12. En esta sección los pacientes podían responder con más una opción.

Condicionantes de la solicitud de tratamiento. 17.7% de los casos expresó dos o más condicionantes de su solicitud de tratamiento. 41.6% acudió por condicionamiento o recomendación familiar; 39.2%, *motu proprio*; 17.3%, por condicionamiento o recomendación escolar y 12.4%, por condicionamiento legal.


Figura 7. Condicionantes de la solicitud de tratamiento según sexo

Aún cuando mujeres y hombres acuden principalmente por recomendación familiar o por iniciativa propia, las mujeres presentan porcentajes más altos en cuanto acudir por condicionamiento o recomendación escolar, mientras que los varones lo hacen por condicionamiento legal o laboral



Antecedentes de acciones contra el consumo de sustancias. 28.8% de los casos expresó que antes de acudir a CIJ, había intentado interrumpir el consumo de drogas de manera voluntaria pero sin apoyo. 12.6% señaló que previamente había estado internado en algún anexo, mientras que 8.6% había acudido a grupos de autoayuda, 5.7% a tratamiento psiquiátrico o psicoterapéutico y 6.0% había realizado juramentos. A diferencia, 29.7% expresó que hasta el momento de la solicitud de tratamiento no había tomado medida alguna en contra del consumo de sustancias; mientras que 10.5% de los casos reportó haber intentado al menos dos tipos distintos de acciones para abandonar el consumo de drogas.


Figura 8. Antecedentes de acciones contra el consumo de sustancias según sexo



Las mujeres adoptan menos medidas o acciones contra el consumo de sustancias que los hombres

Problemas asociados al consumo de sustancias. 77.6% señaló problemas de tipo familiar; 38.3%, de salud; 36.9%, escolares; 36.0%, psicológicos; 24.4%, legales; 20.7%, laborales; 16.0%, de conducta antisocial o delictiva y 12.8%, accidentes o lesiones. Cabe señalar que 74.7% de los casos mencionó dos o más problemas problema asociado al consumo de sustancias, en tanto que 2.2% no reportó ninguno.

Figura 9. Problemas asociados al consumo de sustancias según sexo



Los problemas de tipo familiar son los más frecuentemente asociados al consumo de drogas

Las mujeres refieren más problemas de tipo escolar y de salud que los hombres; mientras que éstos presentan más problemas de tipo legal o laboral

CONSUMO DE DROGAS⁴

Edad de inicio del consumo de sustancias. La edad promedio de inicio del consumo de tabaco se situó en 14.3 años ($\sigma=3.2$ años), la mediana en 14 años y la moda en 15 años; mientras que la edad promedio de inicio del consumo de alcohol se situó en 14.5 años ($\sigma=3.1$ años), la mediana y la moda en 15 años, respectivamente. A diferencia la edad promedio de inicio en el abuso de drogas ilícitas (incluyendo sustancias con utilidad médica utilizadas fuera de prescripción) fue de 16.1 años ($\sigma=4.9$ años), con mediana de 15 años y moda de 15 años. Cabe señalar que considerando el primer decil como indicador de las edades más tempranas reportadas como edad de inicio, puede apreciarse que el consumo de tabaco aparece un año antes (11 años) que el consumo de alcohol y drogas ilícitas (12 años).


Figura 10. Edad de inicio del consumo de sustancias según sexo

	Años			Años			Hombres y mujeres inician el consumo de sustancias casi a la misma edad
	Tabaco	Alcohol	Drogas ilícitas	Tabaco	Alcohol	Drogas ilícitas	
Promedio	14.3	14.5	16.1	14.4	14.4	16.3	
Desviación estándar	3.1	3.0	4.7	3.7	3.7	5.8	
Mediana	14	15	15	14	14	15	
Moda	15	15	15	13	13	14	

Drogas ilícitas de inicio. Las sustancias de inicio más reportadas fueron: marihuana (60.7%); inhalables (solventes/removedores: 15.9%, pegamentos: 3.3% y esmaltes y pinturas: 2.4%) y cocaína (cocaína en polvo blanco: 8.9% y crack: 2.6%); en menor proporción se reportó el consumo de depresores (principalmente benzodiazepinas: 1.7%) y metanfetaminas (1.1%).

⁴ Cfr., Cuadros 13 a 34.

Figura 11. Principales drogas ilícitas de inicio según sexo




Hombres y mujeres inician con mayor frecuencia el consumo de drogas ilegales con cannabis e inhalables.

Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de sustancias y el ingreso a tratamiento en CIJ. La media de tiempo transcurrido entre el inicio del uso de sustancias y la solicitud de tratamiento, cuando se trata de tabaco es de 8.7 años ($\sigma=9.5$ años), cuando se trata del uso de alcohol es de 8.5 años ($\sigma=9.2$ años) y de 6.5 años ($\sigma=8.4$ años) para el consumo de drogas ilícitas. Cabe señalar que alrededor del 40% de los usuarios de tabaco, alcohol y drogas ilícitas dejó pasar entre uno y cinco años antes de acudir a solicitar tratamiento.

Figura 12. Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de sustancias y el ingreso a tratamiento en CIJ según sexo

	Años			Años		
	Tabaco	Alcohol	Drogas ilícitas	Tabaco	Alcohol	Drogas ilícitas
Los hombres dejaron pasar más tiempo que las mujeres para solicitar tratamiento						
Promedio	9.2	9.0	7.1	6.6	6.3	4.2
Desviación estándar	9.6	9.4	8.7	8.5	8.0	6.8
Mediana	5	5	3	3	3	1
Moda	1	1	< 1	1	1	< 1


Tipo de consumo de drogas ilícitas. 52.4% de los casos fue diagnosticado con consumo funcional; 17.9%, con consumo disfuncional; 14.1%, con consumo social u ocasional; 12.0%, con consumo experimental y 3.6%, en remisión.



Total de drogas consumidas. El promedio de sustancias utilizadas alguna vez en la vida, incluyendo alcohol y tabaco, fue de 4.2 drogas (94.8% reportó el uso de dos o más sustancias); en el último año fue de 3.2 drogas (86.7% consumió dos o más sustancias) y en los últimos 30 días fue de 2.1 drogas (66.2% reportó haber utilizado dos o más sustancias).

El promedio de sustancias utilizadas alguna vez en la vida sin incluir alcohol y tabaco, fue de 2.5 drogas (60.2 % reportó el uso de dos o más sustancias); en el último año fue de 1.7 drogas (39.8% consumió dos o más sustancias) y en los últimos 30 días fue de una droga (19.2% reportó haber utilizado dos o más sustancias).

Figura 14. Total de drogas consumidas según sexo




Las mujeres consumen menos drogas que los hombres

Consumo de drogas alguna vez en la vida.⁵ Las proporciones de consumo alguna vez en la vida de los diez grupos de sustancias fueron: alcohol, 88.8%; tabaco, 85.0%; cannabis, 76.6% (76.5% considerando únicamente marihuana); inhalables, 45.1%; cocaína, 44.3%; estimulantes, 18.8%; depresores, 16.3%; drogas alucinógenas y disociativas, 9.6%; opiáceos, 3.8% y otras sustancias de abuso, 2.1%.

En cuanto al uso de sustancias específicas (contenidas en alguno de los diez grupos antes mencionados) destaca el uso cocaína en forma de polvo blanco (36.8%), solventes y removedores (32.3%), crack (22.5%), pegamentos (11.3%), metanfetaminas (11.3%) y benzodiacepinas (14.4%). En menor proporción se registró el uso de éxtasis y metanfetaminas alucinógenas (6.1%), LSD (6.1%), plantas alucinógenas y derivados (5.2%), esmaltes y pinturas (6.3%), heroína (3.2%), *Rohypnol*[®] (2.5%) y anfetamina (3.0%).

⁵ Dado que la mayoría de los casos refirió haber utilizado dos o más sustancias —tanto en esta categoría como en las de uso en el último año y en los últimos 30 días, *infra*— la suma de porcentajes no es igual a 100.

Figura 15. Consumo de drogas alguna vez en la vida según sexo




Las drogas más utilizadas alguna vez en la vida por hombres y mujeres fueron alcohol, tabaco, cannabis e inhalables; las mujeres reportan mayor consumo de inhalables y benzodiacepinas que los hombres

Consumo de drogas en los últimos 12 meses. 98.2% de los casos reportó haber consumido alguna sustancia en el año previo a su ingreso a tratamiento en CIJ.

Las proporciones de consumo de los diez grupos de sustancias consumidas en este lapso fueron: alcohol, 78.9%; tabaco, 74.6%; cannabis, 58.9% (58.8% considerando únicamente marihuana); inhalables, 33.4%; cocaína, 28.4%; estimulantes, 11.9%; depresores, 9.9%; drogas alucinógenas y disociativas, 4.7%; opiáceos, 2.4% y otras sustancias de abuso, 1.3%.

En cuanto al consumo de sustancias específicas contenidas en alguno de los grupos anteriores destaca el uso de solventes y removedores (24.2%), cocaína en polvo blanco (20.1%) y crack (14.5%), seguidas por metanfetaminas (7.1%), benzodiacepinas (9.0%), pegamentos (7.0%), éxtasis y metanfetaminas alucinógenas (3.4%), esmaltes y pinturas (4.6%), LSD (3.4%) y heroína (2.1%).


Figura 16. Consumo de drogas en los últimos 12 meses según sexo



Las drogas más consumidas en el último año por hombres y mujeres fueron alcohol, tabaco, cannabis e inhalables; las mujeres reportan mayor consumo de inhalables y benzodicepinas que los hombres

Droga de preferencia en los últimos 12 meses. Entre las sustancias más frecuentemente referidas se encuentran: marihuana (34.9%), alcohol (18.8%) y tabaco (13.9%). En menor medida se mencionaron: solventes y removedores (11.7%), crack (5.8%), cocaína (4.1%), metanfetaminas (2.5%), pegamentos (2.0%) y heroína (1.4%).

Figura 17. Droga de preferencia en los últimos 12 meses según sexo




Durante el último año los hombres prefirieron principalmente la cannabis; las mujeres, los inhalables

Droga de mayor impacto en los últimos 12 meses. Entre las sustancias a cuyo consumo los pacientes atribuyen los mayores daños en la salud, en el bienestar personal y familiar o en el desempeño escolar, laboral o social se señalaron: marihuana


(30.4%), alcohol (16.6%) y solventes y removedores (15.6%). En menor proporción se registró: crack (8.0%), tabaco (7.6%), cocaína (5.6%), metanfetaminas (4.1%) y pegamentos (3.2%).

Figura 18. Droga de mayor impacto en los últimos 12 meses según sexo



Uso combinado de drogas en los últimos 12 meses.⁶ 53.5% de los casos reportó el consumo de dos o más drogas (excluyendo el uso de tabaco) en un mismo día al menos en una ocasión en el transcurso del último año.

Figura 19. Uso combinado de droga en los últimos 12 meses según sexo




⁶ No se toman en cuenta 3,135 casos (25.3%) que no cumplieron los criterios de inclusión de esta variable; 24.6% de los hombres y 28.5% de las mujeres. (ver anexo).

Consumo de drogas en los últimos 30 días. 90.1% de los casos reportaron consumo de sustancias en el mes anterior al ingreso a tratamiento.

Las proporciones de consumo de los diez grupos de sustancias consumidas en este lapso fueron: tabaco, 63.1%; alcohol, 56.6%; cannabis, 39.8% (39.8% considerando únicamente marihuana); inhalables, 21.4%; cocaína, 15.4%; estimulantes, 5.2%; depresores, 4.8%; opiáceos, 1.6%; drogas alucinógenas y disociativas, 1.1% y otras sustancias de abuso, 0.6%.

En cuanto al consumo de sustancias específicas de estos grupos destaca el uso de solventes/removedores (15.5%), crack (8.5%) y cocaína en polvo blanco (8.7%); en menor proporción se registró el uso de pegamentos (4.0%), benzodiacepinas (4.4%), metanfetaminas (3.5%), esmaltes y pinturas (2.7%) y heroína (1.4%).

Figura 20. Consumo de drogas en los últimos 30 días según sexo




La droga ilícita más utilizada por los hombres en los 30 días previos a la solicitud de tratamiento fue la cannabis; mientras que entre las mujeres fueron los inhalables

Frecuencia de episodios de abuso en los últimos 30 días. 38.5% de quienes reportaron consumo de tabaco en los últimos 30 días aceptó fumar seis o más cigarrillos diariamente. Así mismo, entre quienes consumieron alcohol, una tercera parte (34.9%) reportó consumo abusivo menos de una vez a la semana, otra tercera

parte (32.8%) abusó del alcohol una o dos veces a la semana. Finalmente, 35.7% de los usuarios de drogas ilícitas durante el último mes reportó consumirlas todos los días, 26.9% menos de una vez a la semana y 22.5% una a dos veces a la semana.

Figura 21. Frecuencia de episodios de abuso en los últimos 30 días según sexo



Los hombres registran con mayor frecuencia episodios de abuso que las mujeres

CUADROS

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS USUARIOS DE DROGAS DE PRIMER INGRESO A TRATAMIENTO EN CIJ EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2011

Cuadro 1. Distribución de casos de primer ingreso a tratamiento por unidad de atención

Unidad de atención	Total de casos	%
Álvaro Obregón Centro	251	2.0
Álvaro Obregón Oriente	54	0.4
Azcapotzalco	295	2.4
Benito Juárez	153	1.2
Chalco	206	1.7

Coyoacán	185	1.5
Cuajimalpa	113	0.9
Cuauhtémoc Oriente	157	1.3
Cuauhtémoc Poniente	180	1.5
Ecatepec	222	1.8

Gustavo A. Madero Aragón	384	3.1
Gustavo A. Madero Norte	225	1.8
Gustavo A. Madero Oriente	69	0.6
Iztapalapa Oriente	550	4.4
Iztapalapa Poniente	200	1.6

Magdalena Contreras	64	0.5
Miguel Hidalgo	189	1.5
Naucalpan	222	1.8
Nezahualcóyotl	218	1.8
Texcoco	138	1.1

Tlalnepantla	189	1.5
Tlalpan Periférico	209	1.7
Tlalpan Viaducto	28	0.2
Unidad Móvil de tabaco I (PEMEX)	11	0.1
Venustiano Carranza	201	1.6

Xochimilco	74	0.6
UH Ecatepec	40	0.3
UH Iztapalapa	49	0.4
UH Naucalpan	23	0.2
Acapulco	136	1.1

Aguascalientes	94	0.8
Apodaca	20	0.2
Cancún	160	1.3
Ciudad del Carmen	47	0.4
Ciudad Juárez Norte	76	0.6
Ciudad Victoria	22	0.2

(Continúa)

Cuadro 1. Distribución de casos de primer ingreso a tratamiento por unidad de atención
(Continuación)

Unidad de atención	Total de casos	%
Celaya	163	1.3
Chetumal	63	0.5
Chihuahua	173	1.4
Chilpancingo	42	0.3
Colima	153	1.2
Cozumel	72	0.6
Cuernavaca	101	0.8
Culiacán	110	0.9
Culiacán Oriente	12	0.1
Durango	152	1.2
Escuinapa	65	0.5
Fresnillo Pinacoteca	17	0.1
Guadalajara	230	1.9
Guadalajara Sur	97	0.8
Guadalupe	100	0.8
Guamúchil	42	0.3
Guasave	67	0.5
Hermosillo	233	1.9
Ixtapa Zihuatanejo	23	0.2
La Paz	87	0.7
La Piedad	31	0.3
Laguna Coahuila	4	0.0
Laguna Durango	103	0.8
León	224	1.8
Los Cabos	33	0.3
Los Mochis	65	0.5
Manzanillo	63	0.5
Mazatlán	120	1.0
Mérida	154	1.2
Mexicali	178	1.4
Monterrey	121	1.0
Morelia	71	0.6
Nogales	63	0.5
Oaxaca	86	0.7
Pachuca	161	1.3

(Continúa)

Cuadro 1. Distribución de casos de primer ingreso a tratamiento por unidad de atención
(Continuación)

Unidad de atención	Total de casos	%
Playa del Carmen	39	0.3
Poza Rica	64	0.5
Puebla	207	1.7
Puerto Vallarta	102	0.8
Querétaro	165	1.3
-----	-----	-----
Salamanca	95	0.8
Saltillo	183	1.5
San Luis Potosí	130	1.1
San Nicolás de los Garza	98	0.8
Tampico	87	0.7
-----	-----	-----
Tapachula	42	0.3
Tecomán	68	0.5
Tehuacán	48	0.4
Tepic	60	0.5
Tijuana Guaycura	179	1.4
-----	-----	-----
Tijuana Soler	163	1.3
Tlaquepaque	164	1.3
Toluca	222	1.8
Torreón Oriente	175	1.4
Tuxtla Gutiérrez	107	0.9
-----	-----	-----
Tijuana	73	0.6
Zapopan	78	0.6
Zapotlán el Grande	23	0.2
Villahermosa	70	0.6
Xalapa	91	0.7
-----	-----	-----
Zacatecas	71	0.6
Zamora	74	0.6
Zapopan Kena Moreno	17	0.1
Zapopan Norte	194	1.6
UH Ciudad Juárez (UMAA)	22	0.2
-----	-----	-----
UH Culiacán	32	0.3
UH Ixbalanqué	8	0.1
UH Jerez	86	0.7
UH Monterrey	40	0.3
UH Punta Diamante	67	0.5
UTPPCH Ciudad Juárez	90	0.7
Total	12,367	100.0

UH=Unidad de Hospitalización

UTPPCH=Unidad de Tratamiento a Personas con Problemas de Consumo de Heroína

UMAA=Unidad Médica de Atención a las Adicciones

Cuadro 2. Sexo

	Frec.	%	Razón H:M
Hombres	10,050	81.3	4.3 : 1
Mujeres	2,317	18.7	
Total	12,367	100.0	

Cuadro 3. Persona que proporciona la información

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Usuario de drogas	5,536	44.8	4,603	45.8	933	40.3
Usuario de drogas y familiares u otras personas	6,831	55.2	5,447	54.2	1,384	59.7
Total	12,367	100.0	10,050	100.0	2,317	100.0

Cuadro 4. Edad de ingreso a tratamiento

	General*			Hombres**			Mujeres***		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Hasta 9 años	4	0.0	0.0	4	0.0	0.0	0	0.0	0.0
10 a 14 años	1,930	15.6	15.6	1,320	13.1	13.1	610	26.3	26.3
15 a 19 años	4,807	38.9	38.9	3,884	38.6	38.7	923	39.8	39.8
20 a 24 años	1,765	14.3	14.3	1,480	14.7	14.7	285	12.3	12.3
25 a 29 años	1,187	9.6	9.6	1,037	10.3	10.3	150	6.5	6.5
30 a 34 años	950	7.7	7.7	829	8.2	8.2	121	5.2	5.2
35 a 39 años	703	5.7	5.7	626	6.2	6.2	77	3.3	3.3
40 a 44 años	474	3.8	3.8	416	4.1	4.1	58	2.5	2.5
45 años y más	546	4.4	4.4	453	4.5	4.5	93	4.0	4.0
<i>Sin información</i>	<i>1</i>	<i>0.0</i>	<i>Se omite</i>	<i>1</i>	<i>0.0</i>	<i>Se omite</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>	<i>Se omite</i>
Total	12,367	100.0	100.0	10,050	100.0	100.0	2,317	100.0	100.0

* $\mu= 22.6$; $\sigma = 10.0$; Med.=18; Mo.=15; Decil1 =14** $\mu= 23.2$; $\sigma = 10.0$; Med.=19; Mo.=15; Decil1 =14*** $\mu= 20.4$; $\sigma = 9.5$; Med.=17; Mo.=14; Decil1 =13

Cuadro 5. Estado civil

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Soltero	8,633	69.8	71.3	6,892	68.6	70.0	1,741	75.1	76.9
Casado	1,234	10.0	10.2	1,120	11.1	11.4	114	4.9	5.0
Unión libre	1,337	10.8	11.0	1,109	11.0	11.3	228	9.8	10.1
Separado	707	5.7	5.8	582	5.8	5.9	125	5.4	5.5
Divorciado	167	1.4	1.4	119	1.2	1.2	48	2.1	2.1
Viudo	36	0.3	0.3	27	0.3	0.3	9	0.4	0.4
<i>Sin información</i>	253	2.0	<i>Se omite</i>	201	2.0	<i>Se omite</i>	52	2.2	<i>Se omite</i>
Total	12,367	100.0	100.0	10,050	100.0	100.0	2,317	100.0	100.0

Cuadro 6. Escolaridad

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Ninguna (no sabe leer ni escribir)	53	0.4	0.4	43	0.4	0.4	10	0.4	0.4
Ninguna (sabe leer y escribir)	29	0.2	0.2	21	0.2	0.2	8	0.3	0.3
Primaria incompleta	523	4.2	4.2	438	4.4	4.4	85	3.7	3.7
Primaria completa	860	7.0	7.0	745	7.4	7.4	115	5.0	5.0
Secundaria incompleta	3,759	30.4	30.5	2,897	28.8	28.9	862	37.2	37.3
Secundaria completa	2,338	18.9	19.0	1,975	19.7	19.7	363	15.7	15.7
Estudios técnicos o comerciales incompletos	152	1.2	1.2	125	1.2	1.2	27	1.2	1.2
Estudios técnicos o comerciales completos	136	1.1	1.1	102	1.0	1.0	34	1.5	1.5
Bachillerato incompleto	2,688	21.7	21.8	2,214	22.0	22.1	474	20.5	20.5
Bachillerato completo	874	7.1	7.1	740	7.4	7.4	134	5.8	5.8
Estudios superiores incompletos	579	4.7	4.7	471	4.7	4.7	108	4.7	4.7
Estudios superiores completos	314	2.5	2.5	232	2.3	2.3	82	3.5	3.5
Estudios de posgrado incompletos	8	0.1	0.1	6	0.1	0.1	2	0.1	0.1
Estudios de posgrado completos	24	0.2	0.2	17	0.2	0.2	7	0.3	0.3
<i>Sin información</i>	30	0.2	<i>Se omite</i>	24	0.2	<i>Se omite</i>	6	0.3	<i>Se omite</i>
Total	12,367	100.0	100.0	10,050	100.0	100.0	2,317	100.0	100.0

Cuadro 7. Ocupación

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Desempleado/desocupado	2,997	24.2	24.5	2,530	25.2	25.4	467	20.2	20.4
Hogar	398	3.2	3.2	104	1.0	1.0	294	12.7	12.8
Estudia	4,105	33.2	33.5	3,028	30.1	30.4	1,077	46.5	47.1
Estudia y trabaja	567	4.6	4.6	495	4.9	5.0	72	3.1	3.1
Trabaja	4,141	33.5	33.8	3,769	37.5	37.8	372	16.1	16.3
Pensionado	41	0.3	0.3	35	0.3	0.4	6	0.3	0.3
Sin información	118	1.0	Se omite	89	0.9	Se omite	29	1.3	Se omite
Total	12,367	100.0	100.0	10,050	100.0	100.0	2,317	100.0	100.0

Cuadro 8. Estrato social

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Alto	92	0.7	0.8	71	0.7	0.7	21	0.9	0.9
Medio alto	1,311	10.6	10.7	1,065	10.6	10.7	246	10.6	10.7
Medio bajo	7,612	61.6	62.1	6,153	61.2	61.7	1,459	63.0	63.7
Bajo	3,148	25.5	25.7	2,605	25.9	26.1	543	23.4	23.7
Pobreza extrema o marginación	96	0.8	0.8	73	0.7	0.7	23	1.0	1.0
Sin información	108	0.9	Se omite	83	0.8	Se omite	25	1.1	Se omite
Total	12,367	100.0	100.0	10,050	100.0	100.0	2,317	100.0	100.0

FACTORES ASOCIADOS A LA DEMANDA DE TRATAMIENTO EN PACIENTES DE PRIMER INGRESO A TRATAMIENTO EN CIJ EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2011*

Cuadro 9. Motivos de consulta

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Consumo de drogas ilícitas	8,787	84.2	7,221	85.1	1,566	80.1
Consumo de bebidas alcohólicas	4,322	41.4	3,559	42.0	763	39.0
Consumo de tabaco	3,825	36.6	3,137	37.0	688	35.2
Otro motivo	218	2.1	164	1.9	54	2.8
<i>Ningún motivo específico reportado</i>	174	1.7	130	1.5	44	2.2
<i>Usuarios que reportaron dos o más motivos de consulta</i>	4,414	42.3	3,659	43.1	755	38.6

Cuadro 10. Condicionantes de la solicitud de tratamiento

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Por propia iniciativa	4,093	39.2	3,310	39.0	783	40.0
Por condicionamiento o recomendación familiar	4,338	41.6	3,516	41.5	822	42.0
Por recomendación de pares	150	1.4	120	1.4	30	1.5
Por condicionamiento o recomendación escolar	1,803	17.3	1,338	15.8	465	23.8
Por condicionamiento legal	1,293	12.4	1,182	13.9	111	5.7
Por condicionamiento o recomendación laboral	253	2.4	240	2.8	13	0.7
Por indicación médica	327	3.1	260	3.1	67	3.4
Otros condicionante de solicitud de tratamiento	141	1.4	116	1.4	25	1.3
<i>Ningún condicionante reportado</i>	80	0.8	64	0.8	16	0.8
<i>Pacientes que reportaron dos o más condicionantes de la solicitud de tratamiento</i>	1,850	17.7	1,509	17.8	341	17.4

* Los datos proporcionados en esta sección corresponden a los obtenidos a través del formato impreso de Entrevista Inicial, y se excluyen 1,929 casos que corresponden al formato electrónico de contenido en el Expediente Clínico Epidemiológico. 1,568 casos corresponden a hombres y 361 a mujeres.

Cuadro 11. Antecedentes de acciones contra el consumo de sustancias

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Juramento	630	6.0	575	6.8	55	2.8
Grupo de autoayuda	897	8.6	795	9.4	102	5.2
Internamiento en anexo	1,310	12.6	1,161	13.7	149	7.6
Intervención de emergencia	82	0.8	58	0.7	24	1.2
Programa de mantenimiento	39	0.4	32	0.4	7	0.4
Tratamiento médico no especializado	90	0.9	76	0.9	14	0.7
Tratamiento psiquiátrico o psicoterapéutico ambulatorio	448	4.3	372	4.4	76	3.9
Tratamiento psiquiátrico o psicoterapéutico residencial	175	1.7	142	1.7	33	1.7
Medicina tradicional o alternativa	53	0.5	36	0.4	17	0.9
Intento de interrupción voluntaria del consumo, sin apoyo	3,008	28.8	2,485	29.3	523	26.7
Otras acciones	2,112	20.2	1,688	19.9	424	21.7
<i>Ninguna acción previa reportada</i>	<i>3,100</i>	<i>29.7</i>	<i>2,391</i>	<i>28.2</i>	<i>709</i>	<i>36.2</i>
<i>Pacientes que reportaron dos o más acciones contra el consumo de sustancias antes de solicitar tratamiento en CIJ</i>	<i>1,098</i>	<i>10.5</i>	<i>964</i>	<i>11.4</i>	<i>134</i>	<i>6.9</i>

Cuadro 12. Problemas asociados al consumo de sustancias

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Problemas de salud	3,994	38.3	3,246	38.3	748	38.2
Accidentes o lesiones	1,340	12.8	1,170	13.8	170	8.7
Problemas familiares	8,101	77.6	6,545	77.2	1,556	79.6
Problemas escolares	3,855	36.9	2,973	35.1	882	45.1
Problemas laborales	2,164	20.7	1,986	23.4	178	9.1
Problemas psicológicos	3,759	36.0	2,945	34.7	814	41.6
Problemas legales	2,545	24.4	2,338	27.6	207	10.6
Conducta antisocial o delictiva	1,666	16.0	1,449	17.1	217	11.1
Otros problemas	332	3.2	281	3.3	51	2.6
<i>Ningún problema asociado reportado</i>	<i>229</i>	<i>2.2</i>	<i>180</i>	<i>2.1</i>	<i>49</i>	<i>2.5</i>
<i>Pacientes que reportaron dos o más problemas asociados</i>	<i>7,792</i>	<i>74.7</i>	<i>6,347</i>	<i>74.8</i>	<i>1,445</i>	<i>73.9</i>

CARACTERÍSTICAS DEL CONSUMO DE DROGAS EN PACIENTES DE PRIMER INGRESO A TRATAMIENTO EN CIJ EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2011

Cuadro 13. Edad de inicio del consumo de Tabaco

	General*			Hombres**			Mujeres***		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Hasta 9 años	414	3.3	3.9	361	3.6	4.2	53	2.3	2.9
10 a 14 años	5,587	45.2	53.2	4,511	44.9	52.2	1,076	46.4	58.0
15 a 19 años	4,034	32.6	38.4	3,404	33.9	39.4	630	27.2	33.9
20 a 24 años	321	2.6	3.1	268	2.7	3.1	53	2.3	2.9
25 a 29 años	85	0.7	0.8	55	0.5	0.6	30	1.3	1.6
30 a 34 años	28	0.2	0.3	21	0.2	0.2	7	0.3	0.4
35 a 39 años	16	0.1	0.2	12	0.1	0.1	4	0.2	0.2
40 a 44 años	8	0.1	0.1	5	0.0	0.1	3	0.1	0.2
45 años y más	2	0.0	0.0	2	0.0	0.0	0	0.0	0.0
No consumió	1,857	15.0	Se omite	1,399	13.9	Se omite	458	19.8	Se omite
Sin información	15	0.1	Se omite	12	0.1	Se omite	3	0.1	Se omite
Total	12,367	100.0	100.0	10,050	100.0	100.0	2,317	100.0	100.0

* $\mu= 14.3$; $\sigma = 3.1$; Med.=14; Mo.=15; Decil1 =11

** $\mu= 14.3$; $\sigma = 3.1$; Med.=14; Mo.=15; Decil1 =11

*** $\mu= 14.4$; $\sigma = 3.5$; Med.=14; Mo.=13; Decil1 =11

Cuadro 14. Edad de inicio del consumo de Alcohol.

	General*			Hombres**			Mujeres***		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Hasta 9 años	433	3.5	3.9	355	3.5	4.0	78	3.4	3.9
10 a 14 años	5,219	42.2	47.6	4,120	41.0	46.0	1,099	47.4	54.9
15 a 19 años	4,866	39.3	44.4	4,144	41.2	46.2	722	31.2	36.1
20 a 24 años	334	2.7	3.0	278	2.8	3.1	56	2.4	2.8
25 a 29 años	65	0.5	0.6	40	0.4	0.4	25	1.1	1.2
30 a 34 años	22	0.2	0.2	12	0.1	0.1	10	0.4	0.5
35 a 39 años	16	0.1	0.1	9	0.1	0.1	7	0.3	0.3
40 a 44 años	8	0.1	0.1	6	0.1	0.1	2	0.1	0.1
45 años y más	2	0.0	0.0	0	0.0	0.0	2	0.1	0.1
No consumió	1,381	11.2	Se omite	1,070	10.6	Se omite	311	13.4	Se omite
Sin información	21	0.2	Se omite	16	0.2	Se omite	5	0.2	Se omite
Total	12,367	100.0	100.0	10,050	100.0	100.0	2,317	100.0	100.0

* $\mu= 14.5$; $\sigma = 3.1$; Med.=14; Mo.=15; Decil1 =12

** $\mu= 14.5$; $\sigma = 3.0$; Med.=15; Mo.=15; Decil1 =12

*** $\mu= 14.4$; $\sigma = 3.7$; Med.=14; Mo.=13; Decil1 =11

Cuadro 15. Edad de inicio del consumo de Drogas ilícitas.

	General*			Hombres**			Mujeres***		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Hasta 9 años	126	1.0	1.0	111	1.1	1.1	15	0.6	0.6
10 a 14 años	4,933	39.9	40.0	3,834	38.1	38.3	1,099	47.4	47.5
15 a 19 años	5,669	45.8	46.0	4,812	47.9	48.0	857	37	37.1
20 a 24 años	901	7.3	7.3	735	7.3	7.3	166	7.2	7.2
25 a 29 años	337	2.7	2.7	260	2.6	2.6	77	3.3	3.3
30 a 34 años	184	1.5	1.5	135	1.3	1.3	49	2.1	2.1
35 a 39 años	87	0.7	0.7	70	0.7	0.7	17	0.7	0.7
40 a 44 años	52	0.4	0.4	36	0.4	0.4	16	0.7	0.7
45 años y más	43	0.3	0.3	27	0.3	0.3	16	0.7	0.7
<i>Sin información</i>	35	0.3	<i>Se omite</i>	30	0.3	<i>Se omite</i>	5	0.2	<i>Se omite</i>
Total	12,367	100.0	100.0	10,050	100.0	100.0	2,317	100.0	100.0

* $\mu= 16.1$; $\sigma = 4.9$; Med.=15; Mo.=15; Decil1 =12

** $\mu= 16.1$; $\sigma = 4.7$; Med.=15; Mo.=15; Decil1 =12

*** $\mu= 16.3$; $\sigma = 5.8$; Med.=15; Mo.=14; Decil1 =12

Cuadro 16. Drogas ilícitas de inicio

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Cannabis	7,522	60.8	6,425	63.9	1,097	47.3
Mariguana	7,508	60.7	6,413	63.8	1,095	47.3
Hachís	14	0.1	12	0.1	2	0.1
Cocaína	1,428	11.5	1,206	12.0	222	9.6
Polvo blanco	1,095	8.9	917	9.1	178	7.7
Crack	326	2.6	283	2.8	43	1.9
Otra presentación	7	0.1	6	0.1	1	0.0
Inhalables	2,750	22.2	2,003	19.9	747	32.2
Solventes o removedores	1,970	15.9	1,399	13.9	571	24.6
Pegamentos	402	3.3	319	3.2	83	3.6
Esmaltes o pinturas	296	2.4	222	2.2	74	3.2
Otros	82	0.7	63	0.6	19	0.8
Depresores	241	1.9	116	1.2	125	5.4
Benzodiacepinas	205	1.7	103	1.0	102	4.4
<i>Rohypnol</i> [®]	16	0.1	8	0.1	8	0.3
Otros	20	0.2	5	0.0	15	0.6
Estimulantes	328	2.7	240	2.4	88	3.8
Anfetamina	118	1.0	98	1.0	20	0.9
Metanfetaminas	140	1.1	99	1.0	41	1.8
Éxtasis (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas	36	0.3	16	0.2	20	0.9
Otros	34	0.3	27	0.3	7	0.3
Drogas alucinógenas y disociativas	32	0.3	26	0.3	6	0.3
LSD	15	0.1	10	0.1	5	0.2
Plantas alucinógenas y derivados	13	0.1	12	0.1	1	0.0
Otras	4	0.0	4	0.0	0	0.0
Opiáceos	20	0.2	12	0.1	8	0.3
Heroína	8	0.1	7	0.1	1	0.0
Opiáceos Sintéticos	9	0.1	3	0.0	6	0.3
Opio y otros opiáceos	3	0.0	2	0.0	1	0.0
Otras sustancias de abuso	46	0.4	22	0.2	24	1.0
Con utilidad médica	16	0.1	6	0.1	10	0.4
Otras	30	0.2	16	0.2	14	0.6

Cuadro 17. Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de Tabaco y el ingreso a tratamiento en CIJ

	General*			Hombres**			Mujeres***		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
< de un año	708	5.7	6.7	523	5.2	6.1	185	8.0	10.0
1 a 5 años	4,928	39.8	47.0	3,894	38.7	45.1	1,034	44.6	55.7
6 a 10 años	1,625	13.1	15.5	1,370	13.6	15.9	255	11	13.7
11 a 15 años	1,096	8.9	10.4	962	9.6	11.1	134	5.8	7.2
16 a 20 años	822	6.6	7.8	731	7.3	8.5	91	3.9	4.9
21 a 25 años	538	4.4	5.1	478	4.8	5.5	60	2.6	3.2
26 o más años	777	6.3	7.4	680	6.8	7.9	97	4.2	5.2
No consumió	1,857	15.0	Se omite	1,399	13.9	Se omite	458	19.8	Se omite
Sin información	16	0.1	Se omite	13	0.1	Se omite	3	0.1	Se omite
Total	12,367	100.0	100.0	10,050	100.0	100.0	2,317	100.0	100.0

* $\mu= 8.7$; $\sigma = 9.5$; Med.=5; Mo.=1; Decil1 =1

** $\mu= 9.2$; $\sigma = 9.6$; Med.=5; Mo.=1; Decil1 =1

*** $\mu= 6.6$; $\sigma = 8.5$; Med.=3; Mo.=1; Decil1 = < un año

Cuadro 18. Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de Alcohol y el ingreso a tratamiento en CIJ

	General*			Hombres**			Mujeres***		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
< de un año	806	6.5	7.4	594	5.9	6.6	212	9.1	10.6
1 a 5 años	5,112	41.3	46.6	4,008	39.9	44.7	1,104	47.6	55.2
6 a 10 años	1,770	14.3	16.1	1,464	14.6	16.3	306	13.2	15.3
11 a 15 años	1,111	9.0	10.1	968	9.6	10.8	143	6.2	7.2
16 a 20 años	833	6.7	7.6	744	7.4	8.3	89	3.8	4.5
21 a 25 años	587	4.7	5.4	533	5.3	5.9	54	2.3	2.7
26 o más años	742	6.0	6.8	650	6.5	7.3	92	4.0	4.6
No consumió	1,381	11.2	Se omite	1,070	10.6	Se omite	311	13.4	Se omite
Sin información	25	0.2	Se omite	19	0.2	Se omite	6	0.3	Se omite
Total	12,367	100.0	100.0	10,050	100.0	100.0	2,317	100.0	100.0

* $\mu= 8.5$; $\sigma = 9.2$; Med.=5; Mo.=1; Decil1 =1

** $\mu= 9.0$; $\sigma = 9.4$; Med.=5; Mo.=1; Decil1 =1

*** $\mu= 6.3$; $\sigma = 8.0$; Med.=3; Mo.=1; Decil1 = < un año

Cuadro 19. Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de Drogas ilícitas y el ingreso a tratamiento en CIJ

	General*			Hombres**			Mujeres***		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
< de un año	2,366	19.1	19.2	1,689	16.8	16.9	677	29.2	29.3
1 a 5 años	5,556	44.9	45.1	4,437	44.1	44.3	1,119	48.3	48.4
6 a 10 años	1,601	12.9	13.0	1,359	13.5	13.6	242	10.4	10.5
11 a 15 años	1,090	8.8	8.8	980	9.8	9.8	110	4.7	4.8
16 a 20 años	703	5.7	5.7	639	6.4	6.4	64	2.8	2.8
21 a 25 años	445	3.6	3.6	404	4.0	4.0	41	1.8	1.8
26 o más años	569	4.6	4.6	510	5.1	5.1	59	2.5	2.6
<i>Sin información</i>	37	0.3	<i>Se omite</i>	32	0.3	<i>Se omite</i>	5	0.2	<i>Se omite</i>
Total	12,367	100.0	100.0	10,050	100.0	100.0	2,317	100.0	100.0

* $\mu= 6.5$; $\sigma = 8.4$; Med.=3; Mo.= < un año ; Decil1 =< un año

** $\mu= 7.1$; $\sigma = 8.7$; Med.=3; Mo.= < un año ; Decil1 =< un año

*** $\mu= 4.2$; $\sigma = 6.8$; Med.=1; Mo.= < un año ; Decil1 =< un año

Cuadro 20. Tipo de consumo de drogas ilícitas

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Experimental	1,431	11.6	12.0	998	9.9	10.3	433	18.7	19.5
Social u ocasional	1,688	13.6	14.1	1,290	12.8	13.3	398	17.2	17.9
Funcional	6,258	50.6	52.4	5,262	52.4	54.1	996	43.0	44.8
Disfuncional	2,141	17.3	17.9	1,816	18.1	18.7	325	14.0	14.6
En remisión	436	3.5	3.6	364	3.6	3.7	72	3.1	3.2
<i>Sin información</i>	413	3.3	<i>Se omite</i>	320	3.2	<i>Se omite</i>	93	4.0	<i>Se omite</i>
Total	12,367	100.0	100.0	10,050	100.0	100.0	2,317	100.0	100.0

**Cuadro 21. Total de drogas consumidas alguna vez en la vida.
(Incluye el consumo de tabaco o alcohol)**

	General*		Hombres**		Mujeres***	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
1 sustancia	638	5.2	465	4.6	173	7.5
2 sustancias	1,090	8.8	842	8.4	248	10.7
3 sustancias	3,658	29.6	2,883	28.7	775	33.4
4 sustancias	2,635	21.3	2,149	21.4	486	21.0
5 sustancias	1,738	14.1	1,460	14.5	278	12.0
6 sustancias	1,004	8.1	851	8.5	153	6.6
7 sustancias	646	5.2	556	5.5	90	3.9
8 sustancias	425	3.4	369	3.7	56	2.4
9 sustancias	228	1.8	206	2.0	22	0.9
10 sustancias	133	1.1	119	1.2	14	0.6
11 -18 sustancias	172	1.4	150	1.5	22	0.8
Total	12,367	100.0	10,050	100.00	2,317	100.0

* $\mu= 4.2$; $\sigma = 2.1$; Med.=4; Mo.=3; Decil1 =2

** $\mu= 4.3$; $\sigma = 2.1$; Med.=4; Mo.=3; Decil1 =2

*** $\mu= 3.9$; $\sigma = 1.9$; Med.=3; Mo.=3; Decil1 =2

**Cuadro 22. Total de drogas ilícitas consumidas alguna vez en la vida
(No incluye el consumo de tabaco o alcohol)**

	General*		Hombres**		Mujeres***	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
1 sustancia	4,922	39.8	3,828	38.1	1,094	47.2
2 sustancias	2,877	23.3	2,331	23.2	546	23.6
3 sustancias	1,863	15.1	1,561	15.5	302	13.0
4 sustancias	1,059	8.6	892	8.9	167	7.2
5 sustancias	665	5.4	576	5.7	89	3.8
6 sustancias	432	3.5	373	3.7	59	2.5
7 sustancias	241	1.9	219	2.2	22	0.9
8 sustancias	133	1.1	118	1.2	15	0.6
9 sustancias	79	0.6	69	0.7	10	0.4
10 sustancias	50	0.4	42	0.4	8	0.3
11-16 sustancias	46	0.4	41	0.4	5	0.1
Total	12,367	100.0	10,050	100.00	2,317	100.0

* $\mu= 2.5$; $\sigma = 1.9$; Med.=2; Mo.=1; Decil1 =1

** $\mu= 2.6$; $\sigma = 1.9$; Med.=2; Mo.=1; Decil1 =1

*** $\mu= 2.2$; $\sigma = 1.7$; Med.=2; Mo.=1; Decil1 =1

Cuadro 23. Consumo de drogas alguna vez en la vida por sustancia

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Tabaco	10,509	85.0	8,651	86.1	1,858	80.2
Alcohol	10,986	88.8	8,980	89.4	2,006	86.6
Cannabis	9,476	76.6	8,014	79.7	1,462	63.1
Mariguana	9,466	76.5	8,006	79.7	1,460	63.0
Hachís	512	4.1	440	4.4	72	3.1
Cocaína	5,473	44.3	4,717	46.9	756	32.6
Polvo blanco	4,547	36.8	3,893	38.7	654	28.2
Crack	2,786	22.5	2,477	24.6	309	13.3
Otra presentación	79	0.6	74	0.7	5	0.2
Inhalables	5,578	45.1	4,419	44.0	1,159	50.0
Solventes o removedores	3,997	32.3	3,137	31.2	860	37.1
Pegamentos	1,399	11.3	1,181	11.8	218	9.4
Esmaltes o pinturas	774	6.3	619	6.2	155	6.7
Otros	346	2.8	277	2.8	69	3.0
Depresores	2,019	16.3	1,628	16.2	391	16.9
Benzodiacepinas	1,776	14.4	1,433	14.3	343	14.8
<i>Rohypnol</i> [®]	304	2.5	265	2.6	39	1.7
Otros	80	0.6	55	0.5	25	1.1
Estimulantes	2,331	18.8	1,891	18.8	440	19.0
Anfetamina	372	3.0	294	2.9	78	3.4
Metanfetaminas	1,396	11.3	1,154	11.5	242	10.4
Éxtasis (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas	751	6.1	582	5.8	169	7.3
Otros	97	0.8	83	0.8	14	0.6
Drogas alucinógenas y disociativas	1,190	9.6	1,024	10.2	166	7.2
LSD	758	6.1	634	6.3	124	5.4
Plantas alucinógenas y derivados	647	5.2	575	5.7	72	3.1
Otras	74	0.6	68	0.7	6	0.3
Opiáceos	475	3.8	407	4.0	68	2.9
Heroína	391	3.2	337	3.4	54	2.3
Opiáceos Sintéticos	56	0.5	43	0.4	13	0.6
Opio y otros opiáceos	55	0.4	49	0.5	6	0.3
Otras sustancias de abuso	264	2.1	190	1.9	74	3.2
Con utilidad médica	76	0.6	51	0.5	25	1.1
Otras	194	1.6	143	1.4	51	2.2

**Cuadro 24. Total de drogas consumidas en el último año
(Incluye el consumo de tabaco o alcohol)**

	General*		Hombres**		Mujeres***	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Ninguna	218	1.8	164	1.6	54	2.3
1 sustancia	1,420	11.5	1,100	10.9	320	13.8
2 sustancias	2,605	21.1	2,076	20.7	529	22.8
3 sustancias	3,890	31.5	3,198	31.8	692	29.9
4 sustancias	2,143	17.3	1,772	17.6	371	16.0
5 sustancias	1,060	8.6	861	8.6	199	8.6
6 sustancias	489	4.0	415	4.1	74	3.2
7 sustancias	248	2.0	216	2.1	32	1.4
8 sustancias	156	1.3	129	1.3	27	1.2
9 sustancias	66	0.5	58	0.6	8	0.3
10 sustancias	36	0.3	30	0.3	6	0.3
11-15 sustancias	36	0.2	31	0.2	5	0.1
Total	12,367	100.0	10,050	100.00	2,317	100.0

* $\mu= 3.2$; $\sigma = 1.7$; Med.=3; Mo.=3; Decil1 =1

** $\mu= 3.2$; $\sigma = 1.7$; Med.=3; Mo.=3; Decil1 =1

*** $\mu= 3.0$; $\sigma = 1.7$; Med.=3; Mo.=3; Decil1 =1

**Cuadro 25. Total de drogas ilícitas consumidas en el último año
(No incluye el consumo de tabaco o alcohol)**

	General*		Hombres**		Mujeres***	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Ninguna	1,495	12.1	1,183	11.8	312	13.5
1 sustancia	5,943	48.1	4,810	47.9	1,133	48.9
2 sustancias	2,570	20.8	2,098	20.9	472	20.4
3 sustancias	1,223	9.9	993	9.9	230	9.9
4 sustancias	554	4.5	467	4.6	87	3.8
5 sustancias	270	2.2	237	2.4	33	1.4
6 sustancias	163	1.3	134	1.3	29	1.3
7 sustancias	73	0.6	64	0.6	9	0.4
8 sustancias	39	0.3	32	0.3	7	0.3
9 sustancias	16	0.1	15	0.1	1	0.0
10 sustancias	14	0.1	11	0.1	3	0.1
11-13 sustancias	7	0.0	6	0.0	1	0.0
Total	12,367	100.0	10,050	100.00	2,317	100.0

* $\mu= 1.7$; $\sigma = 1.4$; Med.=1; Mo.=1; Decil1 =ninguna

** $\mu= 1.7$; $\sigma = 1.4$; Med.=1; Mo.=1; Decil1 =ninguna

*** $\mu= 1.6$; $\sigma = 1.3$; Med.=1; Mo.=1; Decil1 =ninguna

Cuadro 26. Consumo de drogas en los últimos 12 meses por sustancia

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Tabaco	9,230	74.6	7,603	75.7	1,627	70.2
Alcohol	9,757	78.9	7,998	79.6	1,759	75.9
Cannabis	7,287	58.9	6,195	61.6	1,092	47.1
Mariguana	7,276	58.8	6,185	61.5	1,091	47.1
Hachís	291	2.4	251	2.5	40	1.7
Cocaína	3,511	28.4	3,010	30.0	501	21.6
Polvo blanco	2,480	20.1	2,082	20.7	398	17.2
Crack	1,797	14.5	1,609	16.0	188	8.1
Otra presentación	30	0.2	29	0.3	1	0.0
Inhalables	4,136	33.4	3,162	31.5	974	42.0
Solventes o removedores	2,990	24.2	2,263	22.5	727	31.4
Pegamentos	862	7.0	695	6.9	167	7.2
Esmaltes o pinturas	575	4.6	450	4.5	125	5.4
Otros	186	1.5	145	1.4	41	1.8
Depresores	1,221	9.9	933	9.3	288	12.4
Benzodiacepinas	1,109	9.0	855	8.5	254	11.0
Rohypnol®	97	0.8	76	0.8	21	0.9
Otros	50	0.4	30	0.3	20	0.9
Estimulantes	1,472	11.9	1,177	11.7	295	12.7
Anfetamina	233	1.9	191	1.9	42	1.8
Metanfetaminas	884	7.1	717	7.1	167	7.2
Éxtasis (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas	415	3.4	312	3.1	103	4.4
Otros	57	0.5	43	0.4	14	0.6
Drogas alucinógenas y disociativas	578	4.7	479	4.8	99	4.3
LSD	423	3.4	342	3.4	81	3.5
Plantas alucinógenas y derivados	237	1.9	207	2.1	30	1.3
Otras	20	0.2	17	0.2	3	0.1
Opiáceos	300	2.4	249	2.5	51	2.2
Heroína	254	2.1	216	2.1	38	1.6
Opiáceos Sintéticos	38	0.3	27	0.3	11	0.5
Opio y Otros opiáceos	19	0.2	14	0.1	5	0.2
Otras sustancias de abuso	159	1.3	103	1.0	56	2.4
Con utilidad médica	44	0.4	29	0.3	15	0.6
Otras	117	0.9	75	0.7	42	1.8

Cuadro 27. Droga de preferencia en los últimos 12 meses, según menciones

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Tabaco	1,645	13.3	13.9	1,280	12.7	13.3	365	15.8	16.8
Alcohol	2,225	18.0	18.8	1,807	18.0	18.8	418	18.0	19.3
Cannabis	4,124	33.3	34.9	3,699	36.8	38.4	425	18.3	19.6
Mariguana	4,117	33.3	34.9	3,693	36.7	38.3	424	18.3	19.6
Hachís	7	0.1	0.1	6	0.1	0.1	1	0.0	0.0
Cocaína	1,170	9.5	9.9	996	9.9	10.3	174	7.5	8
Polvo blanco	487	3.9	4.1	386	3.8	4.0	101	4.4	4.7
Crack	683	5.5	5.8	610	6.1	6.3	73	3.2	3.4
Otra presentación	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
Inhalables	1,835	14.8	15.5	1,268	12.6	13.2	567	24.5	26.2
Solventes o removedores	1,383	11.2	11.7	948	9.4	9.8	435	18.8	20.1
Pegamentos	240	1.9	2.0	167	1.7	1.7	73	3.2	3.4
Esmaltes o pinturas	176	1.4	1.5	126	1.3	1.3	50	2.2	2.3
Otros	36	0.3	0.3	27	0.3	0.3	9	0.4	0.4
Depresores	156	1.3	1.3	81	0.8	0.8	75	3.2	3.5
Benzodiacepinas	127	1.0	1.1	70	0.7	0.7	57	2.5	2.6
Rohypnol®	8	0.1	0.1	4	0.0	0.0	4	0.2	0.2
Otros	21	0.2	0.2	7	0.1	0.1	14	0.6	0.6
Estimulantes	402	3.3	3.4	310	3.1	3.2	92	4.0	4.2
Anfetamina	52	0.4	0.4	40	0.4	0.4	12	0.5	0.6
Metanfetaminas	292	2.4	2.5	232	2.3	2.4	60	2.6	2.8
Éxtasis (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas	40	0.3	0.3	24	0.2	0.2	16	0.7	0.7
Otros	18	0.1	0.2	14	0.1	0.1	4	0.2	0.2
Drogas alucinógenas y disociativas	44	0.4	0.4	32	0.3	0.3	12	0.5	0.6
LSD	38	0.3	0.3	27	0.3	0.3	11	0.5	0.5
Plantas alucinógenas y derivados	6	0.0	0.1	5	0.0	0.1	1	0.0	0.0
Otras	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
Opiáceos	186	1.5	1.6	154	1.5	1.6	32	1.4	1.5
Heroína	162	1.3	1.4	138	1.4	1.4	24	1.0	1.1
Opiáceos Sintéticos	15	0.1	0.1	9	0.1	0.1	6	0.3	0.3
Opio y Otros opiáceos	9	0.1	0.1	7	0.1	0.1	2	0.1	0.1
Otras sustancias de abuso	17	0.1	0.1	10	0.1	0.1	7	0.3	0.3
Con utilidad médica	6	0.0	0.1	3	0.0	0.0	3	0.1	0.1
Otras	11	0.1	0.1	7	0.1	0.1	4	0.2	0.2
<i>No aplica</i>	218	1.8	<i>Se omite</i>	164	1.6	<i>Se omite</i>	54	2.3	<i>Se omite</i>
<i>Sin Información*</i>	345	2.8	<i>Se omite</i>	249	2.5	<i>Se omite</i>	77	3.3	<i>Se omite</i>
Total	12,367	100.0	100.0	10,050	100.0	100.0	2,317	100.0	100.0

Cuadro 28. Droga de mayor impacto en los últimos 12 meses, según menciones

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Tabaco	899	7.3	7.6	687	6.8	7.1	212	9.1	9.7
Alcohol	1,966	15.9	16.6	1,603	16.0	16.6	363	15.7	16.6
Cannabis	3,606	29.2	30.5	3,183	31.7	33	423	18.3	19.4
Mariguana	3,598	29.1	30.4	3,176	31.6	33	422	18.2	19.3
Hachís	8	0.1	0.1	7	0.1	0.1	1	0.0	0.0
Cocaína	1,607	13	13.6	1,407	14	14.6	200	8.6	9.1
Polvo blanco	657	5.3	5.6	550	5.5	5.7	107	4.6	4.9
Crack	948	7.7	8.0	855	8.5	8.9	93	4.0	4.3
Otra presentación	2	0.0	0.0	2	0.0	0.0	0	0.0	0.0
Inhalables	2,540	20.5	21.5	1,843	18.3	19.1	697	30.1	31.9
Solventes o removedores	1,845	14.9	15.6	1,322	13.2	13.7	523	22.6	23.9
Pegamentos	377	3.0	3.2	289	2.9	3.0	88	3.8	4.0
Esmaltes o pinturas	261	2.1	2.2	190	1.9	2.0	71	3.1	3.2
Otros	57	0.5	0.5	42	0.4	0.4	15	0.6	0.7
Depresores	257	2.1	2.2	164	1.6	1.7	93	4	4.3
Benzodiacepinas	218	1.8	1.8	144	1.4	1.5	74	3.2	3.4
Rohypnol®	11	0.1	0.1	8	0.1	0.1	3	0.1	0.1
Otros	28	0.2	0.2	12	0.1	0.1	16	0.7	0.7
Estimulantes	648	5.2	5.5	518	5.2	5.4	130	5.6	5.9
Anfetamina	89	0.7	0.8	68	0.7	0.7	21	0.9	1.0
Metanfetaminas	479	3.9	4.1	398	4.0	4.1	81	3.5	3.7
Éxtasis (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas	54	0.4	0.5	32	0.3	0.3	22	0.9	1.0
Otros	26	0.2	0.2	20	0.2	0.2	6	0.3	0.3
Drogas alucinógenas y disociativas	69	0.6	0.6	51	0.5	0.5	18	0.8	0.8
LSD	57	0.5	0.5	42	0.4	0.4	15	0.6	0.7
Plantas alucinógenas y derivados	11	0.1	0.1	8	0.1	0.1	3	0.1	0.1
Otras	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0
Opiáceos	205	1.7	1.7	166	1.7	1.7	39	1.7	1.8
Heroína	177	1.4	1.5	148	1.5	1.5	29	1.3	1.3
Opiáceos Sintéticos	17	0.1	0.1	9	0.1	0.1	8	0.3	0.4
Opio y Otros opiáceos	11	0.1	0.1	9	0.1	0.1	2	0.1	0.1
Otras sustancias de abuso	20	0.2	0.2	9	0.1	0.1	11	0.5	0.5
Con utilidad médica	10	0.1	0.1	4	0.0	0.0	6	0.3	0.3
Otras	10	0.1	0.1	5	0.0	0.1	5	0.2	0.2
No aplica	218	1.8	Se omite	164	1.6	Se omite	54	2.3	Se omite
Sin Información	332	2.7	Se omite	255	2.5	Se omite	77	3.3	Se omite
Total	12,367	100.0	100.0	10,050	100.0	100.0	2,317	100.0	100.0

**Cuadro 29. Uso combinado de drogas en los últimos 12 meses
(No incluye tabaco)**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Si combinó drogas	4,937	39.9	53.5	4,146	41.3	54.7	791	34.1	47.7
No combinó drogas	4,295	34.7	46.5	3,429	34.1	45.3	866	37.4	52.3
<i>No aplica</i>	<i>3,135</i>	<i>25.3</i>	<i>Se omite</i>	<i>2,475</i>	<i>24.6</i>	<i>Se omite</i>	<i>660</i>	<i>28.5</i>	<i>Se omite</i>
Total	12,367	100.0	100.0	10,050	100.0	100.0	2,317	100.0	100.0

**Cuadro 30. Total de drogas consumidas en los últimos 30 días
(Incluye el consumo de tabaco o alcohol)**

	General*		Hombres**		Mujeres***	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Ninguna	1,227	9.9	930	9.3	297	12.8
1 sustancia	2,957	23.9	2,308	23.0	649	28.0
2 sustancias	3,593	29.1	2,923	29.1	670	28.9
3 sustancias	2,915	23.6	2,484	24.7	431	18.6
4 sustancias	1,113	9.0	938	9.3	175	7.6
5 sustancias	356	2.9	295	2.9	61	2.6
6 sustancias	126	1.0	108	1.1	18	0.8
7 sustancias	51	0.4	40	0.4	11	0.5
8 sustancias	24	0.2	20	0.2	4	0.2
9 sustancias	3	0.0	2	0.0	1	0.0
10 sustancias	1	0.0	1	0.0	0	0.0
11-12 sustancias	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Total	12,367	100.0	10,050	100.00	2,317	100.0

* $\mu= 2.1$ $\sigma = 1.4$; Med.=2; Mo.=2; Decil1 =1

** $\mu= 2.2$; $\sigma = 1.3$; Med.=2; Mo.=2; Decil1 =1

*** $\mu= 1.9$; $\sigma = 1.4$; Med.=2; Mo.=2; Decil1 =ninguna

**Cuadro 31. Total de drogas ilícitas consumidas en los últimos 30 días
(No incluye el consumo de tabaco o alcohol)**

	General*		Hombres**		Mujeres***	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Ninguna	4,201	34.0	3,307	32.9	894	38.6
1 sustancia	5,787	46.8	4,777	47.5	1,010	43.6
2 sustancias	1,642	13.3	1,352	13.5	290	12.5
3 sustancias	487	3.9	407	4.0	80	3.5
4 sustancias	161	1.3	136	1.4	25	1.1
5 sustancias	57	0.5	45	0.4	12	0.5
6 sustancias	26	0.2	21	0.2	5	0.2
7 sustancias	3	0.0	2	0.0	1	0.0
8 sustancias	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9 sustancias	1	0.0	1	0.0	0	0.0
10 sustancias	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Total	12,367	100.0	10,050	100.00	2,317	100.0

* $\mu= 0.9$; $\sigma = 0.9$; Med.=1; Mo.=1; Decil1 =ninguna

** $\mu= 1.0$; $\sigma = 0.9$; Med.=1; Mo.=1; Decil1 =ninguna

*** $\mu= 0.9$; $\sigma = 0.9$; Med.=1; Mo.=1; Decil1 =ninguna

Cuadro 32. Consumo de drogas en los últimos 30 días por sustancia

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Tabaco	7,806	63.1	6,517	64.8	1,289	55.6
Alcohol	7,003	56.6	5,806	57.8	1,197	51.7
Cannabis	4,923	39.8	4,286	42.6	637	27.5
Mariguana	4,916	39.8	4,280	42.6	636	27.4
Hachís	100	0.8	82	0.8	18	0.8
Cocaína	1,910	15.4	1,657	16.5	253	10.9
Polvo blanco	1,079	8.7	907	9.0	172	7.4
Crack	1,049	8.5	943	9.4	106	4.6
Otra presentación	7	0.1	7	0.1	0	0.0
Inhalables	2,648	21.4	1,989	19.8	659	28.4
Solventes o removedores	1,911	15.5	1,418	14.1	493	21.3
Pegamentos	499	4.0	389	3.9	110	4.7
Esmaltes o pinturas	337	2.7	260	2.6	77	3.3
Otros	69	0.6	55	0.5	14	0.6
Depresores	599	4.8	434	4.3	165	7.1
Benzodiacepinas	550	4.4	402	4.0	148	6.4
Rohypnol®	34	0.3	26	0.3	8	0.3
Otros	23	0.2	12	0.1	11	0.5
Estimulantes	641	5.2	514	5.1	127	5.5
Anfetamina	77	0.6	64	0.6	13	0.6
Metanfetaminas	430	3.5	359	3.6	71	3.1
Éxtasis (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas	139	1.1	98	1.0	41	1.8
Otros	23	0.2	15	0.1	8	0.3
Drogas alucinógenas y disociativas	132	1.1	105	1.0	27	1.2
LSD	110	0.9	86	0.9	24	1.0
Plantas alucinógenas y derivados	23	0.2	18	0.2	5	0.2
Otras	5	0.0	5	0.0	0	0.0
Opiáceos	202	1.6	165	1.6	37	1.6
Heroína	177	1.4	150	1.5	27	1.2
Opiáceos Sintéticos	22	0.2	13	0.1	9	0.4
Opio y Otros opiáceos	9	0.1	6	0.1	3	0.1
Otras sustancias de abuso	76	0.6	43	0.4	33	1.4
Con utilidad médica	23	0.2	13	0.1	10	0.4
Otras	53	0.4	30	0.3	23	1.0

Cuadro 33. Frecuencia de episodios de abuso del consumo de Tabaco¹ en los últimos 30 días

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Ni una vez	2,542	20.6	33.1	2,129	21.2	33.2	413	17.8	32.4
< de 1 vez a la semana	812	6.6	10.6	658	6.5	10.3	154	6.6	12.1
1 o 2 veces a la semana	885	7.2	11.5	739	7.4	11.5	146	6.3	11.5
Cada tercer día	491	4.0	6.4	411	4.1	6.4	80	3.5	6.3
Diario	2,961	23.9	38.5	2,479	24.7	38.6	482	20.8	37.8
No consumió en los últimos 30 días	4,561	36.9	Se omite	3,533	35.2	Se omite	1,028	44.4	Se omite
Sin información	115	0.9	Se omite	101	1.0	Se omite	14	0.6	Se omite
Total	12,367	100.0	100.0	10,050	100.0	100.0	2,317	100.0	100.0

¹ Consumo de seis o más cigarrillos en un solo día.

Cuadro 34. Frecuencia de episodios de abuso del consumo de Alcohol¹ en los últimos 30 días

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Ni una vez	1,233	10.0	17.9	980	9.8	17.2	253	10.9	21.5
< de 1 vez a la semana	2,397	19.4	34.9	1,984	19.7	34.8	413	17.8	35.1
1 o 2 veces a la semana	2,256	18.2	32.8	1,904	18.9	33.4	352	15.2	30.0
Cada tercer día	586	4.7	8.5	477	4.7	8.4	109	4.7	9.3
Diario	399	3.2	5.8	351	3.5	6.2	48	2.1	4.1
No consumió en los últimos 30 días	5,364	43.4	Se omite	4,244	42.2	Se omite	1,120	48.3	Se omite
Sin información	132	1.1	Se omite	110	1.1	Se omite	22	0.9	Se omite
Total	12,367	100.0	100.0	10,050	100.0	100.0	2,317	100.0	100.0

¹ Consumo de más de cuatro copas en un día para los hombres y de más de tres copas en un día para las mujeres.

Cuadro 35. Frecuencia de episodios de abuso del consumo de drogas ilícitas¹ en los últimos 30 días

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
< de 1 vez a la semana	1,783	14.4	26.9	1,391	13.8	25.3	392	16.9	34.8
1 o 2 veces a la semana	1,491	12.1	22.5	1,226	12.2	22.3	265	11.4	23.5
Cada tercer día	982	7.9	14.8	840	8.4	15.3	142	6.1	12.6
Diario	2,367	19.1	35.7	2,040	20.3	37.1	327	14.1	29.0
No consumió en los últimos 30 días	4,201	34.0	Se omite	3,307	32.9	Se omite	894	38.6	Se omite
Sin información	1,543	12.5	Se omite	1,246	12.4	Se omite	297	12.8	Se omite
Total	12,367	100.0	100.0	10,050	100.0	100.0	2,317	100.0	100.0

¹ Consumo de cualquier dosis.

GLOSARIO

A continuación se definen algunas de las variables de estudio:

Drogas ilícitas de inicio: Drogas ilegales que el usuario refirió haber utilizado a la misma edad reportada como edad de inicio del consumo de este tipo de sustancias. Excluye el uso de tabaco y alcohol.

Droga de mayor impacto en los últimos 12 meses: Sustancia que el propio usuario de drogas solicitante de tratamiento refiere como la que más problemas le ha ocasionado en los ámbitos de salud, personal, familiar, escolar, laboral o social, en el transcurso del último año.

Droga de preferencia en los últimos 12 meses: Sustancia que el propio usuario solicitante de tratamiento ha elegido o preferido consumir en el transcurso del último año.

Estrato social: Estimación que hace el terapeuta, según su percepción, del estrato al que pertenece el usuario de drogas, considerando aspectos como lugar de residencia, escolaridad, empleo y características manifiestas como higiene y aliño, calidad del vestido, expresión verbal y vocabulario, etc.

Tipo de consumo de drogas ilícitas: Características de consumo de sustancias ilegales según motivo, frecuencia y problemas asociados. No incluye el uso de alcohol y/o tabaco y se clasifica como: experimental, social u ocasional, funcional, disfuncional y en remisión.

Total de drogas consumidas: Número de drogas consumidas (se incluyen las 26 sustancias de seguimiento) en las siguientes categorías: alguna vez en la vida, en el último año y en los últimos 30 días.

Uso combinado de drogas en los últimos 12 meses: Consumo de dos o más sustancias (incluyendo alcohol y cualquier droga ilícita o de uso médico, utilizada sin prescripción, pero excluyendo tabaco) en el transcurso de un mismo día, en el año previo a la solicitud de tratamiento en CIJ.