

---

**CONSUMO DE DROGAS EN PACIENTES DE PRIMER INGRESO A  
TRATAMIENTO A CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL  
ENERO - JUNIO, 2012**

---

**Alma Delia Gutiérrez López**

Centros de Integración Juvenil  
Dirección de Investigación y Enseñanza  
Subdirección de Investigación  
Depto. de Investigación Clínica y Epidemiológica  
México, 2013

---

**Informe de Investigación 13-01a**

## **DIRECTORIO**

### **PRESIDENTE HONORARIO VITALICIO DEL PATRONATO NACIONAL**

Dr. Jesús Kumate Rodríguez

### **PRESIDENTE DEL PATRONATO NACIONAL**

Dr. Roberto Tapia Conyer

### **PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA**

Sra. Kena Moreno

### **DIRECTORA GENERAL**

Lic. Carmen Fernández Cáceres

### **DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE NORMATIVIDAD**

Dr. José Ángel Prado García

### **DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA**

Dr. Ricardo Sánchez Huesca

### **SUBDIRECTOR DE INVESTIGACIÓN**

Mtro. David Bruno Díaz Negrete

### **JEFA DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA Y EPIDEMIOLÓGICA**

Dra. Solveig Eréndira Rodríguez Kuri

## CONTENIDO

ANTECEDENTES.....	5
MÉTODO.....	6
CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS.....	8
FACTORES ASOCIADOS A LA DEMANDA DE TRATAMIENTO.....	11
CONSUMO DE DROGAS.....	13
REFERENCIAS.....	24
CUADROS.....	27
GLOSARIO.....	51

## ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro 1. Pacientes de primer ingreso a tratamiento por unidad de atención (CIJ)	28
Cuadro 2. Sexo	31
Cuadro 3. Persona que proporciona la información	31
Cuadro 4. Edad de ingreso a tratamiento	31
Cuadro 5. Estado civil	32
Cuadro 6. Escolaridad	32
Cuadro 7. Ocupación	33
Cuadro 8. Estrato social	33
Cuadro 9. Motivos de consulta	34
Cuadro 10. Condicionantes de la solicitud de tratamiento	34
Cuadro 11. Antecedentes de acciones contra el consumo de sustancias	35
Cuadro 12. Problemas asociados al consumo de sustancias	35
Cuadro 13. Edad de inicio del consumo de Tabaco	36
Cuadro 14. Edad de inicio del consumo de Alcohol	36
Cuadro 15. Edad de inicio del consumo de Drogas ilícitas	37
Cuadro 16. Drogas ilícitas de inicio	38
Cuadro 17. Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de Tabaco y el ingreso a tratamiento a CIJ	39
Cuadro 18. Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de Alcohol y el ingreso a tratamiento a CIJ	39
Cuadro 19. Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de Drogas ilícitas y el ingreso a tratamiento a CIJ	40
Cuadro 20. Tipo de consumo de drogas ilícitas	40
Cuadro 21. Total de drogas consumidas alguna vez en la vida (incluye alcohol o tabaco)	41
Cuadro 22. Total de drogas ilícitas consumidas alguna vez en la vida (no incluye ni alcohol ni tabaco)	41
Cuadro 23. Consumo de drogas alguna vez en la vida por sustancia	42
Cuadro 24. Total de drogas consumidas en el último año (incluye alcohol o tabaco)	43
Cuadro 25. Total de drogas ilícitas consumidas en el último año (no incluye ni alcohol ni tabaco)	43
Cuadro 26. Consumo de drogas en los últimos 12 meses por sustancia	44
Cuadro 27. Droga de preferencia en los últimos 12 meses, según menciones	45
Cuadro 28. Droga de mayor impacto en los últimos 12 meses, según menciones	46
Cuadro 29. Uso combinado de drogas en los últimos 12 meses (no incluye tabaco)	47
Cuadro 30. Total de drogas consumidas en los últimos 30 días (incluye alcohol o tabaco)	47
Cuadro 31. Total de drogas ilícitas consumidas en los últimos 30 días (no incluye ni alcohol ni tabaco)	48
Cuadro 32. Consumo de drogas en los últimos 30 días por sustancia	49
Cuadro 33. Frecuencia de episodios de abuso del consumo de Tabaco en los últimos 30 días	50
Cuadro 34. Frecuencia de episodios de abuso del consumo de Alcohol en los últimos 30 días	50
Cuadro 35. Frecuencia de episodios de abuso del consumo de drogas ilícitas en los últimos 30 días	50

## RESUMEN

El informe se realizó con base en 12,787 registros clínicos de entrevista inicial de personas usuarias de sustancias psicoactivas que reportaron consumo de al menos una droga ilícita y que acudieron por primera vez a consulta a Centros de Integración Juvenil entre enero y junio de 2012. Los propósitos del estudio son a) actualizar la información del perfil sociodemográfico de pacientes, de los factores asociados a la demanda de tratamiento y del patrón de consumo de sustancias; b) contribuir a retroalimentar sistemas nacionales de información del consumo de drogas en nuestro país; c) aportar bases para fundamentar estudios que involucren a pacientes o consumidores(as) de drogas en México y sus regiones; y d) sobre todo contribuir al desarrollo, diseño y ajuste de los servicios institucionales de prevención y tratamiento del consumo de drogas.

Los datos permiten ver que el uso de drogas ilícitas es aún un trastorno que afecta en mayor proporción a la población masculina que solicita tratamiento, en una razón de 4.3 hombres por cada mujer. La edad media de ingreso a tratamiento fue de 22.9 años, En promedio, los hombres ingresan a tratamiento a una edad mayor que las mujeres (23.3 años hombres y 21.1 años mujeres). La edad promedio del inicio del consumo de tabaco se situó en general en los 14.4 años, la de alcohol en 14.5 años y la de drogas ilícitas en 16.1 años. En promedio, tanto los hombres como las mujeres inician el consumo de estas drogas a la misma edad.

Las drogas de mayor consumo alguna vez en la vida fueron alcohol (89.3%), tabaco (85.6%), cannabis (79.5%), inhalables (43.0%), cocaína/*crack* (45.1%), estimulantes (19.8%), depresores (15.5%), drogas alucinógenas y disociativas (10.1%) y opiáceos (4.4%). En cuanto al consumo en el mes previo al ingreso a tratamiento, las sustancias más utilizadas fueron tabaco (62.9%), alcohol (57.4%), cannabis (42.4%), inhalables (19.4%) y cocaína/*crack* (15.9%). Las sustancias de mayor impacto fueron marihuana (32.3%), alcohol (17.1%), solventes y removedores (13.0%), *crack* (8.4%), tabaco (7.7%), cocaína en polvo (4.9%) y metanfetaminas (4.7%).

En cuanto a los factores asociados a la demanda de tratamiento se observó que los usuarios de drogas acudieron principalmente por condicionamiento o recomendación familiar (45.4%) o por iniciativa propia (41.1%); que buscan atención por el consumo de drogas ilícitas (83.7%), por alcohol (42.9%) y por tabaco (36.7%); que no han tomado ninguna medida contra el problema (25.7%) o que han intentado interrumpir de manera voluntaria y sin apoyo el consumo (29.0%); y que entre los problemas más frecuentemente asociados al consumo se reconocen los de tipo familiar (81.8%), los de salud (42.5%), los psicológicos (38.6%) y los escolares (36.6%).

Cabe destacar que se observan diferencias entre los hombres y mujeres atendidos en cuanto a sus características sociodemográficas, los factores asociados a la demanda de tratamiento y su patrón de consumo.

## ANTECEDENTES

Centros de Integración Juvenil ha reportado información de los pacientes atendidos y su consumo de drogas desde 1976<sup>1</sup> y en 1983 inicia la aplicación de una cédula homogénea a los pacientes de nuevo ingreso<sup>2</sup>, aunque no es sino a partir de 1990 que lleva a cabo el reporte estadístico de datos en forma sistemática y se consolida como *Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas (SIECD)*<sup>3</sup>, con lo cual a lo largo de los años ha podido realizar el seguimiento oportuno de un conjunto de variables que, además de haber contribuido en la toma de decisiones del diseño y ajuste de servicios institucionales, también ha aportado conocimiento de la forma y tendencias del uso de drogas en nuestro país, proporcionando a los Sistemas Epidemiológicos de las Adicciones, tanto a nivel Nacional como Regional, tal es el caso del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA)<sup>4</sup> de la Secretaría de Salud, y desde 1993, ha proporcionado información al Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas (SRID), perteneciente al Instituto Nacional de Psiquiatría “*Ramón de la Fuente*” (INP)<sup>5</sup>, así como al Observatorio Epidemiológico en Drogas de la Secretaría Salud<sup>6</sup>.

El SIECD también ha ofrecido información para el desarrollo de diferentes estudios epidemiológicos especializados, con temas que van desde el perfil de usuarios de drogas y su trayectoria de consumo<sup>7</sup>, el consumo de drogas en las mujeres<sup>8</sup>, en la población infantil<sup>9</sup> o de acuerdo con las etapas de la vida<sup>10</sup>, hasta llegar a los estudios de tendencias<sup>11,12,13</sup>. Toda esta información ha facilitado el enfrentamiento oportuno de las problemáticas generadas por el creciente consumo de estimulantes y simultáneamente ha impulsado el desarrollo de estudios sobre las características particulares de los consumidores de estos alcaloides<sup>14,15</sup>.

Por otro lado, el análisis de la información reportada ha dado pie al desarrollo de estudios epidemiológicos particulares, enfocados en profundizar en las características del consumo de drogas legales de pacientes atendidos. Así, desde el año 2006, el SIECD se avocó a reportar por separado las características de este tipo de usuarios consumidores de tabaco y alcohol<sup>16</sup>, con lo cual se ha logrado identificar una emergencia epidemiológica del consumo de alcohol entre las pacientes atendidas con relación a los años anteriores<sup>17</sup>, emergencia que también ha sido reportada por la Encuesta Nacional de Adicciones (ENA), sobre todo para el caso de las mujeres jóvenes<sup>18</sup> y ha dado pie a CIJ para profundizar en esta problemática<sup>19</sup>.

Adicionalmente, es importante destacar que la información reportada por el SIECD durante el lapso de más de dos décadas ha sido consistente con la de las Encuestas

Nacionales de Adicciones (ENA) de este periodo, ya sea en el nivel nacional o en el regional<sup>18</sup> y también que ha sido referente para el desarrollo de metodologías de investigación en variados estudios clínicos, psicosociales y evaluativos de la Institución, como es el caso de diversos *Estudios de la Comunidad Objetivo (EBCO)*<sup>20</sup> realizados por los CIJ a lo largo y ancho del país.

El presente informe se elaboró con base en la información obtenida por el SIECD de Centros de Integración Juvenil (CIJ) y tiene el objetivo de proporcionar datos actualizados sobre las características sociodemográficas, factores asociados a la demanda de tratamiento y del patrón de consumo de drogas de la población usuaria de los servicios de tratamiento institucionales, con el propósito adicional de apoyar el diseño, planeación y ajuste de los programas institucionales de prevención, tratamiento y rehabilitación, además de contribuir con información a los sistemas de información en drogas de los Gobiernos y de aportar elementos para la elaboración de investigaciones en el campo de las adicciones.

## MÉTODO

**Diseño de estudio:** Censo, estudio transversal, descriptivo.

**Población:** 12,787 pacientes procedentes de 105 unidades de CIJ que acudieron por primera vez a consulta entre enero y junio de 2012, que proporcionaron personalmente la información y reportaron el consumo voluntario de sustancias psicoactivas (cuadro 1. Anexo).

**Fuente de información:** Formato de Entrevista Inicial, aplicado en la primera consulta por parte del personal médico-técnico responsable del ingreso de pacientes a tratamiento, que forman parte del expediente clínico en cualquiera de sus dos versiones: formato electrónico (12,078 casos), base de datos recuperada el día 9 de Octubre del 2012; o formato impreso (709 casos), los cuales se mandaron a capturar en forma externa.

**Variables de estudio:** Las características sociodemográficas estudiadas comprenden: asistentes a la entrevista, sexo, edad de ingreso a tratamiento, estado civil, escolaridad, ocupación y estrato social; las variables de los factores asociados a la demanda de tratamiento: motivo(s) de consulta, condicionante(s) de la solicitud de tratamiento, antecedente(s) de acciones tomadas frente al uso de sustancias y problema(s) asociado(s) al mismo; y las variables de patrón de consumo: edad de inicio, tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de sustancias y el ingreso a tratamiento, consumo alguna vez en la vida, en el último año y en los últimos 30 días; drogas de

preferencia y de mayor impacto en el último año, uso combinado de sustancias, tipo de consumo de drogas ilícitas, episodios de abuso y total de drogas consumidas.

La información sobre el consumo de drogas se presenta categorizada en diez grupos de sustancias: tabaco, alcohol, cannabis, cocaína, inhalables, depresores, estimulantes, drogas alucinógenas y disociativas, opiáceos y otras sustancias de abuso.

Asimismo, también se desagregan los diez grupos antes mencionados en 26 categorías de sustancias: tabaco; alcohol; Cannabis: marihuana y hachís; Cocaína: cocaína en polvo blanco, *crack* y otras presentaciones de cocaína; Inhalables: solventes y removedores, pegamentos, esmaltes y pinturas y otros inhalables; Depresores: benzodiazepinas, *Rohypnol* y otros depresores; Estimulantes: anfetaminas, metanfetaminas (*crystal, ICE, etc.*), MDMA (éxtasis) y metanfetaminas alucinógenas y otros estimulantes; Drogas alucinógenas y disociativas: ácido lisérgico (LSD), plantas alucinógenas y derivados y otras; Opiáceos: heroína, opiáceos sintéticos, y opio y otros opioides; Otras sustancias de abuso: sustancias con utilidad médica y otras.

**Procesamiento de datos.** La información obtenida a través del expediente clínico electrónico fue capturada por los y las terapeutas responsables de realizar la entrevista inicial, mientras que la información recabada a través del formato impreso de Entrevista Inicial fue capturada por profesionales externos mediante el programa *Control de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas* (CIECD). Para el procesamiento estadístico se utilizó el programa SPSS v.19.

Los resultados se presentan tanto en forma general como desglosada por sexo y en porcentajes válidos, excluyendo casos “*sin información*”, así como aquellos que no cumplieron con las condiciones requeridas para el análisis en cada variable de estudio.




## CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS<sup>a</sup>

**Sexo.** La población se conformó por más de diez mil hombres (10,391) y más de dos mil mujeres (2,396) lo que en porcentajes representa a un ochenta por ciento de hombres (81.3%) y veinte por ciento de mujeres (18.7%), dando una proporción aproximada de cuatro hombres (4.3) por cada mujer.

**Persona que proporciona la información.** Casi la mitad de las ocasiones (45.5%) los pacientes acudieron solos (45.8% de los hombres y 44.4% de las mujeres), mientras que en la otra mitad (54.5%) lo hicieron en compañía de familiares u otras personas (54.2% de los hombres y 55.6% de las mujeres).

**Edad de ingreso a tratamiento.** Se observa un rango de edad de 6 a 78 años, con un promedio de 23 años ( $\mu=22.9$ ). Con una desviación estándar de diez años ( $\sigma=10.2$ ), lo cual implica que más del 80% de las personas atendidas (10,595) se ubique entre los 13 y 33 años de edad; la edad mediana de la población fue de 19 años, lo que conduce a precisar que el 42.5% de los casos fueron menores de edad (5,433 sujetos); finalmente, la moda se ubicó en 16 años (1,124 personas atendidas).

Figura 1. Edad de ingreso según sexo




<sup>a</sup> Cfr., Cuadros 1 a 8.

**Estado civil.** La mayor parte de la población refirió ser soltera (71.5%), mientras que un 21.3% indicó que vivía en unión libre o que estaba casada, con ligeras diferencias entre los sexos.


**Figura 2. Estado civil según sexo**

Un mayor porcentaje de hombres cuenta con una relación de pareja; mientras que una mayor proporción de mujeres se encuentran divorciadas o viudas.



**Escolaridad.** 47.6% cursaba o había cursado algún grado de educación secundaria, 30.8% al menos algún grado de bachillerato, 10.6% al menos un año de educación primaria y 7.6% uno o más años de estudios superiores.


**Figura 3. Escolaridad según sexo**



Las mujeres registran mayores niveles de escolaridad que los hombres.

**Ocupación.** 34.1% desempeñaba alguna actividad laboral, 32.1% estudiaba y 25.1% se encontraba desempleado.


**Figura 4. Principal ocupación según sexo**



**Mientras que un mayor porcentaje de mujeres se dedicaba a estudiar o a las labores del hogar; una mayor proporción de hombres trabajaba o no contaba con ocupación alguna.**

**Estrato social.** Según la percepción de los terapeutas 58.8% de los pacientes correspondieron al estrato medio bajo, 30.1%, al estrato bajo y 9.7%, al estrato medio alto.


**Figura 5. Estrato social según sexo**



**Según la percepción de los terapeutas tanto hombres como mujeres presentan condiciones sociales similares.**


## FACTORES ASOCIADOS A LA DEMANDA DE TRATAMIENTO<sup>b</sup>

**Motivos de consulta.** 44.0% de las personas atendidas reportó más de un motivo para acudir a tratamiento (uso de alcohol, tabaco o drogas), mientras que 2.1% no expresó ninguno. Conviene señalar que 83.7% acudió por consumo de drogas ilícitas, 42.9% por uso de bebidas alcohólicas y 36.7% por uso de tabaco.



Un porcentaje un poco menor de mujeres demanda tratamiento por consumo de drogas ilegales, bebidas alcohólicas y tabaco en comparación con los hombres.

**Condicionantes de la solicitud de tratamiento.** 21.0% de los casos expresó dos o más condicionantes de su solicitud de tratamiento, 45.4% acudió por condicionamiento o recomendación familiar, 41.1% por *motu proprio*, 15.4% por condicionamiento o recomendación escolar y 9.4% por condicionamiento legal.




Si bien, hombres y mujeres acuden principalmente por recomendación familiar o por iniciativa propia, las mujeres presentan porcentajes más altos en cuanto acudir por condicionamiento o recomendación escolar y los varones lo hacen por condicionamiento legal o laboral.

<sup>b</sup> Cfr., Cuadros 9 a 12.


**Antecedentes de acciones contra el consumo de sustancias.** 29.0% de los pacientes expresó que antes de acudir a CIJ había intentado interrumpir el consumo de manera voluntaria pero sin apoyo, 7.3% lo había hecho por medio de juramento, 13.6% señaló que previamente había estado internado en algún anexo, mientras que 8.9% había acudido a grupos de autoayuda, 7.0% acudió a algún tipo de tratamiento psiquiátrico o psicoterapéutico y 31.6% reportó haber intentado al menos dos tipos distintos de acciones para abandonar el consumo de estupefacientes. A diferencia, 25.7% expresó que hasta el momento de la solicitud de tratamiento no había tomado ninguna medida en contra del consumo de drogas.

**Figura 8. Antecedentes de acciones contra el consumo de sustancias según sexo**



**Las pacientes adoptan menos medidas o acciones contra el consumo de sustancias que los pacientes antes de solicitar tratamiento a CIJ.**

**Problemas asociados al consumo de sustancias.** 81.8% señaló problemas de tipo familiar, 42.5% de salud, 38.6% psicológicos, 36.6% escolares, 23.4% legales, 23.1% laborales, 18.8% de conducta antisocial o delictiva y 15.2% accidentes o lesiones. Cabe señalar que 77.7% de las personas atendidas mencionaron dos o más problemas asociados al consumo de sustancias, en tanto que 2.6% no reportó ninguno.



**Las mujeres presentan en mayor proporción problemas psicológicos y escolares, mientras que los hombres de tipo legal, laboral y de conducta antisocial.**

## CONSUMO DE DROGAS<sup>c</sup>

**Edad de inicio del consumo de sustancias.** La edad promedio de inicio del consumo de tabaco se situó en 14.4 años ( $\sigma=3.3$  años), y tanto la mediana y la moda en 14 años, mientras que la edad promedio de inicio del consumo de alcohol se ubicó en 14.5 años ( $\sigma=2.8$  años); la mediana se situó en 14 años, mientras que la moda en los 15 años. A diferencia la edad promedio de inicio en el abuso de drogas ilícitas (incluyendo sustancias con utilidad médica utilizadas fuera de prescripción) fue de 16.1 años ( $\sigma=4.9$  años), con mediana y moda de 15 años. Por otra parte, al considerar el primer decil como indicador de las edades de inicio más tempranas, se observa que el consumo de tabaco aparece a los 11 años mientras que el de alcohol y drogas ilícitas lo hace un año después.

**Figura 10. Edad de inicio del consumo de sustancias según sexo**


	Años			Años		
	Tabaco	Alcohol	Drogas ilícitas	Tabaco	Alcohol	Drogas ilícitas
<b>Promedio</b>	14.3	14.5	16.1	14.5	14.4	16.5
<b>Desviación estándar</b>	3.2	2.8	4.6	3.5	3.6	6.1
<b>Mediana</b>	14	15	15	14	14	15
<b>Moda</b>	14	15	15	13	13	13

**Tanto Hombres como mujeres inician el consumo de sustancias a edades similares.**

<sup>c</sup> Cfr., Cuadros 13 a 35

**Drogas ilícitas de inicio.** Las sustancias de inicio más reportadas fueron en primer lugar la cannabis (61.4%), sobre todo en forma de marihuana (61.3%); en segundo lugar los inhalables (21.1%), la mayor parte en forma de solventes y removedores (15.1%); en tercer puesto se ubica la cocaína (11.3%), tanto en forma de polvo blanco (8.2%) o como piedras de *crack* (3.0%); en cuarto lugar aparecen los estimulantes (2.8%), entre los cuales se destacan las metanfetaminas (1.3%) y las anfetaminas (0.8%); en quinto lugar se ubican los depresores con utilidad médica (2.2%; 2.0% reportó el uso de benzodiacepinas); y en sexto puesto los opiáceos (0.4%), sobre todo en el caso de la heroína (49 casos).

**Figura 11. Principales drogas ilícitas de inicio según sexo**



**Es mayor la proporción de hombres que inician el consumo de drogas con cannabis y crack, mientras que entre las mujeres es mayor con inhalables, depresores y metanfetaminas.**



**Lapso transcurrido entre el inicio del consumo de sustancias y el ingreso a tratamiento en CIJ.** El promedio de tiempo entre el inicio de consumo y la solicitud de tratamiento se situó de la siguiente manera: la de tabaco en 8.9 años ( $\sigma=9.7$  años), la de alcohol en 8.8 años ( $\sigma=9.5$  años) y la de drogas ilícitas en 7 años ( $\sigma=8.7$  años), Cabe puntualizar que 50% de los usuarios dejó pasar entre uno y cinco años desde el momento en que se inició el consumo de tabaco y alcohol y el momento de acudir a solicitar tratamiento, mientras que para el caso de las drogas ilícitas fue entre uno y tres años.


**Figura 12. Lapso transcurrido entre el inicio del consumo de sustancias y el ingreso a tratamiento en CIJ según sexo**

Las mujeres solicitan tratamiento en forma más oportuna.

	Años			Años		
	Tabaco	Alcohol	Drogas ilícitas	Tabaco	Alcohol	Drogas ilícitas
<b>Promedio</b>	9.3	9.3	7.4	6.9	6.8	4.8
<b>Desviación estándar</b>	9.8	9.7	8.9	8.6	8.4	7.1
<b>Mediana</b>	5	5	4	3	3	2
<b>Moda</b>	1	1	1	1	1	< 1 año

**Tipo de consumo de drogas ilícitas.** 53.3% de los solicitantes de tratamiento fue diagnosticado con consumo funcional, 18.4% con consumo disfuncional, 13.6% con consumo social u ocasional, 10.8% con consumo experimental y 3.9% en remisión.

**Figura 13. Tipo de consumo de drogas ilícitas según sexo**




Las mujeres presentan patrones de consumo menos graves que los hombres.

**Total de drogas consumidas.** El promedio de sustancias utilizadas alguna vez en la vida, incluyendo alcohol o tabaco, fue de 4.3 drogas (95.5% reportó el uso de dos o más sustancias); en el último año fue de 3.2 drogas (87.0% consumió dos o más sustancias); y en los últimos 30 días fue de 2.2 drogas (67.0% reportó haber utilizado dos o más sustancias).

El promedio de sustancias utilizadas alguna vez en la vida, sin incluir alcohol y tabaco, fue de 2.6 drogas (61.5 % reportó el uso de dos o más sustancias); en el último año fue de 1.7 drogas (40.7% consumió dos o más sustancias); y en los últimos 30 días fue de una droga (20.5% reportó haber utilizado dos o más sustancias).


**Figura 14. Total de drogas consumidas según sexo**



**Mujeres y hombres consumen, prácticamente, el mismo número de drogas.**

**Consumo de drogas alguna vez en la vida.**<sup>d</sup> Las proporciones de consumo alguna vez en la vida de los diez grupos de sustancias fueron: alcohol (89.3%), tabaco (85.6%); cannabis (79.5%), inhalables (43.0%), cocaína (45.1%), estimulantes (19.8%), depresores (15.5%), drogas alucinógenas y disociativas (10.1%), opiáceos (4.4%) y otras sustancias de abuso (2.5%).

En cuanto al uso de sustancias específicas (contenidas en alguno de los diez grupos antes mencionados) sobresalen marihuana (79.4%), cocaína en polvo blanco (37.1%) solventes y removedores (31.3%), crack (23.3%), benzodiacepinas (14.2%), metanfetaminas (12.5%) y pegamentos (11.1%).




**Las drogas más utilizadas alguna vez en la vida por hombres y mujeres fueron alcohol, tabaco, cannabis e inhalables; las mujeres reportan mayor consumo de inhalables y benzodiacepinas que los hombres.**

<sup>d</sup> Dado que la mayoría de los casos refirió haber utilizado dos o más sustancias —tanto en esta categoría como en las de uso en el último año y en los últimos 30 días, *infra*— la suma de porcentajes no es igual a 100.

**Consumo de drogas en los últimos 12 meses.** 97.3% de las personas reportaron haber consumido alguna sustancia en el año previo a su ingreso a tratamiento en CIJ. Las proporciones de consumo de los diez grupos de sustancias utilizadas en este lapso fueron: alcohol (79.2%), tabaco (74.3%), cannabis (60.3%), inhalables (30.7%), cocaína (29.2%), estimulantes (12.4%), depresores (9.2%), drogas alucinógenas y disociativas (4.8%); opiáceos (3.1%) y otras sustancias de abuso (1.4%).

En cuanto al consumo de sustancias específicas contenidas en alguno de los grupos anteriores destacan: marihuana (60.2%), solventes y removedores (22.2%), cocaína en polvo blanco (20.4%) y *crack* (15.2%); en menor proporción se refieren a las benzodiacepinas (8.7%), las metanfetaminas (8.0%) y los pegamentos (6.4%).


**Figura 16. Consumo de drogas en los últimos 12 meses según sexo**



**Las drogas más consumidas en el último año por hombres y mujeres fueron alcohol, tabaco, cannabis e inhalables; las mujeres reportan mayor consumo de inhalables y benzodiacepinas que los hombres.**

**Droga de preferencia en los últimos 12 meses.** Entre las sustancias más frecuentemente referidas se encontraron: cannabis (35.1%), alcohol (19.1%) y tabaco (13.6%). En menores proporciones aparecieron: solventes y removedores (10.2%), crack (6.4%), cocaína en polvo (3.6%), metanfetaminas (3.1%) y heroína (2.1%).


**Figura 17. Droga de preferencia en los últimos 12 meses según sexo**



**Durante el último año los hombres prefirieron consumir en mayor medida cannabis mientras que las mujeres inhalables.**

**Droga de mayor impacto en los últimos 12 meses.** Entre las sustancias a cuyo consumo los pacientes atribuyen los mayores daños en la salud, en el bienestar personal y familiar o en el desempeño escolar, laboral o social se señalaron: cannabis (32.2%), alcohol (17.1%), solventes y removedores (13.0%), crack (8.4%), tabaco (7.7%), cocaína en polvo (4.9%) y metanfetaminas (4.7%).


**Figura 18. Droga de mayor impacto en los últimos 12 meses según sexo**



**La cannabis es la droga que los hombres reportan como la sustancia que les ha causado mayores problemas, mientras que las mujeres refieren a los inhalables**

**Uso combinado de drogas en los últimos 12 meses.<sup>e</sup>** Al menos en una ocasión en el transcurso del último año y excluyendo el consumo de tabaco, poco menos de la mitad de la población (48.2%) reportó el consumo en un mismo día de dos o más sustancias.

**Figura 19. Uso combinado de droga en los últimos 12 meses según sexo**



**Los hombres combinan con mayor frecuencia dos o más drogas que las mujeres**  
(Excluye el consumo de tabaco)


<sup>e</sup> No se toman en cuenta 3,267 casos (25.5%) que no cumplieron los criterios de inclusión de esta variable; 24.8% de los hombres y 28.8% de las mujeres. (ver anexo).

**Consumo de drogas en los últimos 30 días.** Incluyendo al alcohol y al tabaco, 89.8% de los casos reportaron consumo de sustancias en el mes anterior al ingreso a tratamiento.

Las proporciones de consumo de los diez grupos de sustancias utilizadas en este lapso fueron: tabaco (62.9%), alcohol (57.4%), cannabis (41.4%), inhalables (19.4%), cocaína (15.9%), estimulantes (6.1%), depresores (5.0%), opiáceos (2.2%), drogas alucinógenas y disociativas (1.3%) y otras sustancias de abuso (0.8%).


En cuanto al consumo de sustancias específicas destaca el de marihuana con 41.3%, solventes/removedores (13.6%), crack (9.0%), cocaína en polvo (8.8%); en menor proporción se registra el consumo de benzodiacepinas (4.8%), metanfetaminas (4.5%) y pegamentos (3.7%).

**Figura 20. Consumo de drogas en los últimos 30 días según sexo**



**En los 30 días previos a la solicitud de tratamiento las mujeres presentan mayor consumo de inhalables y benzodiacepinas que los hombres.**

**Frecuencia de episodios de abuso en los últimos 30 días.** 39.1% de quienes reportaron consumo de tabaco en los últimos 30 días aceptó fumar seis o más cigarrillos diariamente. Así mismo, entre quienes consumieron alcohol, una tercera parte (34.2%) reportó consumo abusivo menos de una vez a la semana, otra tercera parte (34.0%) abusó del alcohol una o dos veces a la semana. Finalmente, 38.7% de los usuarios de drogas ilícitas durante el último mes reportó consumirlas todos los días, 26.0% menos de una vez a la semana y 21.4% una a dos veces a la semana.



Las proporciones de abuso de y tabaco tienden a ser similares entre los sexos, mientras que en el caso de alcohol y las drogas ilícitas los hombres reportan episodios de abuso con mayor frecuencia que las mujeres.



## Referencias

1. Sánchez-Huesca, R. y López Granados, L. (1985). **Características demográficas y patrones de inicio en el consumo de drogas en asistentes a los Centros Locales; recuperación de los archivos de siete años (1976-1982)**. México: Centros de Integración Juvenil, A.C. (reporte interno).
2. Clarac Rengade, P. y Wagner Echeagaray, F. (1987). Análisis de algunas variables en una muestra de pacientes farmacodependientes (1986). En F. Wagner Echeagaray y R. Ortiz Mondragón (Comp.) (1990). **Estudios acerca de la farmacodependencia en México realizados por Paule Clarac**. México: Centros de Integración Juvenil, A. C. (pp. 111-126).
3. García Aurrecochea, R., Díaz Negrete, B., Balanzario, M. C., Gutierrez-López, A. Castillo-Franco, I. (1999). Características sociodemográficas y de consumo de drogas en pacientes atendidos entre 1990 y 1997. México: Centros de Integración Juvenil, A.C., Dirección de Promoción Institucional. **Informe de investigación 98-12**.
4. Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA), **Informe 2009** (2010). México: Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, Dirección de Epidemiología, Dirección de Investigación Operativa Epidemiológica.  
[http://www.dgepi.salud.gob.mx/2010/PDFS/SISVEA/informes\\_sisvea\\_2009.pdf](http://www.dgepi.salud.gob.mx/2010/PDFS/SISVEA/informes_sisvea_2009.pdf)
5. Ortiz A, Martínez R., Meza D. Grupo Interinstitucional para el desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. **Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana** No. 50, Junio de 2011. México: Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.  
[http://www.inprf.gob.mx/opencms/export/sites/INPRFM/psicosociales/archivos/srid/rep\\_50\\_pdf.pdf](http://www.inprf.gob.mx/opencms/export/sites/INPRFM/psicosociales/archivos/srid/rep_50_pdf.pdf)
6. Díaz, D. B., Balanzario, M. C., Castillo, I., Gutierrez, A. y García, R. (2001). Uso de drogas entre pacientes de primer ingreso en Centros de Integración Juvenil. En Secretaría de Salud. **Observatorio Epidemiológico en drogas. El fenómeno de las adicciones en México 2001**. México: Secretaría de Salud (pp. 66-71) (ISBN: 970-721-008-7). [http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/publicaciones/obs2001\\_cap4.pdf](http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/publicaciones/obs2001_cap4.pdf)
7. García-Aurrecochea, R., Díaz-Negrete, B., Balanzario, M. C., Castillo-Franco, I. (1998). **Perfil y trayectoria del consumo de drogas en pacientes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil en 1996**. En CD: B. D. Díaz Negrete, J. Arellanez, M. C. Balanzario y R. Sánchez Huesca, *Once años de estudios*

*del consumo de drogas en México, Investigaciones realizadas en Centros de Integración Juvenil entre 1997 y 2007.* México: Centros de Integración Juvenil (ISBN: 968-5411-5).

8. Castillo Franco, P. I., Gutiérrez López, A. D. (2008). Consumo de drogas en mujeres asistentes a centros de tratamiento especializado en la Ciudad de México. **Salud Mental 31 (5)**, 351-359. <http://scielo.unam.mx/pdf/sm/v31n5/v31n5a3.pdf>

9. Gracia Gutiérrez de Velasco, S. E. y Balanzario Lorenzana, M. C. (2003). El consumo de drogas en menores de 12 años en Centros de Integración Juvenil en el año 2002. México: Centros de Integración Juvenil, A.C., Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación. **Informe de Investigación 03-17.**

10. García Aurrecochea, R., Castillo Franco, P. I. y Guerrero Huesca, J. A. (2003). El consumo de drogas en pacientes atendidos en Centros de Integración Juvenil según la etapa de vida correspondiente al ingreso a tratamiento. México: Centros de Integración Juvenil, A.C., Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación. **Informe de Investigación 03-13.**

11. García Aurrecochea, R., Díaz Negrete, B., Balanzario, M. C. (2001). Tendencias del consumo de drogas en pacientes de primer ingreso a tratamiento en CIJ entre 1990 y 1999. México: Centros de Integración Juvenil, A.C., Dirección de Promoción Institucional. **Informe de investigación 2000-06.**

12. Gutiérrez López, AD. (2012). Tendencias del consumo de drogas alguna vez en la vida en Centros de Integración Juvenil. Segundo semestre de 2004 - Primer semestre de 2011 (Nivel Nacional y Entidades Federativas). México: Centros de Integración Juvenil, A.C., Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación. **Informe de Investigación 12-02e.** <http://www.cij.gob.mx/Especialistas/pdf/12-02e.pdf>

13. Gutiérrez López, A. D. (2012). Droga de mayor impacto reportada por usuarios de drogas ilícitas en el año previo a la solicitud de tratamiento en Centros de Integración Juvenil. Segundo semestre de 2004 - Primer semestre de 2011 (Nivel Nacional y Entidades Federativa). México: Centros de Integración Juvenil, A.C., Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación. **Informe de Investigación 12-02g.** <http://www.cij.gob.mx/Especialistas/pdf/12-02g.pdf>

14. Jiménez Silvestre K., García Aurrecochea, V. R. y González Sánchez, J. D. (2005). Patrón de Consumo de Cocaína y Crack en pacientes que ingresan a Tratamiento. México: Centros de Integración Juvenil, A.C., Dirección de Investigación y Enseñanza,

Subdirección de Investigación. **Informe de investigación 05-07.**

15. Jiménez-Silvestre, K. y Castillo-Vite N.L. Factores de reincidencia en usuarios de cocaína, crack y metanfetaminas en fase de recuperación. México: Centros de Integración Juvenil, A.C., Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación. **Informe de Investigación 04-14.**

16. Gutiérrez López, A. D. y Castillo Franco, P. I. (2007). Características sociodemográficas y de consumo en usuarios de tabaco y alcohol de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil en 2006. México: Centros de Integración Juvenil, A.C., Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación. **Informe de Investigación 07-13.** <http://www.cij.gob.mx/Especialistas/pdf/07-13.pdf>

17. Velázquez Altamirano, M., Gutiérrez López, AD y Nute Méndez, LD. (2012). Consumo de tabaco y alcohol en pacientes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil. Enero - Junio 2011. México: Centros de Integración Juvenil, A.C., Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación. **Informe de Investigación 12-02d.** <http://www.cij.gob.mx/Especialistas/pdf/12-02d.pdf>

18. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz; Instituto Nacional de Salud Pública; Secretaría de Salud (2012). **Encuesta Nacional de Adicciones 2011: Reporte de Drogas.** Villatoro Velázquez JA, Medina Mora ME, Fleiz Bautista C, Téllez Rojo MM, Mendoza Alvarado LR, Romero Martínez M, Gutierrez Reyes JP, Castro Tinoco M, Hernández Ávila M, Tena Tamayo C, Alvear Sevilla C y Guisa Cruz V. México: INPRFM. <http://www.inprf.gob.mx>, [www.conadic.gob.mx](http://www.conadic.gob.mx), [www.cenadic.salud.gob.mx](http://www.cenadic.salud.gob.mx)

19. K. Moreno (Coord.) (2010). **Los jóvenes y el alcohol en México. Un problema emergente en mujeres.** México: Centros de Integración Juvenil, A.C.

20. CD: **EBCO 2007-2008. Estudio Básico de Comunidad Objetivo Vol. 1 y 2.** México: Centros de Integración Juvenil, A.C., Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación.

---

## **CUADROS**

---

**CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS USUARIOS DE DROGAS DE PRIMER INGRESO A TRATAMIENTO A CIJ EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2012**

**Cuadro 1. Pacientes de primer ingreso por unidad de atención (CIJ)**

CIJ	General		Hombres		Mujeres		Razón H:M
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	
Álvaro Obregón Norte	146	1.1	127	1.2	19	0.8	6.7 : 1
Álvaro Obregón Oriente	55	0.4	41	0.4	14	0.6	2.9 : 1
Azcapotzalco	238	1.9	191	1.8	47	2.0	4.1 : 1
Benito Juárez	169	1.3	129	1.2	40	1.7	3.2 : 1
Chalco	208	1.6	175	1.7	33	1.4	5.3 : 1
Coyoacán	184	1.4	148	1.4	36	1.5	4.1 : 1
Cuajimalpa	103	0.8	80	0.8	23	1.0	3.5 : 1
Cuauhtémoc Oriente	179	1.4	127	1.2	52	2.2	2.4 : 1
Cuauhtémoc Poniente	170	1.3	137	1.3	33	1.4	4.2 : 1
Ecatepec	251	2.0	194	1.9	57	2.4	3.4 : 1
Gustavo A. Madero Oriente	74	0.6	56	0.5	18	0.8	3.1 : 1
Gustavo A. Madero Aragón	309	2.4	278	2.7	31	1.3	9.0 : 1
Gustavo A. Madero Norte	193	1.5	158	1.5	35	1.5	4.5 : 1
Iztapalapa Oriente	532	4.2	447	4.3	85	3.5	5.3 : 1
Iztapalapa Poniente	158	1.2	122	1.2	36	1.5	3.4 : 1
Magdalena Contreras	51	0.4	43	0.4	8	0.3	5.4 : 1
Miguel Hidalgo	169	1.3	130	1.3	39	1.6	3.3 : 1
Naucalpan	297	2.3	223	2.1	74	3.1	3.0 : 1
Nezahualcóyotl	277	2.2	225	2.2	52	2.2	4.3 : 1
Texcoco	135	1.1	113	1.1	22	0.9	5.1 : 1
Tlalnepantla	194	1.5	168	1.6	26	1.1	6.5 : 1
Tlalpan	190	1.5	153	1.5	37	1.5	4.1 : 1
Toluca	224	1.8	178	1.7	46	1.9	3.9 : 1
Venustiano Carranza	201	1.6	166	1.6	35	1.5	4.7 : 1
Xochimilco	73	0.6	58	0.6	15	0.6	3.9 : 1
UH Ecatepec	89	0.7	82	0.8	7	0.3	11.7 : 1
UH Iztapalapa	73	0.6	61	0.6	12	0.5	5.1 : 1
UH Naucalpan	67	0.5	62	0.6	5	0.2	12.4 : 1
Acapulco	171	1.3	128	1.2	43	1.8	3.0 : 1
Aguascalientes	114	0.9	94	0.9	20	0.8	4.7 : 1
Apodaca	47	0.4	42	0.4	5	0.2	8.4 : 1
Cancún	220	1.7	180	1.7	40	1.7	4.5 : 1
Cd. del Carmen	53	0.4	36	0.3	17	0.7	2.1 : 1
Cd. Juárez Norte	150	1.2	120	1.2	30	1.3	4.0 : 1
Cd. Victoria	20	0.2	13	0.1	7	0.3	1.9 : 1

*(Continúa)*

**Cuadro 1. Pacientes de primer ingreso a tratamiento por Unidad de atención (CIJ)**  
(Continuación)

CIJ	General		Hombres		Mujeres		Razón H:M
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	
Celaya	162	1.3	137	1.3	25	1.0	5.5 : 1
Chetumal	83	0.6	69	0.7	14	0.6	4.9 : 1
Chihuahua	200	1.6	161	1.5	39	1.6	4.1 : 1
Chilpancingo	37	0.3	31	0.3	6	0.3	5.2 : 1
Colima	230	1.8	190	1.8	40	1.7	4.8 : 1
Cozumel	83	0.6	64	0.6	19	0.8	3.4 : 1
Cuernavaca	87	0.7	72	0.7	15	0.6	4.8 : 1
Culiacán	170	1.3	152	1.5	18	0.8	8.4 : 1
Durango	107	0.8	73	0.7	34	1.4	2.1 : 1
Escuinapa	66	0.5	57	0.5	9	0.4	6.3 : 1
Fresnillo Pinacoteca	36	0.3	23	0.2	13	0.5	1.8 : 1
Guadalajara Centro	262	2.0	216	2.1	46	1.9	4.7 : 1
Guadalajara Sur	117	0.9	101	1.0	16	0.7	6.3 : 1
Guadalupe	71	0.6	62	0.6	9	0.4	6.9 : 1
Guamúchil	34	0.3	30	0.3	4	0.2	7.5 : 1
Guasave	75	0.6	62	0.6	13	0.5	4.8 : 1
Hermosillo	201	1.6	157	1.5	44	1.8	3.6 : 1
Huatulco	21	0.2	19	0.2	2	0.1	9.5 : 1
Ixtapa Zihuatanejo	30	0.2	24	0.2	6	0.3	4.0 : 1
La Paz	111	0.9	95	0.9	16	0.7	5.9 : 1
La Piedad	30	0.2	20	0.2	10	0.4	2.0 : 1
Laguna Coahuila	200	1.6	129	1.2	71	3.0	1.8 : 1
Laguna Durango	105	0.8	89	0.9	16	0.7	5.6 : 1
León	235	1.8	176	1.7	59	2.5	3.0 : 1
Los Cabos	16	0.1	13	0.1	3	0.1	4.3 : 1
Los Mochis	91	0.7	77	0.7	14	0.6	5.5 : 1
Manzanillo	72	0.6	59	0.6	13	0.5	4.5 : 1
Mazatlán	107	0.8	85	0.8	22	0.9	3.9 : 1
Mérida	149	1.2	122	1.2	27	1.1	4.5 : 1
Mexicali	172	1.3	150	1.4	22	0.9	6.8 : 1
Monterrey	124	1.0	109	1.0	15	0.6	7.3 : 1
Morelia	99	0.8	82	0.8	17	0.7	4.8 : 1
Nogales	62	0.5	48	0.5	14	0.6	3.4 : 1
Oaxaca	126	1.0	107	1.0	19	0.8	5.6 : 1
Pachuca	133	1.0	105	1.0	28	1.2	3.8 : 1
Piedras Negras	4	0.0	4	0.0	0	0.0	---
Playa del Carmen	52	0.4	45	0.4	7	0.3	6.4 : 1

(Continúa)

**Cuadro 1. Pacientes de primer ingreso a tratamiento por Unidad de atención (CIJ)**  
(Continuación)

CIJ	General		Hombres		Mujeres		Razón H:M
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	
Poza Rica	51	0.4	35	0.3	16	0.7	2.2 : 1
Puebla	169	1.3	146	1.4	23	1.0	6.3 : 1
Puerto Vallarta	96	0.8	80	0.8	16	0.7	5.0 : 1
Querétaro	181	1.4	149	1.4	32	1.3	4.7 : 1
Salamanca	104	0.8	88	0.8	16	0.7	5.5 : 1
Saltillo	152	1.2	113	1.1	39	1.6	2.9 : 1
San Luis Potosí	167	1.3	131	1.3	36	1.5	3.6 : 1
San Nicolás de los Garza	49	0.4	38	0.4	11	0.5	3.5 : 1
Tampico	60	0.5	53	0.5	7	0.3	7.6 : 1
Tapachula	19	0.1	16	0.2	3	0.1	5.3 : 1
Tecomán	46	0.4	34	0.3	12	0.5	2.8 : 1
Tehuacán	79	0.6	70	0.7	9	0.4	7.8 : 1
Tepic	58	0.5	56	0.5	2	0.1	28.0 : 1
Tijuana Guaycura	184	1.4	138	1.3	46	1.9	3.0 : 1
Tijuana Soler	193	1.5	149	1.4	44	1.8	3.4 : 1
Tlaquepaque	205	1.6	167	1.6	38	1.6	4.4 : 1
Tuxtla Gutiérrez	156	1.2	126	1.2	30	1.3	4.2 : 1
Villahermosa	59	0.5	47	0.5	12	0.5	3.9 : 1
Xalapa	67	0.5	55	0.5	12	0.5	4.6 : 1
Zacatecas	94	0.7	71	0.7	23	1.0	3.1 : 1
Zamora	86	0.7	72	0.7	14	0.6	5.1 : 1
Zapopan Kena Moreno	13	0.1	12	0.1	1	0.0	12.0 : 1
Zapopan Norte	228	1.8	193	1.9	35	1.5	5.5 : 1
UH Ciudad Juárez (UMAA)	28	0.2	26	0.3	2	0.1	13.0 : 1
UH Culiacán	24	0.2	24	0.2	0	0.0	---
UH Ixbalanqué	14	0.1	13	0.1	1	0.0	13.0 : 1
UH Jerez	67	0.5	60	0.6	7	0.3	8.6 : 1
UH Monterrey	38	0.3	32	0.3	6	0.3	5.3 : 1
UH Punta Diamante	82	0.6	75	0.7	7	0.3	10.7 : 1
UH Tijuana	59	0.5	47	0.5	12	0.5	3.9 : 1
UH Zapopan	112	0.9	89	0.9	23	1.0	3.9 : 1
UH Zapotlán el Grande	26	0.2	26	0.3	0	0.0	---
UTPPCH Cd. Juárez	77	0.6	60	0.6	17	0.7	3.5 : 1
<b>Total</b>	<b>12,787</b>	<b>100.0</b>	<b>10,391</b>	<b>100.0</b>	<b>2,396</b>	<b>100.0</b>	<b>4.3 : 1</b>

UH=Unidad de Hospitalización

UTPPCH=Unidad de Tratamiento a Personas con Problemas de Consumo de Heroína

UMAA=Unidad Médica de Atención a las Adicciones

**Cuadro 2. Sexo**

	Frec.	%	Razón H:M
Hombres	10,391	81.3	4.3 : 1
Mujeres	2,396	18.7	
<b>Total</b>	<b>12,787</b>	<b>100.0</b>	

**Cuadro 3. Persona que proporciona la información**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Usuario de drogas	5,822	45.5	4,757	45.8	1,065	44.4
Usuario de drogas y familiares u otras personas	6,965	54.5	5,634	54.2	1,331	55.6
<b>Total</b>	<b>12,787</b>	<b>100.0</b>	<b>10,391</b>	<b>100.0</b>	<b>2,396</b>	<b>100.0</b>

**Cuadro 4. Edad de ingreso a tratamiento**

	General*			Hombres**			Mujeres***		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Hasta 9 años	6	0.0	0.0	6	0.1	0.1	0	0.0	0.0
10 a 14 años	1,851	14.5	14.5	1,280	12.3	12.3	571	23.8	23.8
15 a 19 años	5,015	39.2	39.2	4,064	39.1	39.1	951	39.7	39.7
20 a 24 años	1,884	14.7	14.7	1,578	15.2	15.2	306	12.8	12.8
25 a 29 años	1,268	9.9	9.9	1,085	10.4	10.4	183	7.6	7.6
30 a 34 años	927	7.2	7.3	795	7.7	7.7	132	5.5	5.5
35 a 39 años	717	5.6	5.6	639	6.1	6.2	78	3.3	3.3
40 a 44 años	472	3.7	3.7	412	4.0	4.0	60	2.5	2.5
45 años y más	643	5.0	5.0	528	5.1	5.1	115	4.8	4.8
<i>Sin información</i>	<i>4</i>	<i>0.0</i>	<i>Se omite</i>	<i>4</i>	<i>0.0</i>	<i>Se omite</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>	<i>Se omite</i>
<b>Total</b>	<b>12,787</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>10,391</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>2,396</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

\*  $\mu = 22.9$   $\sigma = 10.2$ ; Med.= 19; Mo.= 16; Decil1 = 14

\*\*  $\mu = 23.3$ ;  $\sigma = 10.2$ ; Med.= 19; Mo.= 16; Decil1 = 14

\*\*\*  $\mu = 21.1$ ;  $\sigma = 10.0$ ; Med.= 17; Mo.= 14; Decil1 = 13



**Cuadro 5. Estado civil**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Soltero	8,785	68.7	71.5	7,064	68.0	70.7	1,721	71.8	74.6
Casado	1,273	10.0	10.4	1,132	10.9	11.3	141	5.9	6.1
Unión libre	1,346	10.5	10.9	1,082	10.4	10.8	264	11.0	11.4
Separado	715	5.6	5.8	590	5.7	5.9	125	5.2	5.4
Divorciado	140	1.1	1.1	100	1.0	1.0	40	1.7	1.7
Viudo	36	0.3	0.3	20	0.2	0.2	16	0.7	0.7
<i>Sin información</i>	492	3.8	<i>Se omite</i>	403	3.9	<i>Se omite</i>	89	3.7	<i>Se omite</i>
<b>Total</b>	<b>12,787</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>10,391</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>2,396</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

**Cuadro 6. Escolaridad**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Ninguna (no sabe leer ni escribir)	56	0.4	0.4	45	0.4	0.4	11	0.5	0.5
Ninguna (sabe leer y escribir)	48	0.4	0.4	37	0.4	0.4	11	0.5	0.5
Primaria incompleta	503	3.9	3.9	436	4.2	4.2	67	2.8	2.8
Primaria completa	848	6.6	6.7	690	6.6	6.7	158	6.6	6.6
Secundaria incompleta	3,567	27.9	28.0	2,736	26.3	26.4	831	34.7	34.8
Secundaria completa	2,493	19.5	19.6	2,102	20.2	20.3	391	16.3	16.4
Estudios técnicos o comerciales incompletos	150	1.2	1.2	125	1.2	1.2	25	1.0	1.0
Estudios técnicos o comerciales completos	128	1.0	1.0	92	0.9	0.9	36	1.5	1.5
Bachillerato incompleto	2,973	23.3	23.3	2,500	24.1	24.2	473	19.7	19.8
Bachillerato completo	959	7.5	7.5	782	7.5	7.6	177	7.4	7.4
Estudios superiores incompletos	642	5.0	5.0	520	5.0	5.0	122	5.1	5.1
Estudios superiores completos	330	2.6	2.6	251	2.4	2.4	79	3.3	3.3
Estudios de posgrado incompletos	11	0.1	0.1	8	0.1	0.1	3	0.1	0.1
Estudios de posgrado completos	28	0.2	0.2	23	0.2	0.2	5	0.2	0.2
<i>Sin información</i>	51	0.4	<i>Se omite</i>	44	0.4	<i>Se omite</i>	7	0.3	<i>Se omite</i>
<b>Total</b>	<b>12,787</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>10,391</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>2,396</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

**Cuadro 7. Ocupación**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Desempleado(a)	3,174	24.8	25.1	2,655	25.6	25.8	519	21.7	21.8
Estudiante	4,067	31.8	32.1	3,072	29.6	29.9	995	41.5	41.8
Estudia y trabaja	587	4.6	4.6	512	4.9	5.0	75	3.1	3.1
Trabaja	4,316	33.8	34.1	3,875	37.3	37.7	441	18.4	18.5
Tareas del hogar	480	3.8	3.8	129	1.2	1.3	351	14.6	14.7
Pensionado	36	0.3	0.3	34	0.3	0.3	2	0.1	0.1
<i>Sin información</i>	127	1.0	<i>Se omite</i>	114	1.1	<i>Se omite</i>	13	0.5	<i>Se omite</i>
<b>Total</b>	<b>12,787</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>10,391</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>2,396</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

**Cuadro 8. Estrato social**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Alto	69	0.5	0.6	53	0.5	0.5	16	0.7	0.7
Medio alto	1,177	9.2	9.7	942	9.1	9.5	235	9.8	10.3
Medio bajo	7,162	56.0	58.8	5,815	56.0	58.7	1,347	56.2	59.2
Bajo	3,670	28.7	30.1	3,013	29.0	30.4	657	27.4	28.9
Pobreza extrema o marginación	99	0.8	0.8	78	0.8	0.8	21	0.9	0.9
<i>Sin información</i>	610	4.8	<i>Se omite</i>	490	4.7	<i>Se omite</i>	120	5.0	<i>Se omite</i>
<b>Total</b>	<b>12,787</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>10,391</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>2,396</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

**FACTORES ASOCIADOS A LA DEMANDA DE TRATAMIENTO EN PACIENTES DE PRIMER INGRESO A TRATAMIENTO EN CIJ EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2012**

**Cuadro 9. Motivos de consulta**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Consumo de drogas ilícitas	10,707	83.7	8,781	84.5	1,926	80.4
Consumo de bebidas alcohólicas	5,483	42.9	4,524	43.5	959	40.0
Consumo de tabaco	4,697	36.7	3,862	37.2	835	34.8
Otro motivo	384	3.0	285	2.7	99	4.1
<i>Ningún motivo específico reportado</i>	263	2.1	207	2.0	56	2.3
<i>Usuarios que reportaron dos o más motivos de consulta</i>	5,622	44.0	4,654	44.8	968	40.4

**Cuadro 10. Condicionantes de la solicitud de tratamiento**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Por propia iniciativa	5,251	41.1	4,257	41.0	994	41.5
Por condicionamiento o recomendación familiar	5,799	45.4	4,720	45.4	1,079	45.0
Por recomendación de pares	201	1.6	156	1.5	45	1.9
Por condicionamiento o recomendación escolar	1,968	15.4	1,482	14.3	486	20.3
Por condicionamiento legal	1,202	9.4	1,058	10.2	144	6.0
Por condicionamiento o recomendación laboral	242	1.9	232	2.2	10	0.4
Por indicación médica	637	5.0	512	4.9	125	5.2
Otros condicionante de solicitud de tratamiento	296	2.3	237	2.3	59	2.5
<i>Ningún condicionante reportado</i>	139	1.1	111	1.1	28	1.2
<i>Pacientes que reportaron dos o más condicionantes de la solicitud de tratamiento</i>	2,684	21.0	2,169	20.9	515	21.5

**Cuadro 11. Antecedentes de acciones contra el consumo de sustancias**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Juramento	937	7.3	839	8.1	98	4.1
Grupo de autoayuda	1,132	8.9	987	9.5	145	6.1
Internamiento en anexo	1,745	13.6	1,540	14.8	205	8.6
Intervención de emergencia	88	0.7	65	0.6	23	1.0
Programa de mantenimiento	78	0.6	63	0.6	15	0.6
Tratamiento médico no especializado	108	0.8	86	0.8	22	0.9
Tratamiento psiquiátrico o psicoterapéutico ambulatorio	630	4.9	501	4.8	129	5.4
Tratamiento psiquiátrico o psicoterapéutico residencial	305	2.4	243	2.3	62	2.6
Medicina tradicional o alternativa	62	0.5	48	0.5	14	0.6
Intento de interrupción voluntaria del consumo, sin apoyo	3,713	29.0	3,033	29.2	680	28.4
Otras acciones	2,978	23.3	2,373	22.8	605	25.3
<i>Ninguna acción previa reportada</i>	3,291	25.7	2,568	24.7	723	30.2
<i>Pacientes que reportaron dos o más acciones contra el consumo de sustancias antes de solicitar tratamiento en CIJ</i>	4,045	31.6	3,285	31.6	760	31.7

**Cuadro 12. Problemas asociados al consumo de sustancias**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Problemas de salud	5,435	42.5	4,380	42.2	1,055	44.0
Accidentes o lesiones	1,938	15.2	1,657	15.9	281	11.7
Problemas familiares	10,460	81.8	8,499	81.8	1,961	81.8
Problemas escolares	4,684	36.6	3,677	35.4	1,007	42.0
Problemas laborales	2,954	23.1	2,668	25.7	286	11.9
Problemas psicológicos	4,942	38.6	3,915	37.7	1,027	42.9
Problemas legales	2,989	23.4	2,671	25.7	318	13.3
Conducta antisocial o delictiva	2,403	18.8	2,079	20.0	324	13.5
Otros problemas	442	3.5	351	3.4	91	3.8
<i>Ningún problema asociado reportado</i>	327	2.6	266	2.6	61	2.5
<i>Pacientes que reportaron dos o más problemas asociados</i>	9,930	77.7	8,080	77.8	1,850	77.2

**CARACTERÍSTICAS DEL CONSUMO DE DROGAS EN PACIENTES DE PRIMER INGRESO A  
TRATAMIENTO EN CIJ EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2012**

**Cuadro 13. Edad de inicio del consumo de Tabaco**

	General*			Hombres**			Mujeres***		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Hasta 9 años	411	3.2	3.8	360	3.5	4.0	51	2.1	2.6
10 a 14 años	5,778	45.2	53.0	4,699	45.2	52.5	1,079	45.0	55.4
15 a 19 años	4,202	32.9	38.5	3,497	33.7	39.0	705	29.4	36.2
20 a 24 años	343	2.7	3.1	274	2.6	3.1	69	2.9	3.5
25 a 29 años	110	0.9	1.0	76	0.7	0.8	34	1.4	1.7
30 a 34 años	33	0.3	0.3	28	0.3	0.3	5	0.2	0.3
35 a 39 años	18	0.1	0.2	16	0.2	0.2	2	0.1	0.1
40 a 44 años	8	0.1	0.1	5	0.0	0.1	3	0.1	0.2
45 años y más	4	0.0	0.0	3	0.0	0.0	1	0.0	0.1
No consumió	1,839	14.4	Se omite	1,399	13.5	Se omite	440	18.4	Se omite
Sin información	41	0.3	Se omite	34	0.3	Se omite	7	0.3	Se omite
<b>Total</b>	<b>12,787</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>10,391</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>2,396</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

\*  $\mu=14.4$ ;  $\sigma=3.3$ ; Med.= 14; Mo.= 14; Decil1 = 11  
 \*\*  $\mu=14.3$ ;  $\sigma=3.2$ ; Med.= 14; Mo.= 14; Decil1 = 11  
 \*\*\*  $\mu=14.5$ ;  $\sigma=3.5$ ; Med.= 14; Mo.= 13; Decil1 = 11

**Cuadro 14. Edad de inicio del consumo de Alcohol.**

	General*			Hombres**			Mujeres***		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Hasta 9 años	423	3.3	3.7	347	3.3	3.7	76	3.2	3.6
10 a 14 años	5,360	41.9	47.1	4,255	40.9	45.8	1,105	46.1	52.9
15 a 19 años	5,119	40.0	45.0	4,325	41.6	46.6	794	33.1	38.0
20 a 24 años	379	3.0	3.3	301	2.9	3.2	78	3.3	3.7
25 a 29 años	69	0.5	0.6	46	0.4	0.5	23	1.0	1.1
30 a 34 años	14	0.1	0.1	10	0.1	0.1	4	0.2	0.2
35 a 39 años	6	0.0	0.1	2	0.0	0.0	4	0.2	0.2
40 a 44 años	4	0.0	0.0	1	0.0	0.0	3	0.1	0.1
45 años y más	2	0.0	0.0	0	0.0	0.0	2	0.1	0.1
No consumió	1,373	10.7	Se omite	1,074	10.3	Se omite	299	12.5	Se omite
Sin información	38	0.3	Se omite	30	0.3	Se omite	8	0.3	Se omite
<b>Total</b>	<b>12,787</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>10,391</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>2,396</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

\*  $\mu=14.5$ ;  $\sigma=3$ ; Med.= 14; Mo.= 15; Decil1 = 12  
 \*\*  $\mu=14.5$ ;  $\sigma=2.8$ ; Med.= 15; Mo.= 15; Decil1 = 12  
 \*\*\*  $\mu=14.4$ ;  $\sigma=3.6$ ; Med.= 14; Mo.= 13; Decil1 = 11

**Cuadro 15. Edad de inicio del consumo de Drogas ilícitas.**

	General*			Hombres**			Mujeres***		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Hasta 9 años	391	3.1	3.1	328	3.2	3.2	63	2.6	2.7
10 a 14 años	4,833	37.8	38.7	3,818	36.7	37.5	1,015	42.4	44.1
15 a 19 años	5,706	44.6	45.7	4,797	46.2	47.1	909	37.9	39.5
20 a 24 años	872	6.8	7.0	719	6.9	7.1	153	6.4	6.6
25 a 29 años	336	2.6	2.7	271	2.6	2.7	65	2.7	2.8
30 a 34 años	160	1.3	1.3	116	1.1	1.1	44	1.8	1.9
35 a 39 años	97	0.8	0.8	78	0.8	0.8	19	0.8	0.8
40 a 44 años	49	0.4	0.4	31	0.3	0.3	18	0.8	0.8
45 años y más	35	0.3	0.3	20	0.2	0.2	15	0.6	0.7
<i>Sin información</i>	308	2.4	<i>Se omite</i>	213	2.0	<i>Se omite</i>	95	4.0	<i>Se omite</i>
<b>Total</b>	<b>12,787</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>10,391</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>2,396</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

\*  $\mu = 16.1$ ;  $\sigma = 4.9$ ; Med.= 15; Mo.= 15; Decil1 = 12

\*\*  $\mu = 16.1$ ;  $\sigma = 4.6$ ; Med.= 15; Mo.= 15; Decil1 = 12

\*\*\*  $\mu = 16.5$ ;  $\sigma = 6.1$ ; Med.= 15; Mo.= 13; Decil1 = 12

**Cuadro 16. Drogas ilícitas de inicio**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
<b>Cannabis</b>	<b>7,848</b>	<b>61.4</b>	<b>6,704</b>	<b>64.5</b>	<b>1,144</b>	<b>47.7</b>
Mariguana	7,833	61.3	6,695	64.4	1,138	47.5
Hachís	15	0.1	9	0.1	6	0.3
<b>Cocaína</b>	<b>1,440</b>	<b>11.3</b>	<b>1,214</b>	<b>11.7</b>	<b>226</b>	<b>9.4</b>
Polvo blanco	1,047	8.2	868	8.4	179	7.5
<i>Crack</i>	381	3.0	335	3.2	46	1.9
Otra presentación	12	0.1	11	0.1	1	0.0
<b>Inhalables</b>	<b>2,703</b>	<b>21.1</b>	<b>1,989</b>	<b>19.1</b>	<b>714</b>	<b>29.8</b>
Solventes o removedores	1,935	15.1	1,447	13.9	488	20.4
Pegamentos	404	3.2	310	3.0	94	3.9
Esmaltes o pinturas	312	2.4	197	1.9	115	4.8
Otros	52	0.4	35	0.3	17	0.7
<b>Depresores</b>	<b>277</b>	<b>2.2</b>	<b>125</b>	<b>1.2</b>	<b>152</b>	<b>6.3</b>
Benzodiacepinas	260	2.0	117	1.1	143	6.0
<i>Rohypnol</i> <sup>®</sup>	7	0.1	7	0.1	0	0.0
Otros	10	0.1	1	0.0	9	0.4
<b>Estimulantes</b>	<b>355</b>	<b>2.8</b>	<b>248</b>	<b>2.4</b>	<b>107</b>	<b>4.5</b>
Anfetamina	102	0.8	88	0.8	14	0.6
Metanfetaminas	170	1.3	109	1.0	61	2.5
Éxtasis (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas	53	0.4	25	0.2	28	1.2
Otros	30	0.2	26	0.3	4	0.2
<b>Drogas alucinógenas y disociativas</b>	<b>44</b>	<b>0.3</b>	<b>40</b>	<b>0.4</b>	<b>4</b>	<b>0.2</b>
LSD	14	0.1	11	0.1	3	0.1
Plantas alucinógenas y derivados	27	0.2	26	0.3	1	0.0
Otras	3	0.0	3	0.0	0	0.0
<b>Opiáceos</b>	<b>56</b>	<b>0.4</b>	<b>37</b>	<b>0.4</b>	<b>19</b>	<b>0.8</b>
Heroína	49	0.4	33	0.3	16	0.7
Opiáceos Sintéticos	5	0.0	2	0.0	3	0.1
Opio y otros opiáceos	2	0.0	2	0.0	0	0.0
<b>Otras sustancias de abuso</b>	<b>64</b>	<b>0.5</b>	<b>34</b>	<b>0.3</b>	<b>30</b>	<b>1.3</b>
Con utilidad médica	25	0.2	8	0.1	17	0.7
Otras	39	0.3	26	0.3	13	0.5
<b>Total</b>	<b>12,787</b>	<b>100.0</b>	<b>10,391</b>	<b>100.0</b>	<b>2,396</b>	<b>100.0</b>

**Cuadro 17. Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de Tabaco y el ingreso a tratamiento en CIJ**

	General*			Hombres**			Mujeres***		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
< de un año	728	5.7	6.7	538	5.2	6.0	190	7.9	9.7
1 a 5 años	5,019	39.3	46.0	3,986	38.4	44.5	1,033	43.1	53.0
6 a 10 años	1,834	14.3	16.8	1,517	14.6	16.9	317	13.2	16.3
11 a 15 años	1,104	8.6	10.1	946	9.1	10.6	158	6.6	8.1
16 a 20 años	815	6.4	7.5	723	7.0	8.1	92	3.8	4.7
21 a 25 años	566	4.4	5.2	514	4.9	5.7	52	2.2	2.7
26 o más años	838	6.6	7.7	731	7.0	8.2	107	4.5	5.5
No consumió	1,839	14.4	Se omite	1,399	13.5	Se omite	440	18.4	Se omite
Sin información	44	0.3	Se omite	37	0.4	Se omite	7	0.3	Se omite
<b>Total</b>	<b>12,787</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>10,391</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>2,396</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

\*  $\mu=8.9$ ;  $\sigma=9.7$ ; Med.= 5; Mo.= 1; Decil1 = 1

\*\*  $\mu=9.3$ ;  $\sigma=9.8$ ; Med.= 5; Mo.= 1; Decil1 = 1

\*\*\*  $\mu=6.9$ ;  $\sigma=8.6$ ; Med.= 3; Mo.= 1; Decil1 = 1

**Cuadro 18. Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de Alcohol y el ingreso a tratamiento en CIJ**

	General*			Hombres**			Mujeres***		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
< de un año	714	5.6	6.3	520	5.0	5.6	194	8.1	9.3
1 a 5 años	5,295	41.4	46.6	4,161	40.0	44.8	1,134	47.3	54.3
6 a 10 años	1,879	14.7	16.5	1,568	15.1	16.9	311	13.0	14.9
11 a 15 años	1,189	9.3	10.5	1,011	9.7	10.9	178	7.4	8.5
16 a 20 años	840	6.6	7.4	731	7.0	7.9	109	4.5	5.2
21 a 25 años	581	4.5	5.1	523	5.0	5.6	58	2.4	2.8
26 o más años	875	6.8	7.7	770	7.4	8.3	105	4.4	5.0
No consumió	1,373	10.7	Se omite	1,074	10.3	Se omite	299	12.5	Se omite
Sin información	41	0.3	Se omite	33	0.3	Se omite	8	0.3	Se omite
<b>Total</b>	<b>12,787</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>10,391</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>2,396</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

\*  $\mu=8.8$ ;  $\sigma=9.5$ ; Med.= 5; Mo.= 1; Decil1 = 1

\*\*  $\mu=9.3$ ;  $\sigma=9.7$ ; Med.= 5; Mo.= 1; Decil1 = 1

\*\*\*  $\mu=6.8$ ;  $\sigma=8.4$ ; Med.= 3; Mo.= 1; Decil1 = 1



**Cuadro 19. Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de Drogas ilícitas y el ingreso a tratamiento en CIJ**

	General*			Hombres**			Mujeres***		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
< de un año	2,087	16.3	16.7	1,514	14.6	14.9	573	23.9	24.9
1 a 5 años	5,663	44.3	45.4	4,537	43.7	44.6	1,126	47.0	48.9
6 a 10 años	1,698	13.3	13.6	1,442	13.9	14.2	256	10.7	11.1
11 a 15 años	1,176	9.2	9.4	1,017	9.8	10.0	159	6.6	6.9
16 a 20 años	765	6.0	6.1	687	6.6	6.8	78	3.3	3.4
21 a 25 años	434	3.4	3.5	385	3.7	3.8	49	2.0	2.1
26 o más años	653	5.1	5.2	593	5.7	5.8	60	2.5	2.6
<i>Sin información</i>	311	2.4	<i>Se omite</i>	216	2.1	<i>Se omite</i>	95	4.0	<i>Se omite</i>
<b>Total</b>	<b>12,787</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>10,391</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>2,396</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

\*  $\mu = 7$ ;  $\sigma = 8.7$ ; Med.= 3; Mo.= < un año; Decil1 = < un año

\*\*  $\mu = 7.4$ ;  $\sigma = 8.9$ ; Med.= 4; Mo.= 1; Decil1 = < un año

\*\*\*  $\mu = 4.8$ ;  $\sigma = 7.1$ ; Med.= 2; Mo.= < un año; Decil1 = < un año

**Cuadro 20. Tipo de consumo de drogas ilícitas**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Experimental	1,330	10.4	10.8	950	9.1	9.5	380	15.9	16.6
Social u ocasional	1,665	13.0	13.6	1,285	12.4	12.9	380	15.9	16.6
Funcional	6,540	51.1	53.3	5,460	52.5	54.7	1,080	45.1	47.2
Disfuncional	2,263	17.7	18.4	1,918	18.5	19.2	345	14.4	15.1
En remisión	476	3.7	3.9	375	3.6	3.8	101	4.2	4.4
<i>Sin información</i>	513	4.0	<i>Se omite</i>	403	3.9	<i>Se omite</i>	110	4.6	<i>Se omite</i>
<b>Total</b>	<b>12,787</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>10,391</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>2,396</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

**Cuadro 21. Total de drogas consumidas alguna vez en la vida.  
(Incluye alcohol o tabaco)**

	General*		Hombres**		Mujeres***	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
1 sustancia	580	4.5	4.5	430	4.1	4.1
2 sustancias	1,129	8.8	8.8	872	8.4	8.4
3 sustancias	3,735	29.2	29.2	2,989	28.8	28.8
4 sustancias	2,699	21.1	21.1	2,209	21.3	21.3
5 sustancias	1,780	13.9	13.9	1,456	14.0	14.0
6 sustancias	1,122	8.8	8.8	929	8.9	8.9
7 sustancias	731	5.7	5.7	632	6.1	6.1
8 sustancias	424	3.3	3.3	365	3.5	3.5
9 sustancias	255	2.0	2.0	223	2.1	2.1
10 sustancias	127	1.0	1.0	108	1.0	1.0
11 -19 sustancias	205	1.6	1.6	178	1.7	1.7
<b>Total</b>	<b>12,787</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>10,391</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

\*  $\mu= 4.3$ ;  $\sigma = 2.1$ ; Med.= 4; Mo.= 3; Decil1 = 2

\*\*  $\mu= 4.4$ ;  $\sigma = 2.2$ ; Med.= 4; Mo.= 3; Decil1 = 2

\*\*\*  $\mu= 4$ ;  $\sigma = 2$ ; Med.= 4; Mo.= 3; Decil1 = 2

**Cuadro 22. Total de drogas ilícitas consumidas alguna vez en la vida  
(No incluye ni alcohol ni tabaco)**

	General*		Hombres**		Mujeres***	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
1 sustancia	4,922	38.5	38.5	3,870	37.2	37.2
2 sustancias	3,027	23.7	23.7	2,471	23.8	23.8
3 sustancias	1,876	14.7	14.7	1,538	14.8	14.8
4 sustancias	1,161	9.1	9.1	962	9.3	9.3
5 sustancias	771	6.0	6.0	661	6.4	6.4
6 sustancias	421	3.3	3.3	364	3.5	3.5
7 sustancias	269	2.1	2.1	231	2.2	2.2
8 sustancias	134	1.0	1.0	115	1.1	1.1
9 sustancias	85	0.7	0.7	73	0.7	0.7
10 sustancias	57	0.4	0.4	50	0.5	0.5
11-17 sustancias	64	0.5	0.5	56	0.5	0.5
<b>Total</b>	<b>12,787</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>10,391</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

\*  $\mu= 2.6$ ;  $\sigma = 1.9$ ; Med.=2; Mo.= 1; Decil1 = 1

\*\*  $\mu= 2.6$ ;  $\sigma = 2$ ; Med.=2; Mo.= 1; Decil1 = 1

\*\*\*  $\mu= 2.3$ ;  $\sigma = 1.8$ ; Med.=2; Mo.= 1; Decil1 = 1

**Cuadro 23. Consumo de drogas alguna vez en la vida por sustancia**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
<b>Tabaco</b>	<b>10,948</b>	<b>85.6</b>	<b>8,992</b>	<b>86.5</b>	<b>1,956</b>	<b>81.6</b>
<b>Alcohol</b>	<b>11,414</b>	<b>89.3</b>	<b>9,317</b>	<b>89.7</b>	<b>2,097</b>	<b>87.5</b>
<b>Cannabis</b>	<b>10,169</b>	<b>79.5</b>	<b>8,532</b>	<b>82.1</b>	<b>1,637</b>	<b>68.3</b>
Mariguana	10,155	79.4	8,522	82.0	1,633	68.2
Hachís	639	5.0	544	5.2	95	4.0
<b>Cocaína</b>	<b>5,769</b>	<b>45.1</b>	<b>4,920</b>	<b>47.3</b>	<b>849</b>	<b>35.4</b>
Polvo blanco	4,742	37.1	4,013	38.6	729	30.4
<i>Crack</i>	2,975	23.3	2,638	25.4	337	14.1
Otra presentación de cocaína	118	0.9	107	1.0	11	0.5
<b>Inhalables</b>	<b>5,502</b>	<b>43.0</b>	<b>4,404</b>	<b>42.4</b>	<b>1,098</b>	<b>45.8</b>
Solventes o removedores	4,008	31.3	3,238	31.2	770	32.1
Pegamentos	1,415	11.1	1,186	11.4	229	9.6
Esmaltes o pinturas	767	6.0	557	5.4	210	8.8
Otros inhalables	312	2.4	247	2.4	65	2.7
<b>Depresores</b>	<b>1,982</b>	<b>15.5</b>	<b>1,571</b>	<b>15.1</b>	<b>411</b>	<b>17.2</b>
Benzodiacepinas	1,817	14.2	1,431	13.8	386	16.1
<i>Rohypnol</i>	252	2.0	236	2.3	16	0.7
Otros depresores	55	0.4	27	0.3	28	1.2
<b>Estimulantes</b>	<b>2,529</b>	<b>19.8</b>	<b>2,032</b>	<b>19.6</b>	<b>497</b>	<b>20.7</b>
Anfetamina	390	3.0	324	3.1	66	2.8
Metanfetaminas	1,596	12.5	1,315	12.7	281	11.7
Éxtasis (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas	842	6.6	625	6.0	217	9.1
Otros estimulantes	96	0.8	85	0.8	11	0.5
<b>Drogas alucinógenas y disociativas</b>	<b>1,291</b>	<b>10.1</b>	<b>1,071</b>	<b>10.3</b>	<b>220</b>	<b>9.2</b>
LSD	809	6.3	656	6.3	153	6.4
Plantas alucinógenas y derivados	731	5.7	624	6.0	107	4.5
Otras drogas alucinógenas y disoc.	68	0.5	58	0.6	10	0.4
<b>Opiáceos</b>	<b>568</b>	<b>4.4</b>	<b>453</b>	<b>4.4</b>	<b>115</b>	<b>4.8</b>
Heroína	486	3.8	391	3.8	95	4.0
Opiáceos Sintéticos	53	0.4	38	0.4	15	0.6
Opio y otros opiáceos	57	0.4	49	0.5	8	0.3
<b>Otras sustancias de abuso</b>	<b>324</b>	<b>2.5</b>	<b>237</b>	<b>2.3</b>	<b>87</b>	<b>3.6</b>
Con utilidad médica	102	0.8	65	0.6	37	1.5
Otras sustancias de abuso	231	1.8	180	1.7	51	2.1

**Cuadro 24. Total de drogas consumidas en el último año  
(Incluye alcohol o tabaco)**

	General*		Hombres**		Mujeres***	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Ninguna	347	2.7	294	2.8	53	2.2
1 sustancia	1,316	10.3	1,036	10.0	280	11.7
2 sustancias	2,744	21.5	2,129	20.5	615	25.7
3 sustancias	3,965	31.0	3,286	31.6	679	28.3
4 sustancias	2,198	17.2	1,824	17.6	374	15.6
5 sustancias	1,059	8.3	870	8.4	189	7.9
6 sustancias	574	4.5	466	4.5	108	4.5
7 sustancias	292	2.3	242	2.3	50	2.1
8 sustancias	158	1.2	130	1.3	28	1.2
9 sustancias	69	0.5	62	0.6	7	0.3
10 sustancias	33	0.3	27	0.3	6	0.3
11-16 sustancias	18	0.1	14	0.1	4	0.2
<b>Total</b>	<b>12,787</b>	<b>100.0</b>	<b>10,391</b>	<b>100.0</b>	<b>2,396</b>	<b>100.0</b>

\*  $\mu=3.2$ ;  $\sigma=1.7$ ; Med.=3; Mo.=3; Decil1=1

\*\*  $\mu=3.2$ ;  $\sigma=1.7$ ; Med.=3; Mo.=3; Decil1=1

\*\*\*  $\mu=3.1$ ;  $\sigma=1.7$ ; Med.=3; Mo.=3; Decil1=1

**Cuadro 25. Total de drogas ilícitas consumidas en el último año  
(No incluye ni alcohol ni tabaco)**

	General*		Hombres**		Mujeres***	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Ninguna	1,727	13.5	1,372	13.2	355	14.8
1 sustancia	5,860	45.8	4,730	45.5	1,130	47.2
2 sustancias	2,708	21.2	2,241	21.6	467	19.5
3 sustancias	1,222	9.6	1,003	9.7	219	9.1
4 sustancias	632	4.9	518	5.0	114	4.8
5 sustancias	333	2.6	273	2.6	60	2.5
6 sustancias	158	1.2	129	1.2	29	1.2
7 sustancias	80	0.6	71	0.7	9	0.4
8 sustancias	35	0.3	29	0.3	6	0.3
9 sustancias	14	0.1	11	0.1	3	0.1
10 sustancias	7	0.1	6	0.1	1	0.0
11-14 sustancias	11	0.1	8	0.1	3	0.1
<b>Total</b>	<b>12,787</b>	<b>100.0</b>	<b>10,391</b>	<b>100.0</b>	<b>2,396</b>	<b>100.0</b>

\*  $\mu=1.7$ ;  $\sigma=1.4$ ; Med.=1; Mo.=1; Decil1=ninguna

\*\*  $\mu=1.7$ ;  $\sigma=1.4$ ; Med.=1; Mo.=1; Decil1=ninguna

\*\*\*  $\mu=1.6$ ;  $\sigma=1.4$ ; Med.=1; Mo.=1; Decil1=ninguna

**Cuadro 26. Consumo de drogas en los últimos 12 meses por sustancia**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
<b>Tabaco</b>	<b>9,505</b>	<b>74.3</b>	<b>7,784</b>	<b>74.9</b>	<b>1,721</b>	<b>71.8</b>
<b>Alcohol</b>	<b>10,124</b>	<b>79.2</b>	<b>8,260</b>	<b>79.5</b>	<b>1,864</b>	<b>77.8</b>
<b>Cannabis</b>	<b>7,713</b>	<b>60.3</b>	<b>6,517</b>	<b>62.7</b>	<b>1,196</b>	<b>49.9</b>
Mariguana	7,702	60.2	6,510	62.7	1,192	49.7
Hachís	342	2.7	285	2.7	57	2.4
<b>Cocaína</b>	<b>3,732</b>	<b>29.2</b>	<b>3,191</b>	<b>30.7</b>	<b>541</b>	<b>22.6</b>
Polvo blanco	2,614	20.4	2,186	21.0	428	17.9
<i>Crack</i>	1,948	15.2	1,726	16.6	222	9.3
Otra presentación de cocaína	48	0.4	44	0.4	4	0.2
<b>Inhalables</b>	<b>3,932</b>	<b>30.7</b>	<b>3,046</b>	<b>29.3</b>	<b>886</b>	<b>37.0</b>
Solventes o removedores	2,840	22.2	2,208	21.2	632	26.4
Pegamentos	813	6.4	666	6.4	147	6.1
Esmaltes o pinturas	543	4.2	371	3.6	172	7.2
Otros inhalables	147	1.1	107	1.0	40	1.7
<b>Depresores</b>	<b>1,180</b>	<b>9.2</b>	<b>887</b>	<b>8.5</b>	<b>293</b>	<b>12.2</b>
Benzodiacepinas	1,107	8.7	832	8.0	275	11.5
<i>Rohypnol</i>	75	0.6	72	0.7	3	0.1
Otros depresores	36	0.3	16	0.2	20	0.8
<b>Estimulantes</b>	<b>1,587</b>	<b>12.4</b>	<b>1,249</b>	<b>12.0</b>	<b>338</b>	<b>14.1</b>
Anfetamina	205	1.6	173	1.7	32	1.3
Metanfetaminas	1,021	8.0	824	7.9	197	8.2
Éxtasis (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas	463	3.6	320	3.1	143	6.0
Otros estimulantes	42	0.3	41	0.4	1	0.0
<b>Drogas alucinógenas y disociativas</b>	<b>610</b>	<b>4.8</b>	<b>496</b>	<b>4.8</b>	<b>114</b>	<b>4.8</b>
LSD	429	3.4	347	3.3	82	3.4
Plantas alucinógenas y derivados	255	2.0	213	2.0	42	1.8
Otras drogas alucinógenas y disoc.	27	0.2	22	0.2	5	0.2
<b>Opiáceos</b>	<b>391</b>	<b>3.1</b>	<b>311</b>	<b>3.0</b>	<b>80</b>	<b>3.3</b>
Heroína	353	2.8	286	2.8	67	2.8
Opiáceos Sintéticos	30	0.2	20	0.2	10	0.4
Opio y otros opiáceos	20	0.2	16	0.2	4	0.2
<b>Otras sustancias de abuso</b>	<b>185</b>	<b>1.4</b>	<b>129</b>	<b>1.2</b>	<b>56</b>	<b>2.3</b>
Con utilidad médica	58	0.5	36	0.3	22	0.9
Otras sustancias de abuso	132	1.0	97	0.9	35	1.5

**Cuadro 27. Droga de preferencia en los últimos 12 meses, según menciones**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
<b>Tabaco</b>	<b>1,653</b>	<b>12.9</b>	<b>13.6</b>	<b>1,255</b>	<b>12.1</b>	<b>12.7</b>	<b>398</b>	<b>16.6</b>	<b>17.5</b>
<b>Alcohol</b>	<b>2,327</b>	<b>18.2</b>	<b>19.1</b>	<b>1,889</b>	<b>18.2</b>	<b>19.1</b>	<b>438</b>	<b>18.3</b>	<b>19.2</b>
<b>Cannabis</b>	<b>4,270</b>	<b>33.4</b>	<b>35.1</b>	<b>3,808</b>	<b>36.6</b>	<b>38.5</b>	<b>462</b>	<b>19.3</b>	<b>20.3</b>
Mariguana	4,246	33.2	34.9	3,787	36.4	38.3	459	19.2	20.2
Hachís	24	0.2	0.2	21	0.2	0.2	3	0.1	0.1
<b>Cocaína</b>	<b>1,232</b>	<b>9.6</b>	<b>10.1</b>	<b>1,056</b>	<b>10.2</b>	<b>10.7</b>	<b>176</b>	<b>7.3</b>	<b>7.7</b>
Polvo blanco	438	3.4	3.6	349	3.4	3.5	89	3.7	3.9
Crack	785	6.1	6.4	698	6.7	7.1	87	3.6	3.8
Otra presentación de cocaína	9	0.1	0.1	9	0.1	0.1	0	0.0	0.0
<b>Inhalables</b>	<b>1,695</b>	<b>13.3</b>	<b>13.9</b>	<b>1,174</b>	<b>11.3</b>	<b>11.9</b>	<b>521</b>	<b>21.7</b>	<b>22.9</b>
Solventes o removedores	1,237	9.7	10.2	862	8.3	8.7	375	15.7	16.5
Pegamentos	219	1.7	1.8	163	1.6	1.6	56	2.3	2.5
Esmaltes o pinturas	202	1.6	1.7	121	1.2	1.2	81	3.4	3.6
Otros inhalables	37	0.3	0.3	28	0.3	0.3	9	0.4	0.4
<b>Depresores</b>	<b>151</b>	<b>1.2</b>	<b>1.2</b>	<b>73</b>	<b>0.7</b>	<b>0.7</b>	<b>78</b>	<b>3.3</b>	<b>3.4</b>
Benzodiacepinas	127	1.0	1.0	64	0.6	0.6	63	2.6	2.8
Rohypnol	3	0.0	0.0	3	0.0	0.0	0	0.0	0.0
Otros depresores	21	0.2	0.2	6	0.1	0.1	15	0.6	0.7
<b>Estimulantes</b>	<b>484</b>	<b>3.8</b>	<b>4.0</b>	<b>365</b>	<b>3.5</b>	<b>3.7</b>	<b>119</b>	<b>5.0</b>	<b>5.2</b>
Anfetamina	58	0.5	0.5	47	0.5	0.5	11	0.5	0.5
Metanfetaminas	383	3.0	3.1	289	2.8	2.9	94	3.9	4.1
Éxtasis (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas	37	0.3	0.3	24	0.2	0.2	13	0.5	0.6
Otros estimulantes	6	0.0	0.0	5	0.0	0.1	1	0.0	0.0
<b>Drogas alucinógenas y disociativas</b>	<b>35</b>	<b>0.3</b>	<b>0.3</b>	<b>24</b>	<b>0.2</b>	<b>0.2</b>	<b>11</b>	<b>0.5</b>	<b>0.5</b>
LSD	28	0.2	0.2	18	0.2	0.2	10	0.4	0.4
Plantas alucinógenas y derivados	4	0.0	0.0	4	0.0	0.0	0	0.0	0.0
Otras drogas alucinógenas y disoc.	3	0.0	0.0	2	0.0	0.0	1	0.0	0.0
<b>Opiáceos</b>	<b>278</b>	<b>2.2</b>	<b>2.3</b>	<b>226</b>	<b>2.2</b>	<b>2.3</b>	<b>52</b>	<b>2.2</b>	<b>2.3</b>
Heroína	261	2.0	2.1	215	2.1	2.2	46	1.9	2.0
Opiáceos Sintéticos	9	0.1	0.1	5	0.0	0.1	4	0.2	0.2
Opio y otros opiáceos	8	0.1	0.1	6	0.1	0.1	2	0.1	0.1
<b>Otras sustancias de abuso</b>	<b>22</b>	<b>0.2</b>	<b>0.2</b>	<b>10</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>12</b>	<b>0.5</b>	<b>0.5</b>
Con utilidad médica	9	0.1	0.1	2	0.0	0.0	7	0.3	0.3
Otras sustancias de abuso	13	0.1	0.1	8	0.1	0.1	5	0.2	0.2
<b>Ninguna</b>	<b>30</b>	<b>0.2</b>	<b>0.2</b>	<b>20</b>	<b>0.2</b>	<b>0.2</b>	<b>10</b>	<b>0.4</b>	<b>0.4</b>
No consumió en el último año	347	2.7	Se omite	294	2.8	Se omite	53	2.2	Se omite
Sin Información	263	2.1	Se omite	197	1.9	Se omite	66	2.8	Se omite

**Cuadro 28. Droga de mayor impacto en los últimos 12 meses, según menciones**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
<b>Tabaco</b>	<b>934</b>	<b>7.3</b>	<b>7.7</b>	<b>702</b>	<b>6.8</b>	<b>7.1</b>	<b>232</b>	<b>9.7</b>	<b>10.2</b>
<b>Alcohol</b>	<b>2,085</b>	<b>16.3</b>	<b>17.1</b>	<b>1,680</b>	<b>16.2</b>	<b>17.0</b>	<b>405</b>	<b>16.9</b>	<b>17.8</b>
<b>Cannabis</b>	<b>3,931</b>	<b>30.7</b>	<b>32.3</b>	<b>3,488</b>	<b>33.6</b>	<b>35.2</b>	<b>443</b>	<b>18.5</b>	<b>19.5</b>
Mariguana	3,899	30.5	32.0	3,461	33.3	34.9	438	18.3	19.2
Hachís	32	0.3	0.3	27	0.3	0.3	5	0.2	0.2
<b>Cocaína</b>	<b>1,629</b>	<b>12.7</b>	<b>13.4</b>	<b>1,399</b>	<b>13.5</b>	<b>14.1</b>	<b>230</b>	<b>9.6</b>	<b>10.1</b>
Polvo blanco	596	4.7	4.9	480	4.6	4.8	116	4.8	5.1
Crack	1,018	8.0	8.4	904	8.7	9.1	114	4.8	5.0
Otra presentación de cocaína	15	0.1	0.1	15	0.1	0.2	0	0.0	0.0
<b>Inhalables</b>	<b>2,253</b>	<b>17.6</b>	<b>18.5</b>	<b>1,643</b>	<b>15.8</b>	<b>16.6</b>	<b>610</b>	<b>25.5</b>	<b>26.8</b>
Solventes o removedores	1,580	12.4	13.0	1,160	11.2	11.7	420	17.5	18.4
Pegamentos	347	2.7	2.8	274	2.6	2.8	73	3.0	3.2
Esmaltes o pinturas	277	2.2	2.3	173	1.7	1.7	104	4.3	4.6
Otros inhalables	49	0.4	0.4	36	0.3	0.4	13	0.5	0.6
<b>Depresores</b>	<b>216</b>	<b>1.7</b>	<b>1.8</b>	<b>117</b>	<b>1.1</b>	<b>1.2</b>	<b>99</b>	<b>4.1</b>	<b>4.3</b>
Benzodicepinas	180	1.4	1.5	99	1.0	1.0	81	3.4	3.6
Rohypnol	7	0.1	0.1	6	0.1	0.1	1	0.0	0.0
Otros depresores	29	0.2	0.2	12	0.1	0.1	17	0.7	0.7
<b>Estimulantes</b>	<b>736</b>	<b>5.8</b>	<b>6.0</b>	<b>569</b>	<b>5.5</b>	<b>5.7</b>	<b>167</b>	<b>7.0</b>	<b>7.3</b>
Anfetamina	87	0.7	0.7	72	0.7	0.7	15	0.6	0.7
Metanfetaminas	568	4.4	4.7	444	4.3	4.5	124	5.2	5.4
Éxtasis (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas	70	0.5	0.6	43	0.4	0.4	27	1.1	1.2
Otros estimulantes	11	0.1	0.1	10	0.1	0.1	1	0.0	0.0
<b>Drogas alucinógenas y disociativas</b>	<b>53</b>	<b>0.4</b>	<b>0.4</b>	<b>39</b>	<b>0.4</b>	<b>0.4</b>	<b>14</b>	<b>0.6</b>	<b>0.6</b>
LSD	36	0.3	0.3	24	0.2	0.2	12	0.5	0.5
Plantas alucinógenas y derivados	10	0.1	0.1	9	0.1	0.1	1	0.0	0.0
Otras drogas alucinógenas y disoc.	7	0.1	0.1	6	0.1	0.1	1	0.0	0.0
<b>Opiáceos</b>	<b>301</b>	<b>2.4</b>	<b>2.5</b>	<b>243</b>	<b>2.3</b>	<b>2.5</b>	<b>58</b>	<b>2.4</b>	<b>2.5</b>
Heroína	282	2.2	2.3	231	2.2	2.3	51	2.1	2.2
Opiáceos Sintéticos	12	0.1	0.1	7	0.1	0.1	5	0.2	0.2
Opio y otros opiáceos	7	0.1	0.1	5	0.0	0.1	2	0.1	0.1
<b>Otras sustancias de abuso</b>	<b>26</b>	<b>0.2</b>	<b>0.2</b>	<b>11</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>15</b>	<b>0.6</b>	<b>0.7</b>
Con utilidad médica	11	0.1	0.1	2	0.0	0.0	9	0.4	0.4
Otras sustancias de abuso	15	0.1	0.1	9	0.1	0.1	6	0.3	0.3
<b>Ninguna</b>	<b>16</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>12</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>4</b>	<b>0.2</b>	<b>0.2</b>
No consumió en el último año	347	2.7	Se omite	294	2.8	Se omite	53	2.2	Se omite
Sin Información	260	2.0	Se omite	194	1.9	Se omite	66	2.8	Se omite

**Cuadro 29. Uso combinado de drogas en los últimos 12 meses  
(No incluye tabaco)**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Si combinó drogas	4,588	35.9	48.2	3,839	36.9	49.1	749	31.3	43.9
No combinó drogas	4,932	38.6	51.8	3,976	38.3	50.9	956	39.9	56.1
<i>No aplica</i>	3,267	25.5	<i>Se omite</i>	2,576	24.8	<i>Se omite</i>	691	28.8	<i>Se omite</i>
<b>Total</b>	<b>12,787</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>10,391</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>2,396</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

**Cuadro 30. Total de drogas consumidas en los últimos 30 días  
(Incluye alcohol o tabaco)**

	General*		Hombres**		Mujeres***	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Ninguna	1,310	10.2	1,038	10.0	272	11.4
1 sustancia	2,914	22.8	2,277	21.9	637	26.6
2 sustancias	3,714	29.0	2,967	28.6	747	31.2
3 sustancias	3,020	23.6	2,575	24.8	445	18.6
4 sustancias	1,176	9.2	1,011	9.7	165	6.9
5 sustancias	434	3.4	353	3.4	81	3.4
6 sustancias	138	1.1	106	1.0	32	1.3
7 sustancias	58	0.5	47	0.5	11	0.5
8 sustancias	11	0.1	7	0.1	4	0.2
9 sustancias	3	0.0	3	0.0	0	0.0
10 sustancias	5	0.0	3	0.0	2	0.1
11-12 sustancias	4	0.0	4	0.0	0	0.0
<b>Total</b>	<b>12,787</b>	<b>100.0</b>	<b>10,391</b>	<b>100.0</b>	<b>2,396</b>	<b>100.0</b>

\*  $\mu = 2.2$   $\sigma = 1.4$ ; Med.= 2; Mo.= 2; Decil1 = ninguna

\*\*  $\mu = 2.2$ ;  $\sigma = 1.4$ ; Med.= 2; Mo.= 2; Decil1 = 1

\*\*\*  $\mu = 2$ ;  $\sigma = 1.4$ ; Med.=2; Mo.= 2; Decil1 = ninguna



**Cuadro 31. Total de drogas ilícitas consumidas en los últimos 30 días  
(No incluye ni alcohol ni tabaco)**

	General*		Hombres**		Mujeres***	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Ninguna	4,324	33.8	3,411	32.8	913	38.1
1 sustancia	5,843	45.7	4,794	46.1	1,049	43.8
2 sustancias	1,785	14.0	1,514	14.6	271	11.3
3 sustancias	572	4.5	466	4.5	106	4.4
4 sustancias	163	1.3	123	1.2	40	1.7
5 sustancias	74	0.6	64	0.6	10	0.4
6 sustancias	14	0.1	9	0.1	5	0.2
7 sustancias	3	0.0	3	0.0	0	0.0
8 sustancias	4	0.0	3	0.0	1	0.0
9 sustancias	3	0.0	2	0.0	1	0.0
10 sustancias	2	0.0	2	0.0	0	0.0
<b>Total</b>	<b>12,787</b>	<b>100.0</b>	<b>10,391</b>	<b>100.0</b>	<b>2,396</b>	<b>100.0</b>

\*  $\mu=1$ ;  $\sigma=1$ ; Med.= 1; Mo.= 1; Decil1 = ninguna

\*\*  $\mu=1$ ;  $\sigma=1$ ; Med.= 1; Mo.= 1; Decil1 = ninguna

\*\*\*  $\mu=0.9$ ;  $\sigma=1$ ; Med.= 1; Mo.= 1; Decil1 = ninguna

**Cuadro 32. Consumo de drogas en los últimos 30 días por sustancia**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
<b>Tabaco</b>	<b>8,049</b>	<b>62.9</b>	<b>6,654</b>	<b>64.0</b>	<b>1,395</b>	<b>58.2</b>
<b>Alcohol</b>	<b>7,337</b>	<b>57.4</b>	<b>6,046</b>	<b>58.2</b>	<b>1,291</b>	<b>53.9</b>
<b>Cannabis</b>	<b>5,293</b>	<b>41.4</b>	<b>4,581</b>	<b>44.1</b>	<b>712</b>	<b>29.7</b>
Mariguana	5,278	41.3	4,569	44.0	709	29.6
Hachís	127	1.0	108	1.0	19	0.8
<b>Cocaína</b>	<b>2,039</b>	<b>15.9</b>	<b>1,782</b>	<b>17.1</b>	<b>257</b>	<b>10.7</b>
Polvo blanco	1,124	8.8	948	9.1	176	7.3
<i>Crack</i>	1,152	9.0	1,044	10.0	108	4.5
Otra presentación de cocaína	20	0.2	18	0.2	2	0.1
<b>Inhalables</b>	<b>2,481</b>	<b>19.4</b>	<b>1,874</b>	<b>18.0</b>	<b>607</b>	<b>25.3</b>
Solventes o removedores	1,745	13.6	1,327	12.8	418	17.4
Pegamentos	474	3.7	385	3.7	89	3.7
Esmaltes o pinturas	330	2.6	218	2.1	112	4.7
Otros inhalables	58	0.5	37	0.4	21	0.9
<b>Depresores</b>	<b>636</b>	<b>5.0</b>	<b>431</b>	<b>4.1</b>	<b>205</b>	<b>8.6</b>
Benzodiacepinas	610	4.8	416	4.0	194	8.1
<i>Rohypnol</i>	19	0.1	17	0.2	2	0.1
Otros depresores	17	0.1	6	0.1	11	0.5
<b>Estimulantes</b>	<b>785</b>	<b>6.1</b>	<b>620</b>	<b>6.0</b>	<b>165</b>	<b>6.9</b>
Anfetamina	79	0.6	65	0.6	14	0.6
Metanfetaminas	571	4.5	463	4.5	108	4.5
Éxtasis (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas	158	1.2	102	1.0	56	2.3
Otros estimulantes	15	0.1	15	0.1	0	0.0
<b>Drogas alucinógenas y disociativas</b>	<b>163</b>	<b>1.3</b>	<b>126</b>	<b>1.2</b>	<b>37</b>	<b>1.5</b>
LSD	133	1.0	103	1.0	30	1.3
Plantas alucinógenas y derivados	32	0.3	24	0.2	8	0.3
Otras drogas alucinógenas y disoc.	6	0.0	5	0.0	1	0.0
<b>Opiáceos</b>	<b>275</b>	<b>2.2</b>	<b>225</b>	<b>2.2</b>	<b>50</b>	<b>2.1</b>
Heroína	253	2.0	211	2.0	42	1.8
Opiáceos Sintéticos	20	0.2	12	0.1	8	0.3
Opio y otros opiáceos	8	0.1	7	0.1	1	0.0
<b>Otras sustancias de abuso</b>	<b>102</b>	<b>0.8</b>	<b>65</b>	<b>0.6</b>	<b>37</b>	<b>1.5</b>
Con utilidad médica	40	0.3	23	0.2	17	0.7
Otras sustancias de abuso	66	0.5	46	0.4	20	0.8

**Cuadro 33. Frecuencia de episodios de abuso del consumo de Tabaco<sup>1</sup> en los últimos 30 días**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Ni una vez	2,461	19.2	31.2	2,048	19.7	31.4	413	17.2	30.2
< de 1 vez a la semana	884	6.9	11.2	752	7.2	11.5	132	5.5	9.6
1 o 2 veces a la semana	927	7.2	11.8	759	7.3	11.6	168	7.0	12.3
Cada tercer día	531	4.2	6.7	420	4.0	6.4	111	4.6	8.1
Diario	3,085	24.1	39.1	2,540	24.4	39.0	545	22.7	39.8
No consumió en los últimos 30 días	4,738	37.1	Se omite	3,737	36.0	Se omite	1,001	41.8	Se omite
Sin información	161	1.3	Se omite	135	1.3	Se omite	26	1.1	Se omite
<b>Total</b>	<b>12,787</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>10,391</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>2,396</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

<sup>1</sup> Consumo de seis o más cigarros en un solo día.

**Cuadro 34. Frecuencia de episodios de abuso del consumo de Alcohol<sup>1</sup> en los últimos 30 días**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Ni una vez	1,122	8.8	15.6	888	8.5	15.0	234	9.8	18.4
< de 1 vez a la semana	2,465	19.3	34.2	1,990	19.2	33.6	475	19.8	37.4
1 o 2 veces a la semana	2,446	19.1	34.0	2,045	19.7	34.5	401	16.7	31.5
Cada tercer día	623	4.9	8.7	525	5.1	8.9	98	4.1	7.7
Diario	544	4.3	7.6	481	4.6	8.1	63	2.6	5.0
No consumió en los últimos 30 días	5,450	42.6	Se omite	4,345	41.8	Se omite	1,105	46.1	Se omite
Sin información	137	1.1	Se omite	117	1.1	Se omite	20	0.8	Se omite
<b>Total</b>	<b>12,787</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>10,391</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>2,396</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

<sup>1</sup> Consumo de más de cuatro copas en un día para los hombres y de más de tres copas en un día para las mujeres.

**Cuadro 35. Frecuencia de episodios de abuso del consumo de drogas ilícitas<sup>1</sup> en los últimos 30 días**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
< de 1 vez a la semana	1,825	14.3	26.0	1,390	13.4	23.9	435	18.2	35.8
1 o 2 veces a la semana	1,506	11.8	21.4	1,267	12.2	21.8	239	10.0	19.7
Cada tercer día	974	7.6	13.9	815	7.8	14.0	159	6.6	13.1
Diario	2,717	21.2	38.7	2,334	22.5	40.2	383	16.0	31.5
No consumió en los últimos 30 días	4,324	33.8	Se omite	3,411	32.8	Se omite	913	38.1	Se omite
Sin información	1,441	11.3	Se omite	1,174	11.3	Se omite	267	11.1	Se omite
<b>Total</b>	<b>12,787</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>10,391</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>2,396</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

<sup>1</sup> Consumo de cualquier dosis.

## GLOSARIO

A continuación se definen algunas de las variables de estudio:

**Drogas ilícitas de inicio:** Drogas ilegales que el usuario refirió haber utilizado a la misma edad reportada como edad de inicio del consumo de este tipo de sustancias. Excluye el uso de tabaco y alcohol.

**Droga de mayor impacto en los últimos 12 meses:** Sustancia que el propio usuario de drogas solicitante de tratamiento refiere como la que más problemas le ha ocasionado en los ámbitos de salud, personal, familiar, escolar, laboral o social, en el transcurso del último año.

**Droga de preferencia en los últimos 12 meses:** Sustancia que el propio usuario solicitante de tratamiento ha elegido o preferido consumir en el transcurso del último año.

**Estrato social:** Estimación que hace el terapeuta, según su percepción, del estrato al que pertenece el usuario de drogas, considerando aspectos como lugar de residencia, escolaridad, empleo y características manifiestas como higiene y aliño, calidad del vestido, expresión verbal y vocabulario, etc.

**Tipo de consumo de drogas ilícitas:** Características de consumo de sustancias ilegales según motivo, frecuencia y problemas asociados. No incluye el uso de alcohol y/o tabaco y se clasifica como: experimental, social u ocasional, funcional, disfuncional y en remisión.

**Total de drogas consumidas:** Número de drogas consumidas (se incluyen las 26 sustancias de seguimiento) en las siguientes categorías: alguna vez en la vida, en el último año y en los últimos 30 días.

**Uso combinado de drogas en los últimos 12 meses:** Consumo de dos o más sustancias (incluyendo alcohol y cualquier droga ilícita o de uso médico, utilizada sin prescripción, pero excluyendo tabaco) en el transcurso de un mismo día, en el año previo a la solicitud de tratamiento en CIJ.