

---

**CONSUMO DE DROGAS EN PACIENTES DE PRIMER INGRESO A  
TRATAMIENTO A CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL  
ENERO - JUNIO, 2013**

---

**Alma Delia Gutiérrez López**

Centros de Integración Juvenil  
Dirección de Investigación y Enseñanza  
Subdirección de Investigación  
Depto. de Investigación Clínica y Epidemiológica  
México, 2013

## **DIRECTORIO**

### **PRESIDENTE HONORARIO VITALICIO DEL PATRONATO NACIONAL**

Dr. Jesús Kumate Rodríguez

### **PRESIDENTE DEL PATRONATO NACIONAL**

Dr. Roberto Tapia Conyer

### **PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA**

Sra. Kena Moreno

### **DIRECTORA GENERAL**

Lic. Carmen Fernández Cáceres

### **DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE NORMATIVIDAD**

Dr. José Ángel Prado García

### **DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA**

Dr. Ricardo Sánchez Huesca

### **SUBDIRECTOR DE INVESTIGACIÓN**

Mtro. David Bruno Díaz Negrete

### **JEFA DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA Y EPIDEMIOLÓGICA**

Dra. Solveig Eréndira Rodríguez Kuri

## CONTENIDO

ANTECEDENTES.....	5
MÉTODO.....	6
CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS.....	8
FACTORES ASOCIADOS A LA DEMANDA DE TRATAMIENTO.....	11
CONSUMO DE DROGAS.....	14
REFERENCIAS.....	24
CUADROS.....	27
GLOSARIO.....	51

## ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro 1. Pacientes de primer ingreso a tratamiento por unidad de atención (CIJ)	28
Cuadro 2. Sexo	31
Cuadro 3. Persona que proporciona la información	31
Cuadro 4. Edad de ingreso a tratamiento	31
Cuadro 5. Estado civil	32
Cuadro 6. Escolaridad	32
Cuadro 7. Ocupación	33
Cuadro 8. Estrato social	33
Cuadro 9. Motivos de consulta	34
Cuadro 10. Condicionantes de la solicitud de tratamiento	34
Cuadro 11. Antecedentes de acciones contra el consumo de sustancias	35
Cuadro 12. Problemas asociados al consumo de sustancias	35
Cuadro 13. Edad de inicio del consumo de Tabaco	36
Cuadro 14. Edad de inicio del consumo de Alcohol	36
Cuadro 15. Edad de inicio del consumo de Drogas ilícitas	37
Cuadro 16. Drogas ilícitas de inicio	38
Cuadro 17. Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de Tabaco y el ingreso a tratamiento a CIJ	39
Cuadro 18. Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de Alcohol y el ingreso a tratamiento a CIJ	39
Cuadro 19. Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de Drogas ilícitas y el ingreso a tratamiento a CIJ	40
Cuadro 20. Tipo de consumo de drogas ilícitas	40
Cuadro 21. Total de drogas consumidas alguna vez en la vida (incluye alcohol o tabaco)	41
Cuadro 22. Total de drogas ilícitas consumidas alguna vez en la vida (no incluye ni alcohol ni tabaco)	41
Cuadro 23. Consumo de drogas alguna vez en la vida por sustancia	42
Cuadro 24. Total de drogas consumidas en el último año (incluye alcohol o tabaco)	43
Cuadro 25. Total de drogas ilícitas consumidas en el último año (no incluye ni alcohol ni tabaco)	43
Cuadro 26. Consumo de drogas en los últimos 12 meses por sustancia	44
Cuadro 27. Droga de preferencia en los últimos 12 meses, según menciones	45
Cuadro 28. Droga de mayor impacto en los últimos 12 meses, según menciones	46
Cuadro 29. Uso combinado de drogas en los últimos 12 meses (no incluye tabaco)	47
Cuadro 30. Total de drogas consumidas en los últimos 30 días (incluye alcohol o tabaco)	47
Cuadro 31. Total de drogas ilícitas consumidas en los últimos 30 días (no incluye ni alcohol ni tabaco)	48
Cuadro 32. Consumo de drogas en los últimos 30 días por sustancia	49
Cuadro 33. Frecuencia de episodios de abuso del consumo de Tabaco en los últimos 30 días	50
Cuadro 34. Frecuencia de episodios de abuso del consumo de Alcohol en los últimos 30 días	50
Cuadro 35. Frecuencia de episodios de abuso del consumo de drogas ilícitas en los últimos 30 días	50

## RESUMEN

El informe se realizó con base en 13,291 registros clínicos de entrevista inicial de personas usuarias de sustancias psicoactivas que reportaron consumo de al menos una droga ilícita y que acudieron por primera vez a consulta a Centros de Integración Juvenil entre enero y junio de 2013. Los propósitos del estudio son a) actualizar la información del perfil sociodemográfico de pacientes, de los factores asociados a la demanda de tratamiento y del patrón de consumo de sustancias; b) contribuir a retroalimentar sistemas nacionales de información del consumo de drogas en nuestro país; c) aportar bases para fundamentar estudios que involucren a pacientes o consumidores(as) de drogas en México y sus regiones; y d) sobre todo contribuir al desarrollo, diseño y ajuste de los servicios institucionales de prevención y tratamiento del consumo de drogas.

Los datos permiten ver que el uso de drogas ilícitas es aún un trastorno que afecta en mayor proporción a la población masculina que solicita tratamiento, en una proporción de 4.3 hombres por cada mujer. La edad media de ingreso a tratamiento fue de 22.7 años. En promedio, los hombres ingresan a tratamiento a una edad mayor que las mujeres (23.1 años hombres y 20.8 años mujeres). La edad promedio del inicio del consumo de tabaco se situó en general en los 14.3 años, la de alcohol en 14.4 años y la de drogas ilícitas en 16 años. Tanto los hombres como las mujeres inician el consumo de estas drogas alrededor de estas edades.

Las drogas de mayor consumo alguna vez en la vida fueron alcohol (87.4%), tabaco (83.5%), cannabis (83.2%), cocaína/*crack* (41.3%), inhalables (36.1%), estimulantes (21.1%), depresores (15.1%), drogas alucinógenas y disociativas (9.3%) y opiáceos (4.3%). En cuanto al consumo en el mes previo al ingreso a tratamiento, las sustancias más utilizadas fueron tabaco (60.5%), alcohol (54.4%), cannabis (48.4%), inhalables (15.9%) y cocaína/*crack* (13.3%). Las sustancias de mayor impacto fueron marihuana (40.3%), alcohol (14.3%), solventes y removedores (9.2%), metanfetaminas (6.9%), tabaco (6.7%), *crack* (5.9%) y cocaína en polvo (4.1%).

En cuanto a los factores asociados a la demanda de tratamiento se observó que los usuarios de drogas acudieron principalmente por condicionamiento o recomendación familiar (44.8%) o por iniciativa propia (37.6%); que buscan atención por el consumo de drogas ilícitas (87.8%), por alcohol (41.7%) y por tabaco (36.9%); que no han tomado ninguna medida contra el problema (27.6%) o que han intentado interrumpir de manera voluntaria y sin apoyo el consumo (28.6%); y que entre los problemas más frecuentemente asociados al consumo se reconocen los de tipo familiar (79.4%), los de salud (41.7%), los psicológicos (38%) y los escolares (37.8%).

## ANTECEDENTES

Centros de Integración Juvenil ha reportado información de los pacientes atendidos y su consumo de drogas desde 1976<sup>1</sup> y en 1983 inicia la aplicación de una cédula homogénea a los pacientes de nuevo ingreso<sup>2</sup>, aunque no es sino a partir de 1990 que lleva a cabo el reporte estadístico de datos en forma sistemática y se consolida como *Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas (SIECD)*<sup>3</sup>, con lo cual a lo largo de los años ha podido realizar el seguimiento oportuno de un conjunto de variables que, además de haber contribuido en la toma de decisiones del diseño y ajuste de servicios institucionales, también ha aportado conocimiento de la forma y tendencias del uso de drogas en nuestro país, proporcionando a los Sistemas Epidemiológicos de las Adicciones, tanto a nivel Nacional como Regional, tal es el caso del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA)<sup>4</sup> de la Secretaría de Salud, y desde 1993, ha proporcionado información al Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas (SRID), perteneciente al Instituto Nacional de Psiquiatría “*Ramón de la Fuente*” (INP)<sup>5</sup>, así como al Observatorio Epidemiológico en Drogas de la Secretaría Salud<sup>6</sup>.

El SIECD también ha ofrecido información para el desarrollo de diferentes estudios epidemiológicos especializados, con temas que van desde el perfil de usuarios de drogas y su trayectoria de consumo<sup>7</sup>, el consumo de drogas en las mujeres<sup>8</sup>; hasta llegar a los estudios de tendencias<sup>9,10,11</sup>. Toda esta información ha facilitado el enfrentamiento oportuno de las problemáticas generadas por el creciente consumo de estimulantes y simultáneamente ha impulsado el desarrollo de estudios sobre las características particulares de los consumidores de estos alcaloides<sup>12,13</sup>.

Por otro lado, el análisis de la información reportada ha dado pie al desarrollo de estudios epidemiológicos particulares, enfocados en profundizar en las características del consumo de drogas legales de pacientes atendidos. Así, desde el año 2006, el SIECD se avocó a reportar por separado las características de este tipo de usuarios consumidores de tabaco y alcohol<sup>14</sup>, con lo cual se ha logrado identificar una emergencia epidemiológica del consumo de alcohol entre las pacientes atendidas con relación a los años anteriores<sup>15</sup>, emergencia que también ha sido reportada por la Encuesta Nacional de Adicciones (ENA), sobre todo para el caso de las mujeres jóvenes<sup>16</sup> y ha dado pie a CIJ para profundizar en esta problemática<sup>17</sup>.

Es importante destacar que la información reportada por el SIECD durante el lapso de más de dos décadas ha sido consistente con la de las Encuestas Nacionales de Adicciones (ENA) de este periodo.

También ha sido referente para el desarrollo de metodologías de investigación en variados estudios clínicos, psicosociales y evaluativos de la Institución, como es el caso de diversos *Estudios de la Comunidad Objetivo* (EBCO)<sup>18</sup> realizados por los CIJ a lo largo y ancho del país.

Finalmente, cabe señalar que el presente informe se elaboró con base en la información obtenida por el SIECD de Centros de Integración Juvenil (CIJ) y tiene el objetivo de proporcionar datos actualizados sobre las características sociodemográficas, factores asociados a la demanda de tratamiento y del patrón de consumo de drogas de la población usuaria de los servicios de tratamiento institucionales, con el propósito adicional de apoyar el diseño, planeación y ajuste de los programas institucionales de prevención, tratamiento y rehabilitación, además de contribuir con información a los sistemas de información en drogas de los Gobiernos y de aportar elementos para la elaboración de investigaciones en el campo de las adicciones.

## MÉTODO

**Diseño de estudio:** Censo, estudio transversal, descriptivo.

**Población:** 13,291 pacientes procedentes de 103 unidades de CIJ que acudieron por primera vez a consulta entre enero y junio de 2013, que proporcionaron personalmente la información y reportaron el consumo voluntario de sustancias psicoactivas (cfr. Anexo cuadro 1).

**Fuente de información:** Formato de Entrevista Inicial, aplicado en la primera consulta por parte del personal médico-técnico responsable del ingreso de pacientes a tratamiento, que forman parte del expediente clínico en cualquiera de sus dos versiones: formato electrónico (12,907 casos), base de datos recuperada el día 12 de Julio del 2013; o formato impreso (384 casos), los cuales fueron capturados por personal externo de la institución; y revisados y validados por elementos del departamento de Investigación Clínica y Epidemiológica.

**Variables de estudio:** Las características sociodemográficas estudiadas comprenden: persona que proporciona la información, sexo, edad de ingreso a tratamiento, estado civil, escolaridad, ocupación y estrato social; las variables de los factores asociados a la demanda de tratamiento: motivo(s) de consulta, condicionante(s) de la solicitud de tratamiento, antecedente(s) de acciones tomadas frente al uso de sustancias y problema(s) asociado(s) al mismo; y las variables de patrón de consumo: edad de inicio, tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de sustancias y el ingreso a

tratamiento, consumo alguna vez en la vida, en el último año y en los últimos 30 días; drogas de preferencia y de mayor impacto en el último año, uso combinado de sustancias, tipo de consumo de drogas ilícitas, episodios de abuso y total de drogas consumidas.

La información sobre el consumo de drogas se presenta categorizada en diez grupos de sustancias: tabaco, alcohol, cannabis, cocaína, inhalables, depresores, estimulantes, drogas alucinógenas y disociativas, opiáceos y otras sustancias de abuso.

Asimismo, también se desagregan los diez grupos antes mencionados en 26 categorías de sustancias: tabaco; alcohol; Cannabis: marihuana y hachís; Cocaína: cocaína en polvo blanco, *crack* y otras presentaciones de cocaína; Inhalables: solventes y removedores, pegamentos, esmaltes y pinturas y otros inhalables; Depresores: benzodiazepinas, *Rohypnol* y otros depresores; Estimulantes: anfetaminas, metanfetaminas (*crystal, ICE, etc.*), MDMA (éxtasis) y metanfetaminas alucinógenas y otros estimulantes; Drogas alucinógenas y disociativas: ácido lisérgico (LSD), plantas alucinógenas y derivados y otras; Opiáceos: heroína, opiáceos sintéticos, y opio y otros opioides; Otras sustancias de abuso: sustancias con utilidad médica y otras.

**Procesamiento de datos.** La información obtenida a través del expediente clínico electrónico fue capturada por los y las terapeutas responsables de realizar la entrevista inicial, mientras que la información recabada a través del formato impreso de Entrevista Inicial fue capturada mediante el programa *Control de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas* (CIECD). Para el procesamiento estadístico se utilizó el programa SPSS v.19.

Los resultados se presentan tanto en forma general como desglosada por sexo y en porcentajes válidos, excluyendo casos “*sin información*”, así como aquellos que no cumplieron con las condiciones requeridas para el análisis en cada variable de estudio.




## CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS<sup>a</sup>

**Sexo.** La población se conformó por 10,804 hombres y 2,487 mujeres, Lo que en porcentajes representa a un 81.3% y un 18.7%, respectivamente. Dando así una proporción aproximada de cuatro hombres (4.3) por cada mujer.

**Persona que proporciona la información.** En la mitad de los casos (53.3%) los pacientes acudieron en compañía de familiares u otras personas (52.6% de los hombres y 56.7% de las mujeres); mientras que en la otra mitad (47.4%) lo hicieron solos (47.4% de los hombres y 43.3% de las mujeres).

**Edad de ingreso a tratamiento.** Se observa un rango de edad de 9 a 78 años, con un promedio de 22.7 años, con una desviación estándar de diez años ( $\sigma=10.5$ ), lo cual implica que más del 80% de las personas atendidas (11,203) se ubique entre los 12 y 33 años de edad; la edad mediana de la población fue de 18 años, lo que conduce a precisar que el 45.2% de los casos fueron menores de edad (6,004 sujetos); finalmente, la moda se ubicó en 15 años (1,365 personas atendidas).

Figura 1. Edad de ingreso según sexo




<sup>a</sup> Cfr., Cuadros 1 a 8.

**Estado civil.** La mayor parte de la población refirió ser soltera (72.2%), mientras que un 20.4% indicó que vivía en unión libre o que estaba casada, con ligeras diferencias entre los sexos.


**Figura 2. Estado civil según sexo**

Un mayor porcentaje de hombres cuenta con una relación de pareja; mientras que una mayor proporción de mujeres se encuentran solteras o viudas.



**Escolaridad.** 47.3% cursaba o había cursado algún grado de educación secundaria, 32.4% al menos algún grado de bachillerato, 9.8% al menos un año de educación primaria y 7.5% uno o más años de estudios superiores.


**Figura 3. Escolaridad según sexo**



En comparación con los hombres, una mayor proporción de mujeres refiere estudios de secundaria y nivel técnico; en tanto que, un mayor porcentaje de hombres cuenta con estudios a nivel bachillerato.

**Ocupación.** 36% de los casos estudiaba, 35.8% desempeñaba alguna actividad laboral y 24.2% se encontraba desocupado.


**Figura 4. Principal ocupación según sexo**



**Mientras que un mayor porcentaje de mujeres se dedicaba a estudiar o a las labores del hogar; una mayor proporción de hombres trabajaba o no contaba con ocupación alguna. Siendo semejante la proporción de hombres y mujeres que se encuentran jubilados o pensionados.**

**Estrato social.** Según la percepción de los terapeutas 62.1% de los pacientes correspondieron al estrato medio bajo, 26.7%, al estrato bajo y 9.8%, al estrato medio alto.


**Figura 5. Estrato social según sexo**



**Según la percepción de los terapeutas tanto hombres como mujeres presentan condiciones sociales similares.**


## FACTORES ASOCIADOS A LA DEMANDA DE TRATAMIENTO<sup>b</sup>

**Motivos de consulta.** 44.9% de las personas atendidas reportó más de un motivo para acudir a tratamiento (uso de alcohol, tabaco o drogas), mientras que 0.2% no expresó ninguno. Conviene señalar que 87.8% acudió por consumo de drogas ilícitas, 41.7% por uso de bebidas alcohólicas y 36.9% por uso de tabaco.



Un porcentaje un poco menor de mujeres demanda tratamiento por consumo de drogas ilegales y de bebidas alcohólicas, no registrando diferencias por el consumo de y tabaco en comparación con los hombres.

**Condicionantes de la solicitud de tratamiento.** 22% de los casos expresó dos o más condicionantes de su solicitud de tratamiento, 44.8% acudió por condicionamiento o recomendación familiar, 37.6% por *motu proprio*, 18.4% por condicionamiento o recomendación escolar y 10.6% por condicionamiento legal.




Si bien, hombres y mujeres acuden principalmente por recomendación familiar, las mujeres presentan porcentajes más altos en cuanto acudir por condicionamiento o recomendación escolar, mientras que los varones lo hacen por condicionamiento legal o laboral.

<sup>b</sup> Cfr., Cuadros 9 a 12.

**Antecedentes de acciones contra el consumo de sustancias.** 28.6% de los pacientes expresó que antes de acudir a CIJ había intentado interrumpir el consumo de manera voluntaria pero sin apoyo, 12.9% señaló que previamente había estado internado en algún anexo, 7.3% había acudido a grupos de autoayuda, 6.6% acudió a algún tipo de tratamiento psiquiátrico o psicoterapéutico, mientras que 5.3% lo había hecho por medio de juramento. Cabe señalar que 11.3% reportó haber intentado al menos dos tipos distintos de acciones para abandonar el consumo de estupefacientes, en tanto que 27.6% expresó que hasta el momento de la solicitud de tratamiento no había tomado ninguna medida en contra del consumo de drogas.


**Figura 8. Antecedentes de acciones contra el consumo de sustancias según sexo**



**Aun cuando las pacientes adoptan menos medidas o acciones contra el consumo de sustancias que los pacientes antes de solicitar tratamiento a CIJ, la solicitud de ayuda profesional se registra en la misma medida.**

**Problemas asociados al consumo de sustancias.** 79.4% señaló problemas de tipo familiar, 41.7% de salud, 38% psicológicos, 37.8% escolares, 22.9% legales, 21.1% laborales, 16.8% de conducta antisocial o delictiva y 12.4% accidentes o lesiones. Cabe señalar que 76.1% de las personas atendidas mencionaron dos o más problemas asociados al consumo de sustancias, mientras que 3.8% no reportó ninguno.

**Figura 9. Problemas asociados al consumo de sustancias según sexo**





**Las mujeres presentan en mayor proporción problemas psicológicos y escolares, en tanto que los hombres reportan más problemas laborales y legales, así como accidentes o lesiones y de conducta antisocial.**

## CONSUMO DE DROGAS<sup>c</sup>

**Edad de inicio del consumo de sustancias.** La edad promedio de inicio del consumo de tabaco se situó en 14.3 años ( $\sigma=3.3$  años), en tanto que la mediana y la moda en 14 años; la edad promedio de inicio del consumo de alcohol se ubicó en 14.4 años ( $\sigma=3$  años), la mediana en 14 años y la moda en 15 años. A diferencia, la edad promedio de inicio en el abuso de drogas ilícitas (incluyendo sustancias con utilidad médica utilizadas fuera de prescripción) fue de 16 años ( $\sigma=4.9$  años), con mediana y moda de 15 años. Por otra parte, al considerar el primer decil como indicador de las edades de inicio más tempranas, se observa que el consumo de tabaco y bebidas alcohólicas aparece a los 11 años, mientras que el de drogas ilícitas lo hace un año después.

**Figura 10. Edad de inicio del consumo de sustancias según sexo**


	 Años			 Años		
	Tabaco	Alcohol	Drogas ilícitas	Tabaco	Alcohol	Drogas ilícitas
<b>Promedio</b>	14.3	14.4	15.9	14.4	14.2	16.5
<b>Desviación estándar</b>	3.2	2.9	4.5	3.9	3.4	6.6
<b>Mediana</b>	14	14	15	14	14	15
<b>Moda</b>	14	15	15	14	13	14

**En promedio, hombres y mujeres inician el consumo de sustancias a edades similares.**

<sup>c</sup> Cfr., Cuadros 13 a 35

**Drogas ilícitas de inicio.** Las sustancias de inicio más reportadas fueron en primer lugar la cannabis (67.4%), sobre todo en forma de marihuana (67.3%); en segundo lugar los inhalables (16.7%), la mayor parte en forma de solventes y removedores (11%); en tercer puesto se ubica la cocaína (9.9%), tanto en forma de polvo blanco (7.5%) o como *crack* (2.4%); en cuarto lugar aparecen los estimulantes (2.7%), entre los cuales destacan las metanfetaminas (1.9%); en quinto lugar se ubican los depresores con utilidad médica (2.1%; 1.9% reportó el uso de benzodiazepinas); y en sexto puesto se ubican los opiáceos (0.4%), donde sobresale el caso de la heroína (43 casos).

**Figura 11. Principales drogas ilícitas de inicio según sexo**



**La proporción de hombres que inician el consumo de drogas con cannabis es mayor que en las mujeres, mientras que entre éstas es mayor con inhalables, depresores y metanfetaminas.**




**Lapso transcurrido entre el inicio del consumo de sustancias y el ingreso a tratamiento en CIJ.** El promedio de tiempo entre el inicio de consumo y la solicitud de tratamiento se situó para tabaco y alcohol en 8.7 años ( $\sigma=9.9$  y 9.8 años, respectivamente), y el de drogas ilícitas en 6.7 años ( $\sigma=8.8$  años), Cabe puntualizar que el 55% de los usuarios dejó pasar entre uno y cinco años desde el momento en que se inició el consumo de tabaco y alcohol y el momento de acudir a solicitar tratamiento, mientras que para el caso de las drogas ilícitas fue entre uno y tres años.

**Figura 12. Lapso transcurrido entre el inicio del consumo de sustancias y el ingreso a tratamiento en CIJ según sexo**



**Tipo de consumo de drogas ilícitas.** 52.8% de los solicitantes de tratamiento fue diagnosticado con consumo funcional, 17.8% con consumo disfuncional, 14.6% con consumo social u ocasional, 11.2% con consumo experimental y 3.6% en remisión.




**Las mujeres presentan patrones de consumo menos graves que los hombres.**

**Total de drogas consumidas.** El promedio de sustancias utilizadas alguna vez en la vida, incluyendo alcohol o tabaco, fue de 4.2 drogas (94.6% reportó el uso de dos o más sustancias); en el último año fue de 3.3 drogas (87.8% consumió dos o más sustancias); y en los últimos 30 días fue de 2.1 drogas (65.9% reportó haber utilizado dos o más sustancias).

Por otro lado, el promedio de sustancias utilizadas alguna vez en la vida, sin incluir alcohol y tabaco, fue de 2.4 drogas (58.5 % reportó el uso de dos o más sustancias); en el último año fue de 1.8 drogas (43% consumió dos o más sustancias); y en los últimos 30 días fue de una droga (20.7% reportó haber utilizado dos o más sustancias).


**Figura 14. Total de drogas consumidas según sexo**



**Mujeres y hombres consumen, prácticamente, el mismo número de drogas.**

**Consumo de drogas alguna vez en la vida.**<sup>d</sup> Las proporciones de consumo alguna vez en la vida de los diez grupos de sustancias fueron: alcohol (87.4%), tabaco (83.5%); cannabis (83.2%), cocaína (41.3%), inhalables (36.1%), estimulantes (21.1%), depresores (15.1%), drogas alucinógenas y disociativas (9.3%), opiáceos (4.3%) y otras sustancias de abuso (2.4%).

En cuanto al uso de sustancias específicas (contenidas en alguno de los diez grupos antes mencionados) sobresalen: marihuana (83.2%), cocaína en polvo blanco (34.7%) solventes y removedores (25.2%), crack (19.6%), metanfetaminas (14.8%), benzodiacepinas (14%) y pegamentos (9.5%).



**Las drogas más utilizadas alguna vez en la vida por hombres y mujeres fueron alcohol, tabaco y cannabis; sin embargo, los hombres en general presentan mayor consumo de casi todas las sustancias, excepto en el consumo de benzodiacepinas.**


<sup>d</sup> Dado que la mayoría de los casos refirió haber utilizado dos o más sustancias —tanto en esta categoría como en las de uso en el último año y en los últimos 30 días, *infra*— la suma de porcentajes no es igual a 100.

**Consumo de drogas en los últimos 12 meses.** 97.9% de las personas reportaron haber consumido alguna sustancia en el año previo a su ingreso a tratamiento en CIJ.

Las proporciones de consumo de los diez grupos de sustancias utilizadas en este lapso fueron: alcohol (78.7%), tabaco (74%), cannabis (69.6%), cocaína (28.2%), inhalables (27%), estimulantes (16%), depresores (10.4%), drogas alucinógenas y disociativas (5.5%); opiáceos (3.2%) y otras sustancias de abuso (1.6%).

En cuanto al consumo de sustancias específicas contenidas en alguno de los grupos anteriores destacan: mariguana (69.6%), cocaína en polvo blanco (21.4%), solventes y removedores (18.7%), crack (13.2%) y metanfetaminas (11.7%); en menor proporción se refieren a las benzodiacepinas (9.9%) y los pegamentos (6.4%).


**Figura 16. Consumo de drogas en los últimos 12 meses según sexo**



**Las drogas más consumidas en el último año por hombres y mujeres fueron alcohol, tabaco y cannabis; las mujeres reportan mayor consumo de inhalables, benzodiacepinas y alucinógenos que los hombres.**

**Droga de preferencia en los últimos 12 meses.** Entre las sustancias más frecuentemente referidas se encontraron: cannabis (43.2%), alcohol (16.5%), tabaco (11.7%) e inhalables (10.6%). En menores proporciones aparecieron: metanfetaminas (4.8%), crack (4.3%), cocaína en polvo (3.2%) y heroína (2%).


**Figura 17. Droga de preferencia en los últimos 12 meses según sexo**



**Durante el último año, los hombres prefirieron consumir en mayor medida que las mujeres cannabis, inhalables y crack y heroína; mientras que las mujeres prefirieron en mayor medida que los hombres el consumo, tabaco, alcohol, benzodiacepinas y alucinógenos.**

**Droga de mayor impacto en los últimos 12 meses.** Entre las sustancias a cuyo consumo los pacientes atribuyen los mayores daños en la salud, en el bienestar personal y familiar o en el desempeño escolar, laboral o social se señalaron: cannabis (40.3%), alcohol e inhalables (14.3% cada una), metanfetaminas (6.9%), tabaco (6.7%), crack (5.9%) y cocaína en polvo (4.1%).


**Figura 18. Droga de mayor impacto en los últimos 12 meses según sexo**



**La cannabis es la droga que tanto hombres como mujeres reportan como la sustancia que les ha causado mayores problemas. Pese a que una de cada cinco mujeres refiere a los inhalables.**

**Uso combinado de drogas en los últimos 12 meses.<sup>e</sup>** Al menos en una ocasión en el transcurso del último año y excluyendo el consumo de tabaco, poco menos de la mitad de la población (43%) reportó el consumo en un mismo día de dos o más sustancias.

**Figura 19. Uso combinado de droga en los últimos 12 meses según sexo**



**Los hombres combinan con mayor frecuencia dos o más drogas que las mujeres**  
(Excluye el consumo de tabaco)


<sup>e</sup> No se toman en cuenta 3,011 casos (22.7%) que no cumplieron los criterios de inclusión de esta variable; 22% de los hombres y 25.7% de las mujeres (ver anexo, cuadro 29).

**Consumo de drogas en los últimos 30 días.** Incluyendo al alcohol y al tabaco, 89.5% de los casos reportaron consumo de sustancias en el mes anterior al ingreso a tratamiento.

Las proporciones de consumo de los diez grupos de sustancias utilizadas en este lapso fueron: tabaco (60.5%), alcohol (54.4%), cannabis (48.4%), inhalables (15.9%), cocaína (13.3%), estimulantes (8.2%), depresores (5.2%), opiáceos (2.2%), drogas alucinógenas y disociativas (1.3%) y otras sustancias de abuso (0.8%).


En cuanto al consumo de sustancias específicas destaca el de marihuana con 48.4%, le siguen: solventes/removedores (10.8%), cocaína en polvo (8.2%), metanfetaminas (6.6%) y *crack* (6.6%); en menor proporción se registra el consumo de benzodiacepinas (5.1%) y pegamentos (3.2%).

**Figura 20. Consumo de drogas en los últimos 30 días según sexo**



**Si bien las sustancias más consumidas en los 30 días previos a la solicitud de tratamiento por hombres y mujeres fueron tabaco, alcohol y cannabis; las mujeres presentan mayor consumo de inhalables, benzodiacepinas y alucinógenos que los hombres.**

**Frecuencia de episodios de abuso en los últimos 30 días.** 38.3% de quienes reportaron consumo de tabaco en los últimos 30 días aceptó fumar seis o más cigarrillos diariamente. Así mismo, entre quienes consumieron alcohol, una tercera parte (36%) reportó consumo abusivo menos de una vez a la semana, otra tercera parte (33.1%) abusó del alcohol una o dos veces a la semana. Finalmente, 38.1% de los usuarios de drogas ilícitas durante el último mes reportó consumirlas todos los días, 26.2% menos de una vez a la semana y 20.7% una a dos veces a la semana.



**Las proporciones de abuso de tabaco tienden a ser similares entre los sexos, mientras que en el caso del alcohol y las drogas ilícitas los hombres reportan episodios de abuso con mayor frecuencia que las mujeres.**



## Referencias

1. Sánchez-Huesca, R. y López Granados, L. (1985). *Características demográficas y patrones de inicio en el consumo de drogas en asistentes a los Centros Locales; recuperación de los archivos de siete años (1976-1982)*. México: Centros de Integración Juvenil, A.C. (reporte interno).
2. Clarac Rengade, P. y Wagner Echeagaray, F. (1987). Análisis de algunas variables en una muestra de pacientes farmacodependientes (1986). En F. Wagner Echeagaray y R. Ortiz Mondragón (Comp.) (1990). *Estudios acerca de la farmacodependencia en México realizados por Paule Clarac*. México: Centros de Integración Juvenil, A. C. (pp. 111-126).
3. García Aurrecochea, R., Díaz Negrete, B., Balanzario, M. C., Gutierrez-López, A. Castillo-Franco, I. (1999). *Características sociodemográficas y de consumo de drogas en pacientes atendidos entre 1990 y 1997*. México: Centros de Integración Juvenil, A.C., Dirección de Promoción Institucional. *Informe de investigación 98-12*.
4. Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA), *Informe 2009* (2010). México: Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, Dirección de Epidemiología, Dirección de Investigación Operativa Epidemiológica. [http://www.dgepi.salud.gob.mx/2010/PDFS/SISVEA/informes\\_sisvea\\_2009.pdf](http://www.dgepi.salud.gob.mx/2010/PDFS/SISVEA/informes_sisvea_2009.pdf)
5. Ortiz A, Martínez R., Meza D. Grupo Interinstitucional para el desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. *Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana No. 51*, Noviembre de 2011. México: Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. [http://www.inprf.gob.mx/opencms/export/sites/INPRFM/psicosociales/archivos/srid/rep\\_51\\_pdf.pdf](http://www.inprf.gob.mx/opencms/export/sites/INPRFM/psicosociales/archivos/srid/rep_51_pdf.pdf)
6. Díaz, D. B., Balanzario, M. C., Castillo, I., Gutierrez, A. y García, R. (2001). Uso de drogas entre pacientes de primer ingreso en Centros de Integración Juvenil. En Secretaría de Salud. *Observatorio Epidemiológico en drogas. El fenómeno de las adicciones en México 2001*. México: Secretaría de Salud (pp. 66-71). [http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/publicaciones/obs2001\\_cap4.pdf](http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/publicaciones/obs2001_cap4.pdf)
7. García-Aurrecochea, R., Díaz-Negrete, B., Balanzario, M. C., Castillo-Franco, I. (1998). *Perfil y trayectoria del consumo de drogas en pacientes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil en 1996*. En CD: B. D. Díaz Negrete, J. Arellanez, M. C. Balanzario y R. Sánchez Huesca, *Once años de estudios del consumo de drogas en México, Investigaciones realizadas en Centros de*

*Integración Juvenil entre 1997 y 2007.* México: Centros de Integración Juvenil.

8. Castillo Franco, P. I., Gutiérrez López, A. D. (2008). *Consumo de drogas en mujeres asistentes a centros de tratamiento especializado en la Ciudad de México.* *Salud Mental* 31 (5), 351-359. <http://scielo.unam.mx/pdf/sm/v31n5/v31n5a3.pdf>
9. Gutiérrez López, AD. (2013). *Tendencias del consumo de drogas alguna vez en la vida en Centros de Integración Juvenil. Segundo semestre de 2004 - Segundo semestre de 2012 (Nivel Nacional y Entidades Federativas).* México: Centros de Integración Juvenil, A.C., Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación. <http://www.cij.gob.mx/Especialistas/pdf/13-02e.pdf>
10. Gutiérrez López, AD. (2013). *Tendencias del consumo de drogas en los últimos 30 días en Centros de Integración Juvenil. Segundo semestre de 2004 - Segundo semestre de 2012 (Nivel Nacional y Entidades Federativas).* México: Centros de Integración Juvenil, A.C., Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación. <http://www.cij.gob.mx/Especialistas/pdf/13-02f.pdf>
11. Gutiérrez López, A. D. (2013). *Droga de mayor impacto reportada por usuarios de drogas ilícitas en el año previo a la solicitud de tratamiento en Centros de Integración Juvenil. Segundo semestre de 2004 - Segundo semestre de 2012 (Nivel Nacional y Entidades Federativa).* México: Centros de Integración Juvenil, A.C., Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación. <http://www.cij.gob.mx/Especialistas/pdf/13-02g.pdf>
12. Jiménez Silvestre K., García Aurrecochea, V. R. y González Sánchez, J. D. (2005). *Patrón de Consumo de Cocaína y Crack en pacientes que ingresan a Tratamiento.* México: Centros de Integración Juvenil, A.C., Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación. Informe de investigación 05-07.
13. Jiménez-Silvestre, K. y Castillo-Vite N.L. *Factores de reincidencia en usuarios de cocaína, crack y metanfetaminas en fase de recuperación.* México: Centros de Integración Juvenil, A.C., Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación. Informe de Investigación 04-14.
14. Gutiérrez López, A. D. y Castillo Franco, P. I. (2007). *Características sociodemográficas y de consumo en usuarios de tabaco y alcohol de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil en 2006.* México: Centros de Integración Juvenil, A.C., Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación. <http://www.cij.gob.mx/Especialistas/pdf/07-13.pdf>

15. Gutiérrez López, A.D. (2013). *Consumo de tabaco y alcohol en pacientes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil. Julio - Diciembre 2012*. México: Centros de Integración Juvenil, A.C., Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación. <http://www.cij.gob.mx/Especialistas/pdf/13-02d.pdf>
16. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz; Instituto Nacional de Salud Pública; Secretaría de Salud (2012). *Encuesta Nacional de Adicciones 2011: Reporte alcohol*. Villatoro Velázquez JA, Medina Mora ME, Fleiz Bautista C, Téllez Rojo MM, Mendoza Alvarado LR, Romero Martínez M, Gutierrez Reyes JP, Castro Tinoco M, Hernández Ávila M, Tena Tamayo C, Alvear Sevilla C y Guisa Cruz V. México: INPRFM. <http://www.inprf.gob.mx>, [www.conadic.gob.mx](http://www.conadic.gob.mx), [www.cenadic.salud.gob.mx](http://www.cenadic.salud.gob.mx)
17. K. Moreno (Coord.) (2010). *Los jóvenes y el alcohol en México. Un problema emergente en mujeres*. México: Centros de Integración Juvenil, A.C.
18. Centros de Integración Juvenil (2008). *Estudio Básico de Comunidad Objetivo EBCO 2007-2008. Vol. 1 y 2*. CD. México: Centros de Integración Juvenil, A.C., Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación.

---

## **CUADROS**

---

**CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS USUARIOS DE DROGAS DE PRIMER INGRESO A TRATAMIENTO A CIJ EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2013**

**Cuadro 1. Pacientes de primer ingreso por unidad de atención (CIJ)**

CIJ	General		Hombres		Mujeres		Razón H:M
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	
Álvaro Obregón Norte	126	0.9	99	78.6	27	21.4	3.7 : 1
Álvaro Obregón Oriente	91	0.7	78	85.7	13	14.3	6 : 1
Azcapotzalco	214	1.6	184	86.0	30	14.0	6.1 : 1
Benito Juárez	186	1.4	127	68.3	59	31.7	2.2 : 1
Chalco	183	1.4	151	82.5	32	17.5	4.7 : 1
Coyoacán	155	1.2	130	83.9	25	16.1	5.2 : 1
Cuajimalpa	131	1.0	97	74.0	34	26.0	2.9 : 1
Cuauhtémoc Oriente	165	1.2	137	83.0	28	17.0	4.9 : 1
Cuauhtémoc Poniente	187	1.4	149	79.7	38	20.3	3.9 : 1
Ecatepec	263	2.0	219	83.3	44	16.7	5 : 1
Gustavo A. Madero Aragón	317	2.4	276	87.1	41	12.9	6.7 : 1
Gustavo A. Madero Norte	225	1.7	185	82.2	40	17.8	4.6 : 1
Gustavo A. Madero Oriente	46	0.3	33	71.7	13	28.3	2.5 : 1
Iztapalapa Oriente	534	4.0	453	84.8	81	15.2	5.6 : 1
Iztapalapa Poniente	159	1.2	130	81.8	29	18.2	4.5 : 1
Miguel Hidalgo	114	0.9	91	79.8	23	20.2	4 : 1
Naucalpan	235	1.8	185	78.7	50	21.3	3.7 : 1
Nezahualcóyotl	293	2.2	235	80.2	58	19.8	4.1 : 1
Texcoco	144	1.1	123	85.4	21	14.6	5.9 : 1
Tlalnepantla	203	1.5	167	82.3	36	17.7	4.6 : 1
Tlalpan	208	1.6	172	82.7	36	17.3	4.8 : 1
Toluca	231	1.7	201	87.0	30	13.0	6.7 : 1
Venustiano Carranza	183	1.4	149	81.4	34	18.6	4.4 : 1
Xochimilco	16	0.1	9	56.3	7	43.8	1.3 : 1
UH Ecatepec	65	0.5	64	98.5	1	1.5	64 : 1
UH Iztapalapa	84	0.6	65	77.4	19	22.6	3.4 : 1
UH Naucalpan	65	0.5	57	87.7	8	12.3	7.1 : 1
Acapulco	171	1.3	136	79.5	35	20.5	3.9 : 1
Aguascalientes	136	1.0	104	76.5	32	23.5	3.3 : 1
Apodaca	43	0.3	36	83.7	7	16.3	5.1 : 1
Cancún	224	1.7	182	81.3	42	18.8	4.3 : 1
Cd. del Carmen	76	0.6	63	82.9	13	17.1	4.8 : 1
Cd. Juárez Norte	152	1.1	120	78.9	32	21.1	3.8 : 1
Cd. Victoria	15	0.1	13	86.7	2	13.3	6.5 : 1

*(Continúa)*

**Cuadro 1. Pacientes de primer ingreso a tratamiento por Unidad de atención (CIJ)**  
(Continuación)

CIJ	General		Hombres		Mujeres		Razón H:M
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	
Celaya	225	1.7	201	89.3	24	10.7	8.4 : 1
Chetumal	58	0.4	49	84.5	9	15.5	5.4 : 1
Chihuahua	229	1.7	179	78.2	50	21.8	3.6 : 1
Chilpancingo	56	0.4	47	83.9	9	16.1	5.2 : 1
Colima	251	1.9	225	89.6	26	10.4	8.7 : 1
Cozumel	100	0.8	70	70.0	30	30.0	2.3 : 1
Cuernavaca	107	0.8	81	75.7	26	24.3	3.1 : 1
Culiacán	162	1.2	147	90.7	15	9.3	9.8 : 1
Durango	134	1.0	91	67.9	43	32.1	2.1 : 1
Escuinapa	81	0.6	76	93.8	5	6.2	15.2 : 1
Fresnillo Pinacoteca	38	0.3	30	78.9	8	21.1	3.8 : 1
Guadalajara Centro	267	2.0	222	83.1	45	16.9	4.9 : 1
Guadalajara Sur	148	1.1	119	80.4	29	19.6	4.1 : 1
Guadalupe	83	0.6	71	85.5	12	14.5	5.9 : 1
Guamúchil	42	0.3	35	83.3	7	16.7	5 : 1
Guasave	81	0.6	72	88.9	9	11.1	8 : 1
Hermosillo	192	1.4	157	81.8	35	18.2	4.5 : 1
Huatulco	35	0.3	31	88.6	4	11.4	7.8 : 1
Ixtapa Zihuatanejo	43	0.3	37	86.0	6	14.0	6.2 : 1
La Paz	103	0.8	80	77.7	23	22.3	3.5 : 1
La Piedad	35	0.3	26	74.3	9	25.7	2.9 : 1
Laguna Durango	126	0.9	91	72.2	35	27.8	2.6 : 1
León	213	1.6	168	78.9	45	21.1	3.7 : 1
Los Cabos	37	0.3	29	78.4	8	21.6	3.6 : 1
Los Mochis	110	0.8	88	80.0	22	20.0	4 : 1
Manzanillo	93	0.7	72	77.4	21	22.6	3.4 : 1
Mazatlán	133	1.0	114	85.7	19	14.3	6 : 1
Mérida	212	1.6	171	80.7	41	19.3	4.2 : 1
Mexicali	213	1.6	178	83.6	35	16.4	5.1 : 1
Monterrey	122	0.9	97	79.5	25	20.5	3.9 : 1
Morelia	105	0.8	78	74.3	27	25.7	2.9 : 1
Nogales	108	0.8	89	82.4	19	17.6	4.7 : 1
Oaxaca	113	0.9	86	76.1	27	23.9	3.2 : 1
Pachuca	157	1.2	129	82.2	28	17.8	4.6 : 1
Playa del Carmen	63	0.5	54	85.7	9	14.3	6 : 1

(Continúa)

**Cuadro 1. Pacientes de primer ingreso a tratamiento por Unidad de atención (CIJ)**  
(Continuación)

CIJ	General		Hombres		Mujeres		Razón H:M
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	
Poza Rica	42	0.3	32	76.2	10	23.8	3.2 : 1
Puebla	171	1.3	141	82.5	30	17.5	4.7 : 1
Puerto Vallarta	121	0.9	92	76.0	29	24.0	3.2 : 1
Querétaro	178	1.3	143	80.3	35	19.7	4.1 : 1
Salamanca	87	0.7	70	80.5	17	19.5	4.1 : 1
Saltillo	201	1.5	138	68.7	63	31.3	2.2 : 1
San Luis Potosí	168	1.3	123	73.2	45	26.8	2.7 : 1
San Nicolás de los Garza	65	0.5	52	80.0	13	20.0	4 : 1
Tampico	85	0.6	73	85.9	12	14.1	6.1 : 1
Tapachula	16	0.1	12	75.0	4	25.0	3 : 1
Tecomán	58	0.4	52	89.7	6	10.3	8.7 : 1
Tehuacán	72	0.5	59	81.9	13	18.1	4.5 : 1
Tepic	41	0.3	31	75.6	10	24.4	3.1 : 1
Tijuana Guaycura	265	2.0	193	72.8	72	27.2	2.7 : 1
Tijuana Soler	303	2.3	241	79.5	62	20.5	3.9 : 1
Tlaquepaque	237	1.8	210	88.6	27	11.4	7.8 : 1
Torreón	8	0.1	8	100.0	0	0.0	---
Torreón Oriente	171	1.3	116	67.8	55	32.2	2.1 : 1
Tuxtla Gutiérrez	86	0.6	75	87.2	11	12.8	6.8 : 1
Villahermosa	57	0.4	43	75.4	14	24.6	3.1 : 1
Xalapa	80	0.6	63	78.8	17	21.3	3.7 : 1
Zacatecas	81	0.6	67	82.7	14	17.3	4.8 : 1
Zamora	88	0.7	71	80.7	17	19.3	4.2 : 1
Zapopan Norte	222	1.7	174	78.4	48	21.6	3.6 : 1
UH Ciudad Juárez	27	0.2	23	85.2	4	14.8	5.8 : 1
UH Culiacán	42	0.3	42	100.0	0	0.0	---
UH Ixbalanqué	21	0.2	21	100.0	0	0.0	---
UH Jerez	52	0.4	49	94.2	3	5.8	16.3 : 1
UH Monterrey	39	0.3	32	82.1	7	17.9	4.6 : 1
UH Punta Diamante	57	0.4	49	86.0	8	14.0	6.1 : 1
UH Tijuana	51	0.4	43	84.3	8	15.7	5.4 : 1
UH Zapopan	89	0.7	75	84.3	14	15.7	5.4 : 1
UH Zapotlán el Grande	23	0.2	23	100.0	0	0.0	---
UTPPCH Cd. Juárez	72	0.5	58	80.6	14	19.4	4.1 : 1
<b>Total</b>	<b>13,291</b>	<b>100.0</b>	<b>10,804</b>	<b>81.3</b>	<b>2,487</b>	<b>18.7</b>	<b>4.3 : 1</b>

UH=Unidad de Hospitalización

UTPPCH=Unidad de Tratamiento a Personas con Problemas de Consumo de Heroína

UMAA=Unidad Médica de Atención a las Adicciones

**Cuadro 2. Sexo**

	<b>Frec.</b>	<b>%</b>	<b>Razón H:M</b>
Hombres	10,804	81.3	
Mujeres	2,487	18.7	
<b>Total</b>	<b>13,291</b>	<b>100.0</b>	4.3 : 1

**Cuadro 3. Persona que proporciona la información**

	<b>General</b>		<b>Hombres</b>		<b>Mujeres</b>	
	<b>Frec.</b>	<b>%</b>	<b>Frec.</b>	<b>%</b>	<b>Frec.</b>	<b>%</b>
Usuario de drogas	6,204	46.7	5,126	47.4	1,078	43.3
Usuario de drogas y familiares u otras personas	7,087	53.3	5,678	52.6	1,409	56.7
<b>Total</b>	<b>13,291</b>	<b>100.0</b>	<b>10,804</b>	<b>100.0</b>	<b>2,487</b>	<b>100.0</b>

**Cuadro 4. Edad de ingreso a tratamiento**

	<b>General*</b>		<b>Hombres**</b>		<b>Mujeres***</b>	
	<b>Frec.</b>	<b>%</b>	<b>Frec.</b>	<b>%</b>	<b>Frec.</b>	<b>%</b>
Hasta 9 años	4	0.0	4	0.0	0	0.0
10 a 14 años	2,146	16.1	1,480	13.7	666	26.8
15 a 19 años	5,294	39.8	4,316	39.9	978	39.3
20 a 24 años	1,858	14.0	1,555	14.4	303	12.2
25 a 29 años	1,169	8.8	1,022	9.5	147	5.9
30 a 34 años	909	6.8	788	7.3	121	4.9
35 a 39 años	703	5.3	622	5.8	81	3.3
40 a 44 años	512	3.9	446	4.1	66	2.7
45 años y más	696	5.2	571	5.3	125	5.0
<b>Total</b>	<b>13,291</b>	<b>100.0</b>	<b>10,804</b>	<b>100.0</b>	<b>2,487</b>	<b>100.0</b>

\*  $\mu = 22.7$   $\sigma = 10.5$ ; Med.= 18; Mo.= 15; Decil1 = 14\*\* $\mu = 23.1$ ;  $\sigma = 10.5$ ; Med.= 19; Mo.= 15; Decil1 = 14\*\*\*  $\mu = 20.8$ ;  $\sigma = 10.2$ ; Med.= 17; Mo.= 14; Decil1 = 13



**Cuadro 5. Estado civil**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Soltero	9,578	72.1	72.2	7,650	70.8	70.9	1,928	77.5	77.7
Casado	1,271	9.6	9.6	1,136	10.5	10.5	135	5.4	5.4
Unión libre	1,433	10.8	10.8	1,199	11.1	11.1	234	9.4	9.4
Separado	794	6.0	6.0	669	6.2	6.2	125	5.0	5.0
Divorciado	141	1.1	1.1	108	1.0	1.0	33	1.3	1.3
Viudo	58	0.4	0.4	31	0.3	0.3	27	1.1	1.1
<i>Sin información</i>	16	0.1	<i>Se omite</i>	11	0.1	<i>Se omite</i>	5	0.2	<i>Se omite</i>
<b>Total</b>	<b>13,291</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>10,804</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>2,487</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

**Cuadro 6. Escolaridad**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Ninguna (no sabe leer ni escribir)	36	0.3	0.3	26	0.2	0.2	10	0.4	0.4
Ninguna (sabe leer y escribir)	35	0.3	0.3	26	0.2	0.2	9	0.4	0.4
Primaria incompleta	538	4.0	4.1	453	4.2	4.2	85	3.4	3.4
Primaria completa	767	5.8	5.8	656	6.1	6.1	111	4.5	4.5
Secundaria incompleta	4,261	32.1	32.1	3,271	30.3	30.3	990	39.8	39.8
Secundaria completa	2,018	15.2	15.2	1,728	16.0	16.0	290	11.7	11.7
Estudios técnicos o comerciales incompletos	191	1.4	1.4	150	1.4	1.4	41	1.6	1.6
Estudios técnicos o comerciales completos	102	0.8	0.8	70	0.6	0.6	32	1.3	1.3
Bachillerato incompleto	3,470	26.1	26.1	2,888	26.7	26.8	582	23.4	23.4
Bachillerato completo	837	6.3	6.3	695	6.4	6.4	142	5.7	5.7
Estudios superiores incompletos	726	5.5	5.5	594	5.5	5.5	132	5.3	5.3
Estudios superiores completos	275	2.1	2.1	216	2.0	2.0	59	2.4	2.4
Estudios de posgrado incompletos	9	0.1	0.1	8	0.1	0.1	1	0.0	0.0
Estudios de posgrado completos	16	0.1	0.1	14	0.1	0.1	2	0.1	0.1
<i>Sin información</i>	10	0.1	<i>Se omite</i>	9	0.1	<i>Se omite</i>	1	0.0	<i>Se omite</i>
<b>Total</b>	<b>13,291</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>10,804</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>2,487</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

**Cuadro 7. Ocupación**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Desempleado(a)	3,206	24.1	24.2	2,692	24.9	25.0	514	20.7	20.7
Estudiante	4,777	35.9	36.0	3,586	33.2	33.2	1,191	47.9	47.9
Estudia y trabaja	570	4.3	4.3	500	4.6	4.6	70	2.8	2.8
Trabaja	4,186	31.5	31.5	3,816	35.3	35.4	370	14.9	14.9
Tareas del hogar	473	3.6	3.6	143	1.3	1.3	330	13.3	13.3
Pensionado	59	0.4	0.4	50	0.5	0.5	9	0.4	0.4
<i>Sin información</i>	20	0.2	<i>Se omite</i>	17	0.2	<i>Se omite</i>	3	0.1	<i>Se omite</i>
<b>Total</b>	<b>13,291</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>10,804</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>2,487</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

**Cuadro 8. Estrato social**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Alto	81	0.6	0.6	68	0.6	0.6	13	0.5	0.5
Medio alto	1,301	9.8	9.8	1,024	9.5	9.5	277	11.1	11.2
Medio bajo	8,231	61.9	62.1	6,674	61.8	62.0	1,557	62.6	62.7
Bajo	3,533	26.6	26.7	2,911	26.9	27.0	622	25.0	25.1
Pobreza extrema o marginación	110	0.8	0.8	96	0.9	0.9	14	0.6	0.6
<i>Sin información</i>	35	0.3	<i>Se omite</i>	31	0.3	<i>Se omite</i>	4	0.2	<i>Se omite</i>
<b>Total</b>	<b>13,291</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>10,804</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>2,487</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

**FACTORES ASOCIADOS A LA DEMANDA DE TRATAMIENTO EN PACIENTES DE PRIMER INGRESO A TRATAMIENTO EN CIJ EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2013**

**Cuadro 9. Motivos de consulta**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Consumo de drogas ilícitas	11,672	87.8	9,561	88.5	2,111	84.9
Consumo de bebidas alcohólicas	5,544	41.7	4,538	42.0	1,006	40.5
Consumo de tabaco	4,902	36.9	3,997	37.0	905	36.4
Otro motivo	474	3.6	344	3.2	130	5.2
<i>Ningún motivo específico reportado</i>	30	0.2	26	0.2	4	0.2
<i>Usuarios que reportaron dos o más motivos de consulta</i>	5,962	44.9	4,872	45.1	1,090	43.8

**Cuadro 10. Condicionantes de la solicitud de tratamiento**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Por propia iniciativa	5,004	37.6	4,086	37.8	918	36.9
Por condicionamiento o recomendación familiar	5,951	44.8	4,806	44.5	1,145	46.0
Por recomendación de pares	211	1.6	173	1.6	38	1.5
Por condicionamiento o recomendación escolar	2,445	18.4	1,888	17.5	557	22.4
Por condicionamiento legal	1,414	10.6	1,285	11.9	129	5.2
Por condicionamiento o recomendación laboral	180	1.4	172	1.6	8	0.3
Por indicación médica	833	6.3	653	6.0	180	7.2
Otros condicionante de solicitud de tratamiento	304	2.3	232	2.1	72	2.9
<i>Ningún condicionante reportado</i>	183	1.4	149	1.4	34	1.4
<i>Pacientes que reportaron dos o más condicionantes de la solicitud de tratamiento</i>	2,925	22.0	2,388	22.1	537	21.6

**Cuadro 11. Antecedentes de acciones contra el consumo de sustancias**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Juramento	711	5.3	641	5.9	70	2.8
Grupo de autoayuda	968	7.3	853	7.9	115	4.6
Internamiento en anexo	1,709	12.9	1,512	14.0	197	7.9
Intervención de emergencia	78	0.6	62	0.6	16	0.6
Programa de mantenimiento	110	0.8	86	0.8	24	1.0
Tratamiento médico no especializado	84	0.6	71	0.7	13	0.5
Tratamiento psiquiátrico o psicoterapéutico ambulatorio	641	4.8	515	4.8	126	5.1
Tratamiento psiquiátrico o psicoterapéutico residencial	263	2.0	221	2.0	42	1.7
Medicina tradicional o alternativa	65	0.5	52	0.5	13	0.5
Intento de interrupción voluntaria del consumo, sin apoyo	3,797	28.6	3,147	29.1	650	26.1
Otras acciones	3,205	24.1	2,504	23.2	701	28.2
<i>Ninguna acción previa reportada</i>	3,664	27.6	2,891	26.8	773	31.1
<i>Pacientes que reportaron dos o más acciones contra el consumo de sustancias antes de solicitar tratamiento en CIJ</i>	1,506	11.3	1,309	12.1	197	7.9

**Cuadro 12. Problemas asociados al consumo de sustancias**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Problemas de salud	5,548	41.7	4,523	41.9	1,025	41.2
Accidentes o lesiones	1,646	12.4	1,409	13.0	237	9.5
Problemas familiares	10,558	79.4	8,570	79.3	1,988	79.9
Problemas escolares	5,027	37.8	3,953	36.6	1,074	43.2
Problemas laborales	2,808	21.1	2,558	23.7	250	10.1
Problemas psicológicos	5,054	38.0	3,999	37.0	1,055	42.4
Problemas legales	3,047	22.9	2,758	25.5	289	11.6
Conducta antisocial o delictiva	2,229	16.8	1,946	18.0	283	11.4
Otros problemas	419	3.2	331	3.1	88	3.5
<i>Ningún problema asociado reportado</i>	503	3.8	392	3.6	111	4.5
<i>Pacientes que reportaron dos o más problemas asociados</i>	10,120	76.1	8,284	76.7	1,836	73.8

**CARACTERÍSTICAS DEL CONSUMO DE DROGAS EN PACIENTES DE PRIMER INGRESO A TRATAMIENTO EN CIJ EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2013**

**Cuadro 13. Edad de inicio del consumo de Tabaco**

	General*			Hombres**			Mujeres***		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Hasta 9 años	421	3.2	3.8	361	3.3	4.0	60	2.4	3.0
10 a 14 años	5,962	44.9	53.8	4,825	44.7	53.0	1,137	45.7	57.3
15 a 19 años	4,195	31.6	37.8	3,512	32.5	38.6	683	27.5	34.4
20 a 24 años	350	2.6	3.2	292	2.7	3.2	58	2.3	2.9
25 a 29 años	99	0.7	0.9	72	0.7	0.8	27	1.1	1.4
30 a 34 años	31	0.2	0.3	23	0.2	0.3	8	0.3	0.4
35 a 39 años	14	0.1	0.1	12	0.1	0.1	2	0.1	0.1
40 a 44 años	9	0.1	0.1	6	0.1	0.1	3	0.1	0.2
45 años y más	10	0.1	0.1	3	0.0	0.0	7	0.3	0.4
<i>No consumió</i>	2,188	16.5	<i>Se omite</i>	1,687	15.6	<i>Se omite</i>	501	20.1	<i>Se omite</i>
<i>Sin información</i>	12	0.1	<i>Se omite</i>	11	0.1	<i>Se omite</i>	1	0.0	<i>Se omite</i>
<b>Total</b>	<b>13,291</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>10,804</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>2,487</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

\*  $\mu = 14.3$ ;  $\sigma = 3.3$ ; Med.= 14; Mo.= 14; Decil1 = 11

\*\*  $\mu = 14.3$ ;  $\sigma = 3.2$ ; Med.= 14; Mo.= 14; Decil1 = 11

\*\*\*  $\mu = 14.4$ ;  $\sigma = 3.9$ ; Med.= 14; Mo.= 13; Decil1 = 11

**Cuadro 14. Edad de inicio del consumo de Alcohol.**

	General*			Hombres**			Mujeres***		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Hasta 9 años	448	3.4	3.9	376	3.5	4.0	72	2.9	3.4
10 a 14 años	5,631	42.4	48.6	4,426	41.0	46.7	1,205	48.5	57.1
15 a 19 años	5,044	38.0	43.5	4,326	40.0	45.7	718	28.9	34.0
20 a 24 años	353	2.7	3.0	270	2.5	2.8	83	3.3	3.9
25 a 29 años	81	0.6	0.7	61	0.6	0.6	20	0.8	0.9
30 a 34 años	19	0.1	0.2	11	0.1	0.1	8	0.3	0.4
35 a 39 años	6	0.0	0.1	3	0.0	0.0	3	0.1	0.1
40 a 44 años	3	0.0	0.0	1	0.0	0.0	2	0.1	0.1
45 años y más	3	0.0	0.0	2	0.0	0.0	1	0.0	0.0
<i>No consumió</i>	1,678	12.6	<i>Se omite</i>	1,308	12.1	<i>Se omite</i>	370	14.9	<i>Se omite</i>
<i>Sin información</i>	25	0.2	<i>Se omite</i>	20	0.2	<i>Se omite</i>	5	0.2	<i>Se omite</i>
<b>Total</b>	<b>13,291</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>10,804</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>2,487</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

\*  $\mu = 14.4$ ;  $\sigma = 3.0$ ; Med.= 14; Mo.= 15; Decil1 = 11

\*\*  $\mu = 14.4$ ;  $\sigma = 2.9$ ; Med.= 14; Mo.= 15; Decil1 = 12

\*\*\*  $\mu = 14.2$ ;  $\sigma = 3.4$ ; Med.= 14; Mo.= 13; Decil1 = 11

**Cuadro 15. Edad de inicio del consumo de Drogas ilícitas.**

	General*			Hombres**			Mujeres***		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Hasta 9 años	128	1.0	1.0	116	1.1	1.1	12	0.5	0.5
10 a 14 años	5,500	41.4	41.4	4,315	39.9	40.0	1,185	47.6	47.7
15 a 19 años	6,150	46.3	46.3	5,213	48.3	48.3	937	37.7	37.7
20 a 24 años	830	6.2	6.2	676	6.3	6.3	154	6.2	6.2
25 a 29 años	311	2.3	2.3	247	2.3	2.3	64	2.6	2.6
30 a 34 años	156	1.2	1.2	111	1.0	1.0	45	1.8	1.8
35 a 39 años	89	0.7	0.7	59	0.5	0.5	30	1.2	1.2
40 a 44 años	58	0.4	0.4	32	0.3	0.3	26	1.0	1.0
45 años y más	61	0.5	0.5	28	0.3	0.3	33	1.3	1.3
<i>Sin información</i>	8	0.1	<i>Se omite</i>	7	0.1	<i>Se omite</i>	1	0.0	<i>Se omite</i>
<b>Total</b>	<b>13,291</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>10,804</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>2,487</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

\*  $\mu = 16$ ;  $\sigma = 4.9$ ; Med.= 15; Mo.= 15; Decil1 = 12

\*\*  $\mu = 15.9$ ;  $\sigma = 4.5$ ; Med.= 15; Mo.= 15; Decil1 = 12

\*\*\*  $\mu = 16.5$ ;  $\sigma = 6.6$ ; Med.= 15; Mo.= 14; Decil1 = 12

**Cuadro 16. Drogas ilícitas de inicio**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
<b>Cannabis</b>	<b>8,958</b>	<b>67.4</b>	<b>7,518</b>	<b>69.6</b>	<b>1,440</b>	<b>57.9</b>
Mariguana	8,951	67.3	7,516	69.6	1,435	57.7
Hachís	7	0.1	2	0.0	5	0.2
<b>Cocaína</b>	<b>1,322</b>	<b>9.9</b>	<b>1,134</b>	<b>10.5</b>	<b>188</b>	<b>7.6</b>
Polvo blanco	998	7.5	855	7.9	143	5.7
<i>Crack</i>	317	2.4	276	2.6	41	1.6
Otra presentación	7	0.1	3	0.0	4	0.2
<b>Inhalables</b>	<b>2,222</b>	<b>16.7</b>	<b>1,663</b>	<b>15.4</b>	<b>559</b>	<b>22.5</b>
Solventes o removedores	1,462	11.0	1,131	10.5	331	13.3
Pegamentos	373	2.8	282	2.6	91	3.7
Esmaltes o pinturas	346	2.6	226	2.1	120	4.8
Otros	41	0.3	24	0.2	17	0.7
<b>Depresores</b>	<b>274</b>	<b>2.1</b>	<b>125</b>	<b>1.2</b>	<b>149</b>	<b>6.0</b>
Benzodiazepinas	257	1.9	116	1.1	141	5.7
<i>Rohypnol</i> <sup>®</sup>	4	0.0	3	0.0	1	0.0
Otros	13	0.1	6	0.1	7	0.3
<b>Estimulantes</b>	<b>355</b>	<b>2.7</b>	<b>249</b>	<b>2.3</b>	<b>106</b>	<b>4.3</b>
Anfetamina	53	0.4	43	0.4	10	0.4
Metanfetaminas	248	1.9	176	1.6	72	2.9
Éxtasis (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas	43	0.3	22	0.2	21	0.8
Otros	11	0.1	8	0.1	3	0.1
<b>Drogas alucinógenas y disociativas</b>	<b>43</b>	<b>0.3</b>	<b>33</b>	<b>0.3</b>	<b>10</b>	<b>0.4</b>
LSD	17	0.1	13	0.1	4	0.2
Plantas alucinógenas y derivados	24	0.2	20	0.2	4	0.2
Otras	2	0.0	0	0.0	2	0.1
<b>Opiáceos</b>	<b>56</b>	<b>0.4</b>	<b>44</b>	<b>0.4</b>	<b>12</b>	<b>0.5</b>
Heroína	43	0.3	38	0.4	5	0.2
Opiáceos Sintéticos	11	0.1	4	0.0	7	0.3
Opio y otros opiáceos	2	0.0	2	0.0	0	0.0
<b>Otras sustancias de abuso</b>	<b>61</b>	<b>0.5</b>	<b>38</b>	<b>0.4</b>	<b>23</b>	<b>0.9</b>
Con utilidad médica	18	0.1	11	0.1	7	0.3
Otras	43	0.3	27	0.2	16	0.6
<b>Total</b>	<b>13,291</b>	<b>100.0</b>	<b>10,804</b>	<b>100.0</b>	<b>2,487</b>	<b>100.0</b>

**Cuadro 17. Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de Tabaco y el ingreso a tratamiento en CIJ**

	General*			Hombres**			Mujeres***		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
< de un año	875	6.6	7.9	639	5.9	7.0	236	9.5	11.9
1 a 5 años	5,236	39.4	47.2	4,190	38.8	46.0	1,046	42.1	52.7
6 a 10 años	1,740	13.1	15.7	1,458	13.5	16.0	282	11.3	14.2
11 a 15 años	1,046	7.9	9.4	903	8.4	9.9	143	5.7	7.2
16 a 20 años	763	5.7	6.9	670	6.2	7.4	93	3.7	4.7
21 a 25 años	523	3.9	4.7	463	4.3	5.1	60	2.4	3.0
26 o más años	908	6.8	8.2	783	7.2	8.6	125	5.0	6.3
No consumió	2,188	16.5	Se omite	1,687	15.6	Se omite	501	20.1	Se omite
Sin información	12	0.1	Se omite	11	0.1	Se omite	1	0.0	Se omite
<b>Total</b>	<b>13,291</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>10,804</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>2,487</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

\*  $\mu=8.7$ ;  $\sigma=9.9$ ; Med.= 5; Mo.= 1; Decil1 = 1

\*\*  $\mu=9.1$ ;  $\sigma=10.1$ ; Med.= 5; Mo.= 1; Decil1 = 1

\*\*\*  $\mu=6.9$ ;  $\sigma=9$ ; Med.= 3; Mo.= 1; Decil1 = < un año

**Cuadro 18. Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de Alcohol y el ingreso a tratamiento en CIJ**

	General*			Hombres**			Mujeres***		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
< de un año	838	6.3	7.2	620	5.7	6.5	218	8.8	10.3
1 a 5 años	5,470	41.2	47.2	4,326	40.0	45.7	1,144	46.0	54.2
6 a 10 años	1,842	13.9	15.9	1,535	14.2	16.2	307	12.3	14.5
11 a 15 años	1,119	8.4	9.7	958	8.9	10.1	161	6.5	7.6
16 a 20 años	823	6.2	7.1	716	6.6	7.6	107	4.3	5.1
21 a 25 años	568	4.3	4.9	514	4.8	5.4	54	2.2	2.6
26 o más años	928	7.0	8.0	807	7.5	8.5	121	4.9	5.7
No consumió	1,678	12.6	Se omite	1,308	12.1	Se omite	370	14.9	Se omite
Sin información	25	0.2	Se omite	20	0.2	Se omite	5	0.2	Se omite
<b>Total</b>	<b>13,291</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>10,804</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>2,487</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

\*  $\mu=8.7$ ;  $\sigma=9.8$ ; Med.= 5; Mo.= 1; Decil1 = 1

\*\*  $\mu=9.2$ ;  $\sigma=9.9$ ; Med.= 5; Mo.= 1; Decil1 = 1

\*\*\*  $\mu=6.8$ ;  $\sigma=8.7$ ; Med.= 3; Mo.= 1; Decil1 = < un año



**Cuadro 19. Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de drogas ilícitas y el ingreso a tratamiento en CIJ**

	General*			Hombres**			Mujeres***		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
< de un año	2,524	19.0	19.0	1,830	16.9	16.9	694	27.9	27.9
1 a 5 años	6,078	45.7	45.8	4,847	44.9	44.9	1,231	49.5	49.5
6 a 10 años	1,643	12.4	12.4	1,402	13.0	13.0	241	9.7	9.7
11 a 15 años	1,077	8.1	8.1	946	8.8	8.8	131	5.3	5.3
16 a 20 años	771	5.8	5.8	693	6.4	6.4	78	3.1	3.1
21 a 25 años	454	3.4	3.4	411	3.8	3.8	43	1.7	1.7
26 o más años	736	5.5	5.5	668	6.2	6.2	68	2.7	2.7
<i>Sin información</i>	8	0.1	<i>Se omite</i>	7	0.1	<i>Se omite</i>	1	0.0	<i>Se omite</i>
<b>Total</b>	<b>13,291</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>10,804</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>2,487</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

\*  $\mu = 6.7$ ;  $\sigma = 8.8$ ; Med.= 3; Mo.= < un año; Decil1 = < un año

\*\*  $\mu = 7.3$ ;  $\sigma = 9.1$ ; Med.= 3; Mo.= < un año; Decil1 = < un año

\*\*\*  $\mu = 4.3$ ;  $\sigma = 6.9$ ; Med.= 2; Mo.= < un año ; Decil1 = < un año

**Cuadro 20. Tipo de consumo de drogas ilícitas**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Experimental	1,432	10.8	11.2	1,030	9.5	9.9	402	16.2	16.8
Social u ocasional	1,870	14.1	14.6	1,445	13.4	13.9	425	17.1	17.8
Funcional	6,756	50.8	52.8	5,636	52.2	54.2	1,120	45.0	46.9
Disfuncional	2,273	17.1	17.8	1,929	17.9	18.5	344	13.8	14.4
En remisión	461	3.5	3.6	365	3.4	3.5	96	3.9	4.0
<i>Sin información</i>	499	3.8	<i>Se omite</i>	399	3.7	<i>Se omite</i>	100	4.0	<i>Se omite</i>
<b>Total</b>	<b>13,291</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>10,804</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>2,487</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

**Cuadro 21. Total de drogas consumidas alguna vez en la vida.  
(Incluye alcohol o tabaco)**

	General*		Hombres**		Mujeres***	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
1 sustancia	715	5.4	540	5.0	175	7.0
2 sustancias	1,397	10.5	1,084	10.0	313	12.6
3 sustancias	4,034	30.4	3,211	29.7	823	33.1
4 sustancias	2,740	20.6	2,242	20.8	498	20.0
5 sustancias	1,698	12.8	1,422	13.2	276	11.1
6 sustancias	1,108	8.3	934	8.6	174	7.0
7 sustancias	651	4.9	535	5.0	116	4.7
8 sustancias	371	2.8	322	3.0	49	2.0
9 sustancias	232	1.7	207	1.9	25	1.0
10 sustancias	155	1.2	143	1.3	12	0.5
11 -21 sustancias	190	1.4	164	1.5	26	1.0
<b>Total</b>	<b>13,291</b>	<b>100.0</b>	<b>10,804</b>	<b>100.0</b>	<b>2,487</b>	<b>100.0</b>

\*  $\mu= 4.2$ ;  $\sigma = 2.1$ ; Med.= 4; Mo.= 3; Decil1 = 2

\*\*  $\mu= 4.2$ ;  $\sigma = 2.1$ ; Med.= 4; Mo.= 3; Decil1 = 2

\*\*\*  $\mu= 3.8$ ;  $\sigma = 1.9$ ; Med.= 3; Mo.= 3; Decil1 = 2

**Cuadro 22. Total de drogas ilícitas consumidas alguna vez en la vida  
(No incluye ni alcohol ni tabaco)**

	General*		Hombres**		Mujeres***	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
1 sustancia	5,513	41.5	4,343	40.2	1,170	47.0
2 sustancias	3,144	23.7	2,547	23.6	597	24.0
3 sustancias	1,834	13.8	1,527	14.1	307	12.3
4 sustancias	1,153	8.7	976	9.0	177	7.1
5 sustancias	678	5.1	557	5.2	121	4.9
6 sustancias	382	2.9	331	3.1	51	2.1
7 sustancias	240	1.8	215	2.0	25	1.0
8 sustancias	155	1.2	143	1.3	12	0.5
9 sustancias	92	0.7	73	0.7	19	0.8
10 sustancias	43	0.3	40	0.4	3	0.1
11-19 sustancias	57	0.4	52	0.5	5	0.2
<b>Total</b>	<b>13,291</b>	<b>100.0</b>	<b>10,804</b>	<b>100.0</b>	<b>2,487</b>	<b>100.0</b>

\*  $\mu= 2.4$ ;  $\sigma = 1.9$ ; Med.=2; Mo.= 1; Decil1 = 1

\*\*  $\mu= 2.5$ ;  $\sigma = 1.9$ ; Med.=2; Mo.= 1; Decil1 = 1

\*\*\*  $\mu= 2.2$ ;  $\sigma = 1.6$ ; Med.=2; Mo.= 1; Decil1 = 1

**Cuadro 23. Consumo de drogas alguna vez en la vida por sustancia**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
<b>Tabaco</b>	<b>11,102</b>	<b>83.5</b>	<b>9,116</b>	<b>84.4</b>	<b>1,986</b>	<b>79.9</b>
<b>Alcohol</b>	<b>11,612</b>	<b>87.4</b>	<b>9,495</b>	<b>87.9</b>	<b>2,117</b>	<b>85.1</b>
<b>Cannabis</b>	<b>11,060</b>	<b>83.2</b>	<b>9,223</b>	<b>85.4</b>	<b>1,837</b>	<b>73.9</b>
Mariguana	11,058	83.2	9,221	85.3	1,837	73.9
Hachís	650	4.9	561	5.2	89	3.6
<b>Cocaína</b>	<b>5,494</b>	<b>41.3</b>	<b>4,716</b>	<b>43.7</b>	<b>778</b>	<b>31.3</b>
Polvo blanco	4,610	34.7	3,957	36.6	653	26.3
<i>Crack</i>	2,602	19.6	2,299	21.3	303	12.2
Otra presentación de cocaína	92	0.7	78	0.7	14	0.6
<b>Inhalables</b>	<b>4,796</b>	<b>36.1</b>	<b>3,885</b>	<b>36.0</b>	<b>911</b>	<b>36.6</b>
Solventes o removedores	3,350	25.2	2,761	25.6	589	23.7
Pegamentos	1,267	9.5	1,058	9.8	209	8.4
Esmaltes o pinturas	843	6.3	630	5.8	213	8.6
Otros inhalables	248	1.9	192	1.8	56	2.3
<b>Depresores</b>	<b>2,009</b>	<b>15.1</b>	<b>1,591</b>	<b>14.7</b>	<b>418</b>	<b>16.8</b>
Benzodiacepinas	1,862	14.0	1,472	13.6	390	15.7
<i>Rohypnol</i>	198	1.5	179	1.7	19	0.8
Otros depresores	55	0.4	31	0.3	24	1.0
<b>Estimulantes</b>	<b>2,798</b>	<b>21.1</b>	<b>2,285</b>	<b>21.1</b>	<b>513</b>	<b>20.6</b>
Anfetamina	293	2.2	241	2.2	52	2.1
Metanfetaminas	1,968	14.8	1,641	15.2	327	13.1
Éxtasis (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas	841	6.3	643	6.0	198	8.0
Otros estimulantes	65	0.5	53	0.5	12	0.5
<b>Drogas alucinógenas y disociativas</b>	<b>1,237</b>	<b>9.3</b>	<b>1,015</b>	<b>9.4</b>	<b>222</b>	<b>8.9</b>
LSD	810	6.1	649	6.0	161	6.5
Plantas alucinógenas y derivados	658	5.0	564	5.2	94	3.8
Otras drogas alucinógenas y disoc.	69	0.5	61	0.6	8	0.3
<b>Opiáceos</b>	<b>565</b>	<b>4.3</b>	<b>487</b>	<b>4.5</b>	<b>78</b>	<b>3.1</b>
Heroína	490	3.7	435	4.0	55	2.2
Opiáceos Sintéticos	47	0.4	33	0.3	14	0.6
Opio y otros opiáceos	58	0.4	44	0.4	14	0.6
<b>Otras sustancias de abuso</b>	<b>319</b>	<b>2.4</b>	<b>218</b>	<b>2.0</b>	<b>101</b>	<b>4.1</b>
Con utilidad médica	78	0.6	44	0.4	34	1.4
Otras sustancias de abuso	246	1.9	176	1.6	70	2.8

**Cuadro 24. Total de drogas consumidas en el último año  
(Incluye alcohol o tabaco)**

	General*		Hombres**		Mujeres***	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Ninguna	274	2.1	221	2.0	53	2.1
1 sustancia	1,343	10.1	1,033	9.6	310	12.5
2 sustancias	2,706	20.4	2,161	20.0	545	21.9
3 sustancias	4,128	31.1	3,398	31.5	730	29.4
4 sustancias	2,281	17.2	1,890	17.5	391	15.7
5 sustancias	1,172	8.8	962	8.9	210	8.4
6 sustancias	661	5.0	542	5.0	119	4.8
7 sustancias	351	2.6	280	2.6	71	2.9
8 sustancias	179	1.3	151	1.4	28	1.1
9 sustancias	95	0.7	85	0.8	10	0.4
10 sustancias	49	0.4	38	0.4	11	0.4
11-15 sustancias	52	<b>0.4</b>	<b>43</b>	<b>0.4</b>	<b>9</b>	<b>0.4</b>
<b>Total</b>	<b>13,291</b>	<b>100.0</b>	<b>10,804</b>	<b>100.0</b>	<b>2,487</b>	<b>100.0</b>

\*  $\mu=3.3$ ;  $\sigma=1.8$ ; Med.=3; Mo.=3; Decil1=1

\*\*  $\mu=3.3$ ;  $\sigma=1.8$ ; Med.=3; Mo.=3; Decil1=1

\*\*\*  $\mu=3.2$ ;  $\sigma=1.8$ ; Med.=3; Mo.=3; Decil1=1

**Cuadro 25. Total de drogas ilícitas consumidas en el último año  
(No incluye ni alcohol ni tabaco)**

	General*		Hombres**		Mujeres***	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Ninguna	1,276	9.6	1,020	9.4	256	10.3
1 sustancia	6,304	47.4	5,097	47.2	1,207	48.5
2 sustancias	2,861	21.5	2,344	21.7	517	20.8
3 sustancias	1,351	10.2	1,115	10.3	236	9.5
4 sustancias	735	5.5	601	5.6	134	5.4
5 sustancias	371	2.8	297	2.7	74	3.0
6 sustancias	185	1.4	155	1.4	30	1.2
7 sustancias	105	0.8	92	0.9	13	0.5
8 sustancias	48	0.4	38	0.4	10	0.4
9 sustancias	31	0.2	24	0.2	7	0.3
10 sustancias	11	0.1	10	0.1	1	0.0
11-13 sustancias	13	<b>0.1</b>	<b>11</b>	<b>0.1</b>	<b>2</b>	<b>0.1</b>
<b>Total</b>	<b>13,291</b>	<b>100.0</b>	<b>10,804</b>	<b>100.0</b>	<b>2,487</b>	<b>100.0</b>

\*  $\mu=1.8$ ;  $\sigma=1.5$ ; Med.=1; Mo.=1; Decil1=1

\*\*  $\mu=1.8$ ;  $\sigma=1.5$ ; Med.=1; Mo.=1; Decil1=1

\*\*\*  $\mu=1.7$ ;  $\sigma=1.5$ ; Med.=1; Mo.=1; Decil1=ninguna

**Cuadro 26. Consumo de drogas en los últimos 12 meses por sustancia**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
<b>Tabaco</b>	<b>9,833</b>	<b>74.0</b>	<b>8,078</b>	<b>74.8</b>	<b>1,755</b>	<b>70.6</b>
<b>Alcohol</b>	<b>10,461</b>	<b>78.7</b>	<b>8,575</b>	<b>79.4</b>	<b>1,886</b>	<b>75.8</b>
<b>Cannabis</b>	<b>9,256</b>	<b>69.6</b>	<b>7,715</b>	<b>71.4</b>	<b>1,541</b>	<b>62.0</b>
Mariguana	9,253	69.6	7,712	71.4	1,541	62.0
Hachís	391	2.9	325	3.0	66	2.7
<b>Cocaína</b>	<b>3,743</b>	<b>28.2</b>	<b>3,183</b>	<b>29.5</b>	<b>560</b>	<b>22.5</b>
Polvo blanco	2,839	21.4	2,390	22.1	449	18.1
<i>Crack</i>	1,759	13.2	1,551	14.4	208	8.4
Otra presentación de cocaína	45	0.3	36	0.3	9	0.4
<b>Inhalables</b>	<b>3,592</b>	<b>27.0</b>	<b>2,817</b>	<b>26.1</b>	<b>775</b>	<b>31.2</b>
Solventes o removedores	2,485	18.7	1,990	18.4	495	19.9
Pegamentos	845	6.4	675	6.2	170	6.8
Esmaltes o pinturas	624	4.7	439	4.1	185	7.4
Otros inhalables	134	1.0	97	0.9	37	1.5
<b>Depresores</b>	<b>1,382</b>	<b>10.4</b>	<b>1,044</b>	<b>9.7</b>	<b>338</b>	<b>13.6</b>
Benzodiacepinas	1,318	9.9	1,001	9.3	317	12.7
<i>Rohypnol</i>	66	0.5	54	0.5	12	0.5
Otros depresores	40	0.3	20	0.2	20	0.8
<b>Estimulantes</b>	<b>2,123</b>	<b>16.0</b>	<b>1,711</b>	<b>15.8</b>	<b>412</b>	<b>16.6</b>
Anfetamina	188	1.4	147	1.4	41	1.6
Metanfetaminas	1,559	11.7	1,288	11.9	271	10.9
Éxtasis (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas	553	4.2	409	3.8	144	5.8
Otros estimulantes	34	0.3	23	0.2	11	0.4
<b>Drogas alucinógenas y disociativas</b>	<b>734</b>	<b>5.5</b>	<b>571</b>	<b>5.3</b>	<b>163</b>	<b>6.6</b>
LSD	527	4.0	398	3.7	129	5.2
Plantas alucinógenas y derivados	311	2.3	261	2.4	50	2.0
Otras drogas alucinógenas y disoc.	21	0.2	18	0.2	3	0.1
<b>Opiáceos</b>	<b>422</b>	<b>3.2</b>	<b>359</b>	<b>3.3</b>	<b>63</b>	<b>2.5</b>
Heroína	370	2.8	326	3.0	44	1.8
Opiáceos Sintéticos	37	0.3	24	0.2	13	0.5
Opio y otros opiáceos	32	0.2	23	0.2	9	0.4
<b>Otras sustancias de abuso</b>	<b>210</b>	<b>1.6</b>	<b>134</b>	<b>1.2</b>	<b>76</b>	<b>3.1</b>
Con utilidad médica	52	0.4	26	0.2	26	1.0
Otras sustancias de abuso	160	1.2	108	1.0	52	2.1

**Cuadro 27. Droga de preferencia en los últimos 12 meses, según menciones**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
<b>Tabaco</b>	<b>1,514</b>	<b>11.4</b>	<b>11.7</b>	<b>1,174</b>	<b>10.9</b>	<b>11.1</b>	<b>340</b>	<b>13.7</b>	<b>14.0</b>
<b>Alcohol</b>	<b>2,136</b>	<b>16.1</b>	<b>16.5</b>	<b>1,725</b>	<b>16.0</b>	<b>16.3</b>	<b>411</b>	<b>16.5</b>	<b>16.9</b>
<b>Cannabis</b>	<b>5,609</b>	<b>42.2</b>	<b>43.2</b>	<b>4,805</b>	<b>44.5</b>	<b>45.5</b>	<b>804</b>	<b>32.3</b>	<b>33.1</b>
Mariguana	5,590	42.1	43.1	4,789	44.3	45.4	801	32.2	33.0
Hachís	19	0.1	0.1	16	0.1	0.2	3	0.1	0.1
<b>Cocaína</b>	<b>989</b>	<b>7.4</b>	<b>7.6</b>	<b>850</b>	<b>7.9</b>	<b>8.1</b>	<b>139</b>	<b>5.6</b>	<b>5.7</b>
Polvo blanco	419	3.2	3.2	348	3.2	3.3	71	2.9	2.9
Crack	563	4.2	4.3	495	4.6	4.7	68	2.7	2.8
Otra presentación de cocaína	7	0.1	0.1	7	0.1	0.1	0	0.0	0.0
<b>Inhalables</b>	<b>1,377</b>	<b>10.4</b>	<b>10.6</b>	<b>982</b>	<b>9.1</b>	<b>9.3</b>	<b>161</b>	<b>6.5</b>	<b>6.6</b>
Solventes o removedores	905	6.8	7.0	671	6.2	6.4	0	0.0	0.0
Pegamentos	210	1.6	1.6	156	1.4	1.5	54	2.2	2.2
Esmaltes o pinturas	206	1.5	1.6	123	1.1	1.2	83	3.3	3.4
Otros inhalables	56	0.4	0.4	32	0.3	0.3	24	1.0	1.0
<b>Depresores</b>	<b>174</b>	<b>1.3</b>	<b>1.3</b>	<b>90</b>	<b>0.8</b>	<b>0.9</b>	<b>84</b>	<b>3.4</b>	<b>3.5</b>
Benzodiazepinas	154	1.2	1.2	82	0.8	0.8	72	2.9	3.0
Rohypnol	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0
Otros depresores	19	0.1	0.1	7	0.1	0.1	12	0.5	0.5
<b>Estimulantes</b>	<b>698</b>	<b>5.3</b>	<b>5.4</b>	<b>558</b>	<b>5.2</b>	<b>5.3</b>	<b>140</b>	<b>5.6</b>	<b>5.8</b>
Anfetamina	35	0.3	0.3	26	0.2	0.2	9	0.4	0.4
Metanfetaminas	624	4.7	4.8	508	4.7	4.8	116	4.7	4.8
Éxtasis (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas	29	0.2	0.2	16	0.1	0.2	13	0.5	0.5
Otros estimulantes	10	0.1	0.1	8	0.1	0.1	2	0.1	0.1
<b>Drogas alucinógenas y disociativas</b>	<b>47</b>	<b>0.4</b>	<b>0.4</b>	<b>31</b>	<b>0.3</b>	<b>0.3</b>	<b>16</b>	<b>0.6</b>	<b>0.7</b>
LSD	37	0.3	0.3	23	0.2	0.2	14	0.6	0.6
Plantas alucinógenas y derivados	7	0.1	0.1	6	0.1	0.1	1	0.0	0.0
Otras drogas alucinógenas y disoc.	3	0.0	0.0	2	0.0	0.0	1	0.0	0.0
<b>Opiáceos</b>	<b>284</b>	<b>2.1</b>	<b>2.2</b>	<b>244</b>	<b>2.3</b>	<b>2.3</b>	<b>40</b>	<b>1.6</b>	<b>1.6</b>
Heroína	259	1.9	2.0	229	2.1	2.2	30	1.2	1.2
Opiáceos Sintéticos	19	0.1	0.1	10	0.1	0.1	9	0.4	0.4
Opio y otros opiáceos	6	0.0	0.0	5	0.0	0.0	1	0.0	0.0
<b>Otras sustancias de abuso</b>	<b>40</b>	<b>0.3</b>	<b>0.3</b>	<b>20</b>	<b>0.2</b>	<b>0.2</b>	<b>20</b>	<b>0.8</b>	<b>0.8</b>
Con utilidad médica	18	0.1	0.1	6	0.1	0.1	12	0.5	0.5
Otras sustancias de abuso	22	0.2	0.2	14	0.1	0.1	8	0.3	0.3
<b>Ninguna</b>	<b>111</b>	<b>0.8</b>	<b>0.9</b>	<b>72</b>	<b>0.7</b>	<b>0.7</b>	<b>39</b>	<b>1.6</b>	<b>1.6</b>
No consumió en el último año	274	2.1	Se omite	221	2.0	Se omite	53	2.1	Se omite
Sin Información	38	0.3	Se omite	32	0.3	Se omite	6	0.2	Se omite

**Cuadro 28. Droga de mayor impacto en los últimos 12 meses, según menciones**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
<b>Tabaco</b>	<b>866</b>	<b>6.5</b>	<b>6.7</b>	<b>658</b>	<b>6.1</b>	<b>6.2</b>	<b>208</b>	<b>8.4</b>	<b>8.6</b>
<b>Alcohol</b>	<b>1,853</b>	<b>13.9</b>	<b>14.3</b>	<b>1,501</b>	<b>13.9</b>	<b>14.2</b>	<b>352</b>	<b>14.2</b>	<b>14.5</b>
<b>Cannabis</b>	<b>5,226</b>	<b>39.3</b>	<b>40.3</b>	<b>4,439</b>	<b>41.1</b>	<b>42.1</b>	<b>787</b>	<b>31.6</b>	<b>32.4</b>
Mariguana	5,209	39.2	40.1	4,425	41.0	41.9	784	31.5	32.3
Hachís	17	0.1	0.1	14	0.1	0.1	3	0.1	0.1
<b>Cocaína</b>	<b>1,313</b>	<b>9.9</b>	<b>10.1</b>	<b>1,135</b>	<b>10.5</b>	<b>10.8</b>	<b>178</b>	<b>7.2</b>	<b>7.3</b>
Polvo blanco	538	4.0	4.1	444	4.1	4.2	94	3.8	3.9
Crack	765	5.8	5.9	682	6.3	6.5	83	3.3	3.4
Otra presentación de cocaína	10	0.1	0.1	9	0.1	0.1	1	0.0	0.0
<b>Inhalables</b>	<b>1,856</b>	<b>14.0</b>	<b>14.3</b>	<b>1,367</b>	<b>12.7</b>	<b>13.0</b>	<b>489</b>	<b>19.7</b>	<b>20.1</b>
Solventes o removedores	1,196	9.0	9.2	916	8.5	8.7	280	11.3	11.5
Pegamentos	308	2.3	2.4	232	2.1	2.2	76	3.1	3.1
Esmaltes o pinturas	283	2.1	2.2	173	1.6	1.6	110	4.4	4.5
Otros inhalables	69	0.5	0.5	46	0.4	0.4	23	0.9	0.9
<b>Depresores</b>	<b>288</b>	<b>2.2</b>	<b>2.2</b>	<b>181</b>	<b>1.7</b>	<b>1.7</b>	<b>107</b>	<b>4.3</b>	<b>4.4</b>
Benzodicepinas	259	1.9	2.0	162	1.5	1.5	97	3.9	4.0
Rohypnol	6	0.0	0.0	5	0.0	0.0	1	0.0	0.0
Otros depresores	23	0.2	0.2	14	0.1	0.1	9	0.4	0.4
<b>Estimulantes</b>	<b>1,042</b>	<b>7.8</b>	<b>8.0</b>	<b>847</b>	<b>7.8</b>	<b>8.0</b>	<b>195</b>	<b>7.8</b>	<b>8.0</b>
Anfetamina	58	0.4	0.4	48	0.4	0.5	10	0.4	0.4
Metanfetaminas	900	6.8	6.9	744	6.9	7.1	156	6.3	6.4
Éxtasis (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas	63	0.5	0.5	39	0.4	0.4	24	1.0	1.0
Otros estimulantes	21	0.2	0.2	16	0.1	0.2	5	0.2	0.2
<b>Drogas alucinógenas y disociativas</b>	<b>75</b>	<b>0.6</b>	<b>0.6</b>	<b>55</b>	<b>0.5</b>	<b>0.5</b>	<b>20</b>	<b>0.8</b>	<b>0.8</b>
LSD	57	0.4	0.4	38	0.4	0.4	19	0.8	0.8
Plantas alucinógenas y derivados	13	0.1	0.1	12	0.1	0.1	1	0.0	0.0
Otras drogas alucinógenas y disoc.	5	0.0	0.0	5	0.0	0.0	0	0.0	0.0
<b>Opiáceos</b>	<b>313</b>	<b>2.4</b>	<b>2.4</b>	<b>272</b>	<b>2.5</b>	<b>2.6</b>	<b>41</b>	<b>1.6</b>	<b>1.7</b>
Heroína	288	2.2	2.2	257	2.4	2.4	31	1.2	1.3
Opiáceos Sintéticos	19	0.1	0.1	10	0.1	0.1	9	0.4	0.4
Opio y otros opiáceos	6	0.0	0.0	5	0.0	0.0	1	0.0	0.0
<b>Otras sustancias de abuso</b>	<b>47</b>	<b>0.4</b>	<b>0.4</b>	<b>27</b>	<b>0.2</b>	<b>0.3</b>	<b>20</b>	<b>0.8</b>	<b>0.8</b>
Con utilidad médica	20	0.2	0.2	9	0.1	0.1	11	0.4	0.5
Otras sustancias de abuso	27	0.2	0.2	18	0.2	0.2	9	0.4	0.4
<b>Ninguna</b>	<b>98</b>	<b>0.7</b>	<b>0.8</b>	<b>67</b>	<b>0.6</b>	<b>0.6</b>	<b>31</b>	<b>1.2</b>	<b>1.3</b>
No consumió en el último año	274	2.1	Se omite	221	2.0	Se omite	53	2.1	Se omite
Sin Información	40	0.3	Se omite	34	0.3	Se omite	6	0.2	Se omite

**Cuadro 29. Uso combinado de drogas en los últimos 12 meses  
(No incluye tabaco)**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Si combinó drogas	4,419	33.2	43.0	3,731	34.5	44.3	688	27.7	37.2
No combinó drogas	5,861	44.1	57.0	4,700	43.5	55.7	1,161	46.7	62.8
<i>No aplica</i>	<i>3,011</i>	<i>22.7</i>	<i>Se omite</i>	<i>2,373</i>	<i>22.0</i>	<i>Se omite</i>	<i>638</i>	<i>25.7</i>	<i>Se omite</i>
<b>Total</b>	<b>13,291</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>10,804</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>2,487</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

**Cuadro 30. Total de drogas consumidas en los últimos 30 días  
(Incluye alcohol o tabaco)**

	General*		Hombres**		Mujeres***	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Ninguna	1,395	10.5	1,059	9.8	336	13.5
1 sustancia	3,138	23.6	2,453	22.7	685	27.5
2 sustancias	3,757	28.3	3,062	28.3	695	27.9
3 sustancias	3,151	23.7	2,688	24.9	463	18.6
4 sustancias	1,193	9.0	1,007	9.3	186	7.5
5 sustancias	431	3.2	363	3.4	68	2.7
6 sustancias	159	1.2	121	1.1	38	1.5
7 sustancias	44	0.3	32	0.3	12	0.5
8 sustancias	15	0.1	12	0.1	3	0.1
9 sustancias	6	0.0	6	0.1	0	0.0
10 sustancias	1	0.0	0	0.0	1	0.0
12 sustancias	1	0.0	1	0.0	0	0.0
<b>Total</b>	<b>13,291</b>	<b>100.0</b>	<b>10,804</b>	<b>100.0</b>	<b>2,487</b>	<b>100.0</b>

\*  $\mu = 2.1$   $\sigma = 1.4$ ; Med.= 2; Mo.= 2; Decil1 = ninguna

\*\*  $\mu = 2.2$ ;  $\sigma = 1.4$ ; Med.= 2; Mo.= 2; Decil1 = 1

\*\*\*  $\mu = 2$ ;  $\sigma = 1.4$ ; Med.=2; Mo.= 2; Decil1 = ninguna



**Cuadro 31. Total de drogas ilícitas consumidas en los últimos 30 días  
(No incluye ni alcohol ni tabaco)**

	General*		Hombres**		Mujeres***	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Ninguna	4,090	30.8	3,203	29.6	887	35.7
1 sustancia	6,440	48.5	5,317	49.2	1,123	45.2
2 sustancias	1,908	14.4	1,587	14.7	321	12.9
3 sustancias	575	4.3	477	4.4	98	3.9
4 sustancias	195	1.5	157	1.5	38	1.5
5 sustancias	53	0.4	41	0.4	12	0.5
6 sustancias	21	0.2	14	0.1	7	0.3
7 sustancias	6	0.0	6	0.1	0	0.0
8 sustancias	2	0.0	1	0.0	1	0.0
11 sustancias	1	0.0	1	0.0	0	0.0
<b>Total</b>	<b>13,291</b>	<b>100.0</b>	<b>10,804</b>	<b>100.0</b>	<b>2,487</b>	<b>100.0</b>

\*  $\mu=1$ ;  $\sigma=0.9$ ; Med.= 1; Mo.= 1; Decil1 = ninguna

\*\*  $\mu=1$ ;  $\sigma=0.9$ ; Med.= 1; Mo.= 1; Decil1 = ninguna

\*\*\*  $\mu=0.9$ ;  $\sigma=1$ ; Med.= 1; Mo.= 1; Decil1 = ninguna

**Cuadro 32. Consumo de drogas en los últimos 30 días por sustancia**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
<b>Tabaco</b>	<b>8,045</b>	<b>60.5</b>	<b>6,677</b>	<b>61.8</b>	<b>1,368</b>	<b>55.0</b>
<b>Alcohol</b>	<b>7,224</b>	<b>54.4</b>	<b>6,019</b>	<b>55.7</b>	<b>1,205</b>	<b>48.5</b>
<b>Cannabis</b>	<b>6,434</b>	<b>48.4</b>	<b>5,481</b>	<b>50.7</b>	<b>953</b>	<b>38.3</b>
Mariguana	6,432	48.4	5,481	50.7	951	38.2
Hachís	129	1.0	104	1.0	25	1.0
<b>Cocaína</b>	<b>1,767</b>	<b>13.3</b>	<b>1,514</b>	<b>14.0</b>	<b>253</b>	<b>10.2</b>
Polvo blanco	1,085	8.2	904	8.4	181	7.3
<i>Crack</i>	883	6.6	787	7.3	96	3.9
Otra presentación de cocaína	24	0.2	19	0.2	5	0.2
<b>Inhalables</b>	<b>2,111</b>	<b>15.9</b>	<b>1,635</b>	<b>15.1</b>	<b>476</b>	<b>19.1</b>
Solventes o removedores	1,429	10.8	1,131	10.5	298	12.0
Pegamentos	428	3.2	338	3.1	90	3.6
Esmaltes o pinturas	356	2.7	238	2.2	118	4.7
Otros inhalables	49	0.4	34	0.3	15	0.6
<b>Depresores</b>	<b>694</b>	<b>5.2</b>	<b>502</b>	<b>4.6</b>	<b>192</b>	<b>7.7</b>
Benzodiacepinas	673	5.1	491	4.5	182	7.3
<i>Rohypnol</i>	13	0.1	9	0.1	4	0.2
Otros depresores	16	0.1	7	0.1	9	0.4
<b>Estimulantes</b>	<b>1,093</b>	<b>8.2</b>	<b>896</b>	<b>8.3</b>	<b>197</b>	<b>7.9</b>
Anfetamina	70	0.5	55	0.5	15	0.6
Metanfetaminas	899	6.8	752	7.0	147	5.9
Éxtasis (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas	141	1.1	106	1.0	35	1.4
Otros estimulantes	14	0.1	10	0.1	4	0.2
<b>Drogas alucinógenas y disociativas</b>	<b>168</b>	<b>1.3</b>	<b>118</b>	<b>1.1</b>	<b>50</b>	<b>2.0</b>
LSD	139	1.0	92	0.9	47	1.9
Plantas alucinógenas y derivados	27	0.2	25	0.2	2	0.1
Otras drogas alucinógenas y disoc.	5	0.0	4	0.0	1	0.0
<b>Opiáceos</b>	<b>290</b>	<b>2.2</b>	<b>246</b>	<b>2.3</b>	<b>44</b>	<b>1.8</b>
Heroína	267	2.0	232	2.1	35	1.4
Opiáceos Sintéticos	20	0.2	12	0.1	8	0.3
Opio y otros opiáceos	9	0.1	7	0.1	2	0.1
<b>Otras sustancias de abuso</b>	<b>112</b>	<b>0.8</b>	<b>62</b>	<b>0.6</b>	<b>50</b>	<b>2.0</b>
Con utilidad médica	37	0.3	16	0.1	21	0.8
Otras sustancias de abuso	76	0.6	46	0.4	30	1.2

**Cuadro 33. Frecuencia de episodios de abuso del consumo de Tabaco<sup>1</sup> en los últimos 30 días**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Ni una vez	2,454	18.5	31.1	2,052	19.0	31.3	402	16.2	30.2
< de 1 vez a la semana	957	7.2	12.1	782	7.2	11.9	175	7.0	13.1
1 o 2 veces a la semana	888	6.7	11.2	743	6.9	11.3	145	5.8	10.9
Cada tercer día	569	4.3	7.2	473	4.4	7.2	96	3.9	7.2
Diario	3,027	22.8	38.3	2,513	23.3	38.3	514	20.7	38.6
No consumió en los últimos 30 días	5,246	39.5	Se omite	4,127	38.2	Se omite	1,119	45.0	Se omite
Sin información	150	1.1	Se omite	114	1.1	Se omite	36	1.4	Se omite
<b>Total</b>	<b>13,291</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>10,804</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>2,487</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

<sup>1</sup> Consumo de seis o más cigarrillos en un solo día.

**Cuadro 34. Frecuencia de episodios de abuso del consumo de Alcohol<sup>1</sup> en los últimos 30 días**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Ni una vez	1,179	8.9	16.7	946	8.8	16.0	233	9.4	19.7
< de 1 vez a la semana	2,549	19.2	36.0	2,093	19.4	35.5	456	18.3	38.5
1 o 2 veces a la semana	2,341	17.6	33.1	1,991	18.4	33.8	350	14.1	29.6
Cada tercer día	569	4.3	8.0	473	4.4	8.0	96	3.9	8.1
Diario	440	3.3	6.2	392	3.6	6.6	48	1.9	4.1
No consumió en los últimos 30 días	6,067	45.6	Se omite	4,785	44.3	Se omite	1,282	51.5	Se omite
Sin información	146	1.1	Se omite	124	1.1	Se omite	22	0.9	Se omite
<b>Total</b>	<b>13,291</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>10,804</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>2,487</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

<sup>1</sup> Consumo de más de cuatro copas en un día para los hombres y de más de tres copas en un día para las mujeres.

**Cuadro 35. Frecuencia de episodios de abuso del consumo de drogas ilícitas<sup>1</sup> en los últimos 30 días**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
< de 1 vez a la semana	1,982	14.9	26.2	1,515	14.0	24.2	467	18.8	36.2
1 o 2 veces a la semana	1,567	11.8	20.7	1,331	12.3	21.2	236	9.5	18.3
Cada tercer día	1,131	8.5	15.0	949	8.8	15.1	182	7.3	14.1
Diario	2,877	21.6	38.1	2,471	22.9	39.4	406	16.3	31.4
No consumió en los últimos 30 días	4,090	30.8	Se omite	3,203	29.6	Se omite	887	35.7	Se omite
Sin información	1,644	12.4	Se omite	1,335	12.4	Se omite	309	12.4	Se omite
<b>Total</b>	<b>13,291</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>10,804</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>2,487</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

<sup>1</sup> Consumo de cualquier dosis.

## GLOSARIO

A continuación se definen algunas de las variables de estudio:

**Drogas ilícitas de inicio:** Drogas ilegales que el usuario refirió haber utilizado a la misma edad reportada como edad de inicio del consumo de este tipo de sustancias. Excluye el uso de tabaco y alcohol.

**Droga de mayor impacto en los últimos 12 meses:** Sustancia que el propio usuario de drogas solicitante de tratamiento refiere como la que más problemas le ha ocasionado en los ámbitos de salud, personal, familiar, escolar, laboral o social, en el transcurso del último año.

**Droga de preferencia en los últimos 12 meses:** Sustancia que el propio usuario solicitante de tratamiento ha elegido o preferido consumir en el transcurso del último año.

**Estrato social:** Estimación que hace el terapeuta, según su percepción, del estrato al que pertenece el usuario de drogas, considerando aspectos como lugar de residencia, escolaridad, empleo y características manifiestas como higiene y aliño, calidad del vestido, expresión verbal y vocabulario, etc.

**Tipo de consumo de drogas ilícitas:** Características de consumo de sustancias ilegales según motivo, frecuencia y problemas asociados. No incluye el uso de alcohol y/o tabaco y se clasifica como: experimental, social u ocasional, funcional, disfuncional y en remisión.

**Total de drogas consumidas:** Número de drogas consumidas (se incluyen las 26 sustancias de seguimiento) en las siguientes categorías: alguna vez en la vida, en el último año y en los últimos 30 días.

**Uso combinado de drogas en los últimos 12 meses:** Consumo de dos o más sustancias (incluyendo alcohol y cualquier droga ilícita o de uso médico, utilizada sin prescripción, pero excluyendo tabaco) en el transcurso de un mismo día, en el año previo a la solicitud de tratamiento en CIJ.