

SISTEMA DE INFORMACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DEL  
CONSUMO DE DROGAS

**CONSUMO DE DROGAS EN SOLICITANTES DE  
TRATAMIENTO EN CENTROS DE  
INTEGRACIÓN JUVENIL**

**DROGAS ILÍCITAS**

**SEGUNDO SEMESTRE DE 2017**

**José Luis Benítez Villa**

Dirección de Investigación y Enseñanza  
Subdirección de Investigación  
México, marzo del 2018



## **DIRECTORIO**

---

**PRESIDENTE HONORARIO VITALICIO DEL PATRONATO NACIONAL**

Dr. Jesús Kumate Rodríguez

**PRESIDENTE DEL PATRONATO NACIONAL**

Dr. Roberto Tapia Conyer

**FUNDADORA DE CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL, A.C.**

**Y VICEPRESIDENTA VITALICIA DEL PATRONATO NACIONAL**

Sra. Kena Moreno

**DIRECTORA GENERAL**

Mtra. Carmen Fernández Cáceres

**DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE OPERACIÓN Y PATRONATOS**

Dr. José Ángel Prado García

**DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE NORMATIVIDAD**

Dr. Ricardo Sánchez Huesca

**DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA**

Mtro. David Bruno Díaz Negrete

**SUBDIRECTORA DE INVESTIGACIÓN**

Dra. Solveig Eréndira Rodríguez Kuri

**JEFE DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA Y EPIDEMIOLÓGICA**

Dr. Valeriano Raúl García Aurrecoechea

<b>CONTENIDO</b>	<b>PÁG.</b>
RESUMEN	4
ANTECEDENTES	5
MÉTODO	6
RESULTADOS	8
CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS	8
FACTORES ASOCIADOS A LA DEMANDA DE TRATAMIENTO	11
CONSUMO DE DROGAS	14
REFERENCIAS	24
CUADROS	28
GLOSARIO	52

## ÍNDICE DE CUADROS

	PÁG.
Cuadro 1 Pacientes de primer ingreso a tratamiento por unidad de atención (CIJ, UH y UTUH)	29
Cuadro 2 Sexo	32
Cuadro 3 Persona que proporciona la información	32
Cuadro 4 Edad de ingreso a tratamiento	32
Cuadro 5 Estado civil	33
Cuadro 6 Escolaridad	33
Cuadro 7 Ocupación	34
Cuadro 8 Estrato social	34
Cuadro 9 Motivos de consulta	35
Cuadro 10 Condicionantes de la solicitud de tratamiento	35
Cuadro 11 Antecedentes de acciones contra el consumo de sustancias	36
Cuadro 12 Problemas asociados al consumo de sustancias	36
Cuadro 13 Edad de inicio del consumo de tabaco	37
Cuadro 14 Edad de inicio del consumo de alcohol	37
Cuadro 15 Edad de inicio del consumo de drogas ilícitas	38
Cuadro 16 Drogas ilícitas de inicio según menciones	39
Cuadro 17 Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de tabaco y el ingreso a tratamiento a CIJ	40
Cuadro 18 Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de alcohol y el ingreso a tratamiento a CIJ	40
Cuadro 19 Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de drogas ilícitas y el ingreso a tratamiento a CIJ	41
Cuadro 20 Tipo de consumo de drogas ilícitas	41
Cuadro 21 Total de drogas consumidas alguna vez en la vida (incluye alcohol o tabaco)	42
Cuadro 22 Total de drogas ilícitas consumidas alguna vez en la vida (no incluye ni alcohol ni tabaco)	42
Cuadro 23 Consumo de drogas alguna vez en la vida por sustancia	43
Cuadro 24 Total de drogas consumidas en el último año (incluye alcohol o tabaco)	44
Cuadro 25 Total de drogas ilícitas consumidas en el último año (no incluye ni alcohol ni tabaco)	44
Cuadro 26 Consumo de drogas en los últimos 12 meses por sustancia	45
Cuadro 27 Droga de preferencia en los últimos 12 meses, según menciones	46
Cuadro 28 Droga de mayor impacto en los últimos 12 meses, según menciones	47
Cuadro 29 Uso combinado de drogas en los últimos 12 meses (no incluye tabaco)	48
Cuadro 30 Total de drogas consumidas en los últimos 30 días (incluye alcohol o tabaco)	48
Cuadro 31 Total de drogas ilícitas consumidas en los últimos 30 días (no incluye ni alcohol ni tabaco)	49
Cuadro 32 Consumo de drogas en los últimos 30 días por sustancia	50
Cuadro 33 Frecuencia de episodios de abuso del consumo de Tabaco en los últimos 30 días	51
Cuadro 34 Frecuencia de episodios de abuso del consumo de Alcohol en los últimos 30 días	51
Cuadro 35 Frecuencia de episodios de abuso del consumo de drogas ilícitas en los últimos 30 días	51

## RESUMEN

El presente informe se realizó con base en 10,083 registros clínicos de la entrevista inicial realizada a personas que acudieron por primera vez a solicitar tratamiento por el consumo de drogas a Centros de Integración Juvenil (CIJ) entre julio y diciembre de 2017. Los objetivos del estudio son: a) actualizar información de los pacientes en cuanto al perfil sociodemográfico, factores asociados a la demanda de tratamiento y patrón de consumo de sustancias; b) contribuir a retroalimentar sistemas nacionales de información del consumo de drogas; c) generar información que oriente el desarrollo de estudios sobre el uso de tabaco, alcohol y otras sustancias en México; y d) contribuir al desarrollo, diseño y ajuste de los servicios institucionales de prevención y tratamiento del consumo de drogas.

Los datos que se presentan revelan que el uso de drogas ilícitas sigue siendo un problema que afecta mayormente a la población masculina, en una proporción de 4.6 hombres por cada mujer. La edad media de ingreso a tratamiento fue de 23.5 años. En promedio, los hombres ingresaron a tratamiento a mayor edad que las mujeres (23.7 y 22.6 años, respectivamente). La edad promedio del inicio del consumo de tabaco fue a los 14.5 años, la del alcohol a los 14.6 años y la de drogas ilícitas a los 16.3 años. La edad de inicio del consumo de sustancias no presenta diferencias importantes por sexo en cuanto a tabaco y alcohol. Sin embargo, el consumo de drogas ilícitas se presentó de manera más temprana entre los hombres (16.1 años), en comparación con las mujeres (17.3 años.)

Las drogas de mayor consumo alguna vez en la vida fueron: alcohol (87.7%), *cannabis* (86.2%), tabaco (85.4%), cocaína/*crack* (46.7%), estimulantes (35.1%, principalmente metanfetaminas: (30.3%) y *éxtasis* (6.5%); inhalables (26.8%), depresores (14.7%), drogas alucinógenas y disociativas (12.4%) y opiáceos (3.9%, principalmente heroína: 3.0%). Las sustancias más utilizadas el mes previo al ingreso a tratamiento fueron: tabaco (64.1%), alcohol (56.0%), *cannabis* (50.1%), cocaína/*crack* (18.1%), estimulantes (17.3%) e inhalables (9.5%). Las sustancias reportadas como de mayor impacto fueron: marihuana (37.3%), metanfetaminas (18.2%), alcohol (12.5%), *crack* (7.7%), tabaco (6.0%), cocaína (5.2%) y solventes y removedores (4.8%).

En cuanto a los factores asociados a la demanda de tratamiento se observó que, los consultantes acudieron principalmente por recomendación de la familia (45.4%) o por iniciativa propia (41.5%); y solicitaron atención debido a su consumo de drogas ilícitas (88.6%), de alcohol (40.7%) o por el uso de tabaco (37.3%). Previo a su ingreso a tratamiento en CIJ, 32.3% de los solicitantes intentaron interrumpir de manera voluntaria y sin apoyo el uso de sustancias, mientras que 23.8% no habían realizado alguna acción para dejar el consumo. Los problemas asociados al consumo de drogas reportados con mayor frecuencia fueron los del ámbito familiar (80.1%), de salud (44.1%), psicológicos (42.9%) y escolares (37.1%).

## ANTECEDENTES

Centros de Integración Juvenil (CIJ) reporta información epidemiológica del consumo de drogas de los solicitantes de tratamiento desde 1976<sup>1</sup>. En 1983 inicia la aplicación de una cédula homogénea a los pacientes de nuevo ingreso<sup>2</sup>. Sin embargo, es a partir de 1990 que la recolección de datos se realiza de forma sistemática<sup>3</sup>. Posteriormente se hace la implementación del *Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas* (SIECD), el cual se ha consolidado a través de los años y realiza el seguimiento oportuno de un conjunto de variables que contribuyen en la toma de decisiones de los servicios institucionales. Además, ofrece un panorama sobre la forma y tendencias del uso de drogas y aporta información a los sistemas epidemiológicos de las adicciones en el país, a saber: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA)<sup>4</sup> de la Secretaría de Salud, Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas (SRID) –perteneciente al Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz” (INPRF)<sup>5</sup>– y el Observatorio Epidemiológico en Drogas de la Secretaría Salud<sup>6</sup>.

El SIECD ha apoyado en el desarrollo de diferentes estudios epidemiológicos especializados, incluyendo el perfil de usuarios de drogas y su trayectoria de consumo<sup>7</sup>, uso de drogas en mujeres<sup>8</sup>, población infantil<sup>9</sup> o de acuerdo con las etapas de la vida<sup>10</sup> y estudios de tendencias<sup>11,12,13,14</sup>. Esta información permite enfrentar de manera oportuna las problemáticas generadas por el creciente consumo de estimulantes, al mismo tiempo que sustenta el diseño de estudios sobre características particulares de los consumidores de estos alcaloides<sup>15,16</sup>.

La información reportada a través del sistema ha permitido el desarrollo de estudios epidemiológicos particulares enfocados en profundizar en las características del consumo de drogas legales de pacientes atendidos. Así, desde el 2006, el SIECD genera un informe de las características de los pacientes consumidores de tabaco y alcohol<sup>17</sup>, con lo cual se ha logrado identificar una emergencia epidemiológica del consumo de alcohol entre las mujeres atendidas con relación a los años anteriores<sup>18</sup>; suceso que ha dado pie a CIJ para profundizar en esta problemática<sup>19</sup> y que ha sido reportado por la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT), sobre todo para el caso de las mujeres jóvenes<sup>20</sup>.

Cabe destacar que la información generada por el SIECD durante el lapso de más de dos décadas ha sido consistente con la información de otras encuestas nacionales<sup>21,22,23</sup> y también ha sido referente para el desarrollo de metodologías de

investigación en variados estudios clínicos, psicosociales y evaluativos de la Institución, como es el caso de diversos *Estudios de la Comunidad Objetivo (EBCO)*<sup>24</sup> realizados por los CIJ a lo largo del país.

El presente informe se elaboró con base en información obtenida por el SIECD durante el segundo semestre del 2017 y tiene el objetivo de proporcionar datos actualizados sobre las características sociodemográficas, factores asociados a la demanda de tratamiento y patrón de consumo de drogas de los solicitantes de tratamiento, de manera que se aporten elementos para apoyar el diseño, planeación y ajuste de los programas institucionales de prevención, tratamiento y rehabilitación, además de colaborar con otros sistemas de información en drogas y de aportar elementos para el diseño y elaboración de investigaciones en el campo de las adicciones.

## MÉTODO

**Diseño del estudio:** Censo epidemiológico descriptivo semestral.

**Población:** 10,083 usuarios de drogas ilícitas procedentes de 106 unidades de CIJ, que acudieron por primera vez a consulta entre julio y diciembre de 2017 (cuadro 1. Anexo).

**Fuente de información:** Formato de Entrevista Inicial aplicado en la primera consulta por parte del personal médico-técnico responsable del ingreso de pacientes a tratamiento, que forma parte del expediente clínico en cualquiera de sus dos versiones: formato electrónico (base de datos recuperada el día 8 de febrero del 2018 a las 16:39 hrs., con 10,019 registros capturados por los/as terapeutas responsables de realizar la entrevista inicial) o formato impreso (64 registros capturados por personal del departamento de Investigación Clínica y Epidemiológica mediante el programa *Control de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas* desarrollado por CIJ).

**Variables de estudio:** Las características sociodemográficas estudiadas comprenden: persona que proporciona la información, sexo, edad de ingreso a tratamiento, estado civil, escolaridad, ocupación y estrato social; las variables de factores asociados a la demanda de tratamiento incluyen: motivo(s) de consulta, condicionante(s) de la solicitud de tratamiento, antecedente(s) de acciones tomadas frente al uso de sustancias y problema(s) asociado(s) al mismo; y las variables de patrón de consumo: edad de inicio, tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de sustancias y el ingreso a tratamiento, consumo alguna vez en la vida, en el último año y en los últimos 30 días; drogas de preferencia y de mayor impacto en el último año (estas dos últimas variables

de acuerdo con el punto de vista del paciente), uso combinado de sustancias, tipo de consumo de drogas ilícitas, episodios de abuso y total de drogas consumidas.

La información sobre el consumo de drogas se presenta agrupada en 26 categorías de drogas y en algunos casos (consumo alguna vez en la vida, en el último año y en el último mes) se proporciona además información concentrada en diez grupos:

Grupo de Sustancias	Drogas en seguimiento
Tabaco	Cigarrillos
Alcohol	Bebidas alcohólicas
<i>Cannabis</i>	Mariguana y hachís
Cocaína	Cocaína en polvo, <i>crack</i> y otra presentación de cocaína
Inhalables	Solventes y removedores, pegamentos, esmaltes y pinturas y otros inhalables
Depresores	Benzodiacepinas, <i>Rohypnol</i> y otros depresores
Estimulantes	Anfetaminas, metanfetaminas ( <i>crystal</i> o <i>ICE</i> ), MDMA ( <i>éxtasis</i> ) y metanfetaminas alucinógenas; y otros estimulantes
Drogas alucinógenas y disociativas	Ácido lisérgico (LSD), plantas alucinógenas y derivados y otros alucinógenos (PCP y ketamina)
Opiáceos	Heroína, opiáceos sintéticos y opio, y otros opioides
Otras sustancias de abuso	Sustancias con utilidad médica y otras sustancias no identificadas

**Procesamiento de datos.** Para el procesamiento estadístico de la información se utilizó el programa SPSS v.20.

Los resultados se presentan tanto en forma general como desglosada por sexo y en porcentajes válidos, excluyendo los casos “*sin información*” y aquellos que no cumplieron con las condiciones requeridas para el análisis en cada variable de estudio.

## RESULTADOS

### CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS<sup>a</sup>

**Sexo.** La población se conformó por 8,296 hombres y 1,787 mujeres, lo cual representa 82.3% y 17.7%, respectivamente. Es decir, aproximadamente cinco hombres (4.6) solicitan tratamiento en CIJ por cada mujer.

**Persona que proporciona la información.** 50.6% de los casos acudieron en compañía de familiares u otras personas, mientras que 40.6% lo hicieron solos.

**Edad de ingreso a tratamiento.** Se observa un rango de edad de 9 a 77 años, con un promedio de 23.5 años (DE= 10.6 años); es decir, 8,518 de los usuarios de drogas tenía entre los 12 y 34 años de edad (alrededor del 84% de las personas atendidas); la edad mediana de la población fue de 19 años (40.3% de los casos fueron menores de edad; 4,073 sujetos), mientras que la moda se ubicó en 16 años (996 casos atendidos).


Figura 1. Edad de ingreso según sexo

	 Años	 Años	Las mujeres ingresaron a tratamiento a menor edad (en promedio, un año antes que los hombres).
<b>Rango</b>	9 a 77	11 a 76	
<b>Promedio (Desviación estándar)</b>	23.7 (10.7)	22.6 (10.4)	
<b>Mediana</b>	20	19	
<b>Moda</b>	17	15	
<b>Decil<sub>1</sub></b>	14	14	

<sup>a</sup> Cfr., Cuadros 1 a 8.


**Estado civil.** La mayor parte de la población refirió ser soltera (70.5%), mientras que 11.7% indicó que vivía en unión libre y 9.5% estaba casada.

**Figura 2. Estado civil según sexo**



**Escolaridad.** En términos generales, 40.0% había cursado algún grado de bachillerato, 38.6% al menos algún grado de educación secundaria, 11.0% tenía estudios superiores y 7.4% sólo había cursado la primaria.


**Figura 3. Escolaridad según sexo**



El nivel de escolaridad es ligeramente mayor en hombres que en mujeres.

**Ocupación.** 35.5% desempeñaba alguna actividad laboral, 32.4% reportó ser estudiante y 22.4% estaba desempleado.


**Figura 4. Principal ocupación según sexo**



**Estrato social.** Según la percepción de los terapeutas la mitad de los pacientes (51.0%) se ubicaban en el estrato medio bajo, 23.8% en un nivel bajo y 20.1% fue clasificado en el estrato medio.

**Figura 5. Estrato social según sexo**


Según la percepción de los terapeutas, tanto hombres como mujeres presentaron condiciones sociales similares, predominando el estrato medio bajo.



## FACTORES ASOCIADOS A LA DEMANDA DE TRATAMIENTO<sup>b</sup>


**Motivos de consulta.** 45.6% de las personas atendidas reportaron más de un motivo para acudir a tratamiento (uso de alcohol, tabaco o drogas), mientras que 0.1% no expresó ninguno. 88.6% de los pacientes acudió por consumo de drogas ilícitas, 40.7% por uso de bebidas alcohólicas y 37.3% por uso de tabaco.

**Figura 6. Motivos de consulta según sexo**



**Condicionantes de la solicitud de tratamiento.** 28.4% de los casos expresó dos o más condicionantes para acudir a tratamiento; 45.4% acudió por recomendación de la familia, 41.5% por iniciativa propia, 18.0% por condicionamiento o recomendación escolar, 9.6% por indicación médica y 9.5% por condicionamiento legal.


**Figura 7. Condicionantes de la solicitud de tratamiento según sexo**



<sup>b</sup> Cfr. Cuadros 9 a 12.

**Antecedentes de acciones contra el consumo de sustancias.** 32.3% de los pacientes expresó que antes de acudir a CIJ había intentado interrumpir voluntariamente el consumo sin otro tipo de apoyo, 13.1% señaló que había estado internado en algún anexo, 7.3% había acudido a algún grupo de autoayuda, 6.8% lo había hecho a través de juramento y el 6.4% con tratamiento psiquiátrico o psicoterapéutico de tipo ambulatorio. Cabe señalar que 13.2% reportó haber intentado al menos dos formas distintas de acciones para abandonar el consumo de drogas, en tanto que 23.8% expresó que hasta el momento de la solicitud de tratamiento no había tomado ninguna medida en contra del consumo de drogas.


**Figura 8. Antecedentes de acciones contra el consumo de sustancias según sexo**



Mayor porcentaje de mujeres ingresaron a CIJ sin haber realizado acciones previas para dejar el consumo de drogas, mientras que los hombres en mayor proporción que las mujeres intentaron dejarlo de manera voluntaria, se internaron en algún anexo, participaron en grupos de autoayuda o por medio de juramento.

**Problemas asociados al consumo de sustancias.** 80.1% de los pacientes señaló problemas de tipo familiar, 44.1% de salud, 42.9% psicológicos, 37.1% escolares, 25.1% laborales, 20.4% legales, 14.7% de conducta antisocial o delictiva y 13.0% accidentes o lesiones. Cabe señalar que 77.6% de las personas atendidas mencionaron dos o más problemas asociados al consumo de sustancias, mientras que 4.8% no reportó ninguno.

**Figura 9. Problemas asociados al consumo de sustancias según sexo**



## CONSUMO DE DROGAS<sup>c</sup>

**Edad de inicio del consumo de sustancias.** La edad promedio de inicio del consumo de tabaco se situó en 14.5 años (DE =3.5 años), la mediana en 14 años y la moda en 15 años, mientras que la edad promedio de inicio del consumo de alcohol se ubicó en 14.6 años (DE =3.0 años) con una mediana de 15 años y una moda de 15 años. Por su parte, la edad promedio de inicio del uso de drogas ilícitas (incluyendo sustancias de uso médico sin prescripción) fue de 16.3 años (DE =5.7 años), con una mediana y una moda de 15 años. Por otra parte, al considerar el primer decil como indicador de las edades de inicio más tempranas, se observa que el consumo de tabaco aparece a los 11 años, mientras que el de alcohol y drogas ilícitas se presenta a los 12 años de edad.

**Figura 10. Edad de inicio del consumo de sustancias según sexo**

	 <b>Años</b>			 <b>Años</b>		
	Tabaco	Alcohol	Drogas ilícitas	Tabaco	Alcohol	Drogas ilícitas
<b>Promedio</b> (Desviación estándar)	14.5 (3.4)	14.6 (2.9)	16.1 (5.2)	14.8 (4.0)	14.8 (3.6)	17.3 (7.4)
<b>Mediana</b>	14	15	15	14	15	15
<b>Moda</b>	15	15	15	15	15	14
<b>Decil<sub>1</sub></b>	11	12	12	12	12	12


La edad de inicio del consumo de tabaco y alcohol no presentan diferencias considerables entre hombres y mujeres. Por su parte, el consumo de drogas ilícitas se presentó de manera más temprana entre los hombres.

**Drogas ilícitas de inicio.** Las sustancias de inicio más reportadas fueron: marihuana (73.8%); cocaína (10.5%), tanto en forma de polvo blanco (7.9%) como crack (2.5%); inhalables (8.2%), mayormente en forma de solventes y removedores (6.0%); seguidos por los estimulantes (4.8%), donde destacan las metanfetaminas (3.7%); depresores

<sup>c</sup> Cfr., Cuadros 13 a 35

con utilidad médica como las benzodiazepinas (1.6%); y los opiáceos (0.5%), entre los cuales sobresale la heroína (31 casos).

**Figura 11. Principales drogas ilícitas de inicio según sexo**



**Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de sustancias y el ingreso a tratamiento en CIJ.** El promedio de años entre el inicio de consumo y la solicitud de tratamiento se situó de la siguiente manera: tabaco de 9.2 años (DE=10 años), alcohol de 9.3 años (DE =9.9 años) y drogas ilícitas de 7.2 años (DE =8.8 años). No obstante, la mitad de los usuarios dejó pasar seis años desde el momento en que se inició el consumo de tabaco o alcohol y el momento de acudir a solicitar tratamiento, mientras que 55.3% de los usuarios dejaron pasar cuatro años desde el comienzo del consumo de drogas ilegales.


**Figura 12. Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de sustancias y el ingreso a tratamiento en CIJ según sexo**

	 <b>Años</b>			 <b>Años</b>		
	<b>Tabaco</b>	<b>Alcohol</b>	<b>Drogas ilícitas</b>	<b>Tabaco</b>	<b>Alcohol</b>	<b>Drogas ilícitas</b>
<b>Promedio</b> (Desviación estándar)	9.5 (10.2)	9.6 (10.1)	7.6 (9.1)	7.7 (9.1)	7.8 (9.0)	5.2 (7.1)
<b>Mediana</b>	6	6	4	4	4	3
<b>Moda</b>	1	1	1	1	1	< un año
<b>Decil<sub>1</sub></b>	1	1	< un año	1	1	< un año

Los hombres dejan pasar más tiempo que las mujeres para solicitar tratamiento.

**Tipo de consumo de drogas ilícitas.** De acuerdo con los terapeutas, 53.8% de los solicitantes de tratamiento fue diagnosticado con consumo funcional, 22.4% con consumo disfuncional, 12.5% con consumo social u ocasional, 8.7% con consumo experimental y 2.6% presentaba remisión del consumo.

**Figura 13. Tipo de consumo de drogas ilícitas según sexo**




El patrón de consumo funcional y disfuncional entre los sexos es equiparable. Sin embargo, las mujeres reportan con mayor frecuencia el consumo social y experimental de drogas ilícitas.

**Total de drogas consumidas.** El promedio de sustancias utilizadas alguna vez en la vida, incluyendo alcohol o tabaco, fue de 4.3 drogas (95.4% reportó el uso de dos o más sustancias); en el último año fue de 3.6 drogas (89.9% consumió dos o más sustancias); y en los últimos 30 días fue de 2.3 drogas (69.7% reportó haber utilizado dos o más sustancias).

El promedio de sustancias consumidas alguna vez en la vida, sin incluir alcohol y tabaco, fue de 2.6 drogas (63.4% reportó el uso de dos o más sustancias); en el último año fue de 2.0 drogas (49.2% consumió dos o más sustancias); y en los últimos 30 días fue de 1.1 droga (24.3% reportó haber utilizado dos o más sustancias).

**Figura 14. Promedio de drogas consumidas según sexo**




Mujeres y hombres consumieron un promedio similar de drogas.

**Consumo de drogas alguna vez en la vida.** <sup>d</sup> Las proporciones de consumo alguna vez en la vida de los diez grupos de sustancias en seguimiento fueron: *canabbis* (86.2%), alcohol (87.7%), tabaco (85.4%), cocaína, incluyendo *crack* (46.7%), estimulantes (35.1%), inhalables (26.8%), depresores (14.7%), drogas alucinógenas y disociativas (12.4%), opiáceos (3.9%) y otras sustancias de abuso (2.0%).

En cuanto al uso de sustancias específicas (contenidas en alguno de los diez grupos antes mencionados) sobresalen: marihuana (86.2%), cocaína en polvo (40.4%) metanfetaminas (30.3%), *crack* (21.5%), solventes y removedores (19.9%) y benzodiacepinas (14.3%); en menor proporción la LSD (9.9%), los pegamentos (7.1%), *éxtasis* y otras metanfetaminas alucinógenas (6.5%) y el hachís (6.1%).

**Figura 15. Consumo de drogas alguna vez en la vida según sexo**




Los hombres reportaron en mayor proporción que las mujeres el consumo de tabaco, alcohol, marihuana, inhalables, cocaína, crack y heroína. Ellas reportaron mayormente el consumo de metanfetaminas, benzodiacepinas y éxtasis. Ambos consumieron alucinógenos en la misma proporción.

<sup>d</sup> Los casos pudieron haber reportado el consumo de dos o más sustancias, por lo que el total de los porcentajes no suma 100%.

**Consumo de drogas en los últimos 12 meses.** 98.3% de las personas reportaron haber consumido alguna sustancia en el año previo a su ingreso a tratamiento en CIJ. Las proporciones de consumo de los diez grupos de sustancias utilizadas en este lapso fueron: alcohol (80.1%), tabaco (77.6%), marihuana (72.0%), cocaína (35.0%), estimulantes (30.0%), inhalables (19.0%), depresores (10.4%), drogas alucinógenas y disociativas (7.8%); opiáceos (3.0%) y otras sustancias de abuso (1.6%).

En cuanto al consumo de sustancias específicas contenidas en alguno de los grupos anteriores, destacaron: marihuana (72.0%), cocaína en polvo (28.1%), metanfetaminas (26.4%), crack (16.1%) y solventes y removedores (14.0%); en menor proporción se refieren las benzodiazepinas (10.3%) y LSD (6.5%).


**Figura 16. Consumo de drogas en los últimos 12 meses según sexo**



Las drogas más consumidas en el último año por ambos sexos fueron alcohol, tabaco y marihuana; las mujeres usaron en mayor proporción benzodiazepinas, metanfetaminas, éxtasis, drogas alucinógenas e inhalables; los hombres reportaron en mayor proporción el uso de marihuana, cocaína en polvo y crack.

**Droga de preferencia en los últimos 12 meses.** Entre las sustancias más frecuentemente referidas se encontraron: mariguana (41.9%), alcohol (14.5%), tabaco (11.0%), metanfetaminas (12.3%) y crack (6.0%). En menores proporciones aparecieron inhalables (4.8%) y cocaína en polvo (4.0%).


**Figura 17. Droga de preferencia en los últimos 12 meses según sexo**



Los hombres reconocieron mayor preferencia que las mujeres por el uso de mariguana y crack; mientras que en las mujeres la preferencia fue mayor que en los hombres por el tabaco, alcohol, inhalables, metanfetaminas y benzodiazepinas. No obstante, cabe resaltar que la mariguana es la droga preferida por hombres y mujeres.

**Droga de mayor impacto en los últimos 12 meses.** Las principales sustancias reportadas por los pacientes a las cuales atribuyeron los mayores daños a la salud, bienestar personal y familiar o en el desempeño escolar, laboral o social y por las que reportaron haber solicitado tratamiento, fueron: *mariguana* (37.3%), metanfetaminas (18.2%), alcohol (12.5%), crack (7.7%), tabaco (6.0%), cocaína en polvo (5.2%) y solventes o removedores (4.8%). La Figura 18 presenta esta información desagregada por sexos..


**Figura 18. Droga de mayor impacto en los últimos 12 meses según sexo**



Hombres y mujeres acuden a tratamiento principalmente por el consumo de marihuana. Con mayor frecuencia ellos también acuden por los efectos asociados al consumo de crack; mientras que ellas por los del uso de tabaco, alcohol, inhalables, metanfetaminas, benzodiazepinas y alucinógenos.

**Uso combinado de drogas en los últimos 12 meses.<sup>e</sup>** Al menos en una ocasión en el transcurso del último año y sin tomar en cuenta el consumo de tabaco, casi la mitad de la población (46.8%) reportó el consumo de dos o más sustancias en un mismo día.

**Figura 19. Uso combinado de droga en los últimos 12 meses según sexo**



Los hombres y las mujeres combinaron de manera similar dos o más drogas (no se incluyó el consumo de tabaco).


<sup>e</sup> No se toman en cuenta 1,954 casos (19.4%) que no cumplieron los criterios de inclusión de esta variable; 19.3% de los hombres y 19.6% de las mujeres (ver anexo, cuadro 29).

**Consumo de drogas en los últimos 30 días.** Incluyendo alcohol y tabaco, 91.4% de los casos reportaron consumo de sustancias en el mes anterior al ingreso a tratamiento.

Las prevalencias de consumo de los diez grupos de sustancias utilizadas en este lapso fueron: tabaco (64.1%), alcohol (56.0%), *cannabis* (50.1%), cocaína (18.1%), estimulantes (17.3%), inhalables (9.5%), depresores (4.8%), opiáceos (1.9%), drogas alucinógenas y disociativas (1.5%) y otras sustancias de abuso (0.8%).

En cuanto al consumo de sustancias específicas destacó el de marihuana con 50.1%, seguida de: metanfetaminas (16.3%), cocaína en polvo (11.3%), crack (9.4%) y solventes/removedores (7.1%); y en menor proporción se registró el consumo de benzodiazepinas (4.8%) y pegamentos (1.8%).


**Figura 20. Consumo de drogas en los últimos 30 días según sexo**



Hombres y mujeres consumieron predominantemente tabaco, alcohol y marihuana –los hombres en mayor proporción–. Las mujeres reportaron mayor consumo de inhalables, benzodiazepinas, alucinógenos y éxtasis.

**Frecuencia de episodios de abuso en los últimos 30 días.** 38.8% de quienes reportaron consumo de tabaco en los últimos 30 días aceptó fumar seis o más cigarrillos diariamente. Asimismo, entre quienes consumieron alcohol, la mayor parte (35.2%) reportó consumo abusivo menos de una vez a la semana y una o dos veces a la semana (31.8%). Por otra parte, 42.4% de los usuarios de drogas ilícitas durante el último mes reportaron consumirlas todos los días, 20.9% menos de una vez a la semana, 20.5% una a dos veces a la semana y 16.3% cada tercer día.

**Figura 21. Frecuencia de episodios de abuso en los últimos 30 días según sexo**



Los hombres refieren mayor frecuencia de episodios de abuso de drogas ilícitas que las mujeres. Ambos sexos abusan del consumo de tabaco y del alcohol de manera similar.

## REFERENCIAS

1. Sánchez-Huesca, R. y López, L. M. (1985). *Características demográficas y patrones de inicio en el consumo de drogas en asistentes a los Centros Locales; recuperación de los archivos de siete años (1976-1982)*. México: Centros de Integración Juvenil, A.C.
2. Clarac, P. y Wagner, F. (1987). Análisis de algunas variables en una muestra de pacientes farmacodependientes (1986). En Wagner, F. y Ortiz, R. (1990). *Estudios acerca de la farmacodependencia en México realizados por Paule Clarac*. México: Centros de Integración Juvenil, A. C. (pp. 111-126).
3. García V. R., Díaz, D. B., Balanzario, M. C., Gutiérrez, A. D y Castillo, P. I. (1999). *Características sociodemográficas y de consumo de drogas en pacientes atendidos entre 1990 y 1997* (Informe de investigación 98-12). México: Centros de Integración Juvenil, A.C.
4. Secretaria de Salud. *Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA)*. México. Dirección General de Epidemiología. Recuperado de [http://www.epidemiologia.salud.gob.mx/dgae/infoepid/inf\\_sisvea.html](http://www.epidemiologia.salud.gob.mx/dgae/infoepid/inf_sisvea.html)
5. Ortiz, A., Martínez, R., Meza, D. (2016). *Grupo Interinstitucional para el desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas* (Tendencias en el área metropolitana no. 58 junio, 2015). México: Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Recuperado de [http://www.inprf.gob.mx/opencms/export/sites/INPRFM/psicosociales/archivos/srid/rep\\_58\\_pdf.pdf](http://www.inprf.gob.mx/opencms/export/sites/INPRFM/psicosociales/archivos/srid/rep_58_pdf.pdf)
6. Díaz, D. B., Balanzario, M. C., Castillo, P. I., Gutiérrez, A. D. y García, V. R. (2001). Uso de drogas entre pacientes de primer ingreso en Centros de Integración Juvenil. En Secretaría de Salud. *Observatorio Epidemiológico en drogas. El fenómeno de las adicciones en México 2001*. México: Secretaría de Salud (pp. 66-71). Recuperado de [http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/publicaciones/obs2001\\_cap4.pdf](http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/publicaciones/obs2001_cap4.pdf)
7. García-Aurrecochea, V. R., Díaz-Negrete, D. B., Balanzario, M. C. y Castillo-Franco, P. I. (1998). *Perfil y trayectoria del consumo de drogas en pacientes de*

- primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil en 1996*. En CD: D. B. Díaz, J. L. Arellanez, M. C. Balanzario y R. Sánchez, *Once años de estudios del consumo de drogas en México, Investigaciones realizadas en Centros de Integración Juvenil entre 1997 y 2007*. México: Centros de Integración Juvenil, A. C.
8. Castillo, P. I., Gutiérrez, A. D. (2008). Consumo de drogas en mujeres asistentes a centros de tratamiento especializado en la Ciudad de México. *Salud Mental* 31 (5), 351-359. Recuperado de <http://scielo.unam.mx/pdf/sm/v31n5/v31n5a3.pdf>
  9. Gracia, S. E. y Balanzario, M. C. (2003). *El consumo de drogas en menores de 12 años en Centros de Integración Juvenil en el año 2002* (Informe de Investigación 03-17). México: Centros de Integración Juvenil, A. C.
  10. García, V. R., Castillo, P. I. y Guerrero, J. A. (2003). *El consumo de drogas en pacientes atendidos en Centros de Integración Juvenil según la etapa de vida correspondiente al ingreso a tratamiento* (Informe de Investigación 03-13). México: Centros de Integración Juvenil, A. C.
  11. García, V. R., Díaz, D. B. y Balanzario, M. C. (2001). *Tendencias del consumo de drogas en pacientes de primer ingreso a tratamiento en CIJ entre 1990 y 1999* (Informe de investigación 2000-06). México: Centros de Integración Juvenil, A.C.
  12. Gutiérrez López, AD. (2017). *Tendencias del consumo de drogas alguna vez en la vida en Usuarios de drogas ilícitas solicitantes de tratamiento en Centros de Integración Juvenil. Primer semestre de 2005 – Primer semestre de 2017. (Nivel Nacional y Entidades Federativas)* [Informe de Investigación 17-05e]. México: Centros de Integración Juvenil, A. C. Recuperado de <http://www.cij.gob.mx/Programas/Investigacion/pdf/17-05e.pdf>
  13. Gutiérrez, A. D. (2017). *Tendencias del consumo de drogas en los últimos 30 días de drogas ilícitas solicitantes de tratamiento en Centros de Integración Juvenil. Primer semestre de 2005 – Primer semestre de 2017. (Nivel Nacional y Entidades Federativas)* [Informe de Investigación 17-05f]. México: Centros de Integración Juvenil, A. C. Recuperado de <http://www.cij.gob.mx/Programas/Investigacion/pdf/17-05f.pdf>
  14. Gutiérrez, A. D. (2017). Droga de mayor impacto reportada por usuarios de

- drogas ilícitas solicitantes de tratamientos en *Centros de Integración Juvenil. Primer semestre de 2005 – Primer semestre de 2017. (Nivel nacional y entidades federativas)* [Informe de Investigación 17-05g]. México: Centros de Integración Juvenil, A. C. Recuperado de <http://www.cij.gob.mx/Programas/Investigacion/pdf/17-05g.pdf>
15. Jiménez, K., García, V. R. y González, J. D. (2005). *Patrón de consumo de cocaína y crack en pacientes que ingresan a tratamiento* (Informe de investigación 05-07). México: Centros de Integración Juvenil, A. C.
16. Jiménez, K. y Castillo, N. L. (2014). *Factores de reincidencia en usuarios de cocaína, crack y metanfetaminas en fase de recuperación* (Informe de Investigación 04-14). México: Centros de Integración Juvenil, A. C.
17. Gutiérrez, A. D. y Castillo, P. I. (2007). *Estudio epidemiológico del consumo de alcohol y tabaco en pacientes usuarios de estas sustancias solicitantes de tratamiento en CIJ en 2006* (Informe de Investigación 07-13). México: Centros de Integración Juvenil, A. C. Recuperado de <http://www.cij.gob.mx/Programas/Investigacion/pdf/07-13.pdf>
18. Velázquez, M. (2017). *Consumo de sustancias en pacientes de primer ingreso a tratamiento. Segundo semestre del 2016. Usuarios de Tabaco y alcohol* (Informe de Investigación 17-01d). México: Centros de Integración Juvenil, A. C. Recuperado de <http://www.cij.gob.mx/Programas/Investigacion/pdf/17-01d.pdf>
19. Moreno, K. (2010). *Los jóvenes y el alcohol en México. Un problema emergente en mujeres*. México: Centros de Integración Juvenil, A.C.
20. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz; Instituto Nacional de Salud Pública, Comisión Nacional Contra las Adicciones, Secretaría de Salud. Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017: Reporte de Alcohol. Villatoro-Velázquez JA, Reséndiz Escobar, E., Mujica Salazar, A., Bretón-Cirett, M., Cañas-Martínez, V., Soto-Hernández, I., Fregoso-Ito, D., Fleiz-Bautista, C., Medina-Mora ME., Gutiérrez-Reyes, J., Franco-Núñez, A., Romero-Martínez, M. y Mendoza-Alvarado, L. Ciudad de México, México: INPRFM; 2017.
21. Medina-Mora, M. E. Villatoro J. A., Fleiz, C., Téllez, M. M., Mendoza, L. R.,

- Romero, M., Gutiérrez, J. P., Castro, M., Hernández, M., Tena, C., Alvear, C. y Guisa, V. (2012). *Encuesta Nacional de Adicciones 2011: Reporte de Alcohol*. México: Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.
22. Medina-Mora, M. E. Villatoro J. A., Fleiz, C., Téllez, M. M., Mendoza, L. R., Romero, M., Gutiérrez, J. P., Castro, M., Hernández, M., Tena, C., Alvear, C. y Guisa, V. (2012). *Encuesta Nacional de Adicciones 2011: Reporte de Drogas*. México: Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.
23. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz; Instituto Nacional de Salud Pública, Comisión Nacional Contra las Adicciones, Secretaría de Salud. Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017: Reporte de Drogas. Villatoro-Velázquez JA, Reséndiz Escobar, E., Mujica Salazar, A., Bretón-Cirett, M., Cañas-Martínez, V., Soto-Hernández, I., Fregoso-Ito, D., Fleiz-Bautista, C., Medina-Mora ME., Gutiérrez-Reyes, J., Franco-Núñez, A., Romero-Martínez, M. y Mendoza-Alvarado, L. Ciudad de México, México: INPRFM; 2017.
24. Diaz, D. B., Chacón, J. L., Castillo, N. L., Castillo, P. I. y Arellanez, J. L. (2013). *Estudio Básico de Comunidad Objetivo Vol. 1 y 2*. México: Centros de Integración Juvenil, A. C. Recuperado de <http://www.cij.gob.mx/ebco2013/index.html>

---

# Cuadros

---

**CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS USUARIOS DE DROGAS ILÍCITAS DE PRIMER INGRESO A TRATAMIENTO A CIJ EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2017**

**Cuadro 1. Pacientes de primer ingreso por unidad de atención (CIJ, UH y UTH)**

CIJ	General		Hombres		Mujeres		Razón H:M
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	
Álvaro Obregón Norte	54	0.5	50	0.6	4	0.2	12.5:1
Álvaro Obregón Oriente	28	0.3	24	0.3	4	0.2	6.0:1
Atizapán	79	0.8	70	0.8	9	0.5	7.8:1
Azcapotzalco	113	1.1	94	1.1	19	1.1	4.9:1
Benito Juárez	92	0.9	71	0.9	21	1.2	3.4:1
Chalco	123	1.2	107	1.3	16	0.9	6.7:1
Coyoacán	149	1.5	114	1.4	35	2.0	3.3:1
Cuajimalpa	71	0.7	59	0.7	12	0.7	4.9:1
Cuauhtémoc Oriente	111	1.1	89	1.1	22	1.2	4.0:1
Cuauhtémoc Poniente	134	1.3	99	1.2	35	2.0	2.8:1
Ecatepec	204	2.0	178	2.1	26	1.5	6.8:1
Gustavo A. Madero Aragón	213	2.1	197	2.4	16	0.9	12.3:1
Gustavo A. Madero Norte	148	1.5	127	1.5	21	1.2	6.0:1
Gustavo A. Madero Oriente	11	0.1	9	0.1	2	0.1	4.5:1
Iztapalapa Oriente	348	3.5	290	3.5	58	3.2	5.0:1
Iztapalapa Poniente	107	1.1	85	1.0	22	1.2	3.9:1
Miguel Hidalgo	80	0.8	69	0.8	11	0.6	6.3:1
Naucalpan	152	1.5	123	1.5	29	1.6	4.2:1
Nezahualcóyotl	217	2.2	191	2.3	26	1.5	7.3:1
Texcoco	98	1.0	93	1.1	5	0.3	18.6:1
Tlalnepantla	147	1.5	127	1.5	20	1.1	6.4:1
Tlalpan	166	1.6	141	1.7	25	1.4	5.6:1
Venustiano Carranza	121	1.2	100	1.2	21	1.2	4.8:1
UH Ecatepec	50	0.5	45	0.5	5	0.3	9.0:1
UH Iztapalapa	114	1.1	89	1.1	25	1.4	3.6:1
UH Naucalpan	50	0.5	46	0.6	4	0.2	11.5:1
Acapulco	97	1.0	77	0.9	20	1.1	3.9:1
Aguascalientes	193	1.9	150	1.8	43	2.4	3.5:1
Cancún	118	1.2	100	1.2	18	1.0	5.6:1
Cd. del Carmen	29	0.3	28	0.3	1	0.1	28.0:1
Cd. Juárez Norte	102	1.0	77	0.9	25	1.4	3.1:1
Cd. Victoria	32	0.3	31	0.4	1	0.1	31.0:1
Celaya	178	1.8	141	1.7	37	2.1	3.8:1
Chetumal	33	0.3	29	0.3	4	0.2	7.3:1

*(Continúa)*

**Cuadro 1. Pacientes de primer ingreso a tratamiento por unidad de atención (CIJ, UH y UTUH)**  
(Continuación)

CIJ	General		Hombres		Mujeres		Razón H:M
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	
Chihuahua	270	2.7	222	2.7	48	2.7	4.6:1
Chilpancingo	55	0.5	47	0.6	8	0.4	5.9:1
Colima	141	1.4	112	1.4	29	1.6	3.9:1
Cozumel	63	0.6	51	0.6	12	0.7	4.3:1
Cuernavaca	125	1.2	102	1.2	23	1.3	4.4:1
Culiacán	124	1.2	114	1.4	10	0.6	11.4:1
Durango	80	0.8	60	0.7	20	1.1	3.0:1
Escuinapa	46	0.5	26	0.3	20	1.1	1.3:1
Fresnillo	42	0.4	37	0.4	5	0.3	7.4:1
Guadalajara Centro	222	2.2	178	2.1	44	2.5	4.0:1
Guadalajara Sur	106	1.1	83	1.0	23	1.3	3.6:1
Guadalupe	79	0.8	66	0.8	13	0.7	5.1:1
Guamúchil	66	0.7	59	0.7	7	0.4	8.4:1
Guasave	75	0.7	65	0.8	10	0.6	6.5:1
Hermosillo	127	1.3	111	1.3	16	0.9	6.9:1
Huatulco	25	0.2	21	0.3	4	0.2	5.3:1
Ixtapa Zihuatanejo	46	0.5	32	0.4	14	0.8	2.3:1
La Paz	64	0.6	50	0.6	14	0.8	3.6:1
La Piedad	64	0.6	56	0.7	8	0.4	7.0:1
Laguna Durango	76	0.8	62	0.7	14	0.8	4.4:1
León	176	1.7	135	1.6	41	2.3	3.3:1
Los Cabos	37	0.4	30	0.4	7	0.4	4.3:1
Los Mochis	104	1.0	91	1.1	13	0.7	7.0:1
Manzanillo	30	0.3	22	0.3	8	0.4	2.8:1
Mazatlán	114	1.1	85	1.0	29	1.6	2.9:1
Mérida	56	0.6	41	0.5	15	0.8	2.7:1
Mexicali	123	1.2	101	1.2	22	1.2	4.6:1
Monterrey	140	1.4	108	1.3	32	1.8	3.4:1
Morelia	116	1.2	102	1.2	14	0.8	7.3:1
Nogales	68	0.7	50	0.6	18	1.0	2.8:1
Oaxaca	95	0.9	78	0.9	17	1.0	4.6:1
Pachuca	141	1.4	117	1.4	24	1.3	4.9:1
Playa del Carmen	40	0.4	34	0.4	6	0.3	5.7:1
Poza Rica	21	0.2	18	0.2	3	0.2	6.0:1
Puebla	60	0.6	50	0.6	10	0.6	5.0:1
Puerto Vallarta	97	1.0	75	0.9	22	1.2	3.4:1
Querétaro	96	1.0	79	1.0	17	1.0	4.6:1
Ramos Arizpe	17	0.2	13	0.2	4	0.2	3.3:1
Reynosa	23	0.2	20	0.2	3	0.2	6.7:1

(Continúa)

**Cuadro 1. Pacientes de primer ingreso a tratamiento por unidad de atención (CIJ, UH y UTUH)**  
(Continuación)

CIJ	General		Hombres		Mujeres		Razón H:M
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	
Salamanca	88	0.9	65	0.8	23	1.3	2.8:1
Saltillo	191	1.9	146	1.8	45	2.5	3.2:1
San Luis Potosí	136	1.3	110	1.3	26	1.5	4.2:1
San Nicolás de los Garza	115	1.1	92	1.1	23	1.3	4.0:1
Tampico	79	0.8	69	0.8	10	0.6	6.9:1
Tapachula	31	0.3	22	0.3	9	0.5	2.4:1
Tecomán	55	0.5	47	0.6	8	0.4	5.9:1
Tehuacán	77	0.8	62	0.7	15	0.8	4.1:1
Tepic	47	0.5	37	0.4	10	0.6	3.7:1
Tijuana Guaycura	173	1.7	139	1.7	34	1.9	4.1:1
Tijuana Soler	153	1.5	116	1.4	37	2.1	3.1:1
Tlaquepaque	179	1.8	151	1.8	28	1.6	5.4:1
Tlaxcala	58	0.6	53	0.6	5	0.3	10.6:1
Toluca	191	1.9	168	2.0	23	1.3	7.3:1
Torreón Oriente	220	2.2	173	2.1	47	2.6	3.7:1
Tuxtla Gutiérrez	59	0.6	54	0.7	5	0.3	10.8:1
Villahermosa	59	0.6	50	0.6	9	0.5	5.6:1
Xalapa	87	0.9	70	0.8	17	1.0	4.1:1
Yucatán	71	0.7	53	0.6	18	1.0	2.9:1
Zacatecas	77	0.8	63	0.8	14	0.8	4.5:1
Zamora	62	0.6	50	0.6	12	0.7	4.2:1
Zapopan Kena Moreno	5	0.0	4	0.0	1	0.1	4.0:1
Zapopan Norte	149	1.5	120	1.4	26	1.6	4.6:1
UH Cd. Juárez	24	0.2	15	0.2	9	0.5	1.7:1
UH Culiacán	22	0.2	22	0.3	0.0	0.0	--
UH Ixbalanqué	15	0.1	13	0.2	2	0.1	6.5:1
UH Nuevo León	61	0.6	48	0.6	13	0.7	3.7:1
UH Punta Diamante	29	0.3	22	0.3	7	0.4	3.1:1
UH Tijuana	49	0.5	40	0.5	9	0.5	4.4:1
UH Zapopan	42	0.4	37	0.4	5	3.0	7.4:1
UH Zapotlán el Grande	27	0.3	27	0.3	0.0	0.0	--
UTUH Cd. Juárez	13	0.1	12	0.1	1	0.1	12.0:1
UTUH Tijuana	27	0.3	23	0.3	4	0.2	5.8:1
<b>Total</b>	<b>10,083</b>	<b>100.0</b>	<b>8,296</b>	<b>100.0</b>	<b>1,787</b>	<b>100.0</b>	<b>4.6:1</b>

UH=Unidad de Hospitalización  
UTUH=Unidad de Tratamiento para Usuarios de Heroína

**Cuadro 2. Sexo**

	Frec.	%	Razón H:M
Hombres	8,296	82.3	
Mujeres	1,787	17.7	<b>4.6 : 1</b>
<b>Total</b>	<b>10,083</b>	<b>100.0</b>	

**Cuadro 3. Persona que proporciona la información**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Usuario de drogas	4,090	40.6	40.6	3,321	40.0	40.40	769	43.0	43.0
Usuario de drogas y familiares u otras personas	5,100	50.6	50.6	4,242	51.1	51.1	858	48.0	48.0
<i>Sin Información</i>	893	8.9	8.9	733	8.8	8.8	160	9.0	9.0
<b>Total</b>	<b>10,083</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>8,296</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>1,787</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

**Cuadro 4. Edad de ingreso a tratamiento**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Hasta 9 años	2	0.0	0.0	2	0.0	0.0	0	0.0	0.0
10 a 14 años	1,204	11.9	11.9	942	11.4	11.4	262	14.7	14.7
15 a 19 años	3,850	38.2	38.2	3,148	37.9	37.9	702	39.3	39.3
20 a 24 años	1,637	16.2	16.2	1,321	15.9	15.9	316	17.7	17.7
25 a 29 años	1,082	10.7	10.7	912	11.0	11.0	170	9.5	9.5
30 a 34 años	763	7.6	7.6	651	7.8	7.8	112	6.3	6.3
35 a 39 años	558	5.5	5.5	486	5.9	5.9	72	4.0	4.0
40 a 44 años	388	3.8	3.8	332	4.0	4.0	56	3.1	3.1
45 años y más	599	5.9	5.9	502	6.1	6.1	97	5.4	5.4
<b>Total</b>	<b>10,083</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>8,296</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>1,787</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
Media (DE)	23.5 (10.6) años			23.7 (10.7) años			22.6 (10.4) años		
Mediana	19 años			20 años			19 años		
Moda	16 años			17 años			15 años		
Decil1	14 años			14 años			14 años		

DE= Desviación Estándar

**Cuadro 5. Estado civil**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Soltero	7,110	70.5	70.5	5,850	70.5	70.5	1,260	70.5	70.5
Casado	955	9.5	9.5	844	10.2	10.2	111	6.2	6.2
Unión libre	1,176	11.7	11.7	962	11.6	11.6	214	12.0	12.0
Separado	650	6.4	6.4	501	6.0	6.0	149	8.3	8.3
Divorciado	154	1.5	1.5	121	1.5	1.5	33	1.8	1.8
Viudo	35	0.3	0.3	15	0.2	0.2	20	1.1	1.1
<i>Sin información</i>	3	0.0	<i>Se omite</i>	3	0.0	<i>Se omite</i>	0	0.0	<i>Se omite</i>
<b>Total</b>	<b>10,083</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>8,296</b>	<b>82.3</b>	<b>82.3</b>	<b>1,787</b>	<b>17.7</b>	<b>17.7</b>

**Cuadro 6. Escolaridad**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Ninguna (no sabe leer ni escribir)	35	0.3	0.3	29	0.3	0.3	6	0.3	0.3
Ninguna (sabe leer y escribir)	32	0.3	0.3	27	0.3	0.3	5	0.3	0.3
Primaria incompleta	285	2.8	2.8	238	2.9	2.9	47	2.6	2.6
Primaria completa	463	4.6	4.6	369	4.4	4.4	94	5.3	5.3
Secundaria incompleta	2,074	20.6	20.6	1,681	20.3	20.3	393	22.0	22.0
Secundaria completa	1,811	18.0	18.0	1,522	18.3	18.3	289	16.2	16.2
Estudios técnicos o comerciales incompletos	123	1.2	1.2	101	1.2	1.2	22	1.2	1.2
Estudios técnicos o comerciales completos	82	0.8	0.8	51	0.6	0.6	31	1.7	1.7
Bachillerato incompleto	3,202	31.8	31.8	2,674	32.2	32.2	528	29.5	29.6
Bachillerato completo	829	8.2	8.2	694	8.4	8.4	135	7.6	7.6
Estudios superiores incompletos	792	7.9	7.9	641	7.7	7.7	151	8.4	8.5
Estudios superiores completos	308	3.1	3.1	235	2.8	2.8	73	4.1	4.1
Estudios de posgrado incompletos	10	0.1	0.1	8	0.1	0.1	2	0.1	0.1
Estudios de posgrado completos	34	0.3	0.3	24	0.3	0.3	10	0.6	0.6
<i>Sin información</i>	3	0.0	<i>Se omite</i>	2	0	<i>Se omite</i>	1	0.1	<i>Se omite</i>
<b>Total</b>	<b>10,083</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>8,296</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>1,787</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

**Cuadro 7. Ocupación**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Desempleado(a)	2,256	22.4	22.4	1,842	22.2	22.2	414	23.2	23.2
Estudiante	3,270	32.4	32.4	2,624	31.6	31.6	646	36.1	36.1
Estudiante que trabaja	559	5.5	5.5	483	5.8	5.8	76	4.3	4.3
Trabaja	3,576	35.5	35.5	3,188	38.4	38.4	388	21.7	21.7
Tareas del hogar	372	3.7	3.7	116	1.4	1.4	256	14.3	14.3
Pensionado	48	0.5	0.5	41	0.5	0.5	7	0.4	0.4
<i>Sin información</i>	2	0.0	<i>Se omite</i>	2	0.0	<i>Se omite</i>	0	0.0	<i>Se omite</i>
<b>Total</b>	<b>10,083</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>8,296</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>1,787</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

**Cuadro 8. Estrato social**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Alto	30	0.3	0.3	22	0.3	0.3	8	0.4	0.4
Medio alto	420	4.2	4.2	340	4.1	4.1	80	4.5	4.5
Medio	2,022	20.1	20.1	1,661	20.0	20.0	361	20.2	20.2
Medio bajo	5,142	51.0	51.0	4,253	51.3	51.3	889	49.7	49.7
Bajo	2,394	23.7	23.8	1,964	23.7	23.7	430	24.1	24.1
Pobreza extrema o marginación	67	0.7	0.7	48	0.6	0.6	19	1.1	1.1
<i>Sin información</i>	8	0.1	<i>Se omite</i>	8	0.1	<i>Se omite</i>	0	0.0	<i>Se omite</i>
<b>Total</b>	<b>10,083</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>8,296</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>1787</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

**FACTORES ASOCIADOS A LA DEMANDA DE TRATAMIENTO EN PACIENTES DE PRIMER INGRESO A TRATAMIENTO EN CIJ EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2017**

**Cuadro 9. Motivos de consulta**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Consumo de drogas ilícitas	8,932	88.6	7,405	89.3	1,527	85.5
Consumo de bebidas alcohólicas	4,100	40.7	3,365	40.6	735	41.1
Consumo de tabaco	3,765	37.3	3,114	37.5	651	36.4
Otro motivo	441	4.4	326	3.9	115	6.4
<i>Ningún motivo específico reportado</i>	13	0.1	10	0.1	3	0.2
<i>Usuarios que reportaron dos o más motivos de consulta</i>	4,601	45.6	3,796	45.8	805	45.0

**Cuadro 10. Condicionantes de la solicitud de tratamiento**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Por propia iniciativa	4,186	41.5	3,422	41.2	764	42.8
Por condicionamiento o recomendación familiar	4,582	45.4	3,798	45.8	784	43.9
Por recomendación de pares	143	1.4	117	1.4	26	1.5
Por condicionamiento o recomendación escolar	1,812	18.0	1,515	18.3	297	16.6
Por condicionamiento legal	957	9.5	802	9.7	155	8.7
Por condicionamiento o recomendación laboral	227	2.3	218	2.6	9	0.5
Por indicación médica	963	9.6	761	9.2	202	11.3
Por solicitud de novia(o)	48	0.5	34	0.4	14	0.8
Otros condicionantes de solicitud de tratamiento	266	2.6	191	2.3	75	4.2
<i>Ningún condicionante reportado</i>	182	1.8	154	1.9	28	1.6
<i>Pacientes que reportaron dos o más condicionantes de la solicitud de tratamiento</i>	2,862	28.4	2,363	28.5	499	27.9

**Cuadro 11. Antecedentes de acciones contra el consumo de sustancias**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Juramento	690	6.8	611	7.4	79	4.4
Grupo de autoayuda	740	7.3	634	7.6	106	5.9
Internamiento en anexo	1,325	13.1	1,141	13.8	184	10.3
Intervención de emergencia	93	0.9	76	0.9	17	1.0
Programa de mantenimiento	63	0.6	56	0.7	7	0.4
Tratamiento médico no especializado	75	0.7	66	0.8	9	0.5
Tratamiento psiquiátrico o psicoterapéutico ambulatorio	649	6.4	524	6.3	125	7.0
Tratamiento psiquiátrico o psicoterapéutico residencial	220	2.2	166	2.0	54	3.0
Medicina tradicional o alternativa	51	0.5	48	0.6	3	0.2
Intento de interrupción voluntaria del consumo, sin apoyo	3,258	32.3	2,691	32.4	567	31.7
Otras acciones	2,361	23.4	1,901	22.9	460	25.7
<i>Ninguna acción previa reportada</i>	<i>2,400</i>	<i>23.8</i>	<i>1,949</i>	<i>23.5</i>	<i>451</i>	<i>25.2</i>
<i>Pacientes que reportaron dos o más acciones contra el consumo de sustancias antes de solicitar tratamiento en CIJ</i>	<i>1,329</i>	<i>13.2</i>	<i>1,116</i>	<i>13.5</i>	<i>213</i>	<i>11.9</i>

**Cuadro 12. Problemas asociados al consumo de sustancias**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Problemas de salud	4,450	44.1	3,596	43.3	854	47.8
Accidentes o lesiones	1,313	13.0	1,097	13.2	216	12.1
Problemas familiares	8,073	80.1	6,655	80.2	1,418	79.4
Problemas escolares	3,744	37.1	3,078	37.1	666	37.3
Problemas laborales	2,531	25.1	2,244	27.0	287	16.1
Problemas psicológicos	4,327	42.9	3,451	41.6	876	49.0
Problemas legales	2,052	20.4	1,806	21.8	246	13.8
Conducta antisocial o delictiva	1,479	14.7	1,261	15.2	218	12.2
Otros problemas	453	4.5	365	4.4	88	4.9
<i>Ningún problema asociado reportado</i>	<i>482</i>	<i>4.8</i>	<i>379</i>	<i>4.6</i>	<i>103</i>	<i>5.8</i>
<i>Pacientes que reportaron dos o más problemas asociados</i>	<i>7,824</i>	<i>77.6</i>	<i>6,459</i>	<i>77.9</i>	<i>1,365</i>	<i>76.4</i>

**CARACTERÍSTICAS DEL CONSUMO DE DROGAS EN PACIENTES DE PRIMER INGRESO A  
TRATAMIENTO EN CIJ EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2017**

**Cuadro 13. Edad de inicio del consumo de tabaco**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Hasta 9 años	285	2.8	3.3	244	2.9	3.4	41	2.3	2.7
10 a 14 años	4,401	43.6	51.1	3,655	44.1	51.4	746	41.7	50.0
15 a 19 años	3,440	34.1	40.0	2,838	34.2	39.9	602	33.7	40.3
20 a 24 años	331	3.3	3.8	268	3.2	3.8	63	3.5	4.2
25 a 29 años	93	0.9	1.1	75	0.9	1.1	18	1.0	1.2
30 a 34 años	30	0.3	0.3	17	0.2	0.2	13	0.7	0.9
35 a 39 años	14	0.1	0.2	10	0.1	0.1	4	0.2	0.3
40 a 44 años	12	0.1	0.1	7	0.1	0.1	5	0.3	0.3
45 años y más	4	0.0	0.0	3	0.0	0.0	1	0.1	0.1
No consumió	1,468	14.6	Se omite	1,174	14.2	Se omite	294	16.5	Se omite
Sin información	5	0.0	Se omite	5	0.1	Se omite	0	0.0	Se omite
<b>Total</b>	<b>10,083</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>8,296</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>1,787</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
Media (DE)	14.5 (3.4) años			14.5 (3.4) años			14.8 (4.0) años		
Mediana	14 años			14 años			14 años		
Moda	15 años			15 años			15 años		
Decil1	11 años			11 años			12 años		

DE= Desviación Estándar

**Cuadro 14. Edad de inicio del consumo de alcohol**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Hasta 9 años	319	3.2	3.6	278	3.4	3.8	41	2.3	2.6
10 a 14 años	3,948	39.2	44.7	3,231	38.9	44.3	717	40.1	46.1
15 a 19 años	4,182	41.5	47.3	3,479	41.9	47.7	703	39.3	45.2
20 a 24 años	309	3.1	3.5	244	2.9	3.3	65	3.6	4.2
25 a 29 años	60	0.6	0.7	44	0.5	0.6	16	0.9	1.0
30 a 34 años	17	0.2	0.2	10	0.1	0.1	7	0.4	0.5
35 a 39 años	5	0.0	0.1	1	0.0	0.0	4	0.2	0.3
40 a 44 años	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
45 años y más	2	0.0	0.0	0	0.0	0.0	2	0.1	0.1
No consumió	1,238	12.3	Se omite	1,006	12.1	Se omite	232	13.0	Se omite
Sin información	3	0.0	Se omite	3	0.0	Se omite	0	0.0	Se omite
<b>Total</b>	<b>10,083</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>8,296</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>1,787</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
Media (DE)	14.6 (3.0) años			14.6 (2.9) años			14.8 (3.6) años		
Mediana	15 años			15 años			15 años		
Moda	15 años			15 años			15 años		
Decil1	12 años			12 años			12 años		

DE= Desviación Estándar

**Cuadro 15. Edad de inicio del consumo de drogas ilícitas**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Hasta 9 años	116	1.2	1.2	107	1.3	1.3	9	0.5	0.5
10 a 14 años	4,108	40.7	40.8	3,386	40.8	40.8	722	40.4	40.4
15 a 19 años	4,456	44.2	44.2	3,742	45.1	45.1	714	40.0	40.0
20 a 24 años	724	7.2	7.2	568	6.8	6.9	156	8.7	8.7
25 a 29 años	306	3.0	3.0	229	2.8	2.8	77	4.3	4.3
30 a 34 años	143	1.4	1.4	115	1.4	1.4	28	1.6	1.6
35 a 39 años	97	1.0	1.0	70	0.8	0.8	27	1.5	1.5
40 a 44 años	50	0.5	0.5	33	0.4	0.4	17	1.0	1.0
45 años y más	76	0.8	0.8	40	0.5	0.5	36	2.0	2.0
<i>Sin información</i>	7	0.1	<i>Se omite</i>	6	0.1	<i>Se omite</i>	1	0.1	<i>Se omite</i>
<b>Total</b>	<b>10,083</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>8,296</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>1,787</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
Media (DE)	16.3 (5.7) años			16.1 (5.2) años			17.3 (7.4) años		
Mediana	15 años			15 años			15 años		
Moda	15 años			15 años			14 años		
Decil1	12 años			12 años			12 años		

DE= Desviación Estándar

**Cuadro 16. Drogas ilícitas de inicio, según menciones**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Mariguana	7,444	73.8	6,227	75.1	1,217	68.1
Hachís	7	0.1	7	0.1	0	0.0
Cocaína (Clorhidrato)	792	7.9	653	7.9	139	7.8
<i>Crack</i>	253	2.5	224	2.7	29	1.6
Otra presentación de cocaína	7	0.1	7	0.1	0	0.0
Solventes o removedores	601	6.0	483	5.8	118	6.6
Pegamentos	106	1.1	84	1.0	22	1.2
Esmaltes o pinturas	96	1.0	67	0.8	29	1.6
Otros inhalables	14	0.1	12	0.1	2	0.1
Benzodiazepinas	166	1.6	79	1.0	87	4.9
<i>Rohypnol</i> <sup>®</sup>	3	0.0	3	0.0	0	0.0
Otros depresores del SNC	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Anfetamina	76	0.8	72	0.9	4	0.2
Metanfetaminas	369	3.7	276	3.3	93	5.2
Éxtasis (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas	20	0.2	12	0.1	8	0.4
Otros estimulantes del SNC	12	0.1	9	0.1	3	0.2
LSD	15	0.1	13	0.2	2	0.1
Plantas alucinógenas y derivados	10	0.1	10	0.1	0	0.0
Otras drogas alucinógenas y disociativas	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Heroína	31	0.3	23	0.3	8	0.4
Opiáceos Sintéticos	13	0.1	5	0.1	8	0.4
Opio y otros opiáceos	6	0.1	4	0.0	2	0.1
Sustancias con utilidad médica	13	0.1	6	0.1	7	0.4
Otras sustancias de abuso	29	0.3	20	0.2	9	0.5
<b>Total</b>	<b>10,083</b>	<b>100.0</b>	<b>8,296</b>	<b>100.0</b>	<b>1,787</b>	<b>100.0</b>

**Cuadro 17. Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de tabaco y el ingreso a tratamiento a CIJ**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
< de un año	517	5.1	6.0	396	4.8	5.6	121	6.8	8.1
1 a 5 años	3,867	38.4	44.9	3,128	37.7	44.0	739	41.4	49.5
6 a 10 años	1,542	15.3	17.9	1,252	15.1	17.6	290	16.2	19.4
11 a 15 años	907	9.0	10.5	791	9.5	11.1	116	6.5	7.8
16 a 20 años	631	6.3	7.3	536	6.5	7.5	95	5.3	6.4
21 a 25 años	440	4.4	5.1	394	4.7	5.5	46	2.6	3.1
26 o más años	706	7.0	8.2	620	7.5	8.7	86	4.8	5.8
No consumió	1,468	14.6	Se omite	1,174	14.2	Se omite	294	16.5	Se omite
Sin información	5	0.0	Se omite	5	0.1	Se omite	0	0.0	Se omite
<b>Total</b>	<b>10,083</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>8,296</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>1,787</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
Media (DE)	9.3 (10.0) años			9.5 (10.2) años			7.7 (9.1) años		
Mediana	5 años			6 años			4 años		
Moda	1 año			1 año			1 año		
Decil1	1 año			1 año			1 año		

DE= Desviación Estándar

**Cuadro 18. Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de alcohol y el ingreso a tratamiento a CIJ**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
< de un año	552	5.5	6.2	433	5.2	5.9	119	6.7	7.7
1 a 5 años	3,807	37.8	43.1	3,058	36.9	42.0	749	41.9	48.2
6 a 10 años	1,656	16.4	18.7	1,358	16.4	18.6	298	16.7	19.2
11 a 15 años	949	9.4	10.7	806	9.7	11.1	143	8.0	9.2
16 a 20 años	660	6.5	7.5	561	6.8	7.7	99	5.5	6.4
21 a 25 años	480	4.8	5.4	425	5.1	5.8	55	3.1	3.5
26 o más años	738	7.3	8.3	646	7.8	8.9	92	5.1	5.9
No consumió	1,238	12.3	Se omite	1,006	12.1	Se omite	232	13.0	Se omite
Sin información	3	0.0	Se omite	3	0.0	Se omite	0	0.0	Se omite
<b>Total</b>	<b>10,083</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>8,296</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>1,787</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
Media (DE)	9.3 (9.9) años			9.6 (10.1) años			7.8 (9.0) años		
Mediana	6 años			6 años			4 años		
Moda	1 año			1 año			1 año		
Decil1	1 año			1 año			1 año		

DE= Desviación Estándar

**Cuadro 19. Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de drogas ilícitas y el ingreso a tratamiento en CIJ**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
< de un año	1,381	13.7	13.7	1,053	12.7	12.7	328	18.4	18.4
1 a 5 años	4,740	47.0	47.0	3,821	46.1	46.1	919	51.4	51.5
6 a 10 años	1,540	15.3	15.3	1,274	15.4	15.4	266	14.9	14.9
11 a 15 años	868	8.6	8.6	754	9.1	9.1	114	6.4	6.4
16 a 20 años	592	5.9	5.9	518	6.2	6.2	74	4.1	4.1
21 a 25 años	427	4.2	4.2	388	4.7	4.7	39	2.2	2.2
26 o más años	528	5.2	5.2	482	5.8	5.8	46	2.6	2.6
<i>Sin información</i>	7	0.1	<i>Se omite</i>	6	0.1	<i>Se omite</i>	1	0.1	<i>Se omite</i>
<b>Total</b>	<b>10,083</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>8,296</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>1,787</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
Media (DE)	7.2 (8.8) años			7.6 (9.1) años			5.2 (7.1) años		
Mediana	4 años			4 años			3 años		
Moda	1 año			1 año			< un año		
Decil1	< un año			< un año			< un año		

DE= Desviación Estándar

**Cuadro 20. Tipo de consumo de drogas ilícitas**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Experimental	880	8.7	8.7	697	8.4	8.4	183	10.2	10.2
Social u ocasional	1,264	12.5	12.5	1,002	12.1	12.1	262	14.7	14.7
Funcional	5,418	53.7	53.8	4,513	54.4	54.4	905	50.6	50.7
Disfuncional	2,253	22.3	22.4	1,866	22.5	22.5	387	21.7	21.7
En remisión	262	2.6	2.6	213	2.6	2.6	49	2.7	2.7
<i>Sin información</i>	6	0.1	<i>Se omite</i>	5	0.11	<i>Se omite</i>	1	0.1	<i>Se omite</i>
<b>Total</b>	<b>10,083</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>8,296</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>1,787</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

**Cuadro 21. Total de drogas consumidas alguna vez en la vida  
(Incluye alcohol o tabaco)**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
1 sustancia	462	4.6	374	4.5	88	4.9
2 sustancias	967	9.6	781	9.4	186	10.4
3 sustancias	2,735	27.1	2,260	27.2	475	26.6
4 sustancias	2,036	20.2	1,642	19.8	394	22.0
5 sustancias	1,524	15.1	1,264	15.2	260	14.5
6 sustancias	932	9.2	758	9.1	174	9.7
7 sustancias	555	5.5	466	5.6	89	5.0
8 sustancias	343	3.4	286	3.4	57	3.2
9 sustancias	227	2.3	197	2.4	30	1.7
10 sustancias	125	1.2	107	1.3	18	1.0
11-19 sustancias	177	1.8	161	1.9	16	0.9
<b>Total</b>	<b>10,083</b>	<b>100.0</b>	<b>8,296</b>	<b>100.0</b>	<b>1,787</b>	<b>100.0</b>
Media (DE)	4.4 (2.2) drogas		4.4 (2.2) drogas		4.2 (2.0) drogas	
Mediana	4 drogas		4 drogas		4 drogas	
Moda	3 drogas		3 drogas		3 drogas	
Decil1	2 drogas		2 drogas		2 drogas	

DE= Desviación Estándar

**Cuadro 22. Total de drogas ilícitas consumidas alguna vez en la vida  
(No incluye ni alcohol ni tabaco)**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
1 sustancia	3,689	36.6	3,026	36.5	663	37.1
2 sustancias	2,317	23.0	1,881	22.7	436	24.4
3 sustancias	1,647	16.3	1,364	16.4	283	15.8
4 sustancias	964	9.6	779	9.4	185	10.4
5 sustancias	572	5.7	476	5.7	96	5.4
6 sustancias	356	3.5	296	3.6	60	3.4
7 sustancias	234	2.3	204	2.5	30	1.7
8 sustancias	126	1.2	108	1.3	18	1.0
9 sustancias	80	0.8	75	0.9	5	0.3
10 sustancias	51	0.5	44	0.5	7	0.4
11-17 sustancias	47	0.5	43	0.5	4	0.2
<b>Total</b>	<b>10,083</b>	<b>100.0</b>	<b>8,296</b>	<b>100.0</b>	<b>1,787</b>	<b>100.0</b>
Media (DE)	2.6 (2.0) drogas		2.7 (2.0) drogas		2.5 (1.7) drogas	
Mediana	2 drogas		2 drogas		2 drogas	
Moda	1 droga		1 droga		1 droga	
Decil1	1 droga		1 droga		1 droga	

DE= Desviación Estándar

**Cuadro 23. Consumo de drogas alguna vez en la vida por sustancia**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
<b>Tabaco</b>	<b>8,615</b>	<b>85.4</b>	<b>7,122</b>	<b>85.8</b>	<b>1,493</b>	<b>83.5</b>
<b>Alcohol</b>	<b>8,845</b>	<b>87.7</b>	<b>7,290</b>	<b>87.9</b>	<b>1,555</b>	<b>87.0</b>
<b>Cannabis</b>	<b>8,691</b>	<b>86.2</b>	<b>7,234</b>	<b>87.2</b>	<b>1,457</b>	<b>81.5</b>
Mariguana	8,689	86.2	7,232	87.2	1,457	81.5
Hachís	611	6.1	522	6.3	89	5.0
<b>Cocaína</b>	<b>4,705</b>	<b>46.7</b>	<b>3,965</b>	<b>47.8</b>	<b>740</b>	<b>41.4</b>
Cocaína (Clorhidrato)	4,074	40.4	3,421	41.2	653	36.5
Crack	2,164	21.5	1,888	22.8	276	15.4
Otra presentación de cocaína	76	0.8	71	0.9	5	0.3
<b>Inhalables</b>	<b>2,698</b>	<b>26.8</b>	<b>2,241</b>	<b>27.0</b>	<b>457</b>	<b>25.6</b>
Solventes o removedores	2,003	19.9	1,696	20.4	307	17.2
Pegamentos	712	7.1	596	7.2	116	6.5
Esmaltes o pinturas	407	4.0	311	3.7	96	5.4
Otros inhalables	123	1.2	106	1.3	17	1.0
<b>Depresores</b>	<b>1,479</b>	<b>14.7</b>	<b>1,166</b>	<b>14.1</b>	<b>313</b>	<b>17.5</b>
Benzodiacepinas	1,442	14.3	1,133	13.7	309	17.3
Rohypnol	67	0.7	61	0.7	6	0.3
Otros depresores	12	0.1	10	0.1	2	0.1
<b>Estimulantes</b>	<b>3,542</b>	<b>35.1</b>	<b>2,861</b>	<b>34.5</b>	<b>681</b>	<b>38.1</b>
Anfetamina	222	2.2	189	2.3	33	1.8
Metanfetaminas	3,059	30.3	2,481	29.9	578	32.3
Éxtasis (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas	658	6.5	521	6.3	137	7.7
Otros estimulantes	59	0.6	48	0.6	11	0.6
<b>Drogas alucinógenas y disociativas</b>	<b>1,250</b>	<b>12.4</b>	<b>1,028</b>	<b>12.4</b>	<b>222</b>	<b>12.4</b>
LSD	995	9.9	794	9.6	201	11.2
Plantas alucinógenas y derivados	511	5.1	449	5.4	62	3.5
Otras drogas alucinógenas y disoc.	55	0.5	49	0.6	6	0.3
<b>Opiáceos</b>	<b>397</b>	<b>3.9</b>	<b>335</b>	<b>4.0</b>	<b>62</b>	<b>3.5</b>
Heroína	300	3.0	260	3.1	40	2.2
Opiáceos Sintéticos	59	0.6	43	0.5	16	0.9
Opio y otros opiáceos	73	0.7	61	0.7	12	0.7
<b>Otras sustancias de abuso</b>	<b>197</b>	<b>2.0</b>	<b>150</b>	<b>1.8</b>	<b>47</b>	<b>2.6</b>
Con utilidad médica	64	0.6	43	0.5	21	1.2
Otras sustancias de abuso	135	1.3	108	1.3	27	1.5

**Cuadro 24. Total de drogas consumidas en el último año  
(Incluye alcohol o tabaco)**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Ninguna	173	1.7	148	1.8	25	1.4
1 sustancia	842	8.4	688	8.3	154	8.6
2 sustancias	1,785	17.7	1,455	17.5	330	18.5
3 sustancias	2,968	29.4	2,464	29.7	504	28.2
4 sustancias	1,867	18.5	1,517	18.3	350	19.6
5 sustancias	1,108	11.0	919	11.1	189	10.6
6 sustancias	612	6.1	494	6.0	118	6.6
7 sustancias	300	3.0	256	3.1	44	2.5
8 sustancias	187	1.9	154	1.9	33	1.8
9 sustancias	113	1.1	92	1.1	21	1.2
10 sustancias	55	0.5	47	0.6	8	0.4
11-19 sustancias	73	0.7	62	0.7	11	0.6
<b>Total</b>	<b>10,083</b>	<b>100.0</b>	<b>8,296</b>	<b>100.0</b>	<b>1,787</b>	<b>100.0</b>
Media (DE)	3.6 (1.9) drogas		3.6 (2.0) drogas		3.6 (1.9) drogas	
Mediana	3 drogas		3 drogas		3 drogas	
Moda	3 drogas		3 drogas		3 drogas	
Decil1	1 droga		1 drogas		1 droga	

DE= Desviación Estándar

**Cuadro 25. Total de drogas ilícitas consumidas en el último año  
(No incluye ni alcohol ni tabaco)**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Ninguna	771	7.6	644	7.8	127	7.1
1 sustancia	4,346	43.1	3,586	43.2	760	42.5
2 sustancias	2,278	22.6	1,856	22.4	422	23.6
3 sustancias	1,255	12.4	1,036	12.5	219	12.3
4 sustancias	668	6.6	534	6.4	134	7.5
5 sustancias	322	3.2	271	3.3	51	2.9
6 sustancias	198	2.0	165	2.0	33	1.8
7 sustancias	114	1.1	93	1.1	21	1.2
8 sustancias	56	0.6	47	0.6	9	0.5
9 sustancias	37	0.4	33	0.4	4	0.2
10 sustancias	23	0.2	19	0.2	4	0.2
11-17 sustancias	15	0.1	12	0.1	3	0.2
<b>Total</b>	<b>10,083</b>	<b>100.0</b>	<b>8,296</b>	<b>100.0</b>	<b>1,787</b>	<b>100.0</b>
Media (DE)	2.0 (1.6) drogas		2.0 (1.7) drogas		2.0 (1.6) drogas	
Mediana	1 droga		1 droga		2 droga	
Moda	1 droga		1 droga		1 droga	
Decil1	1 droga		1 droga		1 droga	

DE= Desviación Estándar

**Cuadro 26. Consumo de drogas en los últimos 12 meses por sustancia**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
<b>Tabaco</b>	<b>7,823</b>	<b>77.6</b>	<b>6,465</b>	<b>77.9</b>	<b>1,358</b>	<b>76.0</b>
<b>Alcohol</b>	<b>8,078</b>	<b>80.1</b>	<b>6,663</b>	<b>80.3</b>	<b>1,415</b>	<b>79.2</b>
<b>Cannabis</b>	<b>7,265</b>	<b>72.1</b>	<b>6,053</b>	<b>73.0</b>	<b>1,212</b>	<b>67.8</b>
Mariguana	7,261	72.0	6,049	72.9	1212	67.8
Hachís	396	3.9	339	4.1	57	3.2
<b>Cocaína</b>	<b>3,534</b>	<b>35.0</b>	<b>2,954</b>	<b>35.6</b>	<b>580</b>	<b>32.5</b>
Cocaína (Clorhidrato)	2,835	28.1	2,347	28.3	488	27.3
Crack	1,626	16.1	1,407	17.0	219	12.3
Otra presentación de cocaína	42	0.4	38	0.5	4	0.2
<b>Inhalables</b>	<b>1,913</b>	<b>19.0</b>	<b>1,550</b>	<b>18.7</b>	<b>363</b>	<b>20.3</b>
Solventes o removedores	1,416	14.0	1,171	14.1	245	13.7
Pegamentos	455	4.5	368	4.4	87	4.9
Esmaltes o pinturas	281	2.8	208	2.5	73	4.1
Otros inhalables	61	0.6	49	0.6	12	0.7
<b>Depresores</b>	<b>1,051</b>	<b>10.4</b>	<b>810</b>	<b>9.8</b>	<b>241</b>	<b>13.5</b>
Benzodiacepinas	1,034	10.3	795	9.6	239	13.4
Rohypnol	23	0.2	21	0.3	2	0.1
Otros depresores	9	0.1	7	0.1	2	0.1
<b>Estimulantes</b>	<b>3,021</b>	<b>30.0</b>	<b>2,424</b>	<b>29.2</b>	<b>597</b>	<b>33.4</b>
Anfetamina	162	1.6	140	1.7	22	1.2
Metanfetaminas	2,661	26.4	2,138	25.8	523	29.3
Éxtasis (MDMA) y	412	4.1	318	3.8	94	5.3
Metanfetaminas alucinógenas						
Otros estimulantes	41	0.4	32	0.4	9	0.5
<b>Drogas alucinógenas y disociativas</b>	<b>784</b>	<b>7.8</b>	<b>620</b>	<b>7.5</b>	<b>164</b>	<b>9.2</b>
LSD	657	6.5	504	6.1	153	8.6
Plantas alucinógenas y derivados	250	2.5	215	2.6	35	2.0
Otras drogas alucinógenas y disoc.	25	0.2	21	0.3	4	0.2
<b>Opiáceos</b>	<b>301</b>	<b>3.0</b>	<b>249</b>	<b>3.0</b>	<b>52</b>	<b>2.9</b>
Heroína	222	2.2	188	2.3	34	1.9
Opiáceos Sintéticos	47	0.5	34	0.4	13	0.7
Opio y otros opiáceos	53	0.5	43	0.5	10	0.6
<b>Otras sustancias de abuso</b>	<b>159</b>	<b>1.6</b>	<b>118</b>	<b>1.4</b>	<b>41</b>	<b>2.3</b>
Con utilidad médica	53	0.5	36	0.4	17	1.0
Otras sustancias de abuso	107	1.1	83	1.0	24	1.3

**Cuadro 27. Droga de preferencia en los últimos 12 meses, según menciones**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Tabaco	1,083	10.7	11.0	858	10.3	10.6	225	12.6	12.8
Alcohol	1,437	14.3	14.5	1,164	14.0	14.3	273	15.3	15.6
Mariguana	4,140	41.1	41.9	3,560	42.9	43.8	580	32.5	33.1
Hachís	6	0.1	0.1	5	0.1	0.1	1	0.1	0.1
Cocaína (Clorhidrato)	394	3.9	4.0	310	3.7	3.7	84	4.7	4.8
<i>Crack</i>	592	5.9	6.0	526	6.3	6.5	66	3.7	3.8
Otra presentación de cocaína	12	0.1	0.1	9	0.1	0.1	3	0.2	0.2
Solventes o removedores	370	3.7	3.7	284	3.4	3.5	86	4.8	4.9
Pegamentos	62	0.6	0.6	48	0.6	0.6	14	0.8	0.8
Esmaltes o pinturas	42	0.4	0.4	21	0.3	0.3	21	1.2	1.2
Otros inhalables	9	0.1	0.1	5	0.1	0.1	4	0.2	0.2
Benzodiacepinas	87	0.9	0.9	46	0.6	0.6	41	2.3	2.3
<i>Rohypnol</i> <sup>®</sup>	7	0.1	0.1	4	0.0	0.0	3	0.2	0.2
Otros depresores del SNC	4	0.0	0.0	2	0.0	0.0	2	0.1	0.1
Anfetamina	54	0.5	0.5	50	0.6	0.6	4	0.2	0.2
Metanfetaminas	1,219	12.1	12.3	950	11.5	11.7	269	15.1	15.3
Éxtasis (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas	13	0.1	0.1	9	0.1	0.1	4	0.2	0.2
Otros estimulantes del SNC	12	0.1	0.1	10	0.1	0.1	2	0.1	0.1
LSD	28	0.3	0.3	21	0.3	0.3	7	0.4	0.4
Plantas alucinógenas y derivados	3	0.0	0.0	3	0.0	0.0	0	0.0	0.0
Otras drogas alucinógenas y disociativas	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0
Heroína	150	1.5	1.5	129	1.6	1.6	21	1.2	1.2
Opiáceos Sintéticos	18	0.2	0.2	10	0.1	0.1	8	0.4	0.5
Opio y otros opiáceos	10	0.1	0.1	8	0.1	0.1	2	0.1	0.1
Sustancias con utilidad médica	11	0.1	0.1	5	0.1	0.1	6	0.3	0.3
Otras sustancias de abuso	13	0.1	0.1	9	0.1	0.1	4	0.2	0.2
Ninguna	107	1.1	1.1	83	1.0	1.0	24	1.3	1.4
<i>No consumió en el último año</i>	173	1.7	<i>Se omite</i>	148	1.8	<i>Se omite</i>	25	1.4	<i>Se omite</i>
<i>Sin Información</i>	26	0.3	<i>Se omite</i>	18	0.2	<i>Se omite</i>	8	0.4	<i>Se omite</i>
<b>Total</b>	<b>10,083</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>8,296</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>1,787</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

**Cuadro 28. Droga de mayor impacto en los últimos 12 meses, según menciones**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Tabaco	591	5.9	6.0	467	5.6	5.7	124	6.9	7.1
Alcohol	1,233	12.2	12.5	990	11.9	12.2	243	13.6	13.8
Mariguana	3,687	36.6	37.3	3,164	38.1	38.9	523	29.3	29.8
Hachís	11	0.1	0.1	8	0.1	0.1	3	0.2	0.2
Cocaína (Clorhidrato)	516	5.1	5.2	409	4.9	5.0	107	6.0	6.1
<i>Crack</i>	766	7.6	7.7	684	8.2	8.4	82	4.6	4.7
Otra presentación de cocaína	14	0.1	0.1	11	0.1	0.1	3	0.2	0.2
Solventes o removedores	472	4.7	4.8	370	4.5	4.6	102	5.7	5.8
Pegamentos	86	0.9	0.9	68	0.8	0.8	18	1.0	1.0
Esmaltes o pinturas	69	0.7	0.7	41	0.5	0.5	28	1.6	1.6
Otros inhalables	16	0.2	0.2	12	0.1	0.1	4	0.2	0.2
Benzodiacepinas	131	1.3	1.3	74	0.9	0.9	57	3.2	3.2
<i>Rohypnol</i> <sup>®</sup>	6	0.1	0.1	3	0.0	0.0	3	0.2	0.2
Otros depresores del SNC	7	0.1	0.1	5	0.1	0.1	2	0.1	0.1
Anfetamina	68	0.7	0.7	63	0.8	0.8	5	0.3	0.3
Metanfetaminas	1,802	17.9	18.2	1,430	17.2	17.6	372	20.8	21.2
Éxtasis (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas	26	0.3	0.3	19	0.2	0.2	7	0.4	0.4
Otros estimulantes del SNC	13	0.1	0.1	12	0.1	0.1	1	0.1	0.1
LSD	59	0.6	0.6	50	0.6	0.6	9	0.5	0.5
Plantas alucinógenas y derivados	12	0.1	0.1	11	0.1	0.1	1	0.1	0.1
Otras drogas alucinógenas y disociativas	3	0.1	0.0	3	0.0	0.0	0	0.0	0.0
Heroína	155	1.5	1.6	133	1.6	1.6	22	1.2	1.3
Opiáceos Sintéticos	23	0.2	0.2	15	0.2	0.2	8	0.4	0.5
Opio y otros opiáceos	10	0.1	0.1	8	0.1	0.1	2	0.1	0.1
Sustancias con utilidad médica	17	0.2	0.2	9	0.1	0.1	8	0.4	0.5
Otras sustancias de abuso	17	0.2	0.2	12	0.1	0.1	5	0.3	0.3
Ninguna	76	0.8	0.8	60	0.7	0.7	16	0.9	0.9
<i>No consumió en el último año</i>	173	1.7	<i>Se omite</i>	148	1.8	<i>Se omite</i>	25	1.4	<i>Se omite</i>
<i>Sin Información</i>	24	0.2	<i>Se omite</i>	17	0.2	<i>Se omite</i>	7	0.4	<i>Se omite</i>
<b>Total</b>	<b>10,083</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>8,296</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>1,787</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

**Cuadro 29. Uso combinado de drogas en los últimos 12 meses  
(No incluye tabaco)**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Si combinó drogas	3,802	37.7	46.8	3,166	38.2	47.3	636	35.6	44.3
No combinó drogas	4,327	42.9	53.2	3,526	42.5	52.7	801	44.8	55.7
<i>No aplica</i>	<i>1,954</i>	<i>19.4</i>	<i>Se omite</i>	<i>1,604</i>	<i>19.3</i>	<i>Se omite</i>	<i>350</i>	<i>19.6</i>	<i>Se omite</i>
<b>Total</b>	<b>10,083</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>8,296</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>1,787</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

**Cuadro 30. Total de drogas consumidas en los últimos 30 días  
(Incluye alcohol o tabaco)**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Ninguna	872	8.6	667	8.0	205	11.5
1 sustancia	2,173	21.6	1,761	21.2	412	23.1
2 sustancias	2,821	28.0	2,327	28.0	494	27.6
3 sustancias	2,524	25.0	2,126	25.6	398	22.3
4 sustancias	1,086	10.8	927	11.2	159	8.9
5 sustancias	396	3.9	327	3.9	69	3.9
6 sustancias	144	1.4	109	1.3	35	2.0
7 sustancias	47	0.5	36	0.4	11	0.6
8 sustancias	13	0.1	10	0.1	3	0.2
9 sustancias	3	0.0	3	0.0	0	0.0
10 -12 sustancias	4	0.0	3	0.0	1	0.1
<b>Total</b>	<b>10,083</b>	<b>100.0</b>	<b>8,296</b>	<b>100.0</b>	<b>1,787</b>	<b>100.0</b>
Media (DE)	2.3 (1.4) drogas		2.3 (1.4) drogas		2.2 (1.5) drogas	
Mediana	2 drogas		2 drogas		2 drogas	
Moda	2 drogas		2 drogas		2 drogas	
Decil1	1 droga		1 droga		Ninguna	

DE= Desviación Estándar

**Cuadro 31. Total de drogas ilícitas consumidas en los últimos 30 días  
(No incluye ni alcohol ni tabaco)**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Ninguna	2,763	27.4	2,197	26.5	566	31.7
1 sustancia	4,854	48.1	4,042	48.7	812	45.4
2 sustancias	1,667	16.5	1,414	17.0	253	14.2
3 sustancias	539	5.3	444	5.4	95	5.3
4 sustancias	179	1.8	138	1.7	41	2.3
5 sustancias	58	0.6	42	0.5	16	0.9
6 sustancias	15	0.1	13	0.2	2	0.1
7 sustancias	4	0.0	3	0.0	1	0.1
8 sustancias	3	0.0	2	0.0	1	0.1
10 sustancias	1	0.0	1	0.0	0	0.0
<b>Total</b>	<b>10,083</b>	<b>100.0</b>	<b>8,296</b>	<b>100.0</b>	<b>1,787</b>	<b>100.0</b>
Media (DE)	1.1 (1.0) droga		1.1 (1.0) droga		1.0 (1.0) droga	
Mediana	1 droga		1 droga		1 drogas	
Moda	1 droga		1 droga		1 drogas	
Decil1	Ninguna		Ninguna		Ninguna	

DE= Desviación Estándar

**Cuadro 32. Consumo de drogas en los últimos 30 días por sustancia**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
<b>Tabaco</b>	<b>6,466</b>	<b>64.1</b>	<b>5,387</b>	<b>64.9</b>	<b>1,079</b>	<b>60.4</b>
<b>Alcohol</b>	<b>5,648</b>	<b>56.0</b>	<b>4,705</b>	<b>56.7</b>	<b>943</b>	<b>52.8</b>
<b>Cannabis</b>	<b>5,051</b>	<b>50.1</b>	<b>4,296</b>	<b>51.8</b>	<b>755</b>	<b>42.2</b>
Mariguana	5,048	50.1	4,293	51.7	755	42.2
Hachís	97	1.0	83	1.0	14	0.8
<b>Cocaína</b>	<b>1,827</b>	<b>18.1</b>	<b>1,554</b>	<b>18.7</b>	<b>273</b>	<b>15.3</b>
Cocaína (Clorhidrato)	1,140	11.3	941	11.3	199	11.1
<i>Crack</i>	945	9.4	835	10.1	110	6.2
Otra presentación de cocaína	12	0.1	10	0.1	2	0.1
<b>Inhalables</b>	<b>953</b>	<b>9.5</b>	<b>767</b>	<b>9.2</b>	<b>186</b>	<b>10.4</b>
Solventes o removedores	713	7.1	600	7.2	113	6.3
Pegamentos	185	1.8	142	1.7	43	2.4
Esmaltes o pinturas	114	1.1	73	0.9	41	2.3
Otros inhalables	13	0.1	10	0.1	3	0.2
<b>Depresores</b>	<b>489</b>	<b>4.8</b>	<b>350</b>	<b>4.2</b>	<b>139</b>	<b>7.8</b>
Benzodiazepinas	481	4.8	343	4.1	138	7.7
<i>Rohypnol</i>	8	0.1	7	0.1	1	0.1
Otros depresores	4	0.0	3	0.0	1	0.1
<b>Estimulantes</b>	<b>1,741</b>	<b>17.3</b>	<b>1,396</b>	<b>16.8</b>	<b>345</b>	<b>19.3</b>
Anfetamina	34	0.3	30	0.4	4	0.2
Metanfetaminas	1,641	16.3	1,320	15.9	321	18.0
<i>Éxtasis</i> (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas	88	0.9	61	0.7	27	1.5
Otros estimulantes	15	0.1	11	0.1	4	0.2
<b>Drogas alucinógenas y disociativas</b>	<b>150</b>	<b>1.5</b>	<b>113</b>	<b>1.4</b>	<b>37</b>	<b>2.1</b>
LSD	129	1.3	97	1.2	32	1.8
Plantas alucinógenas y derivados	23	0.2	18	0.2	5	0.3
Otras drogas alucinógenas y disoc.	2	0.0	1	0.0	1	0.1
<b>Opiáceos</b>	<b>189</b>	<b>1.9</b>	<b>156</b>	<b>1.9</b>	<b>33</b>	<b>1.8</b>
Heroína	149	1.5	129	1.6	20	1.1
Opiáceos Sintéticos	27	0.3	18	0.2	9	0.5
Opio y otros opiáceos	16	0.2	9	0.1	7	0.4
<b>Otras sustancias de abuso</b>	<b>78</b>	<b>0.8</b>	<b>54</b>	<b>0.7</b>	<b>24</b>	<b>1.3</b>
Con utilidad médica	31	0.3	19	0.2	12	0.7
Otras sustancias de abuso	48	0.5	36	0.4	12	0.7

**Cuadro 33. Frecuencia de episodios de abuso del consumo de tabaco<sup>1</sup> en los últimos 30 días**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Sin consumo abusivo	1,944	19.3	30.5	1,616	19.5	30.4	328	18.4	31.1
< de 1 vez a la semana	740	7.3	11.6	639	7.7	12.0	101	5.7	9.6
1 o 2 veces a la semana	720	7.1	11.3	596	7.2	11.2	124	6.9	11.7
Cada tercer día	496	4.9	7.8	406	4.9	7.6	90	5.0	8.5
Diario	2,471	24.5	38.8	2,058	24.8	38.7	413	23.1	39.1
No consumió en los últimos 30 días	3,617	35.9	Se omite	2,909	35.1	Se omite	708	39.6	Se omite
Sin información	95	0.9	Se omite	72	0.9	Se omite	23	1.3	Se omite
<b>Total</b>	<b>10,083</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>8,296</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>1,787</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

<sup>1</sup> Consumo de seis o más cigarrillos en un solo día.

**Cuadro 34. Frecuencia de episodios de abuso del consumo de alcohol<sup>1</sup> en los últimos 30 días**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Sin consumo abusivo	958	9.5	17.2	771	9.3	16.6	187	10.5	20.3
< de 1 vez a la semana	1,957	19.4	35.2	1,639	19.8	35.3	318	17.8	34.6
1 o 2 veces a la semana	1,769	17.5	31.8	1,481	17.9	31.9	288	16.1	31.3
Cada tercer día	475	4.7	8.5	393	4.7	8.5	82	4.6	8.9
Diario	400	4.0	7.2	355	4.3	7.7	45	2.5	4.9
No consumió en los últimos 30 días	4,435	44.0	Se omite	3,591	43.3	Se omite	844	47.2	Se omite
Sin información	89	0.9	Se omite	66	0.8	Se omite	23	1.3	Se omite
<b>Total</b>	<b>10,083</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>8,296</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>1,787</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

<sup>1</sup> Consumo de más de cuatro copas en un día para los hombres y de más de tres copas en un día para las mujeres.

**Cuadro 35. Frecuencia de episodios de abuso del consumo de drogas ilícitas<sup>1</sup> en los últimos 30 días**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
< de 1 vez a la semana	1,275	12.6	20.9	1,010	12.2	19.7	265	14.8	26.8
1 o 2 veces a la semana	1,251	12.4	20.5	1,046	12.6	20.4	205	11.5	20.7
Cada tercer día	993	9.8	16.3	867	10.5	16.9	126	7.1	12.7
Diario	2,591	25.7	42.4	2,197	26.5	42.9	394	22.0	39.8
No consumió en los últimos 30 días	2,763	27.4	Se omite	2,197	26.5	Se omite	566	31.7	Se omite
Sin información	1,210	12.0	Se omite	979	11.8	Se omite	231	12.9	Se omite
<b>Total</b>	<b>10,083</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>8,296</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>1,787</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

<sup>1</sup> Consumo de cualquier dosis.

## GLOSARIO

<b>Droga ilícita de inicio</b>	Es la sustancia ilegal que el usuario refirió como la droga con la cual inicio el consumo de drogas. No incluye el inicio del consumo con alcohol o tabaco.
<b>Droga de mayor impacto en los últimos 12 meses</b>	Sustancia por la que acuden los pacientes a tratamiento, a cuyo consumo los pacientes atribuyen problemas personales, de salud, familiares, escolares, laborales o sociales, en el transcurso del último año.
<b>Droga de preferencia en los últimos 12 meses</b>	Sustancia que el propio usuario solicitante de tratamiento ha elegido o preferido consumir en el transcurso del último año.
<b>Estrato social</b>	Estimación que hace el terapeuta, según su percepción, del estrato al que pertenece el usuario de drogas, considerando aspectos como lugar de residencia, escolaridad, empleo y características manifiestas como higiene y aliño, calidad del vestido, expresión verbal y vocabulario, etc.
<b>Tipo de consumo de drogas ilícitas</b>	Características de consumo de sustancias ilegales según motivo, frecuencia y problemas asociados. No incluye el uso de alcohol y/o tabaco y se clasifica como: experimental, social u ocasional, funcional, disfuncional y en remisión.
<b>Total de drogas consumidas</b>	Número de drogas consumidas (se incluyen las 26 sustancias de seguimiento) en las siguientes categorías: alguna vez en la vida, en el último año y en los últimos 30 días.
<b>Uso combinado de drogas en los últimos 12 meses</b>	Consumo de dos o más sustancias (incluyendo alcohol y cualquier droga ilícita o de uso médico, utilizada sin prescripción, pero excluyendo tabaco) en el transcurso de un mismo día, en el año previo a la solicitud de tratamiento en CIJ.