

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



**Centros de
Integración
Juvenil, A.C.**

**SISTEMA DE INFORMACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DEL
CONSUMO DE DROGAS**

**CONSUMO DE DROGAS EN SOLICITANTES
DE TRATAMIENTO EN CENTROS DE
INTEGRACIÓN JUVENIL**

DROGAS ILÍCITAS

PRIMER SEMESTRE DE 2018

Marina Velázquez Altamirano

Alma Delia Gutiérrez López

Dirección de Investigación y Enseñanza

Subdirección de Investigación

México, Septiembre del 2018

SIECD

Informe de Investigación 18-06a



DIRECTORIO

PRESIDENTE DEL PATRONATO NACIONAL

Dr. Roberto Tapia Conyer

FUNDADORA DE CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL, A.C. Y VICEPRESIDENTA VITALICIA DEL PATRONATO NACIONAL

Sra. Kena Moreno

DIRECTORA GENERAL

Mtra. Carmen Fernández Cáceres

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE OPERACIÓN Y PATRONATOS

Dr. José Ángel Prado García

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE NORMATIVIDAD

Dr. Ricardo Sánchez Huesca

DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA

Mtro. David Bruno Díaz Negrete

SUBDIRECTORA DE INVESTIGACIÓN

Dra. Solveig Eréndira Rodríguez Kuri

JEFE DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA Y EPIDEMIOLÓGICA

Dr. Valeriano Raúl García Aurrecoechea

CONTENIDO	PÁG.
RESUMEN	4
ANTECEDENTES	5
MÉTODO	6
RESULTADOS	8
CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS	8
FACTORES ASOCIADOS A LA DEMANDA DE TRATAMIENTO	11
CONSUMO DE DROGAS	14
REFERENCIAS	24
CUADROS	28
GLOSARIO	52

ÍNDICE DE CUADROS		PÁG.
Cuadro 1	Pacientes de primer ingreso a tratamiento por unidad de atención (CIJ, UH y UTUH)	30
Cuadro 2	Sexo	33
Cuadro 3	Persona que proporciona la información	33
Cuadro 4	Edad de ingreso a tratamiento	33
Cuadro 5	Estado civil	34
Cuadro 6	Escolaridad	34
Cuadro 7	Ocupación	35
Cuadro 8	Estrato social	35
Cuadro 9	Motivos de consulta	36
Cuadro 10	Condicionantes de la solicitud de tratamiento	36
Cuadro 11	Antecedentes de acciones contra el consumo de sustancias	37
Cuadro 12	Problemas asociados al consumo de sustancias	37
Cuadro 13	Edad de inicio del consumo de tabaco	38
Cuadro 14	Edad de inicio del consumo de alcohol	38
Cuadro 15	Edad de inicio del consumo de drogas ilícitas	39
Cuadro 16	Drogas ilícitas de inicio según menciones	40
Cuadro 17	Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de tabaco y el ingreso a tratamiento a CIJ	41
Cuadro 18	Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de alcohol y el ingreso a tratamiento a CIJ	41
Cuadro 19	Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de drogas ilícitas y el ingreso a tratamiento a CIJ	42
Cuadro 20	Tipo de consumo de drogas ilícitas	42
Cuadro 21	Total de drogas consumidas alguna vez en la vida (incluye alcohol o tabaco)	43
Cuadro 22	Total de drogas ilícitas consumidas alguna vez en la vida (no incluye ni alcohol ni tabaco)	43
Cuadro 23	Consumo de drogas alguna vez en la vida por sustancia	44
Cuadro 24	Total de drogas consumidas en el último año (incluye alcohol o tabaco)	45
Cuadro 25	Total de drogas ilícitas consumidas en el último año (no incluye ni alcohol ni tabaco)	45
Cuadro 26	Consumo de drogas en los últimos 12 meses por sustancia	46
Cuadro 27	Droga de preferencia en los últimos 12 meses, según menciones	47
Cuadro 28	Droga de mayor impacto en los últimos 12 meses, según menciones	48
Cuadro 29	Uso combinado de drogas en los últimos 12 meses (no incluye tabaco)	49
Cuadro 30	Total de drogas consumidas en los últimos 30 días (incluye alcohol o tabaco)	49
Cuadro 31	Total de drogas ilícitas consumidas en los últimos 30 días (no incluye ni alcohol ni tabaco)	50
Cuadro 32	Consumo de drogas en los últimos 30 días por sustancia	51
Cuadro 33	Frecuencia de episodios de abuso del consumo de Tabaco en los últimos 30 días	52
Cuadro 34	Frecuencia de episodios de abuso del consumo de Alcohol en los últimos 30 días	52
Cuadro 35	Frecuencia de episodios de abuso del consumo de drogas ilícitas en los últimos 30 días	52

RESUMEN

El presente informe se realizó con base en 11,352 registros clínicos de la entrevista inicial realizada a personas que acudieron por primera vez a solicitar tratamiento por el consumo de drogas a Centros de Integración Juvenil (CIJ) entre enero y junio de 2018. Los objetivos del estudio son: a) actualizar información de los solicitantes de tratamiento en cuanto al perfil sociodemográfico, factores asociados a la demanda de tratamiento y patrón de consumo de sustancias; b) contribuir al desarrollo, diseño y ajuste de los servicios institucionales de prevención y tratamiento del consumo de drogas c) contribuir con los sistemas nacionales de información del consumo de drogas y d) generar información que oriente el desarrollo de estudios sobre el uso de tabaco, alcohol y otras sustancias en México.

Los datos que se presentan revelan que el uso de drogas ilícitas sigue siendo un problema que afecta mayormente a la población masculina, en una proporción de 4.4 hombres por cada mujer. La edad media de ingreso a tratamiento fue de 23.3 años. En promedio, los hombres ingresaron a tratamiento a mayor edad que las mujeres (23.6 y 22.1 años, respectivamente). La edad promedio del inicio del consumo de tabaco fue a los 14.5 años, la del alcohol a los 14.6 años y la de drogas ilícitas a los 16.1 años. La edad de inicio del consumo de sustancias no presenta diferencias importantes por sexo en cuanto a tabaco y alcohol. Sin embargo, el consumo de drogas ilícitas se presentó de manera más temprana entre los hombres (16.0 años), en comparación con las mujeres (17.0 años.)

Las drogas de mayor consumo alguna vez en la vida fueron: alcohol (87.4%), *cannabis* (87.1%), tabaco (85.2%), cocaína/*crack* (46.7%), estimulantes (35.6%, principalmente metanfetaminas: 31.3% y *éxtasis*: 6.3%); inhalables (24.8%), depresores (14.1%), drogas alucinógenas y disociativas (12.4%) y opiáceos (4.2%, principalmente heroína: 2.6%). Las sustancias más utilizadas el mes previo al ingreso a tratamiento fueron: tabaco (61.3%), alcohol (56.2%), *cannabis* (49.9%), cocaína/*crack* (17.3%), estimulantes (17.3%) e inhalables (8.1%). Las sustancias reportadas como de mayor impacto fueron: marihuana (38.0%), metanfetaminas (18.5%), alcohol (12.8%), *crack* (7.6%), tabaco (6.1%), cocaína (5.2%) e inhalables (5.7%).

En cuanto a los factores asociados a la demanda de tratamiento se observó que los consultantes acudieron principalmente por recomendación de la familia (45.3%) o por iniciativa propia (41.4%); que solicitaron atención debido a su consumo de drogas ilícitas (88.7%), alcohol (42.8%) o tabaco (38.1%). Previo a su ingreso a tratamiento en CIJ, 31.8% de los solicitantes intentaron interrumpir de manera voluntaria y sin apoyo el uso de sustancias, mientras que 24.0% no habían realizado alguna acción para dejar el consumo. Los problemas asociados al consumo de drogas reportados con mayor frecuencia fueron los del ámbito familiar (80.0%), de salud (44.3%), psicológicos (43.6%) y escolares (38.7%).

ANTECEDENTES

Centros de Integración Juvenil (CIJ) reporta información epidemiológica del consumo de drogas de los solicitantes de tratamiento desde 1976¹. En 1983 inicia la aplicación de una cédula homogénea a los pacientes de nuevo ingreso². Sin embargo, es a partir de 1990 que la recolección de datos se realiza de forma sistemática³. Posteriormente, se implementa el *Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas* (SIECD), el cual se ha consolidado a través de los años y realiza el seguimiento oportuno de un conjunto de variables que contribuyen en la toma de decisiones de los servicios institucionales. Además, ofrece un panorama sobre la forma y tendencias del uso de drogas y aporta información a los sistemas epidemiológicos de las adicciones en el país, a saber: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA)⁴ de la Secretaría de Salud, Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas (SRID) –perteneciente al Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz” (INPRF)⁵– y el Observatorio Epidemiológico en Drogas de la Secretaría Salud⁶.

El SIECD ha apoyado en el desarrollo de diferentes estudios epidemiológicos especializados, incluyendo el perfil de usuarios de drogas y su trayectoria de consumo⁷, uso de drogas en mujeres⁸, población infantil⁹ o de acuerdo con las etapas de la vida¹⁰ y estudios de tendencias^{11,12,13,14}. Esta información permite enfrentar de manera oportuna las problemáticas generadas por el creciente consumo de estimulantes, al mismo tiempo que sustenta el diseño de estudios sobre características particulares de los consumidores de estos alcaloides^{15,16}.

La información reportada a través del sistema ha permitido el desarrollo de estudios epidemiológicos particulares enfocados en profundizar en las características del consumo de drogas legales de pacientes atendidos. Así, desde el 2006, el SIECD genera un informe de las características de los pacientes consumidores de tabaco y alcohol¹⁷, con lo cual se ha logrado identificar una emergencia epidemiológica del consumo de alcohol entre las mujeres atendidas con relación a los años anteriores¹⁸; suceso que ha dado pie a CIJ para profundizar en esta problemática¹⁹ y que ha sido reportado por la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT), sobre todo para el caso de las mujeres jóvenes²⁰.

Cabe destacar que la información generada por el SIECD durante el lapso de más de dos décadas ha sido consistente con la información de otras encuestas nacionales^{21,22,23} y también ha sido referente para el desarrollo de metodologías de

investigación en variados estudios clínicos, psicosociales y evaluativos de la Institución, como es el caso de diversos *Estudios de la Comunidad Objetivo (EBCO)*²⁴ realizados por los CIJ a lo largo del país.

El presente informe se elaboró con base en información obtenida por el SIECD durante el primer semestre del 2018 y tiene el objetivo de proporcionar datos actualizados sobre las características sociodemográficas, factores asociados a la demanda de tratamiento y patrón de consumo de drogas de los solicitantes de tratamiento, de manera que se aporten elementos para apoyar el diseño, planeación y ajuste de los programas institucionales de prevención, tratamiento y rehabilitación, además de colaborar con otros sistemas de información en drogas y de aportar elementos para el diseño y elaboración de investigaciones en el campo de las adicciones.

MÉTODO

Diseño del estudio: Censo epidemiológico descriptivo semestral.

Población: 11,352 usuarios de drogas ilícitas procedentes de 106 unidades de CIJ, que acudieron por primera vez a consulta entre enero y junio de 2018 (cuadro 1. Anexo).

Fuente de información: Formato de Entrevista Inicial aplicado en la primera consulta por parte del personal médico-técnico responsable del ingreso de pacientes a tratamiento, que forma parte del expediente clínico en cualquiera de sus dos versiones: formato electrónico (base de datos recuperada el día 19 de julio de 2018 a las 9:50 hrs., con 11,294 registros capturados por los/as terapeutas responsables de realizar la entrevista inicial) o formato impreso (58 registros capturados por personal del departamento de Investigación Clínica y Epidemiológica mediante el programa *Control de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas* desarrollado por CIJ).

Variables de estudio: Las características sociodemográficas estudiadas comprenden: persona que proporciona la información, sexo, edad de ingreso a tratamiento, estado civil, escolaridad, ocupación y estrato social; las variables de factores asociados a la demanda de tratamiento incluyen: motivo(s) de consulta, condicionante(s) de la solicitud de tratamiento, antecedente(s) de acciones tomadas frente al uso de sustancias y problema(s) asociado(s) al mismo; y las variables de patrón de consumo: edad de inicio, tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de sustancias y el ingreso a tratamiento, consumo alguna vez en la vida, en el último año y en los últimos 30 días; drogas de preferencia y de mayor impacto en el último año (estas dos últimas variables

de acuerdo con el punto de vista del paciente), uso combinado de sustancias, tipo de consumo de drogas ilícitas, episodios de abuso y total de drogas consumidas.

La información sobre el consumo de drogas se presenta agrupada en 26 categorías de drogas y en algunos casos (consumo alguna vez en la vida, en el último año y en el último mes) se proporciona además información concentrada en diez grupos:

Grupo de Sustancias	Drogas en seguimiento
Tabaco	Cigarrillos
Alcohol	Bebidas alcohólicas
<i>Cannabis</i>	Mariguana y hachís
Cocaína	Cocaína, <i>crack</i> y otra presentación de cocaína
Inhalables	Solventes y removedores, pegamentos, esmaltes y pinturas y otros inhalables
Depresores	Benzodiacepinas, <i>Rohypnol</i> y otros depresores
Estimulantes	Anfetaminas, metanfetaminas (<i>crystal</i> o <i>ICE</i>), MDMA (<i>éxtasis</i>) y metanfetaminas alucinógenas; y otros estimulantes
Drogas alucinógenas y disociativas	Ácido lisérgico (LSD), plantas alucinógenas y derivados y otros alucinógenos (PCP y ketamina)
Opiáceos	Heroína, Opioides sintéticos y opio, y otros opioides
Otras sustancias de abuso	Sustancias con utilidad médica y otras sustancias no identificadas

Procesamiento de datos. Para el procesamiento estadístico de la información se utilizó el programa SPSS v.20.

Los resultados se presentan tanto en forma general como desglosada por sexo y en porcentajes válidos, excluyendo los casos “*sin información*” y aquellos que no cumplieron con las condiciones requeridas para el análisis en cada variable de estudio.

RESULTADOS



CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS^a

Sexo. La población se conformó por 9,263 hombres y 2,089 mujeres, lo cual representa 81.6% y 18.4%, respectivamente. Es decir, cuatro hombres solicitan tratamiento en CIJ por cada mujer.

Persona que proporciona la información. 51.1% de los casos acudieron en compañía de familiares u otras personas, sin grandes diferencias entre hombres (51.5%) y mujeres (49.1%).

Edad de ingreso a tratamiento. Se observa un rango de edad de 7 a 81 años, con un promedio de 23.3 años (DE= 10.7 años); es decir, 9,651 de los usuarios de drogas tenía entre los 12 y 34 años de edad (alrededor del 85% de las personas atendidas); la edad mediana de la población fue de 19 años (41.7% de los casos fueron menores de edad; 4,732 sujetos), mientras que la moda se ubicó en 16 años (1,113 casos atendidos).


Figura 1. Edad de ingreso según sexo

	 Años	 Años	Las mujeres ingresaron a tratamiento a menor edad (en promedio, un año antes que los hombres).
Rango	7 a 76	11 a 81	
Promedio (Desviación estándar)	23.6 (10.8)	22.1 (10.1)	
Mediana	19	18	
Moda	16	17	
Decil₁	14	14	

^a Cfr., Cuadros 1 a 8.


Estado civil. La mayor parte de la población refirió ser soltera (71.3%), mientras que 12.0% indicó que vivía en unión libre y 9.3% estaba casada.

Figura 2. Estado civil según sexo




Escolaridad. En términos generales, 38.0% había cursado algún grado de bachillerato, 41.8% al menos algún grado de educación secundaria, 10.4% tenía estudios superiores y 7.0% sólo había cursado la primaria.

Figura 3. Escolaridad según sexo



Ocupación. 34.9% desempeñaba alguna actividad laboral, 33.7% reportó ser estudiante y 21.8% estaba desempleado.


Figura 4. Principal ocupación según sexo



Estrato social. De acuerdo con la percepción de los terapeutas, la mitad de los pacientes (50.0%) se ubicaban en el estrato medio bajo, 23.7% en un nivel bajo y 21.6% fue clasificado en el estrato medio.

Figura 5. Estrato social según sexo


Según la percepción de los terapeutas, tanto hombres como mujeres presentaron condiciones sociales similares, predominando el estrato medio bajo.



FACTORES ASOCIADOS A LA DEMANDA DE TRATAMIENTO^b


Motivos de consulta. 46.7% de las personas atendidas reportaron más de un motivo para acudir a tratamiento (uso de alcohol, tabaco o drogas), mientras que 0.1% no expresó ninguno. 88.7% de los pacientes acudió por consumo de drogas ilícitas, 42.8% por uso de bebidas alcohólicas y 38.1% por uso de tabaco.

Figura 6. Motivos de consulta según sexo



Condicionantes de la solicitud de tratamiento. 28.5% de los casos expresó dos o más condicionantes para acudir a tratamiento; 45.3% acudió por recomendación de la familia, 41.4% por iniciativa propia, 19.4% por condicionamiento o recomendación escolar, 9.1 % por condicionamiento legal y 8.9% por indicación médica.


Figura 7. Condicionantes de la solicitud de tratamiento según sexo



^b Cfr. Cuadros 9 a 12.

Antecedentes de acciones contra el consumo de sustancias. 31.8% de los pacientes expresó que antes de acudir a CIJ había intentado interrumpir voluntariamente el consumo sin otro tipo de apoyo, 12.3% señaló que había estado internado en algún anexo, 7.8% había acudido a algún grupo de autoayuda, 7.1% lo había hecho a través de juramento y el 6.7% con tratamiento psiquiátrico o psicoterapéutico de tipo ambulatorio. Cabe señalar que 13.5% reportó haber intentado al menos dos formas distintas de acciones para abandonar el consumo de drogas, en tanto que 24.0% expresó que hasta el momento de la solicitud de tratamiento no había tomado ninguna medida en contra del consumo de drogas.


Figura 8. Antecedentes de acciones contra el consumo de sustancias según sexo



Mayor porcentaje de mujeres ingresaron a CIJ sin haber realizado acciones previas para dejar el consumo de drogas, mientras que los hombres en mayor proporción que las mujeres intentaron dejarlo de manera voluntaria, se internaron en algún anexo, participaron en grupos de autoayuda o por medio de juramento.

Problemas asociados al consumo de sustancias. 80.0% de los pacientes señaló problemas de tipo familiar, 44.3% de salud, 43.6% psicológicos, 38.7% escolares, 24.1% laborales, 20.0% legales, 14.9% de conducta antisocial o delictiva y 13.7% accidentes o lesiones. Cabe señalar que 78.4% de las personas atendidas mencionaron dos o más problemas asociados al consumo de sustancias, mientras que 4.6% no reportó ninguno.



Figura 9. Problemas asociados al consumo de sustancias según sexo



CONSUMO DE DROGAS^c

Edad de inicio del consumo de sustancias. La edad promedio de inicio del consumo de tabaco se situó en 14.5 años (DE =3.4 años), la mediana en 14 años y la moda en 15 años, mientras que la edad promedio de inicio del consumo de alcohol se ubicó en 14.6 años (DE =3.0 años) con una mediana y una moda de 15 años. Por su parte, la edad promedio de inicio del uso de drogas ilícitas (incluyendo sustancias de uso médico sin prescripción) fue de 16.1 años (DE =5.2 años), con una mediana y una moda de 15 años. Por otra parte, al considerar el primer decil como indicador de las edades de inicio más tempranas, se observa que el consumo de tabaco aparece a los 11 años, mientras que el de alcohol y drogas ilícitas se presenta a los 12 años de edad.

Figura 10. Edad de inicio del consumo de sustancias según sexo

	 Años			 Años		
	Tabaco	Alcohol	Drogas ilícitas	Tabaco	Alcohol	Drogas ilícitas
Promedio (Desviación estándar)	14.5 (3.4)	14.6 (2.9)	16.0 (4.9)	14.8 (3.8)	14.7 (3.4)	17.0 (6.4)
Mediana	14	15	15	14	14	15
Moda	15	15	15	14	15	15
Decil₁	11	12	12	12	12	12


No se observan grandes diferencias entre hombres y mujeres en cuanto al consumo de sustancias, no obstante, la mitad de las mujeres inició el consumo de alcohol un año antes que los hombres.

Drogas ilícitas de inicio. Las sustancias de inicio más reportadas fueron: marihuana (75.0%); cocaína (9.7%), tanto en forma de polvo blanco (7.6%) como crack (2.1%); inhalables (7.7%), mayormente en forma de solventes y removedores (5.8%); seguidos por los estimulantes (4.9%), donde destacan las metanfetaminas (4.2%); depresores

^c Cfr., Cuadros 13 a 35

con utilidad médica como las benzodiazepinas (1.4%); y los opiáceos (0.4%), entre los cuales sobresale la heroína (25 casos).



Figura 11. Principales drogas ilícitas de inicio según sexo



Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de sustancias y el ingreso a tratamiento en CIJ. El promedio de años entre el inicio de consumo y la solicitud de tratamiento se situó de la siguiente manera: tabaco, 9.1 años (DE=10.1 años), alcohol 9.2 años (DE=10.0 años) y drogas ilícitas 7.2 años (DE =8.8 años).

Cabe señalar que la mitad de los usuarios de alcohol dejaron pasar seis años desde que iniciaron el consumo hasta que acudieron a solicitar tratamiento; los de tabaco, cinco años y los usuarios de drogas, cuatro años.


Figura 12. Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de sustancias y el ingreso a tratamiento en CIJ según sexo

	 Años			 Años		
	Tabaco	Alcohol	Drogas ilícitas	Tabaco	Alcohol	Drogas ilícitas
Promedio (Desviación estándar)	9.5 (10.3)	9.6 (10.3)	7.6 (9.2)	7.6 (9.1)	7.6 (8.7)	5.2 (7.2)
Mediana	5	6	4	4	4	2
Moda	1	1	1	1	1	< un año
Decil₁	1	1	< un año	1	1	< un año

Los hombres dejan pasar más tiempo que las mujeres para solicitar tratamiento.

Tipo de consumo de drogas ilícitas. De acuerdo con los terapeutas, 50.0% de los solicitantes de tratamiento fue diagnosticado con consumo funcional, 22.5% con consumo disfuncional, 13.6% con consumo social u ocasional, 11.0% con consumo experimental y 2.9% presentaba remisión del consumo.

Figura 13. Tipo de consumo de drogas ilícitas según sexo




El patrón de consumo disfuncional entre los sexos es equiparable. El consumo funcional es mayor en los hombres, mientras que una mayor proporción de mujeres reporta el consumo de tipo ocasional y experimental.

Total de drogas consumidas. El promedio de sustancias utilizadas alguna vez en la vida, incluyendo alcohol o tabaco, fue de 4.3 drogas (94.7% reportó el uso de dos o más sustancias); en el último año fue de 3.6 drogas (89.4% consumió dos o más sustancias); y en los últimos 30 días fue de 2.3 drogas (67.3% reportó haber utilizado dos o más sustancias).

El promedio de sustancias consumidas alguna vez en la vida, sin incluir alcohol y tabaco, fue de 2.6 drogas (62.2% reportó el uso de dos o más sustancias); en el último año fue de 2.0 drogas (48.6% consumió dos o más sustancias); y en los últimos 30 días fue de 1.1 droga (23.5% reportó haber utilizado dos o más sustancias).

Figura 14. Promedio de drogas consumidas según sexo




Mujeres y hombres consumieron un promedio similar de drogas.

Consumo de drogas alguna vez en la vida.^d Las proporciones de consumo alguna vez en la vida de los diez grupos de sustancias en seguimiento fueron: *cannabis* (87.1%), alcohol (87.4%), tabaco (85.2%), cocaína (46.7%), estimulantes (35.6%), inhalables (24.8%), depresores (14.1 %), drogas alucinógenas y disociativas (12.4%), opiáceos (4.2%) y otras sustancias de abuso (2.1%).

En cuanto al uso de sustancias específicas (contenidas en alguno de los diez grupos antes mencionados) sobresalen: marihuana (87.1%), Cocaína (40.4%) metanfetaminas (31.3%), *crack* (21.6%), solventes y removedores (18.7%) y benzodiazepinas (13.6%); en menor proporción la LSD (10.0%), los pegamentos (6.3%), éxtasis y otras metanfetaminas alucinógenas (6.3%) y el hachís (6.2%).

Figura 15. Consumo de drogas alguna vez en la vida según sexo




Los hombres reportaron en mayor proporción que las mujeres el consumo de tabaco, alcohol, marihuana, inhalables, cocaína, crack, alucinógenos y heroína. Ellas reportaron mayormente el consumo de metanfetaminas, benzodiazepinas y éxtasis.

^d Los casos pudieron haber reportado el consumo de dos o más sustancias, por lo que el total de los porcentajes no suma 100%.

Consumo de drogas en los últimos 12 meses. 98.7% de las personas reportaron haber consumido alguna sustancia en el año previo a su ingreso a tratamiento en CIJ. Las proporciones de consumo de los diez grupos de sustancias utilizadas en este lapso fueron: alcohol (80.9%), tabaco (76.9%), cannabis (73.2%), cocaína (35.5%), estimulantes (30.0%), inhalables (17.4%), depresores (9.7%), drogas alucinógenas y disociativas (8.2%); opiáceos (3.1%) y otras sustancias de abuso (1.6%).

En cuanto al consumo de sustancias específicas contenidas en alguno de los grupos anteriores, destacaron: marihuana (73.2%), cocaína (28.4%), metanfetaminas (27.1%), crack (16.5%) y solventes y removedores (13.1%); en menor proporción se refieren las benzodiacepinas (9.5%) y LSD (6.9%).


Figura 16. Consumo de drogas en los últimos 12 meses según sexo



Las drogas más consumidas en el último año por ambos sexos fueron alcohol, tabaco y marihuana; las mujeres usaron en mayor proporción metanfetaminas, benzodiacepinas, drogas alucinógenas y éxtasis; los hombres reportaron en mayor proporción el uso de inhalables, cocaína en polvo y crack.

Droga de preferencia en los últimos 12 meses. Entre las sustancias más frecuentemente referidas se encontraron: marihuana (43.0%), alcohol (15.4%), metanfetaminas (12.5%) y tabaco (10.6%). En menores proporciones aparecieron crack (5.7%), Cocaína (4.0%) y solventes y removedores (3.0%).


Figura 17. Droga de preferencia en los últimos 12 meses según sexo



Los hombres reconocieron mayor preferencia que las mujeres por el uso de marihuana, crack y heroína; mientras que en las mujeres la preferencia fue mayor que en los hombres por el tabaco, alcohol, inhalables, cocaína en polvo, metanfetaminas y benzodiacepinas. No obstante, cabe resaltar que la marihuana y el alcohol son las drogas preferidas por hombres y mujeres.

Droga de mayor impacto en los últimos 12 meses. Las principales sustancias reportadas por los pacientes a las cuales atribuyeron los mayores daños a la salud, bienestar personal y familiar o en el desempeño escolar, laboral o social y por las que reportaron haber solicitado tratamiento fueron: marihuana (38.0%), metanfetaminas (18.5%) y alcohol (12.6%).

Figura 18. Droga de mayor impacto en los últimos 12 meses según sexo




Hombres y mujeres acuden a tratamiento principalmente por el consumo de marihuana y metanfetaminas.

Con mayor frecuencia ellos acuden por los efectos asociados al consumo de marihuana y crack; mientras que ellas por los del uso de tabaco, alcohol, metanfetaminas y benzodiazepinas.

Uso combinado de drogas en los últimos 12 meses.^e Al menos en una ocasión en el transcurso del último año y sin tomar en cuenta el consumo de tabaco, más de la mitad de la población (53.8%) reportó el consumo de dos o más sustancias en un mismo día.

Figura 19. Uso combinado de droga en los últimos 12 meses según sexo



Los hombres y las mujeres combinaron de manera similar dos o más drogas (no se incluyó el consumo de tabaco).


^e No se toman en cuenta 2,177 casos (19.2%) que no cumplieron los criterios de inclusión de esta variable; 18.8% de los hombres y 21.0% de las mujeres (ver anexo, cuadro 29).

Consumo de drogas en los últimos 30 días. Incluyendo alcohol y tabaco, 90.4% de los casos reportaron consumo de sustancias en el mes anterior al ingreso a tratamiento.

Las prevalencias de consumo de los diez grupos de sustancias utilizadas en este lapso fueron: tabaco (61.3%), alcohol (56.2%), cannabis (49.9%), estimulantes (17.4%), cocaína (17.3%), inhalables (8.1%), depresores (4.4%), opiáceos (1.7%), drogas alucinógenas y disociativas (1.7%) y otras sustancias de abuso (0.8%).

En cuanto al consumo de sustancias específicas destacó el de marihuana con 49.9%, seguida de metanfetaminas (16.4%), Cocaína (10.8%), crack (8.9%) y solventes/removedores (6.2%); en menor proporción se registró el consumo de benzodiazepinas (4.3%), pegamentos (1.6%), LSD (1.4%) y heroína (1.1%).


Figura 20. Consumo de drogas en los últimos 30 días según sexo



Hombres y mujeres consumieron predominantemente tabaco, alcohol,, crack y cocaína –los hombres en mayor proporción–. Las mujeres reportaron mayor consumo de metanfetaminas, benzodiazepinas y alucinógenos. En la misma proporción ambos consumieron inhalables.

Frecuencia de episodios de abuso en los últimos 30 días. 38.1% de quienes reportaron consumo de tabaco en los últimos 30 días aceptó fumar seis o más cigarrillos diariamente. Asimismo, entre quienes consumieron alcohol, la mayor parte (36.9%) reportó consumo abusivo menos de una vez a la semana o una o dos veces a la semana (29.1%). Por otra parte, 40.5% de los usuarios de drogas ilícitas durante el último mes reportaron consumirlas todos los días, 23.9% menos de una vez a la semana, 20.1% una a dos veces a la semana y 15.4% cada tercer día.

Figura 21. Frecuencia de episodios de abuso en los últimos 30 días según sexo



Los hombres refieren mayor frecuencia de episodios de abuso de drogas ilícitas que las mujeres. Ambos sexos abusan del consumo de tabaco y del alcohol de manera similar.

REFERENCIAS

1. Sánchez-Huesca, R. y López, L. M. (1985). *Características demográficas y patrones de inicio en el consumo de drogas en asistentes a los Centros Locales; recuperación de los archivos de siete años (1976-1982)*. México: Centros de Integración Juvenil, A.C.
2. Clarac, P. y Wagner, F. (1987). Análisis de algunas variables en una muestra de pacientes farmacodependientes (1986). En Wagner, F. y Ortiz, R. (1990). *Estudios acerca de la farmacodependencia en México realizados por Paule Clarac*. México: Centros de Integración Juvenil, A. C. (pp. 111-126).
3. García V. R., Díaz, D. B., Balanzario, M. C., Gutiérrez, A. D y Castillo, P. I. (1999). *Características sociodemográficas y de consumo de drogas en pacientes atendidos entre 1990 y 1997* (Informe de investigación 98-12). México: Centros de Integración Juvenil, A.C.
4. Secretaria de Salud. *Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA)*. México. Dirección General de Epidemiología. Recuperado de http://www.epidemiologia.salud.gob.mx/dgae/infoepid/inf_sisvea.html
5. Ortiz, A., Martínez, R., Meza, D. (2018). *Grupo Interinstitucional para el desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas. Tendencias en el área metropolitana no. 60*. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. México. Recuperado de http://www.inprf.gob.mx/opencms/export/sites/INPRFM/psicosociales/archivos/srid/rep_60_pdf.pdf
6. Díaz, D. B., Balanzario, M. C., Castillo, P. I., Gutiérrez, A. D. y García, V. R. (2001). Uso de drogas entre pacientes de primer ingreso en Centros de Integración Juvenil. En Secretaría de Salud. *Observatorio Epidemiológico en drogas. El fenómeno de las adicciones en México 2001*. México: Secretaría de Salud (pp. 66-71). Recuperado de http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/publicaciones/obs2001_cap4.pdf
7. García-Aurrecochea, V. R., Díaz-Negrete, D. B., Balanzario, M. C. y Castillo-Franco, P. I. (1998). *Perfil y trayectoria del consumo de drogas en pacientes de*

- primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil en 1996*. En CD: D. B. Díaz, J. L. Arellanez, M. C. Balanzario y R. Sánchez, *Once años de estudios del consumo de drogas en México, Investigaciones realizadas en Centros de Integración Juvenil entre 1997 y 2007*. México: Centros de Integración Juvenil, A. C.
8. Castillo, P. I., Gutiérrez, A. D. (2008). Consumo de drogas en mujeres asistentes a centros de tratamiento especializado en la Ciudad de México. *Salud Mental* 31 (5), 351-359. Recuperado de <http://scielo.unam.mx/pdf/sm/v31n5/v31n5a3.pdf>
 9. Gracia, S. E. y Balanzario, M. C. (2003). *El consumo de drogas en menores de 12 años en Centros de Integración Juvenil en el año 2002* (Informe de Investigación 03-17). México: Centros de Integración Juvenil, A. C.
 10. García, V. R., Castillo, P. I. y Guerrero, J. A. (2003). *El consumo de drogas en pacientes atendidos en Centros de Integración Juvenil según la etapa de vida correspondiente al ingreso a tratamiento* (Informe de Investigación 03-13). México: Centros de Integración Juvenil, A. C.
 11. García, V. R., Díaz, D. B. y Balanzario, M. C. (2001). *Tendencias del consumo de drogas en pacientes de primer ingreso a tratamiento en CIJ entre 1990 y 1999* (Informe de investigación 2000-06). México: Centros de Integración Juvenil, A.C.
 12. Gutiérrez López, AD. (2018). *Tendencias del consumo de drogas alguna vez en la vida en Usuarios de drogas ilícitas solicitantes de tratamiento en Centros de Integración Juvenil. Segundo semestre de 2008 – Segundo semestre de 2017. (Nivel Nacional y Entidades Federativas)* [Informe de Investigación 18-01e]. México: Centros de Integración Juvenil, A. C. Recuperado de <http://www.test.cij.gob.mx/ExtCIJ/programas/Investigacion/pdf/18-01e.pdf>
 13. Gutiérrez, A. D. (2018). *Tendencias del consumo de drogas en los últimos 30 días de drogas ilícitas solicitantes de tratamiento en Centros de Integración Juvenil. Segundo semestre de 2008 – Segundo semestre de 2017. (Nivel Nacional y Entidades Federativas)* [Informe de Investigación 18-01f]. México: Centros de Integración Juvenil, A. C. Recuperado de <http://www.test.cij.gob.mx/ExtCIJ/programas/Investigacion/pdf/18-01f.pdf>
 14. Gutiérrez, A. D. (2018). Droga de mayor impacto reportada por usuarios de

- drogas ilícitas solicitantes de tratamiento en *Centros de Integración Juvenil. Segundo semestre de 2008 – Segundo semestre de 2017. (Nivel nacional y entidades federativas)* [Informe de Investigación 17-01g]. México: Centros de Integración Juvenil, A. C. Recuperado de <http://www.test.cij.gob.mx/ExtCIJ/programas/Investigacion/pdf/18-01g.pdf>
15. Jiménez, K., García, V. R. y González, J. D. (2005). *Patrón de consumo de cocaína y crack en pacientes que ingresan a tratamiento* (Informe de investigación 05-07). México: Centros de Integración Juvenil, A. C.
16. Jiménez, K. y Castillo, N. L. (2014). *Factores de reincidencia en usuarios de cocaína, crack y metanfetaminas en fase de recuperación* (Informe de Investigación 04-14). México: Centros de Integración Juvenil, A. C.
17. Gutiérrez, A. D. y Castillo, P. I. (2007). *Estudio epidemiológico del consumo de alcohol y tabaco en pacientes usuarios de estas sustancias solicitantes de tratamiento en CIJ en 2006* (Informe de Investigación 07-13). México: Centros de Integración Juvenil, A. C. Recuperado de <http://www.cij.gob.mx/Programas/Investigacion/pdf/07-13.pdf>
18. Velázquez, M. (2017). *Consumo de sustancias en pacientes de primer ingreso a tratamiento. Segundo semestre del 2016. Usuarios de Tabaco y alcohol* (Informe de Investigación 17-01d). México: Centros de Integración Juvenil, A. C. Recuperado de <http://www.cij.gob.mx/Programas/Investigacion/pdf/17-01d.pdf>
19. Moreno, K. (2010). *Los jóvenes y el alcohol en México. Un problema emergente en mujeres*. México: Centros de Integración Juvenil, A.C.
20. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz; Instituto Nacional de Salud Pública, Comisión Nacional Contra las Adicciones, Secretaría de Salud. Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017: Reporte de Alcohol. Villatoro-Velázquez JA, Reséndiz Escobar, E., Mujica Salazar, A., Bretón-Cirett, M., Cañas-Martínez, V., Soto-Hernández, I., Fregoso-Ito, D., Fleiz-Bautista, C., Medina-Mora ME., Gutiérrez-Reyes, J., Franco-Núñez, A., Romero-Martínez, M. y Mendoza-Alvarado, L. Ciudad de México, México: INPRFM; 2017.
21. Medina-Mora, M. E. Villatoro J. A., Fleiz, C., Téllez, M. M., Mendoza, L. R.,

- Romero, M., Gutiérrez, J. P., Castro, M., Hernández, M., Tena, C., Alvear, C. y Guisa, V. (2012). *Encuesta Nacional de Adicciones 2011: Reporte de Alcohol*. México: Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.
22. Medina-Mora, M. E. Villatoro J. A., Fleiz, C., Téllez, M. M., Mendoza, L. R., Romero, M., Gutiérrez, J. P., Castro, M., Hernández, M., Tena, C., Alvear, C. y Guisa, V. (2012). *Encuesta Nacional de Adicciones 2011: Reporte de Drogas*. México: Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.
23. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz; Instituto Nacional de Salud Pública, Comisión Nacional Contra las Adicciones, Secretaría de Salud. Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017: Reporte de Drogas. Villatoro-Velázquez JA, Reséndiz Escobar, E., Mujica Salazar, A., Bretón-Cirett, M., Cañas-Martínez, V., Soto-Hernández, I., Fregoso-Ito, D., Fleiz-Bautista, C., Medina-Mora ME., Gutiérrez-Reyes, J., Franco-Núñez, A., Romero-Martínez, M. y Mendoza-Alvarado, L. Ciudad de México, México: INPRFM; 2017.
24. Diaz, D. B., Chacón, J. L., Castillo, N. L., Castillo, P. I. y Arellanez, J. L. (2013). *Estudio Básico de Comunidad Objetivo Vol. 1 y 2*. México: Centros de Integración Juvenil, A. C. Recuperado de <http://www.cij.gob.mx/ebco2013/index.html>

Cuadros

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS USUARIOS DE DROGAS ILÍCITAS DE PRIMER INGRESO A TRATAMIENTO A CIJ EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2018

Cuadro 1. Pacientes de primer ingreso por unidad de atención (CIJ, UH y UTUH)

CIJ	General		Hombres		Mujeres		Razón H:M
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	
Álvaro Obregón Norte	90	0.8	78	0.8	12	0.6	6.5:1
Álvaro Obregón Oriente	61	0.5	51	0.6	10	0.5	5.1:1
Atizapán	101	0.9	93	1.0	8	0.4	11.6:1
Azcapotzalco	119	1.0	101	1.1	18	0.9	5.6:1
Benito Juárez	138	1.2	107	1.2	31	1.5	3.5:1
Chalco	138	1.2	113	1.2	25	1.2	4.5:1
Coyoacán	157	1.4	128	1.4	29	1.4	4.4:1
Cuajimalpa	67	0.6	55	0.6	12	0.6	4.6:1
Cuauhtémoc Oriente	136	1.2	110	1.2	26	1.2	4.2:1
Cuauhtémoc Poniente	130	1.1	99	1.1	31	1.5	3.2:1
Ecatepec	212	1.9	176	1.9	36	1.7	4.9:1
Gustavo A. Madero Aragón	239	2.1	212	2.3	27	1.3	7.9:1
Gustavo A. Madero Norte	161	1.4	144	1.6	17	0.8	8.5:1
Gustavo A. Madero Oriente	24	0.2	22	0.2	2	0.1	11.0:1
Iztapalapa Oriente	418	3.7	353	3.8	65	3.1	5.4:1
Iztapalapa Poniente	114	1.0	94	1.0	20	1.0	4.7:1
Miguel Hidalgo	93	0.8	75	0.8	18	0.9	4.2:1
Naucalpan	141	1.2	123	1.3	18	0.9	6.8:1
Nezahualcóyotl	263	2.3	219	2.4	44	2.1	5.0:1
Texcoco	144	1.3	131	1.4	13	0.6	10.1:1
Tlalnepantla	161	1.4	135	1.5	26	1.2	5.2:1
Tlalpan	225	2.0	185	2.0	40	1.9	4.6:1
Venustiano Carranza	149	1.3	123	1.3	26	1.2	4.7:1
UH Ecatepec	54	0.5	51	0.6	3	0.1	17.0:1
UH Iztapalapa	146	1.3	123	1.3	23	1.1	5.3:1
UH Naucalpan	45	0.4	39	0.4	6	0.3	6.5:1
Acapulco	116	1.0	90	1.0	26	1.2	3.5:1
Aguascalientes	213	1.9	170	1.8	43	2.1	4.0:1
Cancún	173	1.5	138	1.5	35	1.7	3.9:1
Cd. del Carmen	40	0.4	36	0.4	4	0.2	9.0:1
Cd. Juárez Norte	113	1.0	90	1.0	23	1.1	3.9:1
Cd. Victoria	24	0.2	20	0.2	4	0.2	5.0:1
Celaya	198	1.7	161	1.7	37	1.8	4.4:1
Chetumal	62	0.5	51	0.6	11	0.5	4.6:1

(Continúa)

Cuadro 1. Pacientes de primer ingreso a tratamiento por unidad de atención (CIJ, UH y UTUH)
(Continuación)

CIJ	General		Hombres		Mujeres		Razón H:M
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	
Chihuahua	295	2.6	242	2.6	53	2.5	4.6:1
Chilpancingo	59	0.5	47	0.5	12	0.6	3.9:1
Colima	155	1.4	126	1.4	29	1.4	4.3:1
Cozumel	86	0.8	67	0.7	19	0.9	3.5:1
Cuernavaca	119	1.0	98	1.1	21	1.0	4.7:1
Culiacán	145	1.3	128	1.4	17	0.8	7.5:1
Durango	79	0.7	54	0.6	25	1.2	2.2:1
Escuinapa	57	0.5	33	0.4	24	1.1	1.4:1
Fresnillo	46	0.4	40	0.4	6	0.3	6.7:1
Guadalajara Centro	253	2.2	207	2.2	46	2.2	4.5:1
Guadalajara Sur	91	0.8	76	0.8	15	0.7	5.1:1
Guadalupe	135	1.2	108	1.2	27	1.3	4.0:1
Guamúchil	62	0.5	55	0.6	7	0.3	7.9:1
Guasave	85	0.7	75	0.8	10	0.5	7.5:1
Hermosillo	107	0.9	80	0.9	27	1.3	3.0:1
Huatulco	28	0.2	27	0.3	1	0.0	27.0:1
Ixtapa Zihuatanejo	37	0.3	29	0.3	8	0.4	3.6:1
La Paz	56	0.5	41	0.4	15	0.7	2.7:1
La Piedad	58	0.5	43	0.5	15	0.7	2.9:1
Laguna Durango	89	0.8	71	0.8	18	0.9	3.9:1
León	180	1.6	129	1.4	51	2.4	2.5:1
Los Cabos	62	0.5	47	0.5	15	0.7	3.1:1
Los Mochis	78	0.7	62	0.7	16	0.8	3.9:1
Manzanillo	47	0.4	41	0.4	6	0.3	6.8:1
Mazatlán	128	1.1	94	1.0	34	1.6	2.8:1
Mérida	84	0.7	73	0.8	11	0.5	6.6:1
Mexicali	129	1.1	103	1.1	26	1.2	4.0:1
Monterrey	148	1.3	113	1.2	35	1.7	3.2:1
Morelia	109	1.0	83	0.9	26	1.2	3.2:1
Nogales	66	0.6	54	0.6	12	0.6	4.5:1
Oaxaca	142	1.3	108	1.2	34	1.6	3.2:1
Pachuca	148	1.3	114	1.2	34	1.6	3.4:1
Playa del Carmen	61	0.5	49	0.5	12	0.6	4.1:1
Poza Rica	37	0.3	32	0.3	5	0.2	6.4:1
Puebla	106	0.9	90	1.0	16	0.8	5.6:1
Puerto Vallarta	102	0.9	82	0.9	20	1.0	4.1:1
Querétaro	127	1.1	106	1.1	21	1.0	5.0:1
Ramos Arizpe	23	0.2	16	0.2	7	0.3	2.3:1
Reynosa	29	0.3	26	0.3	3	0.1	8.7:1

(Continúa)

Cuadro 1. Pacientes de primer ingreso a tratamiento por unidad de atención (CIJ, UH y UTUH)
(Continuación)

CIJ	General		Hombres		Mujeres		Razón H:M
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	
Salamanca	81	0.7	68	0.7	13	0.6	5.2:1
Saltillo	210	1.8	173	1.9	37	1.8	4.7:1
San Luis Potosí	154	1.4	119	1.3	35	1.7	3.4:1
San Nicolás de los Garza	118	1.0	97	1.0	21	1.0	4.6:1
Tampico	73	0.6	60	0.6	13	0.6	4.6:1
Tapachula	33	0.3	28	0.3	5	0.2	5.6:1
Tecomán	69	0.6	65	0.7	4	0.2	16.3:1
Tehuacán	106	0.9	96	1.0	10	0.5	9.6:1
Tepic	23	0.2	20	0.2	3	0.1	6.7:1
Tijuana Guaycura	227	2.0	166	1.8	61	2.9	2.7:1
Tijuana Soler	170	1.5	131	1.4	39	1.9	3.4:1
Tlaquepaque	176	1.6	139	1.5	37	1.8	3.8:1
Tlaxcala	40	0.4	30	0.3	10	0.5	3.0:1
Toluca	172	1.5	139	1.5	33	1.6	4.2:1
Torreón Oriente	279	2.5	220	2.4	59	2.8	3.7:1
Tuxtla Gutiérrez	69	0.6	56	0.6	13	0.6	4.3:1
Villahermosa	60	0.5	49	0.5	11	0.5	4.5:1
Xalapa	84	0.7	68	0.7	16	0.8	4.3:1
Yucatán	75	0.7	56	0.6	19	0.9	2.9:1
Zacatecas	86	0.8	71	0.8	15	0.7	4.7:1
Zamora	62	0.5	49	0.5	13	0.6	3.8:1
Zapopan Kena Moreno	5	0.0	4	0.0	1	0.0	4.0:1
Zapopan Norte	133	1.2	104	1.1	29	1.4	3.6:1
UH Cd. Juárez	35	0.3	19	0.2	16	0.8	1.2:1
UH Culiacán	33	0.3	33	0.4	0	0.0	---
UH Ixbalanqué	13	0.1	12	0.1	1	0.0	12.0:1
UH Nuevo León	68	0.6	59	0.6	9	0.4	6.6:1
UH Punta Diamante	38	0.3	36	0.4	2	0.1	18.0:1
UH Tijuana	55	0.5	48	0.5	7	0.3	6.9:1
UH Zapopan	28	0.2	23	0.2	5	0.2	4.6:1
UH Zapotlán el Grande	17	0.1	17	0.2	0	0.0	---
UTUH Cd. Juárez	11	0.1	10	0.1	1	0.0	10.0:1
UTUH Tijuana	36	0.3	33	0.4	3	0.1	11.0:1
Total	11,352	100.0	9,263	100.0	2,089	100.0	4.4:1

UH=Unidad de Hospitalización

UTUH=Unidad de Tratamiento para Usuarios de Heroína

Cuadro 2. Sexo

	Frec.	%	Razón H:M
Hombres	9,263	81.6	
Mujeres	2,089	18.4	4.4:1
Total	11,352	100.0	

Cuadro 3. Persona que proporciona la información

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Usuario de drogas	4,529	39.9	39.9	3,655	39.5	39.5	874	41.8	41.8
Usuario de drogas y familiares u otras personas	5,796	51.1	51.1	4,771	51.5	51.5	1,025	49.1	49.1
<i>Sin Información</i>	1,027	9.0	9.0	837	9.0	9.0	190	9.1	9.1
Total	11,352	100.0	100.0	9,263	100.0	100.0	2,089	100.0	100.0

Cuadro 4. Edad de ingreso a tratamiento

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Hasta 9 años	5	0.0	0.0	5	0.1	0.1	0	0.0	0.0
10 a 14 años	1,529	13.5	13.5	1,169	12.6	12.6	360	17.2	17.2
15 a 19 años	4,298	37.9	37.9	3,486	37.6	37.6	812	38.9	38.9
20 a 24 años	1,795	15.8	15.8	1,456	15.7	15.7	339	16.2	16.2
25 a 29 años	1,180	10.4	10.4	975	10.5	10.5	205	9.8	9.8
30 a 34 años	868	7.6	7.6	737	8.0	8.0	131	6.3	6.3
35 a 39 años	619	5.5	5.5	536	5.8	5.8	83	4.0	4.0
40 a 44 años	392	3.5	3.5	338	3.6	3.6	54	2.6	2.6
45 años y más	666	5.9	5.9	561	6.1	6.1	105	5.0	5.0
Total	11,352	100.0	100.0	9,263	100.0	100.0	2,089	100.0	100.0
Media (DE)	23.3 (10.7) años			23.6 (10.8) años			22.1 (10.1) años		
Mediana	19 años			19 años			18 años		
Moda	16 años			16 años			17 años		
Decil1	14 años			14 años			14 años		

DE= Desviación Estándar

Cuadro 5. Estado civil

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Soltero	8,074	71.1	71.3	6,538	70.6	70.8	1,536	73.5	73.7
Casado	1,051	9.3	9.3	941	10.2	10.2	110	5.3	5.3
Unión libre	1,353	11.9	12.0	1,108	12.0	12.0	245	11.7	11.8
Separado	671	5.9	5.9	534	5.8	5.8	137	6.6	6.6
Divorciado	133	1.2	1.2	104	1.1	1.1	29	1.4	1.4
Viudo	40	0.4	0.4	14	0.2	0.2	26	1.2	1.2
<i>Sin información</i>	30	0.3	<i>Se omite</i>	24	0.3	<i>Se omite</i>	6	0.3	<i>Se omite</i>
Total	11,352	100.0	100.0	9, 263	100.0	100.0	2,089	100.0	100.0

Cuadro 6. Escolaridad

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Ninguna (no sabe leer ni escribir)	34	0.3	0.3	28	0.3	0.3	6	0.3	0.3
Ninguna (sabe leer y escribir)	26	0.2	0.2	20	0.2	0.2	6	0.3	0.3
Primaria incompleta	304	2.7	2.7	255	2.8	2.8	49	2.3	2.3
Primaria completa	491	4.3	4.3	406	4.4	4.4	85	4.1	4.1
Secundaria incompleta	2,787	24.6	24.6	2,232	24.1	24.1	555	26.6	26.6
Secundaria completa	1,954	17.2	17.2	1,634	17.6	17.7	320	15.3	15.3
Estudios técnicos o comerciales incompletos	121	1.1	1.1	103	1.1	1.1	18	0.9	0.9
Estudios técnicos o comerciales completos	90	0.8	0.8	69	0.7	0.7	21	1.0	1.0
Bachillerato incompleto	3,397	29.9	29.9	2,791	30.1	30.2	606	29.0	29.0
Bachillerato completo	917	8.1	8.1	759	8.2	8.2	158	7.6	7.6
Estudios superiores incompletos	864	7.6	7.6	677	7.3	7.3	187	9.0	9.0
Estudios superiores completos	320	2.8	2.8	251	2.7	2.7	69	3.3	3.3
Estudios de posgrado incompletos	20	0.2	0.2	15	0.2	0.2	5	0.2	0.2
Estudios de posgrado completos	21	0.2	0.2	17	0.2	0.2	4	0.2	0.2
<i>Sin información</i>	6	0.1	<i>Se omite</i>	6	0.1	<i>Se omite</i>	0	0.0	<i>Se omite</i>
Total	11,352	100.0	100.0	9, 263	100.0	100.0	2,089	100.0	100.0

Cuadro 7. Ocupación

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Desempleado(a)	2,477	21.8	21.8	2,024	21.9	21.9	453	21.7	21.7
Estudiante	3,826	33.7	33.7	2,998	32.4	32.4	828	39.6	39.6
Estudiante que trabaja	623	5.5	5.5	516	5.6	5.6	107	5.1	5.1
Trabaja	3,966	34.9	34.9	3,553	38.4	38.4	413	19.8	19.8
Tareas del hogar	403	3.6	3.6	120	1.3	1.3	283	13.5	13.5
Pensionado	57	0.5	0.5	52	0.6	0.6	5	0.2	0.2
Total	11,352	100.0	100.0	9,263	100.0	100.0	2,089	100.0	100.0

Cuadro 8. Estrato social

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Alto	39	0.3	0.3	31	0.3	0.3	8	0.4	0.4
Medio alto	433	3.8	3.8	367	4.0	4.0	66	3.2	3.2
Medio	2,448	21.6	21.6	1,949	21.0	21.1	499	23.9	24.0
Medio bajo	5,662	49.9	50.0	4,669	50.4	50.5	993	47.5	47.7
Bajo	2,690	23.7	23.7	2,181	23.5	23.6	509	24.4	24.4
Pobreza extrema o marginación	63	0.6	0.6	55	0.6	0.6	8	0.4	0.4
<i>Sin información</i>	17	0.1	<i>Se omite</i>	11	0.1	<i>Se omite</i>	6	0.3	<i>Se omite</i>
Total	11,352	100.0	100.0	9,263	100.0	100.0	2,089	100.0	100.0

FACTORES ASOCIADOS A LA DEMANDA DE TRATAMIENTO EN PACIENTES DE PRIMER INGRESO A TRATAMIENTO EN CIJ EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2018

Cuadro 9. Motivos de consulta

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Consumo de drogas ilícitas	10,073	88.7	8,300	89.6	1,773	84.9
Consumo de bebidas alcohólicas	4,859	42.8	3,967	42.8	892	42.7
Consumo de tabaco	4,322	38.1	3,554	38.4	768	36.8
Otro motivo	331	2.9	249	2.7	82	3.9
<i>Ningún motivo específico reportado</i>	15	0.1	13	0.1	2	0.1
<i>Usuarios que reportaron dos o más motivos de consulta</i>	5,296	46.7	4,368	47.2	928	44.4

Cuadro 10. Condicionantes de la solicitud de tratamiento

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Por propia iniciativa	4,696	41.4	3,817	41.2	879	42.1
Por condicionamiento o recomendación familiar	5,144	45.3	4,246	45.8	898	43.0
Por recomendación de pares	154	1.4	121	1.3	33	1.6
Por condicionamiento o recomendación escolar	2,199	19.4	1,790	19.3	409	19.6
Por condicionamiento legal	1,028	9.1	859	9.3	169	8.1
Por condicionamiento o recomendación laboral	223	2.0	207	2.2	16	0.8
Por indicación médica	1,013	8.9	804	8.7	209	10.0
Por solicitud de novia(o)	56	0.5	43	0.5	13	0.6
Otros condicionantes de solicitud de tratamiento	295	2.6	222	2.4	73	3.5
<i>Ningún condicionante reportado</i>	195	1.7	149	1.6	46	2.2
<i>Pacientes que reportaron dos o más condicionantes de la solicitud de tratamiento</i>	3,232	28.5	2,657	28.7	575	27.5

Cuadro 11. Antecedentes de acciones contra el consumo de sustancias

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Juramento	801	7.1	716	7.7	85	4.1
Grupo de autoayuda	888	7.8	757	8.2	131	6.3
Internamiento en anexo	1,398	12.3	1,209	13.1	189	9.0
Intervención de emergencia	114	1.0	96	1.0	18	0.9
Programa de mantenimiento	72	0.6	62	0.7	10	0.5
Tratamiento médico no especializado	95	0.8	76	0.8	19	0.9
Tratamiento psiquiátrico o psicoterapéutico ambulatorio	758	6.7	596	6.4	162	7.8
Tratamiento psiquiátrico o psicoterapéutico residencial	228	2.0	173	1.9	55	2.6
Medicina tradicional o alternativa	67	0.6	52	0.6	15	0.7
Intento de interrupción voluntaria del consumo, sin apoyo	3,613	31.8	2,968	32.0	645	30.9
Otras acciones	2,768	24.4	2,197	23.7	571	27.3
<i>Ninguna acción previa reportada</i>	<i>2,725</i>	<i>24.0</i>	<i>2,198</i>	<i>23.7</i>	<i>527</i>	<i>25.2</i>
<i>Pacientes que reportaron dos o más acciones contra el consumo de sustancias antes de solicitar tratamiento en CIJ</i>	<i>1,538</i>	<i>13.5</i>	<i>1,290</i>	<i>13.9</i>	<i>248</i>	<i>11.9</i>

Cuadro 12. Problemas asociados al consumo de sustancias

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Problemas de salud	5,030	44.3	4,078	44.0	952	45.6
Accidentes o lesiones	1,553	13.7	1,300	14.0	253	12.1
Problemas familiares	9,079	80.0	7,367	79.5	1,712	82.0
Problemas escolares	4,389	38.7	3,544	38.3	845	40.4
Problemas laborales	2,732	24.1	2,443	26.4	289	13.8
Problemas psicológicos	4,948	43.6	3,923	42.4	1,025	49.1
Problemas legales	2,269	20.0	1,977	21.3	292	14.0
Conducta antisocial o delictiva	1,695	14.9	1,463	15.8	232	11.1
Otros problemas	555	4.9	433	4.7	122	5.8
<i>Ningún problema asociado reportado</i>	<i>522</i>	<i>4.6</i>	<i>427</i>	<i>4.6</i>	<i>95</i>	<i>4.5</i>
<i>Pacientes que reportaron dos o más problemas asociados</i>	<i>8,903</i>	<i>78.4</i>	<i>7,264</i>	<i>78.4</i>	<i>1,639</i>	<i>78.5</i>

**CARACTERÍSTICAS DEL CONSUMO DE DROGAS EN PACIENTES DE PRIMER INGRESO A
TRATAMIENTO EN CIJ EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2017**

Cuadro 13. Edad de inicio del consumo de tabaco

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Hasta 9 años	321	2.8	3.3	273	2.9	3.4	48	2.3	2.7
10 a 14 años	4,873	42.9	50.4	3,985	43.0	50.3	888	42.5	50.8
15 a 19 años	3,957	34.9	40.9	3,264	35.2	41.2	693	33.2	39.6
20 a 24 años	353	3.1	3.7	276	3.0	3.5	77	3.7	4.4
25 a 29 años	91	0.8	0.9	67	0.7	0.8	24	1.1	1.4
30 a 34 años	42	0.4	0.4	31	0.3	0.4	11	0.5	0.6
35 a 39 años	12	0.1	0.1	10	0.1	0.1	2	0.1	0.1
40 a 44 años	11	0.1	0.1	8	0.1	0.1	3	0.1	0.2
45 años y más	6	0.1	0.1	4	0.0	0.1	2	0.1	0.1
<i>No consumió</i>	9,666	85.1	<i>Se omite</i>	1,342	14.5	<i>Se omite</i>	2	0.1	<i>Se omite</i>
<i>Sin información</i>	1,681	14.8	<i>Se omite</i>	3	0.0	<i>Se omite</i>	341	16.3	<i>Se omite</i>
Total	11,352	100.0	100.0	9,263	100.0	100.0	2,089	100.0	100.0
Media (DE)	14.5 (3.4) años			14.5 (3.4) años			14.8 (3.8) años		
Mediana	14 años			14 años			14 años		
Moda	15 años			15 años			14 años		
Decil1	11 años			11 años			12 años		

DE= Desviación Estándar

Cuadro 14. Edad de inicio del consumo de alcohol

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Hasta 9 años	374	3.3	3.8	299	3.2	3.7	75	3.6	4.1
10 a 14 años	4,425	39.0	44.6	3,581	38.7	44.2	844	40.4	46.7
15 a 19 años	4,704	41.4	47.5	3,920	42.3	48.4	784	37.5	43.3
20 a 24 años	315	2.8	3.2	245	2.6	3.0	70	3.4	3.9
25 a 29 años	66	0.6	0.7	43	0.5	0.5	23	1.1	1.3
30 a 34 años	18	0.2	0.2	10	0.1	0.1	8	0.4	0.4
35 a 39 años	5	0.0	0.1	2	0.0	0.0	3	0.1	0.2
40 a 44 años	3	0.0	0.0	1	0.0	0.0	2	0.1	0.1
45 años y más	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0
<i>No consumió</i>	1,430	12.6	<i>Se omite</i>	1,152	12.4	<i>Se omite</i>	278	13.3	<i>Se omite</i>
<i>Sin información</i>	11	0.1	<i>Se omite</i>	9	0.1	<i>Se omite</i>	2	0.1	<i>Se omite</i>
Total	11,352	100.0	100.0	9,263	100.0	100.0	2,089	100.0	100.0
Media (DE)	14.6 (3.0) años			14.6 (2.9) años			14.7 (3.4) años		
Mediana	15 años			15 años			14 años		
Moda	15 años			15 años			15 años		
Decil1	12 años			12 años			12 años		

DE= Desviación Estándar

Cuadro 15. Edad de inicio del consumo de drogas ilícitas

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Hasta 9 años	122	1.1	1.1	114	1.2	1.2	8	0.4	0.4
10 a 14 años	4,638	40.9	40.9	3,816	41.2	41.3	822	39.3	39.4
15 a 19 años	5,052	44.5	44.6	4,162	44.9	45.0	890	42.6	42.7
20 a 24 años	840	7.4	7.4	669	7.2	7.2	171	8.2	8.2
25 a 29 años	317	2.8	2.8	236	2.5	2.6	81	3.9	3.9
30 a 34 años	168	1.5	1.5	120	1.3	1.3	48	2.3	2.3
35 a 39 años	80	0.7	0.7	51	0.6	0.6	29	1.4	1.4
40 a 44 años	49	0.4	0.4	35	0.4	0.4	14	0.7	0.7
45 años y más	62	0.5	0.5	41	0.4	0.4	21	1.0	1.0
<i>Sin información</i>	24	0.2	<i>Se omite</i>	19	0.2	<i>Se omite</i>	5	0.2	<i>Se omite</i>
Total	11,352	100.0	100.0	9,263	100.0	100.0	2,089	100.0	100.0
Media (DE)	16.1 (5.2) años			16.0 (4.9) años			17.0 (6.4) años		
Mediana	15 años			15 años			15 años		
Moda	15 años			15 años			15 años		
Decil1	12 años			12 años			12 años		

DE= Desviación Estándar

Cuadro 16. Drogas ilícitas de inicio, según menciones

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Mariguana	8,499	74.9	7,060	76.2	1,439	68.9
Hachís	7	0.1	5	0.1	2	0.1
Cocaína (Clorhidrato)	859	7.6	703	7.6	156	7.5
<i>Crack</i>	237	2.1	200	2.2	37	1.8
Otra presentación de cocaína	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Solventes y removedores	656	5.8	526	5.7	130	6.2
Pegamentos	118	1.0	97	1.0	21	1.0
Esmaltes o pinturas	87	0.8	65	0.7	22	1.1
Otros inhalables	13	0.1	10	0.1	3	0.1
Benzodiazepinas	163	1.4	87	0.9	76	3.6
<i>Rohypnol</i> [®]	4	0.0	4	0.0	0	0.0
Otros depresores del SNC	7	0.1	5	0.1	2	0.1
Anfetamina	50	0.4	46	0.5	4	0.2
Metanfetaminas	478	4.2	323	3.5	155	7.4
Éxtasis (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas	23	0.2	19	0.2	4	0.2
Otros estimulantes del SNC	9	0.1	8	0.1	1	0.0
LSD	21	0.2	14	0.2	7	0.3
Plantas alucinógenas y derivados	17	0.1	16	0.2	1	0.0
Otras drogas alucinógenas y disociativas	5	0.0	3	0.0	2	0.1
Heroína	25	0.2	21	0.2	4	0.2
Opioides sintéticos	15	0.1	14	0.2	1	0.0
Opio y otros opiáceos	4	0.0	4	0.0	0	0.0
Sustancias con utilidad médica	16	0.1	7	0.1	9	0.4
Otras sustancias de abuso	38	0.3	25	0.3	13	0.6
Total	11,352	100.0	9,263	100.0	2,089	100.0

Cuadro 17. Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de tabaco y el ingreso a tratamiento a CIJ

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
< de un año	560	4.9	5.8	430	4.6	5.4	130	6.2	7.4
1 a 5 años	4,418	38.9	45.7	3,535	38.2	44.6	883	42.3	50.5
6 a 10 años	1,696	14.9	17.5	1,388	15.0	17.5	308	14.7	17.6
11 a 15 años	1,002	8.8	10.4	843	9.1	10.6	159	7.6	9.1
16 a 20 años	679	6.0	7.0	576	6.2	7.3	103	4.9	5.9
21 a 25 años	503	4.4	5.2	447	4.8	5.6	56	2.7	3.2
26 o más años	808	7.1	8.4	699	7.5	8.8	109	5.2	6.2
<i>No consumió</i>	<i>1,681</i>	<i>14.8</i>	<i>Se omite</i>	<i>1,342</i>	<i>14.5</i>	<i>Se omite</i>	<i>339</i>	<i>16.2</i>	<i>Se omite</i>
<i>Sin información</i>	<i>5</i>	<i>0.0</i>	<i>Se omite</i>	<i>3</i>	<i>0.0</i>	<i>Se omite</i>	<i>2</i>	<i>0.1</i>	<i>Se omite</i>
Total	11,352	100.0	100.0	9,263	100.0	100.0	2,089	100.0	100.0
Media (DE)	9.1 (10.1) años			9.5 (10.3) años			7.6 (9.1) años		
Mediana	5 años			5 años			4 años		
Moda	1 año			1 año			1 año		
Decil1	1 año			1 año			1 año		

DE= Desviación Estándar

Cuadro 18. Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de alcohol y el ingreso a tratamiento a CIJ

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
< de un año	657	5.8	6.6	507	5.5	6.3	150	7.2	8.3
1 a 5 años	4,254	37.5	42.9	3,391	36.6	41.9	863	41.3	47.7
6 a 10 años	1,817	16.0	18.3	1,466	15.8	18.1	351	16.8	19.4
11 a 15 años	1,079	9.5	10.9	910	9.8	11.2	169	8.1	9.3
16 a 20 años	787	6.9	7.9	669	7.2	8.3	118	5.6	6.5
21 a 25 años	478	4.2	4.8	421	4.5	5.2	57	2.7	3.2
26 o más años	839	7.4	8.5	738	8.0	9.1	101	4.8	5.6
<i>No consumió</i>	<i>1,430</i>	<i>12.6</i>	<i>Se omite</i>	<i>1,152</i>	<i>12.4</i>	<i>Se omite</i>	<i>278</i>	<i>13.3</i>	<i>Se omite</i>
<i>Sin información</i>	<i>11</i>	<i>0.1</i>	<i>Se omite</i>	<i>9</i>	<i>0.1</i>	<i>Se omite</i>	<i>2</i>	<i>0.1</i>	<i>Se omite</i>
Total	11,352	100.0	100.0	9,263	100.0	100.0	2,089	100.0	100.0
Media (DE)	9.2 (10.0) años			9.6 (10.3) años			7.6 (8.7) años		
Mediana	6 años			6 años			4 años		
Moda	1 año			1 año			1 año		
Decil1	1 año			1 año			1 año		

DE= Desviación Estándar

Cuadro 19. Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de drogas ilícitas y el ingreso a tratamiento en CIJ

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
< de un año	1,676	14.8	14.8	1,263	13.6	13.7	413	19.8	19.8
1 a 5 años	5,210	45.9	46.0	4,149	44.8	44.9	1,061	50.8	50.9
6 a 10 años	1,769	15.6	15.6	1,468	15.8	15.9	301	14.4	14.4
11 a 15 años	943	8.3	8.3	815	8.8	8.8	128	6.1	6.1
16 a 20 años	660	5.8	5.8	585	6.3	6.3	75	3.6	3.6
21 a 25 años	429	3.8	3.8	379	4.1	4.1	50	2.4	2.4
26 o más años	641	5.6	5.7	585	6.3	6.3	56	2.7	2.7
<i>Sin información</i>	24	0.2	<i>Se omite</i>	19	0.2	<i>Se omite</i>	5	0.2	<i>Se omite</i>
Total	11,352	100.0	100.0	9,263	100.0	100.0	2,089	100.0	100.0
Media (DE)	7.2 (8.9) años			7.6 (9.2) años			5.2 (7.2) años		
Mediana	4 años			4 años			2 años		
Moda	1 año			1 año			< un año		
Decil1	< un año			< un año			< un año		

DE= Desviación Estándar

Cuadro 20. Tipo de consumo de drogas ilícitas

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Experimental	1,245	11.0	11.0	948	10.2	10.3	297	14.2	14.3
Social u ocasional	1,537	13.5	13.6	1,212	13.1	13.1	325	15.6	15.6
Funcional	5,666	49.9	50.0	4,716	50.9	51.0	950	45.5	45.6
Disfuncional	2,550	22.5	22.5	2,093	22.6	22.6	457	21.9	21.9
En remisión	332	2.9	2.9	277	3.0	3.0	55	2.6	2.6
<i>Sin información</i>	22	0.2	<i>Se omite</i>	17	0.2	<i>Se omite</i>	5	0.2	<i>Se omite</i>
Total	11,352	100.0	100.0	9,263	100.0	100.0	2,089	100.0	100.0

**Cuadro 21. Total de drogas consumidas alguna vez en la vida
(Incluye alcohol o tabaco)**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
1 sustancia	604	5.3	478	5.2	126	6.0
2 sustancias	1,063	9.4	848	9.2	215	10.3
3 sustancias	3,129	27.6	2,515	27.2	614	29.4
4 sustancias	2,199	19.4	1,751	18.9	448	21.4
5 sustancias	1,676	14.8	1,404	15.2	272	13.0
6 sustancias	1,014	8.9	851	9.2	163	7.8
7 sustancias	671	5.9	561	6.1	110	5.3
8 sustancias	421	3.7	357	3.9	64	3.1
9 sustancias	248	2.2	218	2.4	30	1.4
10 sustancias	137	1.2	114	1.2	23	1.1
11-19 sustancias	190	1.7	166	1.8	24	1.1
Total	11,352	100.0	9,263	100.0	2,089	100.0
Media (DE)	4.3 (2.2) drogas		4.4 (2.2) drogas		4.1 (2.1) drogas	
Mediana	4 drogas		4 drogas		4 drogas	
Moda	3 drogas		3 drogas		3 drogas	
Decil1	2 drogas		2 drogas		2 drogas	

DE= Desviación Estándar

**Cuadro 22. Total de drogas ilícitas consumidas alguna vez en la vida
(No incluye ni alcohol ni tabaco)**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
1 sustancia	4,296	37.8	3,442	37.2	854	40.9
2 sustancias	2,508	22.1	1,990	21.5	518	24.8
3 sustancias	1,788	15.8	1,495	16.1	293	14.0
4 sustancias	1,062	9.4	892	9.6	170	8.1
5 sustancias	682	6.0	572	6.2	110	5.3
6 sustancias	429	3.8	363	3.9	66	3.2
7 sustancias	254	2.2	224	2.4	30	1.4
8 sustancias	143	1.3	119	1.3	24	1.1
9 sustancias	87	0.8	77	0.8	10	0.5
10 sustancias	44	0.4	39	0.4	5	0.2
11-17 sustancias	59	0.5	50	0.5	9	0.4
Total	11,352	100.0	9,263	100.0	2,089	100.0
Media (DE)	2.6 (2.0) drogas		2.7 (2.0) drogas		2.4 (1.8) drogas	
Mediana	2 drogas		2 drogas		2 drogas	
Moda	1 droga		1 droga		1 droga	
Decil1	1 droga		1 droga		1 droga	

DE= Desviación Estándar

Cuadro 23. Consumo de drogas alguna vez en la vida por sustancia

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Tabaco	9,671	85.2	7,921	85.5	1,750	83.8
Alcohol	9,922	87.4	8,111	87.6	1,811	86.7
Cannabis	9,888	87.1	8,162	88.1	1,726	82.6
Mariguana	9,884	87.1	8,160	88.1	1,724	82.5
Hachís	709	6.2	597	6.4	112	5.4
Cocaína	5,298	46.7	4,480	48.4	818	39.2
Cocaína (Clorhidrato)	4,581	40.4	3,854	41.6	727	34.8
<i>Crack</i>	2,450	21.6	2,141	23.1	309	14.8
Otra presentación de cocaína	83	0.7	77	0.8	6	0.3
Inhalables	2,815	24.8	2,357	25.4	458	21.9
Solventes o removedores	2,122	18.7	1,786	19.3	336	16.1
Pegamentos	712	6.3	618	6.7	94	4.5
Esmaltes o pinturas	388	3.4	311	3.4	77	3.7
Otros inhalables	121	1.1	97	1.0	24	1.1
Depresores	1,606	14.1	1,282	13.8	324	15.5
Benzodiacepinas	1,547	13.6	1,235	13.3	312	14.9
<i>Rohypnol</i>	68	0.6	59	0.6	9	0.4
Otros depresores	33	0.3	24	0.3	9	0.4
Estimulantes	4,044	35.6	3,265	35.2	779	37.3
Anfetamina	228	2.0	193	2.1	35	1.7
Metanfetaminas	3,548	31.3	2,870	31.0	678	32.5
<i>Éxtasis</i> (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas	719	6.3	572	6.2	147	7.0
Otros estimulantes	64	0.6	56	0.6	8	0.4
Drogas alucinógenas y disociativas	1,404	12.4	1,164	12.6	240	11.5
LSD	1,139	10.0	936	10.1	203	9.7
Plantas alucinógenas y derivados	574	5.1	487	5.3	87	4.2
Otras drogas alucinógenas y disoc.	54	0.5	47	0.5	7	0.3
Opiáceos	479	4.2	408	4.4	71	3.4
Heroína	300	2.6	258	2.8	42	2.0
Opioides sintéticos	125	1.1	106	1.1	19	0.9
Opio y otros opiáceos	69	0.6	58	0.6	11	0.5
Otras sustancias de abuso	242	2.1	175	1.9	67	3.2
Con utilidad médica	76	0.7	53	0.6	23	1.1
Otras sustancias de abuso	169	1.5	125	1.3	44	2.1

**Cuadro 24. Total de drogas consumidas en el último año
(Incluye alcohol o tabaco)**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Ninguna	145	1.3	116	1.3	29	1.4
1 sustancia	1,055	9.3	843	9.1	212	10.1
2 sustancias	1,956	17.2	1,554	16.8	402	19.2
3 sustancias	3,382	29.8	2,766	29.9	616	29.5
4 sustancias	2,066	18.2	1,695	18.3	371	17.8
5 sustancias	1,221	10.8	1,010	10.9	211	10.1
6 sustancias	647	5.7	539	5.8	108	5.2
7 sustancias	403	3.6	333	3.6	70	3.4
8 sustancias	212	1.9	181	2.0	31	1.5
9 sustancias	123	1.1	107	1.2	16	0.8
10 sustancias	67	0.6	51	0.6	16	0.8
11-17 sustancias	75	0.7	68	0.7	7	0.3
Total	11,352	100.0	9,263	100.0	2,089	100.0
Media (DE)	3.6 (1.9) drogas		3.6 (1.9) drogas		3.4 (1.8) drogas	
Mediana	3 drogas		3 drogas		3 drogas	
Moda	3 drogas		3 drogas		3 drogas	
Decil1	1 droga		1 drogas		1 droga	

DE= Desviación Estándar

**Cuadro 25. Total de drogas ilícitas consumidas en el último año
(No incluye ni alcohol ni tabaco)**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Ninguna	817	7.2	644	7.0	173	8.3
1 sustancia	5,012	44.2	4,062	43.9	950	45.5
2 sustancias	2,543	22.4	2,071	22.4	472	22.6
3 sustancias	1,360	12.0	1,125	12.1	235	11.2
4 sustancias	705	6.2	592	6.4	113	5.4
5 sustancias	421	3.7	347	3.7	74	3.5
6 sustancias	221	1.9	190	2.1	31	1.5
7 sustancias	125	1.1	108	1.2	17	0.8
8 sustancias	71	0.6	55	0.6	16	0.8
9 sustancias	35	0.3	30	0.3	5	0.2
10 sustancias	18	0.2	17	0.2	1	0.0
11-15 sustancias	24	0.2	22	0.2	2	0.1
Total	11,352	100.0	9,263	100.0	2,089	100.0
Media (DE)	2.0 (1.6) drogas		2.0 (1.7) drogas		1.9 (1.5) drogas	
Mediana	1 droga		1 droga		1 droga	
Moda	1 droga		1 droga		1 droga	
Decil1	1 droga		1 droga		1 droga	

DE= Desviación Estándar

Cuadro 26. Consumo de drogas en los últimos 12 meses por sustancia

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Tabaco	8,731	76.9	7,143	77.1	1,588	76.0
Alcohol	9,186	80.9	7,530	81.3	1,656	79.3
Cannabis	8,310	73.2	6,885	74.3	1,425	68.2
Mariguana	8,307	73.2	6,884	74.3	1,423	68.1
Hachís	461	4.1	393	4.2	68	3.3
Cocaína	4,035	35.5	3,417	36.9	618	29.6
Cocaína (Clorhidrato)	3,225	28.4	2,705	29.2	520	24.9
Crack	1,874	16.5	1,643	17.7	231	11.1
Otra presentación de cocaína	56	0.5	51	0.6	5	0.2
Inhalables	1,976	17.4	1,632	17.6	344	16.5
Solventes y removedores	1,488	13.1	1,246	13.5	242	11.6
Pegamentos	454	4.0	380	4.1	74	3.5
Esmaltes o pinturas	255	2.2	193	2.1	62	3.0
Otros inhalables	63	0.6	50	0.5	13	0.6
Depresores	1,101	9.7	856	9.2	245	11.7
Benzodiacepinas	1,074	9.5	837	9.0	237	11.3
Rohypnol	24	0.2	18	0.2	6	0.3
Otros depresores	22	0.2	16	0.2	6	0.3
Estimulantes	3,403	30.0	2,724	29.4	679	32.5
Anfetamina	143	1.3	123	1.3	20	1.0
Metanfetaminas	3,077	27.1	2,468	26.6	609	29.2
Éxtasis (MDMA) y	433	3.8	336	3.6	97	4.6
Metanfetaminas alucinógenas	44	0.4	39	0.4	5	0.2
Otros estimulantes	44	0.4	39	0.4	5	0.2
Drogas alucinógenas y disociativas	926	8.2	749	8.1	177	8.5
LSD	781	6.9	630	6.8	151	7.2
Plantas alucinógenas y derivados	290	2.6	241	2.6	49	2.3
Otras drogas alucinógenas y disoc.	31	0.3	28	0.3	3	0.1
Opiáceos	349	3.1	295	3.2	54	2.6
Heroína	208	1.8	180	1.9	28	1.3
Opioides sintéticos	108	1.0	89	1.0	19	0.9
Opio y otros opiáceos	44	0.4	36	0.4	8	0.4
Otras sustancias de abuso	184	1.6	129	1.4	55	2.6
Con utilidad médica	57	0.5	37	0.4	20	1.0
Otras sustancias de abuso	128	1.1	93	1.0	35	1.7

Cuadro 27. Droga de preferencia en los últimos 12 meses, según menciones

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Tabaco	1,189	10.5	10.6	912	9.8	10.0	277	13.3	13.5
Alcohol	1,718	15.1	15.4	1,347	14.5	14.7	371	17.8	18.1
Mariguana	4,797	42.3	42.9	4,105	44.3	44.9	692	33.1	33.7
Hachís	9	0.1	0.1	8	0.1	0.1	1	0.0	0.0
Cocaína (Clorhidrato)	449	4.0	4.0	358	3.9	3.9	91	4.4	4.4
<i>Crack</i>	639	5.6	5.7	586	6.3	6.4	53	2.5	2.6
Otra presentación de cocaína	8	0.1	0.1	8	0.1	0.1	70	3.4	3.4
Solventes y removedores	338	3.0	3.0	268	2.9	2.9	10	0.5	0.5
Pegamentos	55	0.5	0.5	45	0.5	0.5	13	0.6	0.6
Esmaltes o pinturas	29	0.3	0.3	16	0.2	0.2	3	0.1	0.1
Otros inhalables	8	0.1	0.1	5	0.1	0.1	0	0.0	0.0
Benzodiazepinas	102	0.9	0.9	55	0.6	0.6	47	2.2	2.3
<i>Rohypno</i> [®]	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0
Otros depresores del SNC	11	0.1	0.1	4	0.0	0.0	7	0.3	0.3
Anfetamina	36	0.3	0.3	33	0.4	0.4	3	0.1	0.1
Metanfetaminas	1,395	12.3	12.5	1,064	11.5	11.7	331	15.8	16.1
Éxtasis (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas	18	0.2	0.2	12	0.1	0.1	6	0.3	0.3
Otros estimulantes del SNC	6	0.1	0.1	4	0.0	0.0	2	0.1	0.1
LSD	32	0.3	0.3	25	0.3	0.3	7	0.3	0.3
Plantas alucinógenas y derivados	2	0.0	0.0	2	0.0	0.0	0	0.0	0.0
Otras drogas alucinógenas y disociativas.	5	0.0	0.0	5	0.1	0.1	0	0.0	0.0
Heroína	124	1.1	1.1	108	1.2	1.2	16	0.8	0.8
Opioides sintéticos	13	0.1	0.1	7	0.1	0.1	6	0.3	0.3
Opio y otros opiáceos	13	0.1	0.1	11	0.1	0.1	2	0.1	0.1
Sustancias con utilidad médica	19	0.2	0.2	11	0.1	0.1	8	0.4	0.4
Otras sustancias de abuso	19	0.2	0.2	11	0.1	0.1	8	0.4	0.4
Ninguna	149	1.3	1.3	122	1.3	1.3	27	1.3	1.3
<i>No consumió en el último año</i>	145	1.3	<i>Se omite</i>	116	1.3	<i>Se omite</i>	29	1.4	<i>Se omite</i>
<i>Sin Información</i>	23	0.2	<i>Se omite</i>	14	0.2	<i>Se omite</i>	9	0.4	<i>Se omite</i>
	11,352	100.0	100.0	9,263	100.0	100.0	2,089	100.0	100.0

Cuadro 28. Droga de mayor impacto en los últimos 12 meses, según menciones

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Tabaco	677	6.0	6.1	525	5.7	5.7	152	7.3	7.4
Alcohol	1,436	12.6	12.8	1,107	12.0	12.1	329	15.7	16.0
Mariguana	4,255	37.5	38.0	3,581	38.7	39.2	674	32.3	32.9
Hachís	19	0.2	0.2	16	0.2	0.2	3	0.1	0.1
Cocaína (Clorhidrato)	582	5.1	5.2	480	5.2	5.3	102	4.9	5.0
<i>Crack</i>	848	7.5	7.6	770	8.3	8.4	78	3.7	3.8
Otra presentación de cocaína	10	0.1	0.1	10	0.1	0.1	0	0.0	0.0
Solventes y removedores	491	4.3	4.4	405	4.4	4.4	86	4.1	4.2
Pegamentos	93	0.8	0.8	76	0.8	0.8	17	0.8	0.8
Esmaltes o pinturas	45	0.4	0.4	30	0.3	0.3	15	0.7	0.7
Otros inhalables	10	0.1	0.1	7	0.1	0.1	3	0.1	0.1
Benzodiacepinas	144	1.3	1.3	87	0.9	1.0	57	2.7	2.8
<i>Rohypnol</i> [®]	3	0.0	0.0	3	0.0	0.0	6	0.3	0.3
Otros depresores del SNC	12	0.1	0.1	6	0.1	0.1	21	1.0	1.0
Anfetamina	49	0.4	0.4	46	0.5	0.5	3	0.1	0.1
Metanfetaminas	2,070	18.2	18.5	1,634	17.6	17.9	436	20.9	21.3
Éxtasis (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas	30	0.3	0.3	23	0.2	0.3	7	0.3	0.3
Otros estimulantes del SNC	12	0.1	0.1	7	0.1	0.1	5	0.2	0.2
LSD	65	0.6	0.6	49	0.5	0.5	16	0.8	0.8
Plantas alucinógenas y derivados	5	0.0	0.0	5	0.1	0.1	0	0.0	0.0
Otras drogas alucinógenas y disociativas	6	0.1	0.1	6	0.1	0.1	0	0.0	0.0
Heroína	136	1.2	1.2	115	1.2	1.3	21	1.0	1.0
Opioides sintéticos	17	0.1	0.2	11	0.1	0.1	6	0.3	0.3
Opio y otros opiáceos	13	0.1	0.1	11	0.1	0.1	2	0.1	0.1
Sustancias con utilidad médica	21	0.2	0.2	12	0.1	0.1	9	0.4	0.4
Otras sustancias de abuso	26	0.2	0.2	20	0.2	0.2	6	0.3	0.3
Ninguna	109	1.0	1.0	92	1.0	1.0	17	0.8	0.8
<i>No consumió en el último año</i>	145	1.3	<i>Se omite</i>	116	1.3	<i>Se omite</i>	29	1.4	<i>Se omite</i>
<i>Sin Información</i>	23	0.2	<i>Se omite</i>	13	0.1	<i>Se omite</i>	10	0.5	<i>Se omite</i>
Total	11,352	100.0	100.0	9,263	100.0	100.0	2,089	100.0	100.0

**Cuadro 29. Uso combinado de drogas en los últimos 12 meses
(No incluye tabaco)**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Si combinó drogas	4,241	37.4	46.2	3,511	37.9	46.7	730	34.9	44.2
No combinó drogas	4,934	43.5	53.8	4,013	43.3	53.3	921	44.1	55.8
<i>No aplica</i>	<i>2,177</i>	<i>19.2</i>	<i>Se omite</i>	<i>1,739</i>	<i>18.8</i>	<i>Se omite</i>	<i>438</i>	<i>21.0</i>	<i>Se omite</i>
Total	11,352	100.0	100.0	9,263	100.0	100.0	2,089	100.0	100.0

**Cuadro 30. Total de drogas consumidas en los últimos 30 días
(Incluye alcohol o tabaco)**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Ninguna	1,087	9.6	839	9.1	248	11.9
1 sustancia	2,617	23.1	2,091	22.6	526	25.2
2 sustancias	3,017	26.6	2,447	26.4	570	27.3
3 sustancias	2,804	24.7	2,357	25.4	447	21.4
4 sustancias	1,194	10.5	1,007	10.9	187	9.0
5 sustancias	411	3.6	340	3.7	71	3.4
6 sustancias	146	1.3	123	1.3	23	1.1
7 sustancias	46	0.4	37	0.4	9	0.4
8 sustancias	16	0.1	12	0.1	4	0.2
9 sustancias	8	0.1	6	0.1	2	0.1
10 -12 sustancias	6	0.1	4	0.0	2	0.1
Total	11,352	100.0	9,263	100.0	2,089	100.0
Media (DE)	2.2 (1.4) drogas		2.3 (1.4) drogas		2.1 (1.4) drogas	
Mediana	2 drogas		2 drogas		2 drogas	
Moda	2 drogas		2 drogas		2 drogas	
Decil1	1 droga		1 droga		Ninguna	

DE= Desviación Estándar

**Cuadro 31. Total de drogas ilícitas consumidas en los últimos 30 días
(No incluye ni alcohol ni tabaco)**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Ninguna	3,251	28.6	2,539	27.4	712	34.1
1 sustancia	5,432	47.9	4,510	48.7	922	44.1
2 sustancias	1,843	16.2	1,530	16.5	313	15.0
3 sustancias	554	4.9	463	5.0	91	4.4
4 sustancias	181	1.6	148	1.6	33	1.6
5 sustancias	57	0.5	48	0.5	9	0.4
6 sustancias	17	0.1	13	0.1	4	0.2
7 sustancias	10	0.1	7	0.1	3	0.1
8 sustancias	4	0.0	3	0.0	1	0.0
9 sustancias	1	0.0	1	0.0	0	0.0
10 sustancias	2	0.0	1	0.0	1	0.0
Total	11,352	100.0	9,263	100.0	2,089	100.0
Media (DE)	1.1 (1.0) droga		1.1 (1.0) droga		1.0 (1.0) droga	
Mediana	1 droga		1 droga		1 drogas	
Moda	1 droga		1 droga		1 drogas	
Decil1	Ninguna		Ninguna		Ninguna	

DE= Desviación Estándar

Cuadro 32. Consumo de drogas en los últimos 30 días por sustancia

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Tabaco	6,958	61.3	5,741	62.0	1,217	58.3
Alcohol	6,376	56.2	5,272	56.9	1,104	52.8
Cannabis	5,670	49.9	4,797	51.8	873	41.8
Mariguana	5,663	49.9	4,792	51.7	871	41.7
Hachís	116	1.0	94	1.0	22	1.1
Cocaína	1,969	17.3	1,699	18.3	270	12.9
Cocaína (Clorhidrato)	1,227	10.8	1,031	11.1	196	9.4
<i>Crack</i>	1,013	8.9	907	9.8	106	5.1
Otra presentación de cocaína	17	0.1	14	0.2	3	0.1
Inhalables	923	8.1	754	8.1	169	8.1
Solventes y removedores	701	6.2	587	6.3	114	5.5
Pegamentos	178	1.6	143	1.5	35	1.7
Esmaltes o pinturas	81	0.7	54	0.6	27	1.3
Otros inhalables	15	0.1	10	0.1	5	0.2
Depresores	494	4.4	366	4.0	128	6.1
Benzodiacepinas	483	4.3	359	3.9	124	5.9
<i>Rohypnol</i>	4	0.0	4	0.0	0	0.0
Otros depresores	11	0.1	7	0.1	4	0.2
Estimulantes	1,975	17.4	1,5	16.8	416	19.9
Anfetamina	38	0.3	35	0.4	3	0.1
Metanfetaminas	1,866	16.4	1,470	15.9	396	19.0
<i>Éxtasis</i> (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas	99	0.9	73	0.8	26	1.2
Otros estimulantes	17	0.1	15	0.2	2	0.1
Drogas alucinógenas y disociativas	192	1.7	144	1.6	48	2.3
LSD	164	1.4	117	1.3	47	2.2
Plantas alucinógenas y derivados	35	0.3	29	0.3	6	0.3
Otras drogas alucinógenas y disoc.	5	0.0	5	0.1	0	0.0
Opiáceos	198	1.7	163	1.8	35	1.7
Heroína	121	1.1	105	1.1	16	0.8
Opioides sintéticos	58	0.5	44	0.5	14	0.7
Opio y otros opiáceos	21	0.2	15	0.2	6	0.3
Otras sustancias de abuso	89	0.8	51	0.6	38	1.8
Con utilidad médica	28	0.2	14	0.2	14	0.7
Otras sustancias de abuso	61	0.5	37	0.4	24	1.1

Cuadro 33. Frecuencia de episodios de abuso del consumo de tabaco¹ en los últimos 30 días

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Sin consumo abusivo	2,027	17.9	29.6	1,683	18.2	29.7	344	16.5	28.9
< de 1 vez a la semana	930	8.2	13.6	760	8.2	13.4	170	8.1	14.3
1 o 2 veces a la semana	807	7.1	11.8	663	7.2	11.7	144	6.9	12.1
Cada tercer día	477	4.2	7.0	398	4.3	7.0	79	3.8	6.6
Diario	2,611	23.0	38.1	2,156	23.3	38.1	455	21.8	38.2
<i>No consumió en los últimos 30 días</i>	<i>4,394</i>	<i>38.7</i>	<i>Se omite</i>	<i>3,522</i>	<i>38.0</i>	<i>Se omite</i>	<i>872</i>	<i>41.7</i>	<i>Se omite</i>
<i>Sin información</i>	<i>106</i>	<i>0.9</i>	<i>Se omite</i>	<i>81</i>	<i>0.9</i>	<i>Se omite</i>	<i>25</i>	<i>1.2</i>	<i>Se omite</i>
Total	11,352	100.0	100.0	9,263	100.0	100.0	2,089	100.0	100.0

¹ Consumo de seis o más cigarrillos en un solo día.

Cuadro 34. Frecuencia de episodios de abuso del consumo de alcohol¹ en los últimos 30 días

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Sin consumo abusivo	1,116	9.8	17.8	920	9.9	17.7	196	9.4	18.1
< de 1 vez a la semana	2,314	20.4	36.9	1,900	20.5	36.6	414	19.8	38.2
1 o 2 veces a la semana	1,823	16.1	29.1	1,513	16.3	29.2	310	14.8	28.6
Cada tercer día	537	4.7	8.6	443	4.8	8.5	94	4.5	8.7
Diario	483	4.3	7.7	412	4.4	7.9	71	3.4	6.5
<i>No consumió en los últimos 30 días</i>	<i>4,976</i>	<i>43.8</i>	<i>Se omite</i>	<i>3,991</i>	<i>43.1</i>	<i>Se omite</i>	<i>985</i>	<i>47.2</i>	<i>Se omite</i>
<i>Sin información</i>	<i>103</i>	<i>0.9</i>	<i>Se omite</i>	<i>84</i>	<i>0.9</i>	<i>Se omite</i>	<i>19</i>	<i>0.9</i>	<i>Se omite</i>
Total	11,352	100.0	100.0	9,263	100.0	100.0	2,089	100.0	100.0

¹ Consumo de más de cuatro copas en un día para los hombres y de más de tres copas en un día para las mujeres.

Cuadro 35. Frecuencia de episodios de abuso del consumo de drogas ilícitas¹ en los últimos 30 días

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
< de 1 vez a la semana	1,598	14.1	23.9	1,255	13.5	22.5	343	16.4	31.0
1 o 2 veces a la semana	1,345	11.8	20.1	1,127	12.2	20.2	218	10.4	19.7
Cada tercer día	1,033	9.1	15.4	888	9.6	15.9	145	6.9	13.1
Diario	2,711	23.9	40.5	2,309	24.9	41.4	402	19.2	36.3
<i>No consumió en los últimos 30 días</i>	<i>3,251</i>	<i>28.6</i>	<i>Se omite</i>	<i>2,539</i>	<i>27.4</i>	<i>Se omite</i>	<i>712</i>	<i>34.1</i>	<i>Se omite</i>
<i>Sin información</i>	<i>1,414</i>	<i>12.5</i>	<i>Se omite</i>	<i>1,145</i>	<i>12.4</i>	<i>Se omite</i>	<i>269</i>	<i>12.9</i>	<i>Se omite</i>
Total	11,352	100.0	100.0	9,263	100.0	100.0	2,089	100.0	100.0

¹ Consumo de cualquier dosis.

GLOSARIO

Droga ilícita de inicio	Es la sustancia ilegal que el usuario refirió como la droga con la cual inicio el consumo de drogas. No incluye el inicio del consumo con alcohol o tabaco.
Droga de mayor impacto en los últimos 12 meses	Sustancia por la que acuden los pacientes a tratamiento, a cuyo consumo los pacientes atribuyen problemas personales, de salud, familiares, escolares, laborales o sociales, en el transcurso del último año.
Droga de preferencia en los últimos 12 meses	Sustancia que el propio usuario solicitante de tratamiento ha elegido o preferido consumir en el transcurso del último año.
Estrato social	Estimación que hace el terapeuta, según su percepción, del estrato al que pertenece el usuario de drogas, considerando aspectos como lugar de residencia, escolaridad, empleo y características manifiestas como higiene y aliño, calidad del vestido, expresión verbal y vocabulario, etc.
Tipo de consumo de drogas ilícitas	Características de consumo de sustancias ilegales según motivo, frecuencia y problemas asociados. No incluye el uso de alcohol y/o tabaco y se clasifica como: experimental, social u ocasional, funcional, disfuncional y en remisión.
Total de drogas consumidas	Número de drogas consumidas (se incluyen las 26 sustancias de seguimiento) en las siguientes categorías: alguna vez en la vida, en el último año y en los últimos 30 días.
Uso combinado de drogas en los últimos 12 meses	Consumo de dos o más sustancias (incluyendo alcohol y cualquier droga ilícita o de uso médico, utilizada sin prescripción, pero excluyendo tabaco) en el transcurso de un mismo día, en el año previo a la solicitud de tratamiento en CIJ.