



Centros de  
Integración  
Juvenil, A.C.



**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD

SISTEMA DE INFORMACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DEL  
CONSUMO DE DROGAS

**CONSUMO DE DROGAS EN SOLICITANTES  
DE TRATAMIENTO EN CENTROS DE  
INTEGRACIÓN JUVENIL**

**DROGAS ILÍCITAS**

**SEGUNDO SEMESTRE DE 2018**

**Alma Delia Gutiérrez López**

Dirección de Investigación y Enseñanza  
Subdirección de Investigación  
México, marzo del 2019

**SIECD**

**Informe de Investigación 19-01a**



## **DIRECTORIO**

### **PRESIDENTE DEL PATRONATO NACIONAL**

Dr. Roberto Tapia Conyer

### **FUNDADORA DE CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL, A.C. Y VICEPRESIDENTA VITALICIA DEL PATRONATO NACIONAL**

Sra. Kena Moreno

### **DIRECTORA GENERAL**

Mtra. Carmen Fernández Cáceres

### **DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE OPERACIÓN Y PATRONATOS**

Dr. José Ángel Prado García

### **DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE NORMATIVIDAD**

Dr. Ricardo Sánchez Huesca

### **DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA**

Mtro. David Bruno Díaz Negrete

### **SUBDIRECTORA DE INVESTIGACIÓN**

Dra. Solveig Eréndira Rodríguez Kuri

### **JEFE DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA Y EPIDEMIOLÓGICA**

Dr. Valeriano Raúl García Aurrecoechea

<b>CONTENIDO</b>	<b>PÁG.</b>
RESUMEN	4
ANTECEDENTES	5
MÉTODO	6
RESULTADOS	8
CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS	8
FACTORES ASOCIADOS A LA DEMANDA DE TRATAMIENTO	11
CONSUMO DE DROGAS	14
REFERENCIAS	24
CUADROS	28
GLOSARIO	52

<b>ÍNDICE DE CUADROS</b>		<b>PÁG.</b>
Cuadro 1	Pacientes de primer ingreso a tratamiento por unidad de atención (CIJ, UH y UTUH)	29
Cuadro 2	Sexo	32
Cuadro 3	Persona que proporciona la información	32
Cuadro 4	Edad de ingreso a tratamiento	32
Cuadro 5	Estado civil	33
Cuadro 6	Escolaridad	33
Cuadro 7	Ocupación	34
Cuadro 8	Estrato social	34
Cuadro 9	Motivos de consulta	35
Cuadro 10	Condicionantes de la solicitud de tratamiento	35
Cuadro 11	Antecedentes de acciones contra el consumo de sustancias	36
Cuadro 12	Problemas asociados al consumo de sustancias	36
Cuadro 13	Edad de inicio del consumo de tabaco	37
Cuadro 14	Edad de inicio del consumo de alcohol	37
Cuadro 15	Edad de inicio del consumo de drogas ilícitas	38
Cuadro 16	Drogas ilícitas de inicio según menciones	39
Cuadro 17	Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de tabaco y el ingreso a tratamiento a CIJ	40
Cuadro 18	Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de alcohol y el ingreso a tratamiento a CIJ	40
Cuadro 19	Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de drogas ilícitas y el ingreso a tratamiento a CIJ	41
Cuadro 20	Tipo de consumo de drogas ilícitas	41
Cuadro 21	Total de drogas consumidas alguna vez en la vida (incluye alcohol o tabaco)	42
Cuadro 22	Total de drogas ilícitas consumidas alguna vez en la vida (no incluye ni alcohol ni tabaco)	42
Cuadro 23	Consumo de drogas alguna vez en la vida por sustancia	43
Cuadro 24	Total de drogas consumidas en el último año (incluye alcohol o tabaco)	44
Cuadro 25	Total de drogas ilícitas consumidas en el último año (no incluye ni alcohol ni tabaco)	44
Cuadro 26	Consumo de drogas en los últimos 12 meses por sustancia	45
Cuadro 27	Droga de preferencia en los últimos 12 meses, según menciones	46
Cuadro 28	Droga de mayor impacto en los últimos 12 meses, según menciones	47
Cuadro 29	Uso combinado de drogas en los últimos 12 meses (no incluye tabaco)	48
Cuadro 30	Total de drogas consumidas en los últimos 30 días (incluye alcohol o tabaco)	48
Cuadro 31	Total de drogas ilícitas consumidas en los últimos 30 días (no incluye ni alcohol ni tabaco)	49
Cuadro 32	Consumo de drogas en los últimos 30 días por sustancia	50
Cuadro 33	Frecuencia de episodios de abuso del consumo de Tabaco en los últimos 30 días	51
Cuadro 34	Frecuencia de episodios de abuso del consumo de Alcohol en los últimos 30 días	51
Cuadro 35	Frecuencia de episodios de abuso del consumo de drogas ilícitas en los últimos 30 días	51

## RESUMEN

El presente informe se realizó con base en 10,757 registros clínicos de la entrevista inicial realizada a personas que acudieron por primera vez a solicitar tratamiento por el consumo de drogas a Centros de Integración Juvenil (CIJ) entre julio y diciembre de 2018.

Los objetivos del estudio son: a) actualizar información de los solicitantes de tratamiento en cuanto al perfil sociodemográfico, factores asociados a la demanda de tratamiento y patrón de consumo de sustancias; b) contribuir al desarrollo, diseño y ajuste de los servicios institucionales de prevención y tratamiento del consumo de drogas c) contribuir con los sistemas nacionales de información del consumo de drogas y d) generar información que oriente el desarrollo de estudios sobre el uso de tabaco, alcohol y otras sustancias en México.

Los datos que se presentan revelan que el uso de drogas ilícitas sigue siendo un problema que afecta mayormente a la población masculina, en una proporción de 4.9 hombres por cada mujer. La edad media de ingreso a tratamiento fue de 24.0 años. En promedio, los hombres ingresaron a tratamiento a mayor edad que las mujeres (24.2 y 23.0 años, respectivamente). La edad promedio del inicio del consumo de tabaco fue a los 14.6 años, la del alcohol a los 14.7 años y la de drogas ilícitas a los 16.4 años. La edad de inicio del consumo de sustancias no presenta diferencias importantes por sexo en cuanto a tabaco y alcohol. Sin embargo, el consumo de drogas ilícitas se presentó de manera más temprana entre los hombres (16.2 años), en comparación con las mujeres (17.4 años.)

Las drogas de mayor consumo alguna vez en la vida fueron: alcohol (88.5%), cannabis (86.4%), tabaco (85.2%), cocaína/crack (47.5%), estimulantes (37.4%, principalmente metanfetaminas: 33.4% y éxtasis: 5.9%), inhalables (22.2%), depresores (14.4 %), drogas alucinógenas y disociativas (12.9%) y opiáceos (4.2%, principalmente heroína: 2.6%). Las sustancias más utilizadas el mes previo al ingreso a tratamiento fueron: tabaco (62.1%), alcohol (57.0%), cannabis (48.7%), estimulantes (18.8%), cocaína (16.3%) e inhalables (6.5%). Las sustancias reportadas como de mayor impacto fueron: marihuana (35.3%), metanfetaminas (21.6%), alcohol (14.2%), crack (7.2%), tabaco (6.3%) y cocaína en polvo (5.4%).

En cuanto a los factores asociados a la demanda de tratamiento se observó que los consultantes acudieron principalmente por recomendación de la familia (44.1%) o por iniciativa propia (41.7%); que solicitaron atención debido a su consumo de drogas ilícitas (88.1%), alcohol (42.6%) o tabaco (36.4%). Previo a su ingreso a tratamiento en CIJ, 33.1% de los solicitantes intentaron interrumpir de manera voluntaria y sin apoyo el uso de sustancias, mientras que 23.4% no habían realizado alguna acción para dejar el consumo. Los problemas asociados al consumo de drogas reportados con mayor frecuencia fueron los del ámbito familiar (78.7%), de salud (44.8%), psicológicos (45.2%) y escolares (35.9%).

## ANTECEDENTES

Centros de Integración Juvenil (CIJ) reporta información epidemiológica del consumo de drogas de los solicitantes de tratamiento desde 1976<sup>1</sup>. En 1983 inicia la aplicación de una cédula homogénea a los pacientes de nuevo ingreso<sup>2</sup>. Sin embargo, es a partir de 1990 que la recolección de datos se realiza de forma sistemática<sup>3</sup>. Posteriormente, se implementa el *Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas* (SIECD), el cual se ha consolidado a través de los años y realiza el seguimiento oportuno de un conjunto de variables que contribuyen en la toma de decisiones de los servicios institucionales. Además, ofrece un panorama sobre la forma y tendencias del uso de drogas y aporta información a los sistemas epidemiológicos de las adicciones en el país, a saber: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA)<sup>4</sup> de la Secretaría de Salud, Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas (SRID) –perteneciente al Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz” (INPRF)<sup>5</sup>– y el Observatorio Epidemiológico en Drogas de la Secretaría Salud<sup>6</sup>.

El SIECD ha apoyado en el desarrollo de diferentes estudios epidemiológicos especializados, incluyendo el perfil de usuarios de drogas y su trayectoria de consumo<sup>7</sup>, uso de drogas en mujeres<sup>8</sup>, población infantil<sup>9</sup> o de acuerdo con las etapas de la vida<sup>10</sup> y estudios de tendencias<sup>11,12,13,14</sup>. Esta información permite enfrentar de manera oportuna las problemáticas generadas por el creciente consumo de estimulantes, al mismo tiempo que sustenta el diseño de estudios sobre características particulares de los consumidores de estos alcaloides<sup>15,16</sup>.

La información reportada a través del sistema ha permitido el desarrollo de estudios epidemiológicos particulares enfocados en profundizar en las características del consumo de drogas legales de pacientes atendidos. Así, desde el 2006, el SIECD genera un informe de las características de los pacientes consumidores de tabaco y alcohol<sup>17</sup>, con lo cual se ha logrado identificar una emergencia epidemiológica del consumo de alcohol entre las mujeres atendidas con relación a los años anteriores<sup>18</sup>; suceso que ha dado pie a CIJ para profundizar en esta problemática<sup>19</sup> y que ha sido reportado por la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT), sobre todo para el caso de las mujeres jóvenes<sup>20</sup>.

Cabe destacar que la información generada por el SIECD durante el lapso de más de dos décadas ha sido consistente con la información de otras encuestas nacionales<sup>21,22,23</sup> y también ha sido referente para el desarrollo de metodologías de

investigación en variados estudios clínicos, psicosociales y evaluativos de la Institución, como es el caso de diversos *Estudios de la Comunidad Objetivo (EBCO)*<sup>24</sup> realizados por los CIJ a lo largo del país.

El presente informe se elaboró con base en información obtenida por el SIECD durante el segundo semestre del 2018 y tiene el objetivo de proporcionar datos actualizados sobre las características sociodemográficas, factores asociados a la demanda de tratamiento y patrón de consumo de drogas de los solicitantes de tratamiento, de manera que se aporten elementos para apoyar el diseño, planeación y ajuste de los programas institucionales de prevención, tratamiento y rehabilitación, además de colaborar con otros sistemas de información en drogas y de aportar elementos para el diseño y elaboración de investigaciones en el campo de las adicciones.

## MÉTODO

**Diseño del estudio:** Censo, descriptivo, semestral.

**Población:** 10,757 usuarios de drogas ilícitas procedentes de 107 unidades de CIJ, que acudieron por primera vez a consulta entre julio y diciembre de 2018 (cuadro 1. Anexo).

**Fuente de información:** Formato de Entrevista Inicial aplicado en la primera consulta por parte del personal médico-técnico responsable del ingreso de pacientes a tratamiento, que forma parte del expediente clínico en cualquiera de sus dos versiones: formato electrónico (base de datos recuperada el día 21 de enero de 2019 a las 11:22 hrs., con 10,719 registros capturados por los/as terapeutas responsables de realizar la entrevista inicial) o formato impreso (38 registros capturados por personal del departamento de Investigación Clínica y Epidemiológica mediante el programa *Control de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas* desarrollado por CIJ).

**Variables de estudio:** Las características sociodemográficas estudiadas comprenden: persona que proporciona la información, sexo, edad de ingreso a tratamiento, estado civil, escolaridad, ocupación y estrato social; las variables de factores asociados a la demanda de tratamiento incluyen: motivo(s) de consulta, condicionante(s) de la solicitud de tratamiento, antecedente(s) de acciones tomadas frente al uso de sustancias y problema(s) asociado(s) al mismo; y las variables de patrón de consumo: edad de inicio, tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de sustancias y el ingreso a tratamiento, consumo alguna vez en la vida, en el último año y en los últimos 30 días; drogas de preferencia y de mayor impacto en el último año (estas dos últimas variables

de acuerdo con el punto de vista del paciente), uso combinado de sustancias, tipo de consumo de drogas ilícitas, episodios de abuso y total de drogas consumidas.

La información sobre el consumo de drogas se presenta agrupada en 26 categorías de drogas y en algunos casos (consumo alguna vez en la vida, en el último año y en el último mes) se proporciona además información concentrada en diez grupos:

Grupo de Sustancias	Drogas en seguimiento
Tabaco	Cigarrillos
Alcohol	Bebidas alcohólicas
<i>Cannabis</i>	Mariguana y hachís
Cocaína	Cocaína, <i>crack</i> y otra presentación de cocaína
Inhalables	Solventes y removedores, pegamentos, esmaltes y pinturas y otros inhalables
Depresores	Benzodiacepinas, <i>Rohypnol</i> y otros depresores
Estimulantes	Anfetaminas, metanfetaminas ( <i>crystal</i> o <i>ICE</i> ), MDMA ( <i>éxtasis</i> ) y metanfetaminas alucinógenas; y otros estimulantes
Drogas alucinógenas y disociativas	Ácido lisérgico (LSD), plantas alucinógenas y derivados y otros alucinógenos (PCP y ketamina)
Opiáceos	Heroína, Opioides sintéticos y opio y otros opiáceos
Otras sustancias de abuso	Sustancias con utilidad médica y otras sustancias no identificadas

**Procesamiento de datos.** Para el procesamiento estadístico de la información se utilizó el programa SPSS v.19.

Los resultados se presentan tanto en forma general como desglosada por sexo y en porcentajes válidos, excluyendo los casos “*sin información*” y aquellos que no cumplieron con las condiciones requeridas para el análisis en cada variable de estudio.



## RESULTADOS



### CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS<sup>a</sup>

**Sexo.** La población se conformó por 8,934 hombres y 1,822 mujeres, lo cual representa 83.1% y 16.9%, respectivamente. Es decir, cuatro hombres solicitan tratamiento en CIJ por cada mujer.

**Persona que proporciona la información.** 48.3% de los casos acudieron en compañía de familiares u otras personas, sin grandes diferencias entre hombres (48.6%) y mujeres (46.9%).

**Edad de ingreso a tratamiento.** Se observa un rango de edad de 8 a 87 años, con un promedio de 24.0 años (DE= 11.0 años); es decir, 9,010 de los usuarios de drogas tenía entre los 13 y 35 años de edad (alrededor del 84% de las personas atendidas); la edad mediana de la población fue de 20 años (38.5% de los casos fueron menores de edad; 4,139 sujetos), mientras que la moda se ubicó en 16 años (1,009 casos atendidos).

Figura 1. Edad de ingreso según sexo


	 Años	 Años	Las mujeres ingresaron a tratamiento a menor edad (en promedio, un año antes que los hombres).
<b>Rango</b>	8 a 84	10 a 87	
<b>Promedio (Desviación estándar)</b>	24.2 (11.0)	23.0 (10.6)	
<b>Mediana</b>	20	19	
<b>Moda</b>	16	15	
<b>Decil<sub>1</sub></b>	14	14	

<sup>a</sup> Cfr., Cuadros 1 a 8.

**Estado civil.** La mayor parte de la población refirió ser soltera (69.4%), mientras que 12.6% indicó que vivía en unión libre y 9.9% estaba casada.


**Figura 2. Estado civil según sexo**

La proporción de hombres y mujeres solteros es equivalente, siendo la categoría que representa el estado civil de la mayoría de los usuarios. No obstante que la proporción de hombres que cuentan con alguna relación de pareja es mayor que la de mujeres.



**Escolaridad.** En términos generales, 40.9% había cursado algún grado de bachillerato, 36.3% al menos algún grado de educación secundaria, 12.3% tenía estudios superiores y 7.1% solo había cursado la primaria.


**Figura 3. Escolaridad según sexo**



Tanto hombres como mujeres cuentan con estudios similares.


**Ocupación.** 37.6% desempeñaba alguna actividad laboral, 30.7% reportó ser estudiante y 21.3% estaba desempleado.

**Figura 4. Principal ocupación según sexo**



**Estrato social.** De acuerdo con la percepción de los terapeutas, la mitad de los pacientes (50.7%) se ubicaban en el estrato medio bajo, 22.9% en un nivel bajo y 21.7% fue clasificado en el estrato medio.


**Figura 5. Estrato social según sexo**



## FACTORES ASOCIADOS A LA DEMANDA DE TRATAMIENTO<sup>b</sup>


**Motivos de consulta.** 45.7% de las personas atendidas reportaron más de un motivo para acudir a tratamiento (uso de alcohol, tabaco o drogas), mientras que 0.1% no expresó ninguno. 88.1% de los pacientes acudió por consumo de drogas ilícitas, 42.6% por uso de bebidas alcohólicas y 36.4% por uso de tabaco.

**Figura 6. Motivos de consulta según sexo**



**Condicionantes de la solicitud de tratamiento.** 28.1% de los casos expresó dos o más condicionantes para acudir a tratamiento; 44.1% acudió por recomendación de la familia, 41.7% por iniciativa propia, 18.0% por condicionamiento o recomendación escolar, 9.8% por indicación médica y 9.3 % por condicionamiento legal.


**Figura 7. Condicionantes de la solicitud de tratamiento según sexo**



<sup>b</sup> Cfr. Cuadros 9 a 12.

**Antecedentes de acciones contra el consumo de sustancias.** 33.1% de los pacientes expresó que antes de acudir a CIJ había intentado interrumpir voluntariamente el consumo sin otro tipo de apoyo, 13.2% señaló que había estado internado en algún anexo, 7.6% había acudido a algún grupo de autoayuda, 7.4% lo había hecho a través de juramento y el 6.8% con tratamiento psiquiátrico o psicoterapéutico de tipo ambulatorio. Cabe señalar que 14.4% reportó haber intentado al menos dos formas distintas de acciones para abandonar el consumo de drogas, en tanto que 23.4% expresó que hasta el momento de la solicitud de tratamiento no había tomado ninguna medida en contra del consumo de drogas.


**Figura 8. Antecedentes de acciones contra el consumo de sustancias según sexo**



Mayor porcentaje de mujeres ingresaron a CIJ sin haber realizado acciones previas para dejar el consumo de drogas o habían acudido a tratamientos psiquiátricos o psicoterapéuticos ambulatorios, mientras que los hombres en mayor proporción que las mujeres intentaron dejarlo de manera voluntaria, se internaron en algún anexo, participaron en grupos de autoayuda o por medio de juramento.

**Problemas asociados al consumo de sustancias.** 78.7% de los pacientes señaló problemas de tipo familiar, 44.8% de salud, 45.2% psicológicos, 35.9% escolares, 25.1% laborales, 20.2% legales, 14.5% de conducta antisocial o delictiva y 13.6% accidentes o lesiones. Cabe señalar que 78.0% de las personas atendidas mencionaron dos o más problemas asociados al consumo de sustancias, mientras que 4.6% no reportó ninguno.

**Figura 9. Problemas asociados al consumo de sustancias según sexo**





Los problemas familiares son los más frecuentemente relacionados al consumo de drogas entre hombres y mujeres.

Sin embargo, las mujeres reportaron en mayor proporción que los hombres problemas psicológicos, de salud y escolares; mientras que los hombres por poco duplican el porcentaje de mujeres, al referir problemas de tipo laboral y legal.

## CONSUMO DE DROGAS<sup>c</sup>

**Edad de inicio del consumo de sustancias.** La edad promedio de inicio del consumo de tabaco se situó en 14.6 años (DE =3.6 años), la mediana en 14 años y la moda en 15 años, mientras que la edad promedio de inicio del consumo de alcohol se ubicó en 14.7 años (DE =3.2 años) con una mediana y una moda de 15 años. Por su parte, la edad promedio de inicio del uso de drogas ilícitas (incluyendo sustancias de uso médico sin prescripción) fue de 16.4 años (DE =5.6 años), con una mediana y una moda de 15 años. Por otra parte, al considerar el primer decil como indicador de las edades de inicio más tempranas, se observa que el consumo de tabaco aparece a los 11 años, mientras que el de alcohol y drogas ilícitas se presenta a los 12 años de edad.

**Figura 10. Edad de inicio del consumo de sustancias según sexo**

	 <b>Años</b>			 <b>Años</b>		
	Tabaco	Alcohol	Drogas ilícitas	Tabaco	Alcohol	Drogas ilícitas
<b>Promedio</b> (Desviación estándar)	14.6 (3.6)	14.7 (3.0)	16.2 (5.1)	14.8 (3.9)	14.8 (3.8)	17.4 (7.2)
<b>Mediana</b>	14	15	15	14	15	15
<b>Moda</b>	15	15	15	15	15	15
<b>Decil<sub>1</sub></b>	11	12	12	11	12	12


En cuanto a la edad de inicio del consumo de sustancias, no se observan grandes diferencias entre hombres y mujeres.

**Drogas ilícitas de inicio.** Las sustancias de inicio más reportadas fueron: marihuana (74.5%); cocaína (10.9%), tanto en forma de polvo blanco (8.4%) como crack (2.4%); inhalables (6.4%), mayormente en forma de solventes y removedores (4.6%); seguidos por los estimulantes (5.4%), donde destacan las metanfetaminas (4.6%); depresores

<sup>c</sup> Cfr., Cuadros 13 a 35

con utilidad médica como las benzodiacepinas (1.4%); y los opiáceos (0.5%), entre los cuales sobresalen los opioides sintéticos (29 casos) y la heroína (24 casos).

**Figura 11. Principales drogas ilícitas de inicio según sexo**





**Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de sustancias y el ingreso a tratamiento en CIJ.** El promedio de años entre el inicio de consumo y la solicitud de tratamiento se situó de la siguiente manera: tabaco, 9.8 años (DE=10.5 años), alcohol 9.9 años (DE=10.4 años) y drogas ilícitas 7.6 años (DE =9.3 años).

Cabe señalar que la mitad de los usuarios de alcohol y la mitad de los usuarios de tabaco dejaron pasar seis años desde que iniciaron el consumo hasta que acudieron a solicitar tratamiento; en tanto que los usuarios de drogas dejaron pasar cuatro años.




**Figura 12. Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de sustancias y el ingreso a tratamiento en CIJ según sexo**

	 Años			 Años		
	Tabaco	Alcohol	Drogas ilícitas	Tabaco	Alcohol	Drogas ilícitas
<b>Promedio</b> (Desviación estándar)	10.1 (10.6)	10.2 (10.6)	8.0 (9.5)	8.5 (9.7)	8.3 (9.6)	5.6 (7.7)
<b>Mediana</b>	6	6	4	5	5	3
<b>Moda</b>	1	1	1	1	1	< un año
<b>Decil<sub>1</sub></b>	1	1	< un año	1	1	< un año

Los hombres dejan pasar más tiempo que las mujeres para solicitar tratamiento.

**Tipo de consumo de drogas ilícitas.** De acuerdo con los terapeutas, 53.4% de los solicitantes de tratamiento fue diagnosticado con consumo funcional, 21.9% con consumo disfuncional, 12.9% con consumo social u ocasional, 8.9% con consumo experimental y 3.0% presentaba remisión del consumo.

**Figura 13. Tipo de consumo de drogas ilícitas según sexo**




El patrón de consumo funcional y disfuncional es mayor en los hombres, mientras que una mayor proporción de mujeres reporta el consumo de tipo ocasional y experimental.

**Total de drogas consumidas.** El promedio de sustancias utilizadas alguna vez en la vida, incluyendo alcohol o tabaco, fue de 4.3 drogas (95.1% reportó el uso de dos o más sustancias); en el último año fue de 3.5 drogas (89.0% consumió dos o más sustancias); y en los últimos 30 días fue de 2.2 drogas (67.7% reportó haber utilizado dos o más sustancias).

El promedio de sustancias consumidas alguna vez en la vida, sin incluir alcohol y tabaco, fue de 2.6 drogas (62.4% reportó el uso de dos o más sustancias); en el último año fue de 1.9 drogas (48.0% consumió dos o más sustancias); y en los últimos 30 días fue de 1.0 droga (22.7% reportó haber utilizado dos o más sustancias).

**Figura 14. Promedio de drogas consumidas según sexo**




Mujeres y hombres consumieron un promedio similar de drogas.

**Consumo de drogas alguna vez en la vida.**<sup>d</sup> Las proporciones de consumo alguna vez en la vida de los diez grupos de sustancias en seguimiento fueron: alcohol (88.5%), *cannabis* (86.4%), tabaco (85.2%), cocaína (47.5%), estimulantes (37.4%), inhalables (22.2%), depresores (14.4 %), drogas alucinógenas y disociativas (12.9%), opiáceos (4.2%) y otras sustancias de abuso (1.8%).

En cuanto al uso de sustancias específicas (contenidas en alguno de los diez grupos antes mencionados) sobresalen: marihuana (86.4%), cocaína en polvo (41.5%), metanfetaminas (33.4%), *crack* (20.7%), solventes y removedores (16.5%) y benzodiacepinas (13.9%); en menor proporción la LSD (10.6%), *éxtasis* y otras metanfetaminas alucinógenas (5.9%), pegamentos (5.7%) y hachís (5.2%).

**Figura 15. Consumo de drogas alguna vez en la vida según sexo**




Los hombres reportaron en mayor proporción que las mujeres el consumo de tabaco, marihuana, inhalables, cocaína y crack. Ellas reportaron mayormente el consumo de metanfetaminas, benzodiacepinas y éxtasis.

<sup>d</sup> Los casos pudieron haber reportado el consumo de dos o más sustancias, por lo que el total de los porcentajes no suma 100%.

**Consumo de drogas en los últimos 12 meses.** 98.7% de las personas reportaron haber consumido alguna sustancia en el año previo a su ingreso a tratamiento en CIJ. Las proporciones de consumo de los diez grupos de sustancias utilizadas en este lapso fueron: alcohol (81.2%), tabaco (76.2%), *cannabis* (71.7%), cocaína (34.9%), estimulantes (32.2%), inhalables (14.8%), depresores (10.0%), drogas alucinógenas y disociativas (8.1%); opiáceos (3.1%) y otras sustancias de abuso (1.3%).

En cuanto al consumo de sustancias específicas contenidas en alguno de los grupos anteriores, destacaron: marihuana (71.7%), metanfetaminas (29.4%), cocaína en polvo (28.1%), *crack* (15.2%) y solventes y removedores (11.3%); en menor proporción se refieren las benzodiazepinas (9.7%) y LSD (7.0%).


**Figura 16. Consumo de drogas en los últimos 12 meses según sexo**



Las drogas más consumidas en el último año por ambos sexos fueron alcohol, tabaco y marihuana; las mujeres usaron en mayor proporción metanfetaminas, benzodiazepinas, drogas alucinógenas y éxtasis; los hombres reportaron en mayor proporción el uso de inhalables, cocaína en polvo y crack.

**Droga de preferencia en los últimos 12 meses.** Entre las sustancias más frecuentemente referidas se encontraron: marihuana (40.9%), alcohol (16.6%), metanfetaminas (14.3%) y tabaco (10.7%).

**Figura 17. Droga de preferencia en los últimos 12 meses según sexo**




Los hombres reconocieron mayor preferencia que las mujeres por el uso de marihuana, cocaína en polvo, crack y heroína; mientras que en las mujeres la preferencia fue mayor que en los hombres por el tabaco, alcohol, inhalables, metanfetaminas y benzodiacepinas.

No obstante, cabe resaltar que la marihuana es la droga preferidas tanto por hombres como por mujeres.

**Droga de mayor impacto en los últimos 12 meses.** Las principales sustancias reportadas por los pacientes a las cuales atribuyeron los mayores daños a la salud, bienestar personal y familiar o en el desempeño escolar, laboral o social y por las que reportaron haber solicitado tratamiento fueron: marihuana (35.3%), metanfetaminas (21.6%) y alcohol (14.2%); en menor medida se mencionó al crack (7.2%), tabaco (6.3%) y cocaína en polvo (5.4%).

**Figura 18. Droga de mayor impacto en los últimos 12 meses según sexo**




Hombres y mujeres acuden a tratamiento principalmente por el consumo de marihuana y metanfetaminas.

Con mayor frecuencia ellos acuden por los efectos asociados al consumo de marihuana y crack; mientras que ellas por los del uso de tabaco, alcohol, metanfetaminas y benzodiacepinas.

**Uso combinado de drogas en los últimos 12 meses.<sup>e</sup>** Al menos en una ocasión en el transcurso del último año y sin tomar en cuenta el consumo de tabaco, más de la mitad de la población (47.0%) reportó el consumo de dos o más sustancias en un mismo día.

**Figura 19. Uso combinado de droga en los últimos 12 meses según sexo**



Los hombres reportan el uso de dos o más sustancias (no se incluye el consumo de tabaco) en un mismo día.


<sup>e</sup> No se toman en cuenta 2,078 casos (19.3%) que no cumplieron los criterios de inclusión de esta variable; 19.2% de los hombres y 19.9% de las mujeres (ver anexo, cuadro 29).

**Consumo de drogas en los últimos 30 días.** Incluyendo alcohol y tabaco, 90.9% de los casos reportaron consumo de sustancias en el mes anterior al ingreso a tratamiento.

Las prevalencias de consumo de los diez grupos de sustancias utilizadas en este lapso fueron: tabaco (62.1%), alcohol (57.0%), cannabis (48.7%), estimulantes (18.8%), cocaína (16.3%), inhalables (6.5%), depresores (4.3%), drogas alucinógenas y disociativas (1.8%), opiáceos (1.6%) y otras sustancias de abuso (0.7%).


En cuanto al consumo de sustancias específicas destacó el de marihuana con 48.7%, seguida de metanfetaminas (18.0%), Cocaína (10.6%), crack (7.9%) y solventes/removedores (5.3%); en menor proporción se registró el consumo de benzodiacepinas (4.2), LSD (1.5%) y heroína (1.1%).

**Figura 20. Consumo de drogas en los últimos 30 días según sexo**



**Frecuencia de episodios de abuso en los últimos 30 días.** 39.8% de quienes reportaron consumo de tabaco en los últimos 30 días aceptó fumar seis o más cigarrillos diariamente. Asimismo, entre quienes consumieron alcohol, la mayor parte (35.5%) reportó consumo abusivo menos de una vez a la semana o una o dos veces a la semana (31.0%). Por otra parte, 40.2% de los usuarios de drogas ilícitas durante el último mes reportaron consumirlas todos los días, 23.4% menos de una vez a la semana, 20.2% una a dos veces a la semana y 16.3% cada tercer día.

**Figura 21. Frecuencia de episodios de abuso en los últimos 30 días según sexo**



Los hombres refieren mayor frecuencia de episodios de abuso de drogas ilícitas y de alcohol que las mujeres. Las mujeres abusan más del consumo de tabaco que los hombres.



## REFERENCIAS

1. Sánchez-Huesca, R. y López, L. M. (1985). *Características demográficas y patrones de inicio en el consumo de drogas en asistentes a los Centros Locales; recuperación de los archivos de siete años (1976-1982)*. México: Centros de Integración Juvenil, A.C.
2. Clarac, P. y Wagner, F. (1987). Análisis de algunas variables en una muestra de pacientes farmacodependientes (1986). En Wagner, F. y Ortiz, R. (1990). *Estudios acerca de la farmacodependencia en México realizados por Paule Clarac*. México: Centros de Integración Juvenil, A. C. (pp. 111-126).
3. García V. R., Díaz, D. B., Balanzario, M. C., Gutiérrez, A. D y Castillo, P. I. (1999). *Características sociodemográficas y de consumo de drogas en pacientes atendidos entre 1990 y 1997* (Informe de investigación 98-12). México: Centros de Integración Juvenil, A.C.
4. Secretaria de Salud. *Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA)*. México. Dirección General de Epidemiología. Recuperado de [http://187.191.75.115/gobmx/salud/documentos/info\\_sisvea/informes\\_sisvea\\_2006.pdf](http://187.191.75.115/gobmx/salud/documentos/info_sisvea/informes_sisvea_2006.pdf)
5. Ortiz, A., Martínez, R., Meza, D. (2018). *Grupo Interinstitucional para el desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas. Tendencias en el área metropolitana no. 61*. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. México. Recuperado de [http://www.inprf.gob.mx/opencms/export/sites/INPRFM/psicosociales/archivos/srid/rep\\_61\\_pdf.pdf](http://www.inprf.gob.mx/opencms/export/sites/INPRFM/psicosociales/archivos/srid/rep_61_pdf.pdf)
6. Díaz, D. B., Balanzario, M. C., Castillo, P. I., Gutiérrez, A. D. y García, V. R. (2001). Uso de drogas entre pacientes de primer ingreso en Centros de Integración Juvenil. En Secretaría de Salud. *Observatorio Epidemiológico en drogas. El fenómeno de las adicciones en México 2001*. México: Secretaría de Salud (pp. 66-71). Recuperado de [http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/publicaciones/obs2001\\_cap4.pdf](http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/publicaciones/obs2001_cap4.pdf)
7. García-Aurrecoechea, V. R., Díaz-Negrete, D. B., Balanzario, M. C. y Castillo-

- Franco, P. I. (1998). *Perfil y trayectoria del consumo de drogas en pacientes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil en 1996*. En CD: D. B. Diaz, J. L. Arellanez, M. C. Balanzario y R. Sánchez, *Once años de estudios del consumo de drogas en México, Investigaciones realizadas en Centros de Integración Juvenil entre 1997 y 2007*. México: Centros de Integración Juvenil, A. C.
8. Castillo, P. I., Gutiérrez, A. D. (2008). Consumo de drogas en mujeres asistentes a centros de tratamiento especializado en la Ciudad de México. *Salud Mental* 31 (5), 351-359. Recuperado de <http://scielo.unam.mx/pdf/sm/v31n5/v31n5a3.pdf>
  9. Gracia, S. E. y Balanzario, M. C. (2003). *El consumo de drogas en menores de 12 años en Centros de Integración Juvenil en el año 2002* (Informe de Investigación 03-17). México: Centros de Integración Juvenil, A. C.
  10. García, V. R., Castillo, P. I. y Guerrero, J. A. (2003). *El consumo de drogas en pacientes atendidos en Centros de Integración Juvenil según la etapa de vida correspondiente al ingreso a tratamiento* (Informe de Investigación 03-13). México: Centros de Integración Juvenil, A. C.
  11. García, V. R., Diaz, D. B. y Balanzario, M. C. (2001). *Tendencias del consumo de drogas en pacientes de primer ingreso a tratamiento en CIJ entre 1990 y 1999* (Informe de investigación 2000-06). México: Centros de Integración Juvenil, A.C.
  12. Gutiérrez López, AD. (2018). *Tendencias del consumo de drogas alguna vez en la vida en Usuarios de drogas ilícitas solicitantes de tratamiento en Centros de Integración Juvenil. Segundo semestre de 2008 – primer semestre de 2018. (Nivel Nacional y Entidades Federativas)* [Informe de Investigación 18-06e]. México: Centros de Integración Juvenil, A. C. Recuperado de <http://www.test.cij.gob.mx/ExtCIJ/programas/Investigacion/pdf/18-06e.pdf>
  13. Gutiérrez, A. D. (2018). *Tendencias del consumo de drogas en los últimos 30 días de drogas ilícitas solicitantes de tratamiento en Centros de Integración Juvenil. Segundo semestre de 2008 – primer semestre de 2018. (Nivel Nacional y Entidades Federativas)* [Informe de Investigación 18-06f]. México: Centros de Integración Juvenil, A. C. Recuperado de <http://www.test.cij.gob.mx/ExtCIJ/programas/Investigacion/pdf/18-06f.pdf>

14. Gutiérrez, A. D. (2018). *Droga de mayor impacto reportada por usuarios de drogas ilícitas solicitantes de tratamiento en Centros de Integración Juvenil. Segundo semestre de 2008 – primer semestre de 2018. (Nivel nacional y entidades federativas)* [Informe de Investigación 18-06g]. México: Centros de Integración Juvenil, A. C. Recuperado de <http://www.test.cij.gob.mx/ExtCIJ/programas/Investigacion/pdf/18-06g.pdf>
15. Jiménez, K., García, V. R. y González, J. D. (2005). *Patrón de consumo de cocaína y crack en pacientes que ingresan a tratamiento* (Informe de investigación 05-07). México: Centros de Integración Juvenil, A. C.
16. Jiménez, K. y Castillo, N. L. (2014). *Factores de reincidencia en usuarios de cocaína, crack y metanfetaminas en fase de recuperación* (Informe de Investigación 04-14). México: Centros de Integración Juvenil, A. C.
17. Gutiérrez, A. D. y Castillo, P. I. (2007). *Estudio epidemiológico del consumo de alcohol y tabaco en pacientes usuarios de estas sustancias solicitantes de tratamiento en CIJ en 2006* (Informe de Investigación 07-13). México: Centros de Integración Juvenil, A. C. Recuperado de <http://www.test.cij.gob.mx/ExtCIJ/programas/Investigacion/pdf/07-13.pdf>
18. Benítez, J.L. (2018). *Consumo de drogas en solicitantes de tratamiento en Centros de Integración Juvenil. Tabaco y alcohol. Primer semestre del 2018.* (Informe de Investigación 18-06d). México: Centros de Integración Juvenil, A. C. Recuperado de <http://www.test.cij.gob.mx/ExtCIJ/programas/Investigacion/pdf/18-06d.pdf>
19. Moreno, K. (2010). *Los jóvenes y el alcohol en México. Un problema emergente en mujeres.* México: Centros de Integración Juvenil, A.C.
20. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz; Instituto Nacional de Salud Pública, Comisión Nacional Contra las Adicciones, Secretaría de Salud. Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017: Reporte de Alcohol. Villatoro-Velázquez JA, Reséndiz Escobar, E., Mujica Salazar, A., Bretón-Cirett, M., Cañas-Martínez, V., Soto-Hernández, I., Fregoso-Ito, D., Fleiz-Bautista, C., Medina-Mora ME., Gutiérrez-Reyes, J., Franco-Núñez, A., Romero-Martínez, M. y Mendoza-Alvarado, L. Ciudad de México, México: INPRFM; 2017.

21. Medina-Mora, M. E. Villatoro J. A., Fleiz, C., Téllez, M. M., Mendoza, L. R., Romero, M., Gutiérrez, J. P., Castro, M., Hernández, M., Tena, C., Alvear, C. y Guisa, V. (2012). *Encuesta Nacional de Adicciones 2011: Reporte de Alcohol*. México: Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.
22. Medina-Mora, M. E. Villatoro J. A., Fleiz, C., Téllez, M. M., Mendoza, L. R., Romero, M., Gutiérrez, J. P., Castro, M., Hernández, M., Tena, C., Alvear, C. y Guisa, V. (2012). *Encuesta Nacional de Adicciones 2011: Reporte de Drogas*. México: Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.
23. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz; Instituto Nacional de Salud Pública, Comisión Nacional Contra las Adicciones, Secretaría de Salud. *Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017: Reporte de Drogas*. Villatoro-Velázquez JA, Reséndiz Escobar, E., Mujica Salazar, A., Bretón-Cirett, M., Cañas-Martínez, V., Soto-Hernández, I., Fregoso-Ito, D., Fleiz-Bautista, C., Medina-Mora ME., Gutiérrez-Reyes, J., Franco-Núñez, A., Romero-Martínez, M. y Mendoza-Alvarado, L. Ciudad de México, México: INPRFM; 2017.
24. Diaz, D. B., Chacón, J. L., Castillo, N. L., Castillo, P. I. y Arellanez, J. L. (2013). *Estudio Básico de Comunidad Objetivo Vol. 1 y 2*. México: Centros de Integración Juvenil, A. C. Recuperado de <http://www.cij.gob.mx/ebco2013/index.html>

---

# Cuadros

---

**CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS USUARIOS DE DROGAS ILÍCITAS DE PRIMER INGRESO A TRATAMIENTO A CIJ EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2018**

**Cuadro 1. Pacientes de primer ingreso por unidad de atención (CIJ, UH y UTUH)**

CIJ	General		Hombres		Mujeres		Razón H:M
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	
Álvaro Obregón Norte	106	1.0	94	1.1	12	0.7	7.8 : 1
Álvaro Obregón Oriente	57	0.5	45	0.5	12	0.7	3.8 : 1
Atizapán	104	1.0	93	1.0	11	0.6	8.5 : 1
Azcapotzalco	120	1.1	97	1.1	23	1.3	4.2 : 1
Benito Juárez	136	1.3	113	1.3	23	1.3	4.9 : 1
Chalco	149	1.4	124	1.4	25	1.4	5.0 : 1
Coyoacán	130	1.2	101	1.1	29	1.6	3.5 : 1
Cuajimalpa	87	0.8	77	0.9	10	0.5	7.7 : 1
Cuauhtémoc Oriente	118	1.1	101	1.1	17	0.9	5.9 : 1
Cuauhtémoc Poniente	116	1.1	91	1.0	25	1.4	3.6 : 1
Ecatepec	204	1.9	174	1.9	30	1.6	5.8 : 1
Gustavo A. Madero Aragón	189	1.8	164	1.8	25	1.4	6.6 : 1
Gustavo A. Madero Norte	12	0.1	8	0.1	4	0.2	2.0 : 1
Gustavo A. Madero Oriente	163	1.5	135	1.5	28	1.5	4.8 : 1
Iztapalapa Oriente	347	3.2	294	3.3	53	2.9	5.5 : 1
Iztapalapa Poniente	110	1.0	89	1.0	21	1.2	4.2 : 1
Miguel Hidalgo	110	1.0	92	1.0	18	1.0	5.1 : 1
Naucalpan	106	1.0	90	1.0	16	0.9	5.6 : 1
Nezahualcóyotl	241	2.2	199	2.2	42	2.3	4.7 : 1
Texcoco	121	1.1	112	1.3	9	0.5	12.4 : 1
Tlalnepantla	188	1.7	154	1.7	34	1.9	4.5 : 1
Tlalpan	160	1.5	135	1.5	25	1.4	5.4 : 1
Venustiano Carranza	154	1.4	132	1.5	22	1.2	6.0 : 1
UH Ecatepec	58	0.5	56	0.6	2	0.1	28.0 : 1
UH Iztapalapa	124	1.2	111	1.2	13	0.7	8.5 : 1
UH Naucalpan	47	0.4	41	0.5	6	0.3	6.8 : 1
Acapulco	115	1.1	94	1.1	21	1.2	4.5 : 1
Aguascalientes	218	2.0	181	2.0	37	2.0	4.9 : 1
Cancún	116	1.1	92	1.0	24	1.3	3.8 : 1
Cd. del Carmen	30	0.3	24	0.3	6	0.3	4.0 : 1
Cd. Juárez Norte	106	1.0	83	0.9	23	1.3	3.6 : 1
Cd. Victoria	22	0.2	19	0.2	3	0.2	6.3 : 1
Celaya	253	2.4	220	2.5	33	1.8	6.7 : 1
Chetumal	35	0.3	32	0.4	3	0.2	10.7 : 1

*(Continúa)*

**Cuadro 1. Pacientes de primer ingreso a tratamiento por unidad de atención (CIJ, UH y UTUH)**  
(Continuación)

CIJ	General		Hombres		Mujeres		Razón H:M
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	
Chihuahua	261	2.4	214	2.4	47	2.6	4.6 : 1
Chilpancingo	56	0.5	45	0.5	11	0.6	4.1 : 1
Colima	126	1.2	106	1.2	20	1.1	5.3 : 1
Cozumel	49	0.5	37	0.4	12	0.7	3.1 : 1
Cuernavaca	122	1.1	98	1.1	24	1.3	4.1 : 1
Culiacán	138	1.3	117	1.3	21	1.2	5.6 : 1
Durango	91	0.8	64	0.7	27	1.5	2.4 : 1
Escuinapa	44	0.4	38	0.4	6	0.3	6.3 : 1
Fresnillo	39	0.4	30	0.3	9	0.5	3.3 : 1
Guadalajara Centro	278	2.6	221	2.5	57	3.1	3.9 : 1
Guadalajara Sur	126	1.2	93	1.0	33	1.8	2.8 : 1
Guadalupe	83	0.8	70	0.8	13	0.7	5.4 : 1
Guamúchil	56	0.5	50	0.6	6	0.3	8.3 : 1
Guasave	95	0.9	85	1.0	10	0.5	8.5 : 1
Hermosillo	133	1.2	107	1.2	26	1.4	4.1 : 1
Huatulco	30	0.3	26	0.3	4	0.2	6.5 : 1
Ixtapa Zihuatanejo	51	0.5	40	0.4	11	0.6	3.6 : 1
La Paz	53	0.5	43	0.5	10	0.5	4.3 : 1
La Piedad	38	0.4	30	0.3	8	0.4	3.8 : 1
Laguna Durango	83	0.8	69	0.8	14	0.8	4.9 : 1
León	193	1.8	161	1.8	32	1.8	5.0 : 1
Los Cabos	39	0.4	35	0.4	4	0.2	8.8 : 1
Los Mochis	84	0.8	76	0.9	8	0.4	9.5 : 1
Manzanillo	39	0.4	31	0.3	8	0.4	3.9 : 1
Mazatlán	95	0.9	79	0.9	16	0.9	4.9 : 1
Mérida	61	0.6	57	0.6	4	0.2	14.3 : 1
Mexicali	131	1.2	101	1.1	30	1.6	3.4 : 1
Monterrey	149	1.4	121	1.4	28	1.5	4.3 : 1
Morelia	103	1.0	83	0.9	20	1.1	4.2 : 1
Nogales	79	0.7	58	0.6	21	1.2	2.8 : 1
Oaxaca	101	0.9	83	0.9	18	1.0	4.6 : 1
Pachuca	155	1.4	125	1.4	30	1.6	4.2 : 1
Playa del Carmen	54	0.5	43	0.5	11	0.6	3.9 : 1
Poza Rica	43	0.4	38	0.4	5	0.3	7.6 : 1
Puebla	97	0.9	86	1.0	11	0.6	7.8 : 1
Puerto Vallarta	82	0.8	70	0.8	12	0.7	5.8 : 1
Querétaro	109	1.0	92	1.0	17	0.9	5.4 : 1
Ramos Arizpe	14	0.1	12	0.1	2	0.1	6.0 : 1
Reynosa	34	0.3	30	0.3	4	0.2	7.5 : 1

(Continúa)

**Cuadro 1. Pacientes de primer ingreso a tratamiento por unidad de atención (CIJ, UH y UTUH)**  
(Continuación)

CIJ	General		Hombres		Mujeres		Razón H:M
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	
Salamanca	97	0.9	86	1.0	11	0.6	7.8 : 1
Saltillo	201	1.9	158	1.8	43	2.4	3.7 : 1
San Luis Potosí	164	1.5	138	1.5	26	1.4	5.3 : 1
San Nicolás de los Garza	115	1.1	94	1.1	21	1.2	4.5 : 1
Tampico	63	0.6	54	0.6	9	0.5	6.0 : 1
Tapachula	30	0.3	27	0.3	3	0.2	9.0 : 1
Tecomán	55	0.5	45	0.5	10	0.5	4.5 : 1
Tehuacán	89	0.8	73	0.8	16	0.9	4.6 : 1
Tepic	48	0.4	42	0.5	6	0.3	7.0 : 1
Tijuana Guaycura	192	1.8	142	1.6	50	2.7	2.8 : 1
Tijuana Soler	160	1.5	121	1.4	39	2.1	3.1 : 1
Tlaquepaque	180	1.7	140	1.6	40	2.2	3.5 : 1
Tlaxcala	57	0.5	55	0.6	2	0.1	27.5 : 1
Toluca	178	1.7	159	1.8	19	1.0	8.4 : 1
Torreón Oriente	282	2.6	227	2.5	55	3.0	4.1 : 1
Tuxtla Gutiérrez	61	0.6	53	0.6	8	0.4	6.6 : 1
Villahermosa	59	0.5	54	0.6	5	0.3	10.8 : 1
Xalapa	78	0.7	66	0.7	12	0.7	5.5 : 1
Yucatán	51	0.5	43	0.5	7	0.4	6.1 : 1
Zacatecas	85	0.8	70	0.8	15	0.8	4.7 : 1
Zamora	80	0.7	66	0.7	14	0.8	4.7 : 1
Zapopan Kena Moreno	4	0.0	3	0.0	1	0.1	3.0 : 1
Zapopan Norte	180	1.7	146	1.6	34	1.9	4.3 : 1
UH Cd. Juárez	17	0.2	9	0.1	8	0.4	1.1 : 1
UH Culiacán	21	0.2	21	0.2	0	0.0	---
UH Ixbalanqué	10	0.1	9	0.1	1	0.1	9.0 : 1
UH Nuevo León	56	0.5	47	0.5	9	0.5	5.2 : 1
UH Punta Diamante	34	0.3	27	0.3	7	0.4	3.9 : 1
UH Tijuana	55	0.5	47	0.5	8	0.4	5.9 : 1
UH Zapopan	32	0.3	28	0.3	4	0.2	7.0 : 1
UH Zapotlán el Grande	17	0.2	16	0.2	1	0.1	16.0 : 1
UTUH Cd. Juárez	9	0.1	8	0.1	1	0.1	8.0 : 1
UTUH Tijuana	31	0.3	29	0.3	2	0.1	14.5 : 1
<b>Total</b>	<b>10,757</b>	<b>100.0</b>	<b>8,934</b>	<b>100.0</b>	<b>1,822</b>	<b>100.0</b>	<b>4.9 : 1</b>

UH=Unidad de Hospitalización

UTUH=Unidad de Tratamiento para Usuarios de Heroína



**Cuadro 2. Sexo**

	Frec.	%	Razón H:M
Hombres	8,934	83.1	
Mujeres	1,822	16.9	4.9:1
<i>Sin Información</i>	1	0.0	
<b>Total</b>	<b>10,757</b>	<b>100.0</b>	

**Cuadro 3. Persona que proporciona la información**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Usuario de drogas	5,557	51.7	51.7	4,589	51.4	51.4	967	53.1	53.1
Usuario de drogas y familiares u otras personas	5,200	48.3	48.3	4,345	48.6	48.6	855	46.9	46.9
<b>Total</b>	<b>10,757</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>8,934</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>1,822</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

**Cuadro 4. Edad de ingreso a tratamiento**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Hasta 9 años	4	0.0	0.0	4	0.0	0.0	0	0.0	0.0
10 a 14 años	1,214	11.3	11.3	967	10.8	10.8	246	13.5	13.5
15 a 19 años	4,019	37.4	37.4	3,314	37.1	37.1	705	38.7	38.7
20 a 24 años	1,716	16.0	16.0	1,405	15.7	15.7	311	17.1	17.1
25 a 29 años	1,168	10.9	10.9	981	11.0	11.0	187	10.3	10.3
30 a 34 años	891	8.3	8.3	760	8.5	8.5	131	7.2	7.2
35 a 39 años	582	5.4	5.4	498	5.6	5.6	84	4.6	4.6
40 a 44 años	415	3.9	3.9	367	4.1	4.1	48	2.6	2.6
45 años y más	747	6.9	6.9	637	7.1	7.1	110	6.0	6.0
<i>Sin información</i>	1	0.0	<i>Se omite</i>	1	0.0	<i>Se omite</i>	0	0.0	<i>Se omite</i>
<b>Total</b>	<b>10,757</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>8,934</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>1,822</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
Media (DE)	24.0 (11.0) años			24.2 (11.0) años			23.0 (10.6) años		
Mediana	20 años			20 años			19 años		
Moda	16 años			16 años			15 años		
Decil1	14 años			14 años			14 años		

DE= Desviación Estándar

**Cuadro 5. Estado civil**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Soltero	7,456	69.3	69.4	6,171	69.1	69.2	1,284	70.5	70.6
Casado	1,060	9.9	9.9	958	10.7	10.7	102	5.6	5.6
Unión libre	1,356	12.6	12.6	1,121	12.5	12.6	235	12.9	12.9
Separado	652	6.1	6.1	511	5.7	5.7	141	7.7	7.8
Divorciado	167	1.6	1.6	136	1.5	1.5	31	1.7	1.7
Viudo	47	0.4	0.4	22	0.2	0.2	25	1.4	1.4
<i>Sin información</i>	19	0.2	<i>Se omite</i>	15	0.2	<i>Se omite</i>	4	0.2	<i>Se omite</i>
<b>Total</b>	<b>10,757</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>8,934</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>1,822</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

**Cuadro 6. Escolaridad**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Ninguna (no sabe leer ni escribir)	42	0.4	0.4	32	0.4	0.4	10	0.5	0.5
Ninguna (sabe leer y escribir)	26	0.2	0.2	18	0.2	0.2	8	0.4	0.4
Primaria incompleta	293	2.7	2.7	249	2.8	2.8	44	2.4	2.4
Primaria completa	470	4.4	4.4	384	4.3	4.3	86	4.7	4.7
Secundaria incompleta	2,047	19.0	19.0	1,691	18.9	18.9	355	19.5	19.5
Secundaria completa	1,859	17.3	17.3	1,594	17.8	17.8	265	14.5	14.6
Estudios técnicos o comerciales incompletos	144	1.3	1.3	121	1.4	1.4	23	1.3	1.3
Estudios técnicos o comerciales completos	105	1.0	1.0	74	0.8	0.8	31	1.7	1.7
Bachillerato incompleto	3,403	31.6	31.6	2,824	31.6	31.6	579	31.8	31.8
Bachillerato completo	993	9.2	9.2	843	9.4	9.4	150	8.2	8.2
Estudios superiores incompletos	926	8.6	8.6	735	8.2	8.2	191	10.5	10.5
Estudios superiores completos	392	3.6	3.6	325	3.6	3.6	67	3.7	3.7
Estudios de posgrado incompletos	13	0.1	0.1	7	0.1	0.1	6	0.3	0.3
Estudios de posgrado completos	40	0.4	0.4	35	0.4	0.4	5	0.3	0.3
<i>Sin información</i>	4	0.0	<i>Se omite</i>	2	0.0	<i>Se omite</i>	2	0.1	<i>Se omite</i>
<b>Total</b>	<b>10,757</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>8,934</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>1,822</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

**Cuadro 7. Ocupación**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Desempleado(a)	2,291	21.3	21.3	1,898	21.2	21.3	393	21.6	21.6
Estudiante	3,304	30.7	30.7	2,631	29.4	29.5	672	36.9	36.9
Estudiante que trabaja	646	6.0	6.0	566	6.3	6.3	80	4.4	4.4
Trabaja	4,047	37.6	37.6	3,655	40.9	40.9	392	21.5	21.5
Tareas del hogar	381	3.5	3.5	112	1.3	1.3	269	14.8	14.8
Pensionado	83	0.8	0.8	67	0.7	0.8	16	0.9	0.9
<i>Sin información</i>	5	0.0	<i>Se omite</i>	5	0.1	<i>Se omite</i>	0	0.0	<i>Se omite</i>
<b>Total</b>	<b>10,757</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>8,934</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>1,822</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

**Cuadro 8. Estrato social**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Alto	33	0.3	0.3	30	0.3	0.3	3	0.2	0.2
Medio alto	411	3.8	3.8	341	3.8	3.8	70	3.8	3.8
Medio	2,330	21.7	21.7	1,926	21.6	21.6	404	22.2	22.2
Medio bajo	5,442	50.6	50.7	4,525	50.6	50.7	916	50.3	50.3
Bajo	2,459	22.9	22.9	2,051	23.0	23.0	408	22.4	22.4
Pobreza extrema o marginación	65	0.6	0.6	46	0.5	0.5	19	1.0	1.0
<i>Sin información</i>	17	0.2	<i>Se omite</i>	15	0.2	<i>Se omite</i>	2	0.1	<i>Se omite</i>
<b>Total</b>	<b>10,757</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>8,934</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>1,822</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

**FACTORES ASOCIADOS A LA DEMANDA DE TRATAMIENTO EN PACIENTES DE PRIMER INGRESO A TRATAMIENTO EN CIJ EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2018**

**Cuadro 9. Motivos de consulta**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Consumo de drogas ilícitas	9,474	88.1	7,933	88.8	1,540	84.5
Consumo de bebidas alcohólicas	4,584	42.6	3,837	42.9	747	41.0
Consumo de tabaco	3,918	36.4	3,285	36.8	632	34.7
Otro motivo	346	3.2	260	2.9	86	4.7
<i>Ningún motivo específico reportado</i>	10	0.1	7	0.1	3	0.2
<i>Usuarios que reportaron dos o más motivos de consulta</i>	4,918	45.7	4,120	46.1	797	43.7

**Cuadro 10. Condicionantes de la solicitud de tratamiento**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Por propia iniciativa	4,491	41.7	3,742	41.9	749	41.1
Por condicionamiento o recomendación familiar	4,744	44.1	3,971	44.4	773	42.4
Por recomendación de pares	167	1.6	144	1.6	23	1.3
Por condicionamiento o recomendación escolar	1,941	18.0	1,633	18.3	307	16.8
Por condicionamiento legal	1,002	9.3	855	9.6	147	8.1
Por condicionamiento o recomendación laboral	203	1.9	193	2.2	10	0.5
Por indicación médica	1,054	9.8	848	9.5	206	11.3
Por solicitud de novia(o)	51	0.5	39	0.4	12	0.7
Otros condicionantes de solicitud de tratamiento	324	3.0	219	2.5	105	5.8
<i>Ningún condicionante reportado</i>	197	1.8	162	1.8	35	1.9
<i>Pacientes que reportaron dos o más condicionantes de la solicitud de tratamiento</i>	3,026	28.1	2,559	28.6	467	25.6

**Cuadro 11. Antecedentes de acciones contra el consumo de sustancias**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Juramento	797	7.4	725	8.1	72	4.0
Grupo de autoayuda	821	7.6	709	7.9	112	6.1
Internamiento en anexo	1,417	13.2	1,253	14.0	164	9.0
Intervención de emergencia	75	0.7	61	0.7	14	0.8
Programa de mantenimiento	55	0.5	45	0.5	10	0.5
Tratamiento médico no especializado	78	0.7	62	0.7	16	0.9
Tratamiento psiquiátrico o psicoterapéutico ambulatorio	734	6.8	580	6.5	154	8.5
Tratamiento psiquiátrico o psicoterapéutico residencial	219	2.0	180	2.0	39	2.1
Medicina tradicional o alternativa	59	0.5	54	0.6	5	0.3
Intento de interrupción voluntaria del consumo, sin apoyo	3,564	33.1	2,968	33.2	596	32.7
Otras acciones	2,583	24.0	2,105	23.6	477	26.2
<i>Ninguna acción previa reportada</i>	<i>2,515</i>	<i>23.4</i>	<i>2,071</i>	<i>23.2</i>	<i>444</i>	<i>24.4</i>
<i>Pacientes que reportaron dos o más acciones contra el consumo de sustancias antes de solicitar tratamiento en CIJ</i>	<i>1,550</i>	<i>14.4</i>	<i>1,336</i>	<i>15.0</i>	<i>214</i>	<i>11.7</i>

**Cuadro 12. Problemas asociados al consumo de sustancias**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Problemas de salud	4,816	44.8	3,945	44.2	871	47.8
Accidentes o lesiones	1,467	13.6	1,246	13.9	221	12.1
Problemas familiares	8,463	78.7	7,051	78.9	1,412	77.5
Problemas escolares	3,862	35.9	3,162	35.4	700	38.4
Problemas laborales	2,701	25.1	2,410	27.0	291	16.0
Problemas psicológicos	4,859	45.2	3,928	44.0	931	51.1
Problemas legales	2,170	20.2	1,927	21.6	243	13.3
Conducta antisocial o delictiva	1,564	14.5	1,372	15.4	192	10.5
Otros problemas	567	5.3	459	5.1	108	5.9
<i>Ningún problema asociado reportado</i>	<i>499</i>	<i>4.6</i>	<i>424</i>	<i>4.7</i>	<i>74</i>	<i>4.1</i>
<i>Pacientes que reportaron dos o más problemas asociados</i>	<i>8,387</i>	<i>78.0</i>	<i>6,972</i>	<i>78.0</i>	<i>1,415</i>	<i>77.7</i>

**CARACTERÍSTICAS DEL CONSUMO DE DROGAS EN PACIENTES DE PRIMER INGRESO A TRATAMIENTO EN CIJ EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2018**

**Cuadro 13. Edad de inicio del consumo de tabaco**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Hasta 9 años	323	3.0	3.5	276	3.1	3.6	47	2.6	3.1
10 a 14 años	4,445	41.3	48.5	3,685	41.2	48.2	759	41.7	50.0
15 a 19 años	3,848	35.8	42.0	3,234	36.2	42.3	614	33.7	40.4
20 a 24 años	383	3.6	4.2	320	3.6	4.2	63	3.5	4.1
25 a 29 años	86	0.8	0.9	67	0.7	0.9	19	1.0	1.3
30 a 34 años	42	0.4	0.5	33	0.4	0.4	9	0.5	0.6
35 a 39 años	11	0.1	0.1	8	0.1	0.1	3	0.2	0.2
40 a 44 años	13	0.1	0.1	11	0.1	0.1	2	0.1	0.1
45 años y más	11	0.1	0.1	8	0.1	0.1	3	0.2	0.2
<i>No consumió</i>	<i>1,591</i>	<i>14.8</i>	<i>Se omite</i>	<i>1,288</i>	<i>14.4</i>	<i>Se omite</i>	<i>303</i>	<i>16.6</i>	<i>Se omite</i>
<i>Sin información</i>	<i>4</i>	<i>0.0</i>	<i>Se omite</i>	<i>4</i>	<i>0.0</i>	<i>Se omite</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>	<i>Se omite</i>
<b>Total</b>	<b>10,757</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>8,934</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>1,822</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
Media (DE)	14.6 (3.4) años			14.6 (3.6) años			14.8 (3.9) años		
Mediana	14 años			14 años			14 años		
Moda	15 años			15 años			15 años		
Decil1	11 años			11 años			11 años		

DE= Desviación Estándar

**Cuadro 14. Edad de inicio del consumo de alcohol**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Hasta 9 años	368	3.4	3.9	304	3.4	3.9	64	3.5	3.9
10 a 14 años	4,036	37.5	42.4	3,320	37.2	42.1	715	39.2	44.1
15 a 19 años	4,655	43.3	48.9	3,907	43.7	49.5	748	41.1	46.1
20 a 24 años	346	3.2	3.6	281	3.1	3.6	65	3.6	4.0
25 a 29 años	76	0.7	0.8	57	0.6	0.7	19	1.0	1.2
30 a 34 años	20	0.2	0.2	16	0.2	0.2	4	0.2	0.2
35 a 39 años	8	0.1	0.1	6	0.1	0.1	2	0.1	0.1
40 a 44 años	5	0.0	0.1	2	0.0	0.0	3	0.2	0.2
45 años y más	3	0.0	0.0	0	0.0	0.0	3	0.2	0.2
<i>No consumió</i>	<i>1,236</i>	<i>11.5</i>	<i>Se omite</i>	<i>1,037</i>	<i>11.6</i>	<i>Se omite</i>	<i>199</i>	<i>10.9</i>	<i>Se omite</i>
<i>Sin información</i>	<i>4</i>	<i>0.0</i>	<i>Se omite</i>	<i>4</i>	<i>0.0</i>	<i>Se omite</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>	<i>Se omite</i>
<b>Total</b>	<b>10,757</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>8,934</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>1,822</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
Media (DE)	14.7 (3.2) años			14.7 (3.0) años			14.8 (3.8) años		
Mediana	15 años			15 años			15 años		
Moda	15 años			15 años			15 años		
Decil1	12 años			12 años			12 años		

DE= Desviación Estándar

**Cuadro 15. Edad de inicio del consumo de drogas ilícitas**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Hasta 9 años	115	1.1	1.1	104	1.2	1.2	11	0.6	0.6
10 a 14 años	4,206	39.1	39.1	3,517	39.4	39.4	688	37.8	37.8
15 a 19 años	4,841	45.0	45.0	4,066	45.5	45.6	775	42.5	42.5
20 a 24 años	839	7.8	7.8	694	7.8	7.8	145	8.0	8.0
25 a 29 años	344	3.2	3.2	262	2.9	2.9	82	4.5	4.5
30 a 34 años	195	1.8	1.8	144	1.6	1.6	51	2.8	2.8
35 a 39 años	76	0.7	0.7	52	0.6	0.6	24	1.3	1.3
40 a 44 años	61	0.6	0.6	46	0.5	0.5	15	0.8	0.8
45 años y más	70	0.7	0.7	39	0.4	0.4	31	1.7	1.7
<i>Sin información</i>	10	0.1	<i>Se omite</i>	10	0.1	<i>Se omite</i>	0	0.0	<i>Se omite</i>
<b>Total</b>	<b>10,757</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>8,934</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>1,822</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
Media (DE)	16.4 (5.6) años			16.2 (5.1) años			17.4 (7.2) años		
Mediana	15 años			15 años			15 años		
Moda	15 años			15 años			15 años		
Decil1	12 años			12 años			12 años		

DE= Desviación Estándar

**Cuadro 16. Drogas ilícitas de inicio, según menciones**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Mariguana	8,016	74.5	6,745	75.5	1,270	69.7
Hachís	6	0.1	6	0.1	0	0.0
Cocaína (Clorhidrato)	900	8.4	754	8.4	146	8.0
<i>Crack</i>	258	2.4	226	2.5	32	1.8
Otra presentación de cocaína	8	0.1	8	0.1	0	0.0
Solventes y removedores	499	4.6	427	4.8	72	4.0
Pegamentos	113	1.1	94	1.1	19	1.0
Esmaltes o pinturas	62	0.6	48	0.5	14	0.8
Otros inhalables	12	0.1	12	0.1	0	0.0
Benzodiazepinas	155	1.4	89	1.0	66	3.6
<i>Rohypnol</i> <sup>®</sup>	3	0.0	3	0.0	0	0.0
Otros depresores del SNC	4	0.0	3	0.0	1	0.1
Anfetamina	60	0.6	50	0.6	10	0.5
Metanfetaminas	490	4.6	349	3.9	141	7.7
Éxtasis (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas	18	0.2	16	0.2	2	0.1
Otros estimulantes del SNC	13	0.1	11	0.1	2	0.1
LSD	15	0.1	11	0.1	4	0.2
Plantas alucinógenas y derivados	17	0.2	13	0.1	4	0.2
Otras drogas alucinógenas y disociativas	5	0.0	3	0.0	2	0.1
Heroína	24	0.2	17	0.2	7	0.4
Opioides sintéticos	29	0.3	19	0.2	10	0.5
Opio y otros opiáceos	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Sustancias con utilidad médica	22	0.2	12	0.1	10	0.5
Otras sustancias de abuso	27	0.3	17	0.2	10	0.5
<b>Total</b>	<b>10,757</b>	<b>100.0</b>	<b>8,934</b>	<b>100.0</b>	<b>1,822</b>	<b>100.0</b>



**Cuadro 17. Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de tabaco y el ingreso a tratamiento a CIJ**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
< de un año	527	4.9	5.8	429	4.8	5.6	98	5.4	6.5
1 a 5 años	3,916	36.4	42.7	3,168	35.5	41.5	747	41.0	49.2
6 a 10 años	1,650	15.3	18.0	1,404	15.7	18.4	246	13.5	16.2
11 a 15 años	1,010	9.4	11.0	861	9.6	11.3	149	8.2	9.8
16 a 20 años	725	6.7	7.9	611	6.8	8.0	114	6.3	7.5
21 a 25 años	454	4.2	5.0	400	4.5	5.2	54	3.0	3.6
26 o más años	880	8.2	9.6	769	8.6	10.1	111	6.1	7.3
<i>No consumió</i>	1,591	14.8	<i>Se omite</i>	1,288	14.4	<i>Se omite</i>	303	16.6	<i>Se omite</i>
<i>Sin información</i>	4	0.0	<i>Se omite</i>	4	0.0	<i>Se omite</i>	0	0.0	<i>Se omite</i>
<b>Total</b>	<b>10,757</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>8,934</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>1,822</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
Media (DE)	9.8 (10.5) años			10.1 (10.6) años			8.5 (9.7) años		
Mediana	6 años			6 años			5 años		
Moda	1 año			1 año			1 año		
Decil1	1 año			1 año			1 año		

DE= Desviación Estándar

**Cuadro 18. Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de alcohol y el ingreso a tratamiento a CIJ**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
< de un año	550	5.1	5.8	434	4.9	5.5	116	6.4	7.1
1 a 5 años	3,971	36.9	41.7	3,197	35.8	40.5	773	42.4	47.6
6 a 10 años	1,740	16.2	18.3	1,461	16.4	18.5	279	15.3	17.2
11 a 15 años	1,065	9.9	11.2	893	10.0	11.3	172	9.4	10.6
16 a 20 años	750	7.0	7.9	646	7.2	8.2	104	5.7	6.4
21 a 25 años	501	4.7	5.3	434	4.9	5.5	67	3.7	4.1
26 o más años	940	8.7	9.9	828	9.3	10.5	112	6.1	6.9
<i>No consumió</i>	1,236	11.5	<i>Se omite</i>	1,037	11.6	<i>Se omite</i>	199	10.9	<i>Se omite</i>
<i>Sin información</i>	4	0.0	<i>Se omite</i>	4	0.0	<i>Se omite</i>	0	0.0	<i>Se omite</i>
<b>Total</b>	<b>10,757</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>8,934</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>1,822</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
Media (DE)	9.9 (10.4) años			10.2 (10.6) años			8.3 (9.6) años		
Mediana	6 años			6 años			5 años		
Moda	1 año			1 año			1 año		
Decil1	1 año			1 año			1 año		

DE= Desviación Estándar

**Cuadro 19. Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de drogas ilícitas y el ingreso a tratamiento en CIJ**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
< de un año	1,441	13.4	13.4	1,108	12.4	12.4	333	18.3	18.3
1 a 5 años	4,869	45.3	45.3	3,945	44.2	44.2	923	50.7	50.7
6 a 10 años	1,716	16.0	16.0	1,465	16.4	16.4	251	13.8	13.8
11 a 15 años	987	9.2	9.2	852	9.5	9.5	135	7.4	7.4
16 a 20 años	644	6.0	6.0	564	6.3	6.3	80	4.4	4.4
21 a 25 años	407	3.8	3.8	374	4.2	4.2	33	1.8	1.8
26 o más años	682	6.3	6.3	615	6.9	6.9	67	3.7	3.7
<i>Sin información</i>	11	0.1	<i>Se omite</i>	11	0.1	<i>Se omite</i>	0	0.0	<i>Se omite</i>
<b>Total</b>	<b>10,757</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>8,934</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>1,822</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
Media (DE)	7.6 (9.3) años			8.0 (9.5) años			5.6 (7.7) años		
Mediana	4 años			4 años			3 años		
Moda	1 año			1 año			< un año		
Decil1	< un año			< un año			< un año		

DE= Desviación Estándar

**Cuadro 20. Tipo de consumo de drogas ilícitas**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Experimental	959	8.9	8.9	757	8.5	8.5	202	11.1	11.1
Social u ocasional	1,382	12.8	12.9	1,111	12.4	12.4	270	14.8	14.8
Funcional	5,737	53.3	53.4	4,815	53.9	53.9	922	50.6	50.6
Disfuncional	2,351	21.9	21.9	1,975	22.1	22.1	376	20.6	20.6
En remisión	320	3.0	3.0	268	3.0	3.0	52	2.9	2.9
<i>Sin información</i>	8	0.1	<i>Se omite</i>	8	0.1	<i>Se omite</i>	0	0.0	<i>Se omite</i>
<b>Total</b>	<b>10,757</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>8,934</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>1,822</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

**Cuadro 21. Total de drogas consumidas alguna vez en la vida  
(Incluye alcohol o tabaco)**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
1 sustancia	532	4.9	438	4.9	94	5.2
2 sustancias	947	8.8	771	8.6	176	9.7
3 sustancias	3,041	28.3	2,501	28.0	539	29.6
4 sustancias	2,174	20.2	1,795	20.1	379	20.8
5 sustancias	1,553	14.4	1,294	14.5	259	14.2
6 sustancias	981	9.1	806	9.0	175	9.6
7 sustancias	610	5.7	524	5.9	86	4.7
8 sustancias	411	3.8	364	4.1	47	2.6
9 sustancias	237	2.2	202	2.3	35	1.9
10 sustancias	124	1.2	106	1.2	18	1.0
11-18 sustancias	147	1.4	133	1.5	14	0.8
<b>Total</b>	<b>10,757</b>	<b>100.0</b>	<b>8,934</b>	<b>100.0</b>	<b>1,822</b>	<b>100.0</b>
Media (DE)	4.3 (2.1) drogas		4.4 (2.2) drogas		4.1 (1.9) drogas	
Mediana	4 drogas		4 drogas		4 drogas	
Moda	3 drogas		3 drogas		3 drogas	
Decil1	2 drogas		2 drogas		2 drogas	

DE= Desviación Estándar

**Cuadro 22. Total de drogas ilícitas consumidas alguna vez en la vida  
(No incluye ni alcohol ni tabaco)**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
1 sustancia	4,040	37.6	3,303	37.0	736	40.4
2 sustancias	2,464	22.9	2,049	22.9	415	22.8
3 sustancias	1,672	15.5	1,394	15.6	278	15.3
4 sustancias	1,011	9.4	825	9.2	186	10.2
5 sustancias	629	5.8	538	6.0	91	5.0
6 sustancias	426	4.0	378	4.2	48	2.6
7 sustancias	240	2.2	204	2.3	36	2.0
8 sustancias	127	1.2	109	1.2	18	1.0
9 sustancias	77	0.7	67	0.7	10	0.5
10 sustancias	29	0.3	27	0.3	2	0.1
11-16 sustancias	42	0.4	40	0.4	2	0.1
<b>Total</b>	<b>10,757</b>	<b>100.0</b>	<b>8,934</b>	<b>100.0</b>	<b>1,822</b>	<b>100.0</b>
Media (DE)	2.6 (1.9) drogas		2.6 (1.9) drogas		2.4 (1.7) drogas	
Mediana	2 drogas		2 drogas		2 drogas	
Moda	1 droga		1 droga		1 droga	
Decil1	1 droga		1 droga		1 droga	

DE= Desviación Estándar

**Cuadro 23. Consumo de drogas alguna vez en la vida por sustancia**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
<b>Tabaco</b>	<b>9,166</b>	<b>85.2</b>	<b>7,646</b>	<b>85.6</b>	<b>1,519</b>	<b>83.4</b>
<b>Alcohol</b>	<b>9,521</b>	<b>88.5</b>	<b>7,897</b>	<b>88.4</b>	<b>1,623</b>	<b>89.1</b>
<b>Cannabis</b>	<b>9,294</b>	<b>86.4</b>	<b>7,797</b>	<b>87.3</b>	<b>1,496</b>	<b>82.1</b>
Mariguana	9,291	86.4	7,794	87.2	1,496	82.1
Hachís	557	5.2	487	5.5	70	3.8
<b>Cocaína</b>	<b>5,114</b>	<b>47.5</b>	<b>4,375</b>	<b>49.0</b>	<b>739</b>	<b>40.6</b>
Cocaína (Clorhidrato)	4,465	41.5	3,805	42.6	660	36.2
<i>Crack</i>	2,223	20.7	1,949	21.8	274	15.0
Otra presentación de cocaína	94	0.9	89	1.0	5	0.3
<b>Inhalables</b>	<b>2,388</b>	<b>22.2</b>	<b>2,044</b>	<b>22.9</b>	<b>344</b>	<b>18.9</b>
Solventes o removedores	1,772	16.5	1,538	17.2	234	12.8
Pegamentos	610	5.7	519	5.8	91	5.0
Esmaltes o pinturas	332	3.1	269	3.0	63	3.5
Otros inhalables	101	0.9	87	1.0	14	0.8
<b>Depresores</b>	<b>1,546</b>	<b>14.4</b>	<b>1,244</b>	<b>13.9</b>	<b>302</b>	<b>16.6</b>
Benzodiacepinas	1,495	13.9	1,200	13.4	295	16.2
<i>Rohypnol</i>	62	0.6	57	0.6	5	0.3
Otros depresores	28	0.3	23	0.3	5	0.3
<b>Estimulantes</b>	<b>4,024</b>	<b>37.4</b>	<b>3,293</b>	<b>36.9</b>	<b>731</b>	<b>40.1</b>
Anfetamina	221	2.1	188	2.1	33	1.8
Metanfetaminas	3,590	33.4	2,945	33.0	645	35.4
<i>Éxtasis</i> (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas	637	5.9	518	5.8	119	6.5
Otros estimulantes	49	0.5	42	0.5	7	0.4
<b>Drogas alucinógenas y disociativas</b>	<b>1,383</b>	<b>12.9</b>	<b>1,153</b>	<b>12.9</b>	<b>230</b>	<b>12.6</b>
LSD	1,139	10.6	943	10.6	196	10.8
Plantas alucinógenas y derivados	537	5.0	469	5.2	68	3.7
Otras drogas alucinógenas y disoc.	45	0.4	40	0.4	5	0.3
<b>Opiáceos</b>	<b>448</b>	<b>4.2</b>	<b>372</b>	<b>4.2</b>	<b>76</b>	<b>4.2</b>
Heroína	283	2.6	235	2.6	48	2.6
Opioides sintéticos	135	1.3	110	1.2	25	1.4
Opio y otros opiáceos	51	0.5	46	0.5	5	0.3
<b>Otras sustancias de abuso</b>	<b>198</b>	<b>1.8</b>	<b>144</b>	<b>1.6</b>	<b>54</b>	<b>3.0</b>
Con utilidad médica	74	0.7	49	0.5	25	1.4
Otras sustancias de abuso	125	1.2	96	1.1	29	1.6

**Cuadro 24. Total de drogas consumidas en el último año  
(Incluye alcohol o tabaco)**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Ninguna	140	1.3	111	1.2	29	1.6
1 sustancia	999	9.3	826	9.2	173	9.5
2 sustancias	1,926	17.9	1,567	17.5	359	19.7
3 sustancias	3,213	29.9	2,691	30.1	521	28.6
4 sustancias	1,950	18.1	1,637	18.3	313	17.2
5 sustancias	1,164	10.8	949	10.6	215	11.8
6 sustancias	639	5.9	528	5.9	111	6.1
7 sustancias	329	3.1	288	3.2	41	2.3
8 sustancias	205	1.9	172	1.9	33	1.8
9 sustancias	98	0.9	81	0.9	17	0.9
10 sustancias	52	0.5	46	0.5	6	0.3
11-18 sustancias	42	0.4	38	0.4	4	0.2
<b>Total</b>	<b>10,757</b>	<b>100.0</b>	<b>8,934</b>	<b>100.0</b>	<b>1,822</b>	<b>100.0</b>
Media (DE)	3.5 (1.9) drogas		3.5 (1.9) drogas		3.4 (1.8) drogas	
Mediana	3 drogas		3 drogas		3 drogas	
Moda	3 drogas		3 drogas		3 drogas	
Decil1	1 droga		1 drogas		1 droga	

DE= Desviación Estándar

**Cuadro 25. Total de drogas ilícitas consumidas en el último año  
(No incluye ni alcohol ni tabaco)**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Ninguna	871	8.1	705	7.9	166	9.1
1 sustancia	4,709	43.8	3,909	43.8	799	43.9
2 sustancias	2,400	22.3	2,019	22.6	381	20.9
3 sustancias	1,314	12.2	1,070	12.0	244	13.4
4 sustancias	690	6.4	567	6.3	123	6.8
5 sustancias	362	3.4	314	3.5	48	2.6
6 sustancias	216	2.0	183	2.0	33	1.8
7 sustancias	96	0.9	78	0.9	18	1.0
8 sustancias	56	0.5	50	0.6	6	0.3
9 sustancias	20	0.2	18	0.2	2	0.1
10 sustancias	11	0.1	10	0.1	1	0.1
11-16 sustancias	12	0.1	0	0.0	0	0.0
<b>Total</b>	<b>10,757</b>	<b>100.0</b>	<b>8,934</b>	<b>100.0</b>	<b>1,822</b>	<b>100.0</b>
Media (DE)	1.9 (1.6) drogas		2.0 (1.6) drogas		1.9 (1.5) drogas	
Mediana	1 droga		1 droga		1 droga	
Moda	1 droga		1 droga		1 droga	
Decil1	1 droga		1 droga		1 droga	

DE= Desviación Estándar

**Cuadro 26. Consumo de drogas en los últimos 12 meses por sustancia**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
<b>Tabaco</b>	<b>8,196</b>	<b>76.2</b>	<b>6,851</b>	<b>76.7</b>	<b>1,344</b>	<b>73.8</b>
<b>Alcohol</b>	<b>8,731</b>	<b>81.2</b>	<b>7,252</b>	<b>81.2</b>	<b>1,478</b>	<b>81.1</b>
<b>Cannabis</b>	<b>7,709</b>	<b>71.7</b>	<b>6,475</b>	<b>72.5</b>	<b>1,233</b>	<b>67.7</b>
Mariguana	7,708	71.7	6,475	72.5	1,232	67.6
Hachís	373	3.5	323	3.6	50	2.7
<b>Cocaína</b>	<b>3,749</b>	<b>34.9</b>	<b>3,196</b>	<b>35.8</b>	<b>553</b>	<b>30.4</b>
Cocaína (Clorhidrato)	3,026	28.1	2,555	28.6	471	25.9
<i>Crack</i>	1,633	15.2	1,430	16.0	203	11.1
Otra presentación de cocaína	61	0.6	57	0.6	4	0.2
<b>Inhalables</b>	<b>1,590</b>	<b>14.8</b>	<b>1,346</b>	<b>15.1</b>	<b>244</b>	<b>13.4</b>
Solventes y removedores	1,216	11.3	1,041	11.7	175	9.6
Pegamentos	325	3.0	274	3.1	51	2.8
Esmaltes o pinturas	195	1.8	150	1.7	45	2.5
Otros inhalables	46	0.4	40	0.4	6	0.3
<b>Depresores</b>	<b>1,074</b>	<b>10.0</b>	<b>845</b>	<b>9.5</b>	<b>229</b>	<b>12.6</b>
Benzodiacepinas	1,048	9.7	823	9.2	225	12.3
<i>Rohypnol</i>	23	0.2	23	0.3	0	0.0
Otros depresores	20	0.2	15	0.2	5	0.3
<b>Estimulantes</b>	<b>3,460</b>	<b>32.2</b>	<b>2,816</b>	<b>31.5</b>	<b>644</b>	<b>35.3</b>
Anfetamina	152	1.4	126	1.4	26	1.4
Metanfetaminas	3,162	29.4	2,576	28.8	586	32.2
<i>Éxtasis</i> (MDMA) y	356	3.3	286	3.2	70	3.8
Metanfetaminas alucinógenas						
Otros estimulantes	30	0.3	26	0.3	4	0.2
<b>Drogas alucinógenas y disociativas</b>	<b>872</b>	<b>8.1</b>	<b>708</b>	<b>7.9</b>	<b>164</b>	<b>9.0</b>
LSD	751	7.0	604	6.8	147	8.1
Plantas alucinógenas y derivados	245	2.3	211	2.4	34	1.9
Otras drogas alucinógenas y disoc.	24	0.2	20	0.2	4	0.2
<b>Opiáceos</b>	<b>334</b>	<b>3.1</b>	<b>276</b>	<b>3.1</b>	<b>58</b>	<b>3.2</b>
Heroína	201	1.9	168	1.9	33	1.8
Opioides sintéticos	113	1.1	91	1.0	22	1.2
Opio y otros opiáceos	32	0.3	27	0.3	5	0.3
<b>Otras sustancias de abuso</b>	<b>137</b>	<b>1.3</b>	<b>99</b>	<b>1.1</b>	<b>38</b>	<b>2.1</b>
Con utilidad médica	54	0.5	36	0.4	18	1.0
Otras sustancias de abuso	84	0.8	64	0.7	20	1.1

**Cuadro 27. Droga de preferencia en los últimos 12 meses, según menciones**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Tabaco	1,135	10.6	10.7	892	10.0	10.1	242	13.3	13.5
Alcohol	1,761	16.4	16.6	1,451	16.2	16.5	310	17.0	17.3
Mariguana	4,317	40.1	40.8	3,716	41.6	42.3	601	33.0	33.6
Hachís	14	0.1	0.1	12	0.1	0.1	2	0.1	0.1
Cocaína (Clorhidrato)	430	4.0	4.1	370	4.1	4.2	60	3.3	3.4
<i>Crack</i>	582	5.4	5.5	523	5.9	5.9	59	3.2	3.3
Otra presentación de cocaína	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0
Solventes y removedores	267	2.5	2.5	212	2.4	2.4	55	3.0	3.1
Pegamentos	35	0.3	0.3	25	0.3	0.3	10	0.5	0.6
Esmaltes o pinturas	27	0.3	0.3	18	0.2	0.2	9	0.5	0.5
Otros inhalables	6	0.1	0.1	5	0.1	0.1	1	0.1	0.1
Benzodiazepinas	87	0.8	0.8	43	0.5	0.5	44	2.4	2.5
<i>Rohypno</i> <sup>®</sup>	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0
Otros depresores del SNC	9	0.1	0.1	7	0.1	0.1	2	0.1	0.1
Anfetamina	38	0.4	0.4	36	0.4	0.4	2	0.1	0.1
Metanfetaminas	1,515	14.1	14.3	1,208	13.5	13.7	307	16.8	17.2
Éxtasis (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas	12	0.1	0.1	10	0.1	0.1	2	0.1	0.1
Otros estimulantes del SNC	6	0.1	0.1	4	0.0	0.0	2	0.1	0.1
LSD	31	0.3	0.3	23	0.3	0.3	8	0.4	0.4
Plantas alucinógenas y derivados	8	0.1	0.1	7	0.1	0.1	1	0.1	0.1
Otras drogas alucinógenas y disociativas.	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0
Heroína	125	1.2	1.2	108	1.2	1.2	17	0.9	1.0
Opioides sintéticos	23	0.2	0.2	16	0.2	0.2	7	0.4	0.4
Opio y otros opiáceos	7	0.1	0.1	7	0.1	0.1	0	0.0	0.0
Sustancias con utilidad médica	14	0.1	0.1	5	0.1	0.1	9	0.5	0.5
Otras sustancias de abuso	5	0.0	0.0	2	0.0	0.0	3	0.2	0.2
Ninguna	128	1.2	1.2	92	1.0	1.0	36	2.0	2.0
<i>No consumió en el último año</i>	140	1.3	<i>Se omite</i>	111	1.2	<i>Se omite</i>	29	1.6	<i>Se omite</i>
<i>Sin Información</i>	32	0.3	<i>Se omite</i>	28	0.3	<i>Se omite</i>	4	0.2	<i>Se omite</i>
<b>Total</b>	<b>10,757</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>8,934</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>1,822</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

**Cuadro 28. Droga de mayor impacto en los últimos 12 meses, según menciones**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Tabaco	666	6.2	6.3	544	6.1	6.2	122	6.7	6.8
Alcohol	1,506	14.0	14.2	1,215	13.6	13.8	291	16.0	16.3
Mariguana	3,733	34.7	35.3	3,212	36.0	36.5	520	28.5	29.1
Hachís	16	0.1	0.2	15	0.2	0.2	1	0.1	0.1
Cocaína (Clorhidrato)	573	5.3	5.4	479	5.4	5.4	94	5.2	5.3
<i>Crack</i>	766	7.1	7.2	686	7.7	7.8	80	4.4	4.5
Otra presentación de cocaína	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0
Solventes y removedores	366	3.4	3.5	305	3.4	3.5	61	3.3	3.4
Pegamentos	56	0.5	0.5	44	0.5	0.5	12	0.7	0.7
Esmaltes o pinturas	36	0.3	0.3	26	0.3	0.3	10	0.5	0.6
Otros inhalables	8	0.1	0.1	7	0.1	0.1	1	0.1	0.1
Benzodiazepinas	132	1.2	1.2	78	0.9	0.9	54	3.0	3.0
<i>Rohypnol</i> <sup>®</sup>	2	0.0	0.0	1	0.0	0.0	1	0.1	0.1
Otros depresores del SNC	11	0.1	0.1	7	0.1	0.1	4	0.2	0.2
Anfetamina	50	0.5	0.5	45	0.5	0.5	5	0.3	0.3
Metanfetaminas	2,284	21.2	21.6	1,840	20.6	20.9	444	24.4	24.8
Éxtasis (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas	21	0.2	0.2	18	0.2	0.2	3	0.2	0.2
Otros estimulantes del SNC	8	0.1	0.1	7	0.1	0.1	1	0.1	0.1
LSD	53	0.5	0.5	37	0.4	0.4	16	0.9	0.9
Plantas alucinógenas y derivados	6	0.1	0.1	6	0.1	0.1	0	0.0	0.0
Otras drogas alucinógenas y disociativas	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0
Heroína	135	1.3	1.3	114	1.3	1.3	21	1.2	1.2
Opioides sintéticos	21	0.2	0.2	16	0.2	0.2	5	0.3	0.3
Opio y otros opiáceos	10	0.1	0.1	10	0.1	0.1	0	0.0	0.0
Sustancias con utilidad médica	10	0.1	0.1	4	0.0	0.0	6	0.3	0.3
Otras sustancias de abuso	6	0.1	0.1	2	0.0	0.0	4	0.2	0.2
Ninguna	105	1.0	1.0	72	0.8	0.8	33	1.8	1.8
<i>No consumió en el último año</i>	140	1.3	<i>Se omite</i>	111	1.2	<i>Se omite</i>	29	1.6	<i>Se omite</i>
<i>Sin Información</i>	35	0.3	<i>Se omite</i>	31	0.3	<i>Se omite</i>	4	0.2	<i>Se omite</i>
<b>Total</b>	<b>10,757</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>8,934</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>1,822</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>



**Cuadro 29. Uso combinado de drogas en los últimos 12 meses  
(No incluye tabaco)**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Si combinó drogas	4,076	37.9	47.0	3,457	38.7	47.9	619	34.0	42.4
No combinó drogas	4,603	42.8	53.0	3,762	42.1	52.1	840	46.1	57.6
<i>No aplica</i>	<i>2,078</i>	<i>19.3</i>	<i>Se omite</i>	<i>1,715</i>	<i>19.2</i>	<i>Se omite</i>	<i>363</i>	<i>19.9</i>	<i>Se omite</i>
<b>Total</b>	<b>10,757</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>8,934</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>1,822</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

**Cuadro 30. Total de drogas consumidas en los últimos 30 días  
(Incluye alcohol o tabaco)**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Ninguna	975	9.1	762	8.5	213	11.7
1 sustancia	2,495	23.2	2,052	23.0	442	24.3
2 sustancias	2,964	27.6	2,453	27.5	511	28.0
3 sustancias	2,645	24.6	2,249	25.2	396	21.7
4 sustancias	1,129	10.5	970	10.9	159	8.7
5 sustancias	377	3.5	304	3.4	73	4.0
6 sustancias	116	1.1	96	1.1	20	1.1
7 sustancias	39	0.4	34	0.4	5	0.3
8 sustancias	10	0.1	7	0.1	3	0.2
9 sustancias	6	0.1	6	0.1	0	0.0
10 -13 sustancias	1	0.0	1	0.0	0	0.0
<b>Total</b>	<b>10,757</b>	<b>100.0</b>	<b>8,934</b>	<b>100.0</b>	<b>1,822</b>	<b>100.0</b>
Media (DE)	2.2 (1.4) drogas		2.2 (1.4) drogas		2.1 (1.4) drogas	
Mediana	2 drogas		2 drogas		2 drogas	
Moda	2 drogas		2 drogas		2 drogas	
Decil1	1 droga		1 droga		Ninguna	

DE= Desviación Estándar

**Cuadro 31. Total de drogas ilícitas consumidas en los últimos 30 días  
(No incluye ni alcohol ni tabaco)**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Ninguna	3,176	29.5	2,552	28.6	623	34.2
1 sustancia	5,143	47.8	4,348	48.7	795	43.6
2 sustancias	1,704	15.8	1,429	16.0	275	15.1
3 sustancias	517	4.8	426	4.8	91	5.0
4 sustancias	150	1.4	121	1.4	29	1.6
5 sustancias	48	0.4	42	0.5	6	0.3
6 sustancias	12	0.1	9	0.1	3	0.2
7 sustancias	6	0.1	6	0.1	0	0.0
11 sustancias	1	0.0	1	0.0	0	0.0
<b>Total</b>	<b>10,757</b>	<b>100.0</b>	<b>8,934</b>	<b>100.0</b>	<b>1,822</b>	<b>100.0</b>
Media (DE)	1.0 (0.9) droga		1.0 (0.9) droga		1.0 (1.0) droga	
Mediana	1 droga		1 droga		1 drogas	
Moda	1 droga		1 droga		1 drogas	
Decil1	Ninguna		Ninguna		Ninguna	

DE= Desviación Estándar

**Cuadro 32. Consumo de drogas en los últimos 30 días por sustancia**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
<b>Tabaco</b>	<b>6,676</b>	<b>62.1</b>	<b>5,602</b>	<b>62.7</b>	<b>1,073</b>	<b>58.9</b>
<b>Alcohol</b>	<b>6,132</b>	<b>57.0</b>	<b>5,155</b>	<b>57.7</b>	<b>977</b>	<b>53.6</b>
<b>Cannabis</b>	<b>5,242</b>	<b>48.7</b>	<b>4,481</b>	<b>50.2</b>	<b>761</b>	<b>41.8</b>
Mariguana	5,237	48.7	4,477	50.1	760	41.7
Hachís	97	0.9	83	0.9	14	0.8
<b>Cocaína</b>	<b>1,758</b>	<b>16.3</b>	<b>1,518</b>	<b>17.0</b>	<b>240</b>	<b>13.2</b>
Cocaína (Clorhidrato)	1,139	10.6	955	10.7	184	10.1
Crack	855	7.9	767	8.6	88	4.8
Otra presentación de cocaína	12	0.1	11	0.1	1	0.1
<b>Inhalables</b>	<b>703</b>	<b>6.5</b>	<b>589</b>	<b>6.6</b>	<b>114</b>	<b>6.3</b>
Solventes y removedores	568	5.3	482	5.4	86	4.7
Pegamentos	95	0.9	77	0.9	18	1.0
Esmaltes o pinturas	55	0.5	39	0.4	16	0.9
Otros inhalables	13	0.1	10	0.1	3	0.2
<b>Depresores</b>	<b>467</b>	<b>4.3</b>	<b>348</b>	<b>3.9</b>	<b>119</b>	<b>6.5</b>
Benzodiacepinas	456	4.2	341	3.8	115	6.3
Rohypnol	3	0.0	3	0.0	0	0.0
Otros depresores	10	0.1	6	0.1	4	0.2
<b>Estimulantes</b>	<b>2,027</b>	<b>18.8</b>	<b>1,644</b>	<b>18.4</b>	<b>383</b>	<b>21.0</b>
Anfetamina	47	0.4	39	0.4	8	0.4
Metanfetaminas	1,936	18.0	1,570	17.6	366	20.1
Éxtasis (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas	79	0.7	66	0.7	13	0.7
Otros estimulantes	8	0.1	5	0.1	3	0.2
<b>Drogas alucinógenas y disociativas</b>	<b>194</b>	<b>1.8</b>	<b>152</b>	<b>1.7</b>	<b>42</b>	<b>2.3</b>
LSD	161	1.5	124	1.4	37	2.0
Plantas alucinógenas y derivados	39	0.4	33	0.4	6	0.3
Otras drogas alucinógenas y disoc.	6	0.1	5	0.1	1	0.1
<b>Opiáceos</b>	<b>177</b>	<b>1.6</b>	<b>146</b>	<b>1.6</b>	<b>31</b>	<b>1.7</b>
Heroína	122	1.1	105	1.2	17	0.9
Opioides sintéticos	48	0.4	35	0.4	13	0.7
Opio y otros opiáceos	7	0.1	6	0.1	1	0.1
<b>Otras sustancias de abuso</b>	<b>73</b>	<b>0.7</b>	<b>45</b>	<b>0.5</b>	<b>28</b>	<b>1.5</b>
Con utilidad médica	31	0.3	16	0.2	15	0.8
Otras sustancias de abuso	43	0.4	30	0.3	13	0.7

**Cuadro 33. Frecuencia de episodios de abuso del consumo de tabaco<sup>1</sup> en los últimos 30 días**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Sin consumo abusivo	1,885	17.5	28.8	1,606	18.0	29.2	279	15.3	26.6
< de 1 vez a la semana	827	7.7	12.6	660	7.4	12.0	167	9.2	15.9
1 o 2 veces a la semana	751	7.0	11.5	623	7.0	11.3	128	7.0	12.2
Cada tercer día	479	4.5	7.3	395	4.4	7.2	84	4.6	8.0
Diario	2,609	24.3	39.8	2,219	24.8	40.3	390	21.4	37.2
<i>No consumió en los últimos 30 días</i>	<i>4,081</i>	<i>37.9</i>	<i>Se omite</i>	<i>3,332</i>	<i>37.3</i>	<i>Se omite</i>	<i>749</i>	<i>41.1</i>	<i>Se omite</i>
<i>Sin información</i>	<i>125</i>	<i>1.2</i>	<i>Se omite</i>	<i>99</i>	<i>1.1</i>	<i>Se omite</i>	<i>25</i>	<i>1.4</i>	<i>Se omite</i>
<b>Total</b>	<b>10,757</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>8,934</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>1,822</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

<sup>1</sup> Consumo de seis o más cigarrillos en un solo día.

**Cuadro 34. Frecuencia de episodios de abuso del consumo de alcohol<sup>1</sup> en los últimos 30 días**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Sin consumo abusivo	1,054	9.8	17.6	879	9.8	17.4	175	9.6	18.4
< de 1 vez a la semana	2,131	19.8	35.5	1,753	19.6	34.7	378	20.7	39.7
1 o 2 veces a la semana	1,859	17.3	31.0	1,585	17.7	31.4	274	15.0	28.8
Cada tercer día	502	4.7	8.4	433	4.8	8.6	69	3.8	7.2
Diario	458	4.3	7.6	401	4.5	7.9	57	3.1	6.0
<i>No consumió en los últimos 30 días</i>	<i>4,625</i>	<i>43.0</i>	<i>Se omite</i>	<i>3,779</i>	<i>42.3</i>	<i>Se omite</i>	<i>845</i>	<i>46.4</i>	<i>Se omite</i>
<i>Sin información</i>	<i>128</i>	<i>1.2</i>	<i>Se omite</i>	<i>104</i>	<i>1.2</i>	<i>Se omite</i>	<i>24</i>	<i>1.3</i>	<i>Se omite</i>
<b>Total</b>	<b>10,757</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>8,934</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>1,822</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

<sup>1</sup> Consumo de más de cuatro copas en un día para los hombres y de más de tres copas en un día para las mujeres.

**Cuadro 35. Frecuencia de episodios de abuso del consumo de drogas ilícitas<sup>1</sup> en los últimos 30 días**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
< de 1 vez a la semana	1,454	13.5	23.4	1,173	13.1	22.5	281	15.4	28.0
1 o 2 veces a la semana	1,258	11.7	20.2	1,064	11.9	20.4	194	10.6	19.3
Cada tercer día	1,012	9.4	16.3	865	9.7	16.6	147	8.1	14.7
Diario	2,500	23.2	40.2	2,119	23.7	40.6	381	20.9	38.0
<i>No consumió en los últimos 30 días</i>	<i>3,176</i>	<i>29.5</i>	<i>Se omite</i>	<i>2,552</i>	<i>28.6</i>	<i>Se omite</i>	<i>623</i>	<i>34.2</i>	<i>Se omite</i>
<i>Sin información</i>	<i>1,357</i>	<i>12.6</i>	<i>Se omite</i>	<i>1,161</i>	<i>13.0</i>	<i>Se omite</i>	<i>196</i>	<i>10.8</i>	<i>Se omite</i>
<b>Total</b>	<b>10,757</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>8,934</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>1,822</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

<sup>1</sup> Consumo de cualquier dosis.

## GLOSARIO

<b>Droga ilícita de inicio</b>	<p>Es la sustancia ilegal que el usuario refirió como la droga con la cual inicio el consumo de drogas. No incluye el inicio del consumo con alcohol o tabaco.</p>
<b>Droga de mayor impacto</b>	<p>Sustancia por la que acuden los pacientes a tratamiento, a cuyo consumo los pacientes atribuyen problemas personales, de salud, familiares, escolares, laborales o sociales, en el transcurso del último año.</p>
<b>Droga de preferencia</b>	<p>Sustancia que el propio usuario solicitante de tratamiento ha elegido o preferido consumir en el transcurso del último año.</p>
<b>Estrato social</b>	<p>Estimación que hace el terapeuta, según su percepción, del estrato al que pertenece el usuario de drogas, considerando aspectos como lugar de residencia, escolaridad, empleo y características manifiestas como higiene y aliño, calidad del vestido, expresión verbal y vocabulario, etc.</p>
<b>Tipo de consumo de drogas ilícitas</b>	<p>Características de consumo de sustancias ilegales según motivo, frecuencia y problemas asociados. No incluye el uso de alcohol y/o tabaco y se clasifica como: experimental, social u ocasional, funcional, disfuncional y en remisión.</p>
<b>Total de drogas consumidas</b>	<p>Número de drogas consumidas (se incluyen las 26 sustancias de seguimiento) en las siguientes categorías: alguna vez en la vida, en el último año y en los últimos 30 días.</p>
<b>Uso combinado de drogas</b>	<p>Consumo de dos o más sustancias (incluyendo alcohol y cualquier droga ilícita o de uso médico, utilizada sin prescripción, pero excluyendo tabaco) en el transcurso de un mismo día, en el año previo a la solicitud de tratamiento en CIJ.</p>