



**Centros de  
Integración  
Juvenil, A.C.**

**SISTEMA DE INFORMACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DEL  
CONSUMO DE DROGAS**

**CONSUMO DE DROGAS EN SOLICITANTES  
DE TRATAMIENTO EN CENTROS DE  
INTEGRACIÓN JUVENIL**

**DROGAS ILÍCITAS**

**SEGUNDO SEMESTRE DE 2019**

**Marina Velázquez Altamirano**

**Alma Delia Gutiérrez López**

Dirección de Investigación y Enseñanza

Subdirección de Investigación

México, marzo del 2020

**Informe de Investigación 20-03a**

**SIECD**



## **DIRECTORIO**

### **PRESIDENTE DEL PATRONATO NACIONAL**

Dr. Roberto Tapia Conyer

### **FUNDADORA DE CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL, A.C. Y VICEPRESIDENTA VITALICIA DEL PATRONATO NACIONAL**

Sra. Kena Moreno

### **DIRECTORA GENERAL**

Mtra. Carmen Fernández Cáceres

### **DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE OPERACIÓN Y PATRONATOS**

Dr. José Ángel Prado García

### **DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE NORMATIVIDAD**

Dr. Ricardo Sánchez Huesca

### **DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA**

Mtro. David Bruno Díaz Negrete

### **SUBDIRECTORA DE INVESTIGACIÓN**

Dra. Solveig Eréndira Rodríguez Kuri

### **JEFE DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA Y EPIDEMIOLÓGICA**

Dr. Valeriano Raúl García Aurrecoechea

<b>CONTENIDO</b>	<b>PÁG.</b>
RESUMEN	4
ANTECEDENTES	5
MÉTODO	6
RESULTADOS	8
CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS	8
FACTORES ASOCIADOS A LA DEMANDA DE TRATAMIENTO	11
CONSUMO DE DROGAS	14
REFERENCIAS	24
CUADROS	28
GLOSARIO	52

<b>ÍNDICE DE CUADROS</b>		<b>PÁG.</b>
Cuadro 1	Pacientes de primer ingreso a tratamiento por unidad de atención (CIJ, UH y UTUH)	29
Cuadro 2	Sexo	32
Cuadro 3	Persona que proporciona la información	32
Cuadro 4	Edad de ingreso a tratamiento	32
Cuadro 5	Estado civil	33
Cuadro 6	Escolaridad	33
Cuadro 7	Ocupación	34
Cuadro 8	Estrato social	34
Cuadro 9	Motivos de consulta	35
Cuadro 10	Condicionantes de la solicitud de tratamiento	35
Cuadro 11	Antecedentes de acciones contra el consumo de sustancias	36
Cuadro 12	Problemas asociados al consumo de sustancias	36
Cuadro 13	Edad de inicio del consumo de tabaco	37
Cuadro 14	Edad de inicio del consumo de alcohol	37
Cuadro 15	Edad de inicio del consumo de drogas ilícitas	38
Cuadro 16	Drogas ilícitas de inicio según menciones	39
Cuadro 17	Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de tabaco y el ingreso a tratamiento a CIJ	40
Cuadro 18	Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de alcohol y el ingreso a tratamiento a CIJ	40
Cuadro 19	Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de drogas ilícitas y el ingreso a tratamiento a CIJ	41
Cuadro 20	Tipo de consumo de drogas ilícitas	41
Cuadro 21	Total de drogas consumidas alguna vez en la vida (incluye alcohol o tabaco)	42
Cuadro 22	Total de drogas ilícitas consumidas alguna vez en la vida (no incluye ni alcohol ni tabaco)	42
Cuadro 23	Consumo de drogas alguna vez en la vida por sustancia	43
Cuadro 24	Total de drogas consumidas en el último año (incluye alcohol o tabaco)	44
Cuadro 25	Total de drogas ilícitas consumidas en el último año (no incluye ni alcohol ni tabaco)	44
Cuadro 26	Consumo de drogas en los últimos 12 meses por sustancia	45
Cuadro 27	Droga de preferencia en los últimos 12 meses, según menciones	46
Cuadro 28	Droga de mayor impacto en los últimos 12 meses, según menciones	47
Cuadro 29	Uso combinado de drogas en los últimos 12 meses (no incluye tabaco)	48
Cuadro 30	Total de drogas consumidas en los últimos 30 días (incluye alcohol o tabaco)	48
Cuadro 31	Total de drogas ilícitas consumidas en los últimos 30 días (no incluye ni alcohol ni tabaco)	49
Cuadro 32	Consumo de drogas en los últimos 30 días por sustancia	50
Cuadro 33	Frecuencia de episodios de abuso del consumo de Tabaco en los últimos 30 días	51
Cuadro 34	Frecuencia de episodios de abuso del consumo de Alcohol en los últimos 30 días	51
Cuadro 35	Frecuencia de episodios de abuso del consumo de drogas ilícitas en los últimos 30 días	51

## RESUMEN

El presente informe se realizó con base en 11,238 registros clínicos de la entrevista inicial realizada a personas que acudieron por primera vez a solicitar tratamiento por el consumo de drogas a Centros de Integración Juvenil (CIJ) entre julio y diciembre de 2019.

Los objetivos del estudio son: a) actualizar información de los solicitantes de tratamiento en cuanto al perfil sociodemográfico, factores asociados a la demanda de tratamiento y patrón de consumo de sustancias; b) contribuir al desarrollo, diseño y ajuste de los servicios institucionales de prevención y tratamiento del consumo de drogas c) contribuir con los sistemas nacionales de información del consumo de drogas y d) generar información que oriente el desarrollo de estudios sobre el uso de tabaco, alcohol y otras sustancias en México.

Los datos que se presentan revelan que el uso de drogas ilícitas sigue siendo un problema que afecta mayormente a la población masculina, en una proporción de 4.4 hombres por cada mujer. La edad media de ingreso a tratamiento fue de 24.2 años. En promedio, los hombres ingresaron a tratamiento a mayor edad que las mujeres (24.5 y 23.2 años, respectivamente). La edad promedio del inicio del consumo de tabaco y de alcohol fue a los 14.8 años y la de drogas ilícitas a los 16.4 años. La edad de inicio del consumo de sustancias entre no presenta diferencias importantes por sexo en cuanto a tabaco y alcohol. Sin embargo, el consumo de drogas ilícitas se presentó de manera más temprana entre los hombres (16.2 años), en comparación con las mujeres (17.3 años).

Las drogas de mayor consumo alguna vez en la vida fueron: alcohol (88.5%), cannabis (86.7%), tabaco (85.1%), cocaína/crack (47.8%), estimulantes (42.6%; principalmente metanfetaminas: 38.6% y éxtasis: 6.7%), inhalables (21.0%), depresores (16.0%), drogas alucinógenas y disociativas (14.6%) y opiáceos (4.1%, principalmente heroína: 2.5%). Las sustancias más utilizadas el mes previo al ingreso a tratamiento fueron: tabaco (60.9%), alcohol (56.7%), cannabis (48.5%), metanfetaminas (21.5%), cocaína/crack (15.2%), inhalables (5.5%) y benzodiacepinas (4.8%). Las sustancias reportadas como de mayor impacto fueron: marihuana (35.4%), metanfetaminas (25.4%), alcohol (13.6%), crack (6.1%), tabaco (5.5%) y cocaína en polvo (5.1%).

En cuanto a los factores asociados a la demanda de tratamiento se observó que los consultantes acudieron principalmente por iniciativa propia (44.1%) o por recomendación de la familia (43.8%); que solicitaron atención debido a su consumo de drogas ilícitas (87.4%), alcohol (44.2%) o tabaco (37.2%). Previo a su ingreso a tratamiento en CIJ, 31.7% de los solicitantes intentaron interrumpir el uso de sustancias de manera voluntaria y sin apoyo, mientras que 24.8% no habían realizado alguna acción para dejar el consumo. Los problemas asociados al consumo de drogas reportados con mayor frecuencia fueron los del ámbito familiar (79.2%), de salud (46.3%), psicológicos (45.7%) y escolares (34.8%).

## ANTECEDENTES

Centros de Integración Juvenil (CIJ) reporta información epidemiológica del consumo de drogas de los solicitantes de tratamiento desde 1976<sup>1</sup>. En 1983 inicia la aplicación de una cédula homogénea a los pacientes de nuevo ingreso<sup>2</sup>. Sin embargo, es a partir de 1990 que la recolección de datos se realiza de forma sistemática<sup>3</sup>. Posteriormente, se implementa el *Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas* (SIECD), el cual se ha consolidado a través de los años y realiza el seguimiento oportuno de un conjunto de variables que contribuyen en la toma de decisiones de los servicios institucionales. Además, ofrece un panorama sobre la forma y tendencias del uso de drogas y aporta información a los sistemas epidemiológicos de las adicciones en el país, a saber: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA)<sup>4</sup> de la Secretaría de Salud, Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas (SRID) –perteneciente al Instituto Nacional de Psiquiatría “*Ramón de la Fuente Muñiz*” (INPRF)<sup>5</sup>– y el Observatorio Mexicano de Drogas a cargo de la Comisión Nacional contra las Adicciones de la Secretaría Salud<sup>6</sup>.

El SIECD ha apoyado en el desarrollo de diferentes estudios epidemiológicos especializados, incluyendo el perfil de usuarios de drogas y su trayectoria de consumo<sup>7</sup>, uso de drogas en mujeres<sup>8</sup>, población infantil<sup>9</sup> o de acuerdo con las etapas de la vida<sup>10</sup> y estudios de tendencias<sup>11,12,13,14</sup>. Esta información permite enfrentar de manera oportuna las problemáticas generadas por el creciente consumo de estimulantes, al mismo tiempo que sustenta el diseño de estudios sobre características particulares de los consumidores de estos alcaloides<sup>15,16</sup>.

La información reportada a través del sistema ha permitido el desarrollo de estudios epidemiológicos particulares enfocados en profundizar en las características del consumo de drogas legales de pacientes atendidos. Así, desde el 2006, el SIECD genera un informe de las características de los pacientes consumidores de tabaco y alcohol<sup>17</sup>, con lo cual se ha logrado identificar una emergencia epidemiológica del consumo de alcohol entre las mujeres atendidas con relación a los años anteriores<sup>18</sup>; suceso que ha dado pie a CIJ para profundizar en esta problemática<sup>19</sup> y que ha sido reportado por la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT), sobre todo para el caso de las mujeres jóvenes<sup>20</sup>.

Cabe destacar que la información generada por el SIECD durante el lapso de más de dos décadas ha sido consistente con la información de otras encuestas nacionales<sup>21,22,23</sup> y también ha sido referente para el desarrollo de metodologías de

investigación en variados estudios clínicos, psicosociales y evaluativos de la Institución, como es el caso de diversos *Estudios de la Comunidad Objetivo (EBCO)*<sup>24</sup> realizados por los CIJ a lo largo del país.

El presente informe se elaboró con base en información obtenida por el SIECD durante el segundo semestre del 2019 y tiene el objetivo de proporcionar datos actualizados sobre las características sociodemográficas, factores asociados a la demanda de tratamiento y patrón de consumo de drogas de los solicitantes de tratamiento, de manera que se aporten elementos para apoyar el diseño, planeación y ajuste de los programas institucionales de prevención, tratamiento y rehabilitación, además de colaborar con otros sistemas de información en drogas y de aportar elementos para el diseño y elaboración de investigaciones en el campo de las adicciones.

## MÉTODO

**Diseño del estudio:** Censo, descriptivo, semestral.

**Población:** 11,238 usuarios de drogas ilícitas procedentes de 107 unidades de CIJ, que acudieron por primera vez a consulta entre junio y diciembre de 2019 (cuadro 1. Anexo).

**Fuente de información:** Formato de Entrevista Inicial aplicado en la primera consulta por parte del personal médico-técnico responsable del ingreso de pacientes a tratamiento, que forma parte del expediente clínico en cualquiera de sus dos versiones: formato electrónico (base de datos recuperada el día 30 de enero de 2020 a las 17:51 hrs., con 11,174 registros capturados por los/as terapeutas responsables de realizar la entrevista inicial) o formato impreso (64 registros capturados por personal del departamento de Investigación Clínica y Epidemiológica mediante el programa *Control de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas* desarrollado por CIJ) utilizado por el CIJ La Piedad.

**Variables de estudio:** Las características sociodemográficas estudiadas comprenden: persona que proporciona la información, sexo, edad de ingreso a tratamiento, estado civil, escolaridad, ocupación y estrato social; las variables de factores asociados a la demanda de tratamiento incluyen: motivo(s) de consulta, condicionante(s) de la solicitud de tratamiento, antecedente(s) de acciones tomadas frente al uso de sustancias y problema(s) asociado(s) al mismo; y las variables de patrón de consumo: edad de inicio, tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de sustancias y el ingreso a

tratamiento, droga ilícita de inicio, consumo alguna vez en la vida, en el último año y en los últimos 30 días; drogas de preferencia y de mayor impacto en el último año (estas dos últimas variables de acuerdo con el punto de vista del paciente), uso combinado de sustancias, tipo de consumo de drogas ilícitas, episodios de abuso y total de drogas consumidas.

La información sobre el consumo de drogas se presenta agrupada en 26 categorías de drogas y en algunos casos (consumo alguna vez en la vida, en el último año y en el último mes) se proporciona además información concentrada en diez grupos:

Grupo de Sustancias	Drogas en seguimiento
Tabaco	Cigarrillos
Alcohol	Bebidas alcohólicas
<i>Cannabis</i>	Mariguana y hachís
Cocaína	Cocaína, <i>crack</i> y otra presentación de cocaína
Inhalables	Solventes y removedores, pegamentos, esmaltes y pinturas y otros inhalables
Depresores	Benzodiacepinas, <i>Rohypnol</i> y otros depresores
Estimulantes	Anfetaminas, metanfetaminas ( <i>crystal</i> o <i>ICE</i> ), MDMA ( <i>éxtasis</i> ) y metanfetaminas alucinógenas; y otros estimulantes
Drogas alucinógenas y disociativas	Ácido lisérgico (LSD), plantas alucinógenas y derivados y otros alucinógenos (PCP y ketamina)
Opiáceos	Heroína, Opioides sintéticos y opio y otros opiáceos
Otras sustancias de abuso	Sustancias con utilidad médica y otras sustancias no identificadas

**Procesamiento de datos.** Para el procesamiento estadístico de la información se utilizó el programa SPSS v.19.

Los resultados se presentan tanto en forma general como desglosada por sexo y en porcentajes válidos, excluyendo los casos “*sin información*” y aquellos que no cumplieron con las condiciones requeridas para el análisis en cada variable de estudio.



## RESULTADOS



### CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS<sup>a</sup>

**Sexo.** La población se conformó por 9,158 hombres y 2,080 mujeres, lo cual representa 81.5% y 18.5%, respectivamente. Es decir, 4.4 hombres solicitan tratamiento en CIJ por cada mujer.

**Persona que proporciona la información.** 46.4% de los casos acudieron en compañía de familiares u otras personas, sin diferencias entre hombres (46.8%) y mujeres (44.9%).

**Edad de ingreso a tratamiento.** Se observa un rango de edad de 6 a 79 años, con un promedio de 24.2 años (DE= 10.8 años); es decir, 9,409 de los usuarios de drogas tenía entre los 13 y 35 años de edad (alrededor del 83% de las personas atendidas); la edad mediana de la población fue de 20 años (36.8% de los casos fueron menores de edad; 4,141 sujetos), mientras que la moda se ubicó en 16 años (1,109 casos atendidos).

**Figura 1. Edad de ingreso según sexo**


	 Años	 Años	Las mujeres ingresaron a tratamiento a menor edad que los hombres.
<b>Rango</b>	8 a 79	6 a 78	
<b>Promedio (Desviación estándar)</b>	24.5 (10.9)	23.2 (10.5)	
<b>Mediana</b>	21	19	
<b>Moda</b>	16	16	
<b>Decil<sub>1</sub></b>	15	14	

<sup>a</sup> Cfr., Cuadros 1 a 8.

**Estado civil.** La mayor parte de la población refirió ser soltera (69.3%), mientras que 12.7% indicó que vivía en unión libre y 9.9% estaba casada.


**Figura 2. Estado civil según sexo**

La proporción de hombres que cuentan con alguna relación de pareja es mayor que la de mujeres.



**Escolaridad.** En términos generales, 35.6% había cursado al menos algún grado de educación secundaria, 41.3% algún grado de bachillerato, 13.1% tenía estudios superiores y 6.7% solo había cursado la primaria.


**Figura 3. Escolaridad según sexo**



Las mujeres cuentan, en mayor proporción que los hombres, con estudios superiores.

**Ocupación.** 37.8% desempeñaba alguna actividad laboral, 30.3% reportó ser estudiante y 21.6% estaba desempleado.


**Figura 4. Principal ocupación según sexo**



**Estrato social.** De acuerdo con la percepción de los terapeutas, la mitad de los pacientes (49.6%) se ubicaban en el estrato medio bajo, 23.6% en un nivel bajo y 21.9% fue clasificado en el estrato medio.

**Figura 5. Estrato social según sexo**


Según la percepción de los terapeutas, tanto hombres como mujeres presentaron condiciones sociales similares, predominando el estrato medio bajo.



## FACTORES ASOCIADOS A LA DEMANDA DE TRATAMIENTO<sup>b</sup>


**Motivos de consulta.** 47.4% de las personas atendidas reportaron más de un motivo para acudir a tratamiento (uso de alcohol, tabaco o drogas), mientras que 0.2% no expresó ninguno. 87.4% de los pacientes acudió por consumo de drogas ilícitas, 44.2% por uso de bebidas alcohólicas y 37.2% por uso de tabaco.

**Figura 6. Motivos de consulta según sexo**



**Condicionantes de la solicitud de tratamiento.** 28.4% de los casos expresó dos o más condicionantes para acudir a tratamiento; 44.1% por iniciativa propia, 43.8% acudió por recomendación de la familia, 17.5% por condicionamiento o recomendación escolar, 10.1% por indicación médica y 8.9 % por condicionamiento legal.


**Figura 7. Condicionantes de la solicitud de tratamiento según sexo**



<sup>b</sup> Cfr. Cuadros 9 a 12.

**Antecedentes de acciones contra el consumo de sustancias.** 31.7% de los pacientes expresó que antes de acudir a CIJ había intentado interrumpir voluntariamente el consumo sin otro tipo de apoyo, 13.0% señaló que había estado internado en algún anexo, 7.7% había acudido a algún grupo de ayuda mutua, 6.8% lo había hecho a través de juramento y el 6.2% con tratamiento psiquiátrico o psicoterapéutico de tipo ambulatorio. Cabe señalar que 13.5% reportó haber intentado al menos dos formas distintas de acciones para abandonar el consumo de drogas, en tanto que 24.8% expresó que hasta el momento de la solicitud de tratamiento no había tomado ninguna medida en contra del consumo de drogas.


**Figura 8. Antecedentes de acciones contra el consumo de sustancias según sexo**



Mayor porcentaje de mujeres ingresaron a CIJ sin haber realizado acciones previas para dejar el consumo de drogas o habían acudido a tratamientos psiquiátricos o psicoterapéuticos ambulatorios, mientras que los hombres en mayor proporción que las mujeres intentaron dejarlo de manera voluntaria, se internaron en algún anexo, participaron en grupos de ayuda mutua o por medio de juramento.

**Problemas asociados al consumo de sustancias.** 79.2% de los pacientes señaló problemas de tipo familiar, 46.3% de salud, 45.7% psicológicos, 34.8% escolares, 27.3% laborales, 19.4% legales, 14.7% de conducta antisocial o delictiva y 14.3% accidentes o lesiones. Cabe señalar que 78.1% de las personas atendidas mencionaron dos o más problemas asociados al consumo de sustancias, mientras que 5.0% no reportó ninguno.

**Figura 9. Problemas asociados al consumo de sustancias según sexo**





Los problemas familiares son los más frecuentemente relacionados al consumo de drogas entre hombres y mujeres.

Sin embargo, las mujeres reportaron en mayor proporción que los hombres problemas psicológicos, de salud y escolares; mientras que los hombres rebasan el porcentaje de mujeres, al referir problemas de tipo laboral, legal, conducta antisocial y accidentes o lesiones.

## CONSUMO DE DROGAS<sup>c</sup>

**Edad de inicio del consumo de sustancias.** La edad promedio de inicio del consumo de tabaco se situó en 14.8 años (DE =3.7 años), la mediana en 14 años y la moda en 15 años, mientras que la edad promedio de inicio del consumo de alcohol se ubicó en 14.8 años (DE =3.3 años) con una mediana y una moda de 15 años. Por su parte, la edad promedio de inicio del uso de drogas ilícitas (incluyendo sustancias de uso médico sin prescripción) fue de 16.4 años (DE =5.5 años), con una mediana y una moda de 15 años. Por otra parte, al considerar el primer decil como indicador de las edades de inicio más tempranas, se observa que el consumo de tabaco aparece a los 11 años, mientras que el de alcohol y drogas ilícitas se presenta a los 12 años de edad.

**Figura 10. Edad de inicio del consumo de sustancias según sexo**

	 <b>Años</b>			 <b>Años</b>		
	Tabaco	Alcohol	Drogas ilícitas	Tabaco	Alcohol	Drogas ilícitas
<b>Promedio</b> (Desviación estándar)	14.7 (3.5)	14.7 (3.1)	16.2 (5.1)	15.3 (4.5)	15.0 (4.0)	17.3 (6.8)
<b>Mediana</b>	14	15	15	15	15	15
<b>Moda</b>	15	15	15	15	15	15
<b>Decil<sub>1</sub></b>	11	12	12	12	12	13


En cuanto a la edad de inicio del consumo de sustancias, no se observan diferencias entre hombres y mujeres.

**Drogas ilícitas de inicio.** Las sustancias de inicio más reportadas fueron: marihuana (73.9%); cocaína (10.0%), tanto en forma de polvo blanco (8.3%) como crack (1.7%); estimulantes (6.5%), donde destacan las metanfetaminas (5.6%); seguidos por los inhalables (6.2%), mayormente en forma de solventes y removedores (4.7%); los

<sup>c</sup> Cfr., Cuadros 13 a 35

depresores con utilidad médica como las benzodiacepinas (1.8%); y los opiáceos (0.5%), entre los cuales sobresalen los opioides sintéticos (26 casos) y la heroína (18 casos).

**Figura 11. Principales drogas ilícitas de inicio según sexo**





**Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de sustancias y el ingreso a tratamiento en CIJ.** El promedio de años entre el inicio de consumo y la solicitud de tratamiento se situó de la siguiente manera: tabaco, 9.9 años (DE=10.3 años), alcohol 10.0 años (DE=10.2 años) y drogas ilícitas 7.8 años (DE =9.2 años).

Cabe señalar que la mitad de los usuarios de alcohol y la mitad de los usuarios de tabaco dejaron pasar seis años desde que iniciaron el consumo hasta que acudieron a solicitar tratamiento; en tanto que los usuarios de drogas dejaron pasar cuatro años.




**Figura 12. Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de sustancias y el ingreso a tratamiento en CIJ según sexo**

	 <b>Años</b>			 <b>Años</b>		
	<b>Tabaco</b>	<b>Alcohol</b>	<b>Drogas ilícitas</b>	<b>Tabaco</b>	<b>Alcohol</b>	<b>Drogas ilícitas</b>
<b>Promedio</b> (Desviación estándar)	10.2 (10.5)	10.3 (10.4)	8.2 (9.4)	8.4 (9.4)	8.5 (9.2)	5.9 (7.8)
<b>Mediana</b>	6	7	4	5	5	3
<b>Moda</b>	1	1	1	1	1	< un año
<b>Decil<sub>1</sub></b>	1	1	< un año	1	1	< un año

Los hombres dejan pasar más tiempo que las mujeres para solicitar tratamiento.

**Tipo de consumo de drogas ilícitas.** De acuerdo con los terapeutas, 51.5% de los solicitantes de tratamiento fue diagnosticado con consumo funcional, 23.6% con consumo disfuncional, 13.2% con consumo social u ocasional, 9.0% con consumo experimental y 2.6% presentaba remisión del consumo.

**Figura 13. Tipo de consumo de drogas ilícitas según sexo**




El patrón de consumo funcional y disfuncional es mayor en los hombres, mientras que una mayor proporción de mujeres reporta el consumo de tipo ocasional y experimental.

**Total de drogas consumidas.** El promedio de sustancias utilizadas alguna vez en la vida, incluyendo alcohol o tabaco, fue de 4.4 drogas (94.9% reportó el uso de dos o más sustancias); en el último año fue de 3.6 drogas (89.5% consumió dos o más sustancias); y en los últimos 30 días fue de 2.2 drogas (67.7% reportó haber utilizado dos o más sustancias).

El promedio de sustancias consumidas alguna vez en la vida, sin incluir alcohol y tabaco, fue de 2.7 drogas (64.1% reportó el uso de dos o más sustancias); en el último año fue de 2.0 drogas (49.6% consumió dos o más sustancias); y en los últimos 30 días fue de 1.0 droga (23.1% reportó haber utilizado dos o más sustancias).

**Figura 14. Promedio de drogas consumidas según sexo**




Mujeres y hombres han consumido prácticamente el mismo número de sustancias.

**Consumo de drogas alguna vez en la vida.**<sup>d</sup> Las proporciones de consumo alguna vez en la vida de los diez grupos de sustancias en seguimiento fueron: alcohol (88.5%), *cannabis* (86.7%), tabaco (85.1%), cocaína (47.8%), estimulantes (42.6%), inhalables (21.0%), depresores (16.0 %), drogas alucinógenas y disociativas (14.6%), opiáceos (4.1%) y otras sustancias de abuso (2.2%).

En cuanto al uso de sustancias específicas (contenidas en alguno de los diez grupos antes mencionados) sobresalen: marihuana (86.7%), cocaína en polvo (42.9%), metanfetaminas (38.6%), *crack* (20.5%), solventes y removedores (16.1%), benzodiacepinas (15.6%) y LSD (12.0%); en menor proporción se reportó el consumo de *éxtasis* y otras metanfetaminas alucinógenas (6.7%), hachís (6.5%), plantas alucinógenas y derivados (5.6%) y pegamentos (5.2%).

**Figura 15. Consumo de drogas alguna vez en la vida según sexo**




Los hombres reportaron en mayor proporción que las mujeres el consumo de tabaco, alcohol, marihuana, inhalables, cocaína y crack. Ellas reportaron en mayor proporción que los hombres el consumo de benzodiacepinas y éxtasis.

<sup>d</sup> Los casos pudieron haber reportado el consumo de dos o más sustancias, por lo que el total de los porcentajes no suma 100%.

**Consumo de drogas en los últimos 12 meses.** 98.8% de las personas reportaron haber consumido alguna sustancia en el año previo a su ingreso a tratamiento en CIJ. Las proporciones de consumo de los diez grupos de sustancias utilizadas en este lapso fueron: alcohol (81.1%), tabaco (76.1%), cannabis (72.4%), estimulantes (37.2%), cocaína (34.1%), inhalables (13.2%), depresores (11.1%), drogas alucinógenas y disociativas (9.3%); opiáceos (2.8%) y otras sustancias de abuso (1.6%).

En cuanto al consumo de sustancias específicas contenidas en alguno de los grupos anteriores, destacaron: marihuana (72.4%), metanfetaminas (34.5%), cocaína en polvo (28.3%), crack (14.8%), benzodiazepinas (10.8%) y solventes y removedores (10.5%) y LSD (8.1%).


**Figura 16. Consumo de drogas en los últimos 12 meses según sexo**



Las drogas más consumidas en el último año por ambos sexos fueron alcohol, tabaco y marihuana; las mujeres usaron en mayor proporción que los hombres: metanfetaminas, éxtasis, benzodiazepinas y alucinógenos.

**Droga de preferencia en los últimos 12 meses.** Entre las sustancias más frecuentemente referidas se encontraron: marihuana (40.1%), metanfetaminas (17.9%), alcohol (16.3%) y tabaco (9.6%).


**Figura 17. Droga de preferencia en los últimos 12 meses según sexo**



Los hombres reconocieron mayor preferencia que las mujeres por el uso de marihuana, cocaína en polvo, y crack; mientras que en las mujeres la preferencia fue mayor que en los hombres por el tabaco, alcohol, inhalables, metanfetaminas, benzodiacepinas, alucinógenos y heroína. No obstante, cabe resaltar que la marihuana es la droga preferidas tanto por hombres como por mujeres.

**Droga de mayor impacto en los últimos 12 meses.** Las principales sustancias reportadas por los pacientes a las cuales atribuyeron los mayores daños a la salud, bienestar personal y familiar o en el desempeño escolar, laboral o social y por las que reportaron haber solicitado tratamiento fueron: marihuana (35.4%), metanfetaminas (25.4%) y alcohol (13.6%); en menor medida se mencionó al crack (6.1%), tabaco (5.5%) y cocaína en polvo (5.1%).

**Figura 18. Droga de mayor impacto en los últimos 12 meses según sexo**




Hombres y mujeres acuden a tratamiento principalmente por el consumo de marihuana y metanfetaminas.

Con mayor frecuencia ellos acuden por los efectos asociados al consumo de marihuana y crack; mientras que ellas por los del uso de tabaco, alcohol, metanfetaminas, benzodiazepinas y alucinógenos.

**Uso combinado de drogas en los últimos 12 meses.<sup>e</sup>** Al menos en una ocasión en el transcurso del último año y sin tomar en cuenta el consumo de tabaco, casi la mitad de la población (47.4%) reportó el consumo de dos o más sustancias en un mismo día.

**Figura 19. Uso combinado de droga en los últimos 12 meses según sexo**



Los hombres reportan en mayor proporción que las mujeres el uso de dos o más sustancias (no se incluye el consumo de tabaco) en un mismo día.


<sup>e</sup> No se toman en cuenta 2,173 casos (19.3%) que no cumplieron los criterios de inclusión de esta variable; 18.8% de los hombres y 21.7% de las mujeres (ver anexo, cuadro 29).

**Consumo de drogas en los últimos 30 días.** Incluyendo alcohol y tabaco, 91.0% de los casos reportaron consumo de sustancias en el mes anterior al ingreso a tratamiento.

Las prevalencias de consumo de los diez grupos de sustancias utilizadas en este lapso fueron: tabaco (60.9%), alcohol (56.7%), cannabis (48.5%), estimulantes (22.6%), cocaína (15.2%), inhalables (5.5%), depresores (4.9%), drogas alucinógenas y disociativas (1.8%), opiáceos (1.4%) y otras sustancias de abuso (0.8%).

En cuanto al consumo de sustancias específicas destacó el de marihuana con 48.5%, seguida de metanfetaminas (21.5%), cocaína (9.9%), crack (7.2%), benzodiacepinas (4.8%) y solventes/removedores (4.4%); en menor proporción se registró el consumo de LSD (1.5%) y heroína (0.8%).


**Figura 20. Consumo de drogas en los últimos 30 días según sexo**



Hombres y mujeres consumieron predominantemente tabaco, alcohol, marihuana—los hombres en mayor proporción—. Las mujeres reportaron mayor consumo de metanfetaminas, benzodiacepinas, alucinógenos y heroína.

**Frecuencia de episodios de abuso en los últimos 30 días.** 41.0% de quienes reportaron consumo de tabaco en los últimos 30 días aceptó fumar seis o más cigarrillos diariamente. Asimismo, entre quienes consumieron alcohol, la mayor parte (36.2) reportó consumo abusivo menos de una vez a la semana o una o dos veces a la semana (29.9%). Por otra parte, 41.6% de los usuarios de drogas ilícitas durante el último mes reportaron consumirlas todos los días, 22.3% menos de una vez a la semana, 18.9% una a dos veces a la semana y 17.2% cada tercer día.

**Figura 21. Frecuencia de episodios de abuso en los últimos 30 días según sexo**



En general, los hombres refieren mayor frecuencia de episodios de abuso de drogas ilícitas, tabaco y alcohol que las mujeres.



## REFERENCIAS

1. Sánchez-Huesca, R. y López, L. M. (1985). *Características demográficas y patrones de inicio en el consumo de drogas en asistentes a los Centros Locales; recuperación de los archivos de siete años (1976-1982)*. México: Centros de Integración Juvenil, A.C.
2. Clarac, P. y Wagner, F. (1987). Análisis de algunas variables en una muestra de pacientes farmacodependientes (1986). En Wagner, F. y Ortiz, R. (1990). *Estudios acerca de la farmacodependencia en México realizados por Paule Clarac*. México: Centros de Integración Juvenil, A. C. (pp. 111-126).
3. García V. R., Díaz, D. B., Balanzario, M. C., Gutiérrez, A. D y Castillo, P. I. (1999). *Características sociodemográficas y de consumo de drogas en pacientes atendidos entre 1990 y 1997* (Informe de investigación 98-12). México: Centros de Integración Juvenil, A.C.
4. Secretaria de Salud. *Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA)*. México. Dirección General de Epidemiología. Recuperado de [http://187.191.75.115/gobmx/salud/documentos/info\\_sisvea/informes\\_sisvea\\_2006.pdf](http://187.191.75.115/gobmx/salud/documentos/info_sisvea/informes_sisvea_2006.pdf)
5. Ortiz A, Martínez R., Meza D. (2019). Grupo Interinstitucional para el desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana No. 63, Noviembre de 2017. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Ciudad de México. Recuperado de [http://inprf.gob.mx/psicosociales/archivos/srid/rep\\_63\\_pdf.pdf](http://inprf.gob.mx/psicosociales/archivos/srid/rep_63_pdf.pdf)
6. Secretaría de Salud, Comisión Nacional contra las Adicciones (2019). *Observatorio Mexicano de Drogas*. Recuperado de <https://www.gob.mx/salud/conadic/acciones-y-programas/observatorio-mexicano-de-drogas-omd>
7. García-Aurrecochea, V. R., Díaz-Negrete, D. B., Balanzario, M. C. y Castillo-Franco, P. I. (1998). *Perfil y trayectoria del consumo de drogas en pacientes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil en 1996*. En CD: D. B. Díaz, J. L. Arellanez, M. C. Balanzario y R. Sánchez, *Once años de*

- estudios del consumo de drogas en México, Investigaciones realizadas en Centros de Integración Juvenil entre 1997 y 2007.* México: Centros de Integración Juvenil, A. C.
8. Castillo, P. I., Gutiérrez, A. D. (2008). Consumo de drogas en mujeres asistentes a centros de tratamiento especializado en la Ciudad de México. *Salud Mental* 31 (5), 351-359. Recuperado de <http://scielo.unam.mx/pdf/sm/v31n5/v31n5a3.pdf>
  9. Gracia, S. E. y Balanzario, M. C. (2003). *El consumo de drogas en menores de 12 años en Centros de Integración Juvenil en el año 2002* (Informe de Investigación 03-17). México: Centros de Integración Juvenil, A. C.
  10. García, V. R., Castillo, P. I. y Guerrero, J. A. (2003). *El consumo de drogas en pacientes atendidos en Centros de Integración Juvenil según la etapa de vida correspondiente al ingreso a tratamiento* (Informe de Investigación 03-13). México: Centros de Integración Juvenil, A. C.
  11. García, V. R., Díaz, D. B. y Balanzario, M. C. (2001). *Tendencias del consumo de drogas en pacientes de primer ingreso a tratamiento en CIJ entre 1990 y 1999* (Informe de investigación 2000-06). México: Centros de Integración Juvenil, A.C.
  12. Gutiérrez López, AD. (2019). *Tendencias del consumo de drogas alguna vez en la vida en usuarios de drogas ilícitas solicitantes de tratamiento en Centros de Integración Juvenil del 2° semestre de 2004 al 1er semestre de 2019. (Nivel Nacional y Entidades Federativas)* [Informe de Investigación 19-04e]. México: Centros de Integración Juvenil, A. C. Recuperado de <http://www.cij.gob.mx/programas/Investigacion/pdf/19-04e.pdf>
  13. Gutiérrez, A. D. (2019). *Tendencias del consumo de drogas en los últimos 30 días en usuarios de drogas ilícitas solicitantes de tratamiento en Centros de Integración Juvenil del 2° semestre de 2004 al 1er semestre de 2019. (Nivel Nacional y Entidades Federativas)* [Informe de Investigación 19-04f]. México: Centros de Integración Juvenil, A. C. Recuperado de <http://www.cij.gob.mx/programas/Investigacion/pdf/19-04f.pdf>
  14. Gutiérrez, A. D. (2019). *Droga de mayor impacto reportada por usuarios de drogas ilícitas solicitantes de tratamiento en Centros de Integración Juvenil del 2° semestre de 2004 al 1er semestre de 2019. (Nivel nacional y entidades*

- federativas*) [Informe de Investigación 19-04g]. México: Centros de Integración Juvenil, A. C. Recuperado de <http://www.cij.gob.mx/programas/Investigacion/pdf/19-04g.pdf>
15. Jiménez, K., García, V. R. y González, J. D. (2005). *Patrón de consumo de cocaína y crack en pacientes que ingresan a tratamiento* (Informe de investigación 05-07). México: Centros de Integración Juvenil, A. C.
  16. Jiménez, K. y Castillo, N. L. (2014). *Factores de reincidencia en usuarios de cocaína, crack y metanfetaminas en fase de recuperación* (Informe de Investigación 04-14). México: Centros de Integración Juvenil, A. C.
  17. Gutiérrez, A. D. y Castillo, P. I. (2007). *Estudio epidemiológico del consumo de alcohol y tabaco en pacientes usuarios de estas sustancias solicitantes de tratamiento en CIJ en 2006* (Informe de Investigación 07-13). México: Centros de Integración Juvenil, A. C. Recuperado de <http://www.test.cij.gob.mx/ExtCIJ/programas/Investigacion/pdf/07-13.pdf>
  18. Gutiérrez, A. D. (2019). *Consumo de drogas en solicitantes de tratamiento en Centros de Integración Juvenil. Tabaco y alcohol. Segundo semestre del 2018.* (Informe de Investigación 19-01d). México: Centros de Integración Juvenil, A. C. Recuperado de <http://www.test.cij.gob.mx/ExtCIJ/programas/Investigacion/pdf/19-01d.pdf>
  19. Moreno, K. (2010). *Los jóvenes y el alcohol en México. Un problema emergente en mujeres.* México: Centros de Integración Juvenil, A.C.
  20. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz; Instituto Nacional de Salud Pública, Comisión Nacional Contra las Adicciones, Secretaría de Salud. Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017: Reporte de Alcohol. Villatoro-Velázquez JA, Reséndiz Escobar, E., Mujica Salazar, A., Bretón-Cirett, M., Cañas-Martínez, V., Soto-Hernández, I., Fregoso-Ito, D., Fleiz-Bautista, C., Medina-Mora ME., Gutiérrez-Reyes, J., Franco-Núñez, A., Romero-Martínez, M. y Mendoza-Alvarado, L. Ciudad de México, México: INPRFM; 2017.
  21. Medina-Mora, M. E. Villatoro J. A., Fleiz, C., Téllez, M. M., Mendoza, L. R., Romero, M., Gutiérrez, J. P., Castro, M., Hernández, M., Tena, C., Alvear, C. y

- Guisa, V. (2012). *Encuesta Nacional de Adicciones 2011: Reporte de Alcohol*. México: Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.
22. Medina-Mora, M. E. Villatoro J. A., Fleiz, C., Téllez, M. M., Mendoza, L. R., Romero, M., Gutiérrez, J. P., Castro, M., Hernández, M., Tena, C., Alvear, C. y Guisa, V. (2012). *Encuesta Nacional de Adicciones 2011: Reporte de Drogas*. México: Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.
23. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz; Instituto Nacional de Salud Pública, Comisión Nacional Contra las Adicciones, Secretaría de Salud. *Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017: Reporte de Drogas*. Villatoro-Velázquez JA, Reséndiz Escobar, E., Mujica Salazar, A., Bretón-Cirett, M., Cañas-Martínez, V., Soto-Hernández, I., Fregoso-Ito, D., Fleiz-Bautista, C., Medina-Mora ME., Gutiérrez-Reyes, J., Franco-Núñez, A., Romero-Martínez, M. y Mendoza-Alvarado, L. Ciudad de México, México: INPRFM; 2017.
24. Centros de Integración Juvenil, A.C. (2019). *Estudio Básico de Comunidad Objetivo 2018*. México: Centros de Integración Juvenil, A. C. Recuperado de <http://www.cij.gob.mx/ebco2018-2024/Index.html>

---

# Cuadros

---

**CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS USUARIOS DE DROGAS ILÍCITAS DE PRIMER INGRESO A TRATAMIENTO A CIJ EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2019**

**Cuadro 1. Pacientes de primer ingreso por unidad de atención (CIJ, UH y UTH)**

CIJ	General		Hombres		Mujeres		Razón H:M
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	
Álvaro Obregón Norte	109	1.0	90	1.0	19	0.9	4.7 : 1
Álvaro Obregón Oriente	51	0.5	44	0.5	7	0.3	6.3 : 1
Atizapán	131	1.2	106	1.2	25	1.2	4.2 : 1
Azcapotzalco	106	0.9	86	0.9	20	1.0	4.3 : 1
Benito Juárez	124	1.1	104	1.1	20	1.0	5.2 : 1
Chalco	116	1.0	96	1.0	20	1.0	4.8 : 1
Coyoacán	172	1.5	136	1.5	36	1.7	3.8 : 1
Cuajimalpa	91	0.8	74	0.8	17	0.8	4.4 : 1
Cuauhtémoc Oriente	137	1.2	112	1.2	25	1.2	4.5 : 1
Cuauhtémoc Poniente	120	1.1	89	1.0	31	1.5	2.9 : 1
Ecatepec	166	1.5	142	1.6	24	1.2	5.9 : 1
Gustavo A. Madero Aragón	223	2.0	194	2.1	29	1.4	6.7 : 1
Gustavo A. Madero Norte	166	1.5	136	1.5	30	1.4	4.5 : 1
Gustavo A. Madero Oriente	17	0.2	11	0.1	6	0.3	1.8 : 1
Iztapalapa Oriente	396	3.5	337	3.7	59	2.8	5.7 : 1
Iztapalapa Poniente	112	1.0	87	0.9	25	1.2	3.5 : 1
Miguel Hidalgo	88	0.8	70	0.8	18	0.9	3.9 : 1
Naucalpan	114	1.0	97	1.1	17	0.8	5.7 : 1
Nezahualcóyotl	249	2.2	215	2.3	34	1.6	6.3 : 1
Texcoco	101	0.9	86	0.9	15	0.7	5.7 : 1
Tlalnepantla	219	1.9	187	2.0	32	1.5	5.8 : 1
Tlalpan	194	1.7	158	1.7	36	1.7	4.4 : 1
Venustiano Carranza	136	1.2	106	1.2	30	1.4	3.5 : 1
UH Ecatepec	60	0.5	59	0.6	1	0.0	59.0 : 1
UH Iztapalapa	103	0.9	94	1.0	9	0.4	10.4 : 1
UH Naucalpan	30	0.3	23	0.3	7	0.3	3.3 : 1
Acapulco	125	1.1	106	1.2	19	0.9	5.6 : 1
Aguascalientes	232	2.1	186	2.0	46	2.2	4.0 : 1
Cancún	109	1.0	85	0.9	24	1.2	3.5 : 1
Cd. del Carmen	41	0.4	31	0.3	10	0.5	3.1 : 1
Cd. Juárez Norte	131	1.2	97	1.1	34	1.6	2.9 : 1
Cd. Victoria	23	0.2	17	0.2	6	0.3	2.8 : 1
Celaya	195	1.7	161	1.8	34	1.6	4.7 : 1
Chetumal	47	0.4	35	0.4	12	0.6	2.9 : 1

*(Continúa)*

**Cuadro 1. Pacientes de primer ingreso a tratamiento por unidad de atención (CIJ, UH y UTUH)**  
(Continuación)

CIJ	General		Hombres		Mujeres		Razón H:M
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	
Chihuahua	277	2.5	220	2.4	57	2.7	3.9 : 1
Chilpancingo	62	0.6	46	0.5	16	0.8	2.9 : 1
Colima	129	1.1	103	1.1	26	1.3	4.0 : 1
Cozumel	58	0.5	48	0.5	10	0.5	4.8 : 1
Cuernavaca	129	1.1	101	1.1	28	1.3	3.6 : 1
Culiacán	151	1.3	128	1.4	23	1.1	5.6 : 1
Durango	66	0.6	49	0.5	17	0.8	2.9 : 1
Escuinapa	45	0.4	42	0.5	3	0.1	14.0 : 1
Fresnillo	55	0.5	40	0.4	15	0.7	2.7 : 1
Guadalajara Centro	240	2.1	193	2.1	47	2.3	4.1 : 1
Guadalajara Sur	120	1.1	96	1.0	24	1.2	4.0 : 1
Guadalupe	86	0.8	66	0.7	20	1.0	3.3 : 1
Guadalupe Zacatecas	5	0.0	8	0.1	0	0.0	---
Guamúchil	70	0.6	64	0.7	6	0.3	10.7 : 1
Guasave	89	0.8	81	0.9	8	0.4	10.1 : 1
Hermosillo	122	1.1	100	1.1	22	1.1	4.5 : 1
Huatulco	28	0.2	25	0.3	3	0.1	8.3 : 1
Ixtapa Zihuatanejo	61	0.5	48	0.5	13	0.6	3.7 : 1
La Paz	62	0.6	45	0.5	17	0.8	2.6 : 1
La Piedad	41	0.4	34	0.4	7	0.3	4.9 : 1
Laguna Durango	113	1.0	90	1.0	23	1.1	3.9 : 1
León	228	2.0	180	2.0	48	2.3	3.8 : 1
Los Cabos	39	0.3	25	0.3	14	0.7	1.8 : 1
Los Mochis	90	0.8	77	0.8	13	0.6	5.9 : 1
Manzanillo	45	0.4	38	0.4	7	0.3	5.4 : 1
Mazatlán	109	1.0	88	1.0	21	1.0	4.2 : 1
Mérida	81	0.7	60	0.7	21	1.0	2.9 : 1
Mexicali	167	1.5	127	1.4	40	1.9	3.2 : 1
Monterrey	145	1.3	113	1.2	32	1.5	3.5 : 1
Morelia	146	1.3	122	1.3	24	1.2	5.1 : 1
Nogales	87	0.8	56	0.6	31	1.5	1.8 : 1
Oaxaca	135	1.2	109	1.2	26	1.3	4.2 : 1
Pachuca	178	1.6	157	1.7	21	1.0	7.5 : 1
Playa del Carmen	48	0.4	39	0.4	9	0.4	4.3 : 1
Poza Rica	24	0.2	21	0.2	3	0.1	7.0 : 1
Puebla	88	0.8	75	0.8	13	0.6	5.8 : 1
Puerto Vallarta	104	0.9	90	1.0	14	0.7	6.4 : 1
Querétaro	150	1.3	124	1.4	26	1.3	4.8 : 1
Reynosa	26	0.2	22	0.2	4	0.2	5.5 : 1

(Continúa)

**Cuadro 1. Pacientes de primer ingreso a tratamiento por unidad de atención (CIJ, UH y UTUH)**  
(Continuación)

CIJ	General		Hombres		Mujeres		Razón H:M
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	
Salamanca	64	0.6	56	0.6	8	0.4	7.0 : 1
Saltillo	237	2.1	189	2.1	48	2.3	3.9 : 1
San Luis Potosí	234	2.1	200	2.2	34	1.6	5.9 : 1
San Nicolás de los Garza	142	1.3	119	1.3	23	1.1	5.2 : 1
Tampico	80	0.7	66	0.7	14	0.7	4.7 : 1
Tapachula	39	0.3	35	0.4	4	0.2	8.8 : 1
Tecomán	65	0.6	53	0.6	12	0.6	4.4 : 1
Tehuacán	115	1.0	96	1.0	19	0.9	5.1 : 1
Tepic	42	0.4	30	0.3	12	0.6	2.5 : 1
Tijuana Guaycura	186	1.7	133	1.5	53	2.5	2.5 : 1
Tijuana Soler	173	1.5	130	1.4	43	2.1	3.0 : 1
Tlaquepaque	160	1.4	135	1.5	25	1.2	5.4 : 1
Tlaxcala	58	0.5	50	0.5	8	0.4	6.3 : 1
Toluca	157	1.4	137	1.5	20	1.0	6.9 : 1
Torreón Oriente	251	2.2	192	2.1	59	2.8	3.3 : 1
Tuxtla Gutiérrez	71	0.6	55	0.6	16	0.8	3.4 : 1
Villa Victoria	8	0.1	2	0.0	3	0.1	0.7 : 1
Villahermosa	51	0.5	37	0.4	14	0.7	2.6 : 1
Xalapa	82	0.7	69	0.8	13	0.6	5.3 : 1
Yucatán	54	0.5	48	0.5	6	0.3	8.0 : 1
Zacatecas	85	0.8	71	0.8	14	0.7	5.1 : 1
Zamora	71	0.6	59	0.6	12	0.6	4.9 : 1
Zapopan Kena Moreno	6	0.1	5	0.1	1	0.0	5.0 : 1
Zapopan Norte	213	1.9	166	1.8	47	2.3	3.5 : 1
UH Cd. Juárez	28	0.2	20	0.2	8	0.4	2.5 : 1
UH Culiacán	13	0.1	13	0.1	0	0.0	---
UH Ixbalanqué	14	0.1	13	0.1	1	0.0	13.0 : 1
UH Nuevo León	69	0.6	56	0.6	13	0.6	4.3 : 1
UH Punta Diamante	38	0.3	31	0.3	7	0.3	4.4 : 1
UH Tijuana	43	0.4	35	0.4	8	0.4	4.4 : 1
UH Zapopan	13	0.1	12	0.1	1	0.0	12.0 : 1
UH Zapotlán el Grande	17	0.2	17	0.2	0	0.0	---
UTUH Cd. Juárez	9	0.1	8	0.1	1	0.0	8.0 : 1
UTUH Tijuana	17	0.2	13	0.1	4	0.2	3.3 : 1
<b>Total</b>	<b>11,238</b>	<b>100.0</b>	<b>9,158</b>	<b>100.0</b>	<b>2,080</b>	<b>100.0</b>	<b>4.4 : 1</b>

UH=Unidad de Hospitalización  
UTUH=Unidad de Tratamiento para Usuarios de Heroína



**Cuadro 2. Sexo**

	<b>Frec.</b>	<b>%</b>	<b>Razón H:M</b>
Hombres	9,158	81.5	
Mujeres	2,080	18.5	<b>4.4 : 1</b>
<b>Total</b>	<b>11,238</b>	<b>100.0</b>	

**Cuadro 3. Persona que proporciona la información**

	<b>General</b>		<b>Hombres</b>		<b>Mujeres</b>	
	<b>Frec.</b>	<b>%</b>	<b>Frec.</b>	<b>%</b>	<b>Frec.</b>	<b>%</b>
Usuario de drogas	4,895	43.6	3,967	43.3	928	44.6
Usuario de drogas y familiares u otras personas	5,216	46.4	4,282	46.8	934	44.9
<i>Sin Información</i>	1,127	10.0	909	9.9	218	10.5
<b>Total</b>	<b>11,238</b>	<b>100.0</b>	<b>9,158</b>	<b>100.0</b>	<b>2,080</b>	<b>100.0</b>

**Cuadro 4. Edad de ingreso a tratamiento**

	<b>General</b>			<b>Hombres</b>			<b>Mujeres</b>		
	<b>Frec.</b>	<b>%</b>	<b>% válido</b>	<b>Frec.</b>	<b>%</b>	<b>% válido</b>	<b>Frec.</b>	<b>%</b>	<b>% válido</b>
Hasta 9 años	2	0.0	0.0	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
10 a 14 años	1,147	10.2	10.2	875	9.6	9.6	272	13.1	13.1
15 a 19 años	4,126	36.7	36.7	3,335	36.4	36.4	791	38.0	38.0
20 a 24 años	1,836	16.3	16.3	1,492	16.3	16.3	344	16.5	16.5
25 a 29 años	1,333	11.9	11.9	1,111	12.1	12.1	222	10.7	10.7
30 a 34 años	894	8.0	8.0	743	8.1	8.1	151	7.3	7.3
35 a 39 años	742	6.6	6.6	614	6.7	6.7	128	6.2	6.2
40 a 44 años	453	4.0	4.0	394	4.3	4.3	59	2.8	2.8
45 años y más	705	6.3	6.3	593	6.5	6.5	112	5.4	5.4
<b>Total</b>	<b>11,238</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>9,158</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>2,080</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
Media (DE)	24.2 (10.8) años			24.5 (10.9) años			23.2 (10.5) años		
Mediana	20 años			21 años			19 años		
Moda	16 años			16 años			16 años		
Decil1	14 años			15 años			14 años		

DE= Desviación Estándar

**Cuadro 5. Estado civil**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Soltero	7,781	69.2	69.3	6,273	68.5	68.6	1,508	72.5	72.7
Casado	1,110	9.9	9.9	991	10.8	10.8	119	5.7	5.7
Unión libre	1,421	12.6	12.7	1,171	12.8	12.8	250	12.0	12.0
Separado	683	6.1	6.1	546	6.0	6.0	137	6.6	6.6
Divorciado	182	1.6	1.6	148	1.6	1.6	34	1.6	1.6
Viudo	48	0.4	0.4	21	0.2	0.2	27	1.3	1.3
<i>Sin información</i>	13	0.1	<i>Se omite</i>	8	0.1	<i>Se omite</i>	5	0.2	<i>Se omite</i>
<b>Total</b>	<b>11,238</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>9,158</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>2,080</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

**Cuadro 6. Escolaridad**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Ninguna (no sabe leer ni escribir)	34	0.3	0.3	25	0.3	0.3	9	0.4	0.4
Ninguna (sabe leer y escribir)	22	0.2	0.2	18	0.2	0.2	4	0.2	0.2
Primaria incompleta	248	2.2	2.2	199	2.2	2.2	49	2.4	2.4
Primaria completa	502	4.5	4.5	393	4.3	4.3	109	5.2	5.2
Secundaria incompleta	1,955	17.4	17.4	1,586	17.3	17.3	369	17.7	17.7
Secundaria completa	2,043	18.2	18.2	1,697	18.5	18.5	346	16.6	16.6
Estudios técnicos o comerciales incompletos	167	1.5	1.5	142	1.6	1.6	25	1.2	1.2
Estudios técnicos o comerciales completos	103	0.9	0.9	70	0.8	0.8	33	1.6	1.6
Bachillerato incompleto	3,584	31.9	31.9	2,958	32.3	32.3	626	30.1	30.1
Bachillerato completo	1,053	9.4	9.4	876	9.6	9.6	177	8.5	8.5
Estudios superiores incompletos	1,011	9.0	9.0	801	8.7	8.7	210	10.1	10.1
Estudios superiores completos	457	4.1	4.1	353	3.9	3.9	104	5.0	5.0
Estudios de posgrado incompletos	20	0.2	0.2	12	0.1	0.1	8	0.4	0.4
Estudios de posgrado completos	35	0.3	0.3	25	0.3	0.3	10	0.5	0.5
<i>Sin información</i>	4	0.0	<i>Se omite</i>	3	0.0	<i>Se omite</i>	1	0.0	<i>Se omite</i>
<b>Total</b>	<b>11,238</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>9,158</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>2,080</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

**Cuadro 7. Ocupación**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Desempleado(a)	2,429	21.6	21.6	1,968	21.5	21.5	461	22.2	22.2
Estudiante	3,401	30.3	30.3	2,668	29.1	29.1	733	35.2	35.2
Estudiante que trabaja	695	6.2	6.2	601	6.6	6.6	94	4.5	4.5
Trabaja	4,243	37.8	37.8	3,742	40.9	40.9	501	24.1	24.1
Tareas del hogar	400	3.6	3.6	121	1.3	1.3	279	13.4	13.4
Pensionado	67	0.6	0.6	55	0.6	0.6	12	0.6	0.6
<i>Sin información</i>	3	0.0	<i>Se omite</i>	3	0.0	<i>Se omite</i>	0	0.0	<i>Se omite</i>
<b>Total</b>	<b>11,238</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>9,158</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>2,080</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

**Cuadro 8. Estrato social**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Alto	36	0.3	0.3	30	0.3	0.3	6	0.3	0.3
Medio alto	439	3.9	3.9	352	3.8	3.8	87	4.2	4.2
Medio	2,457	21.9	21.9	1,969	21.5	21.5	488	23.5	23.5
Medio bajo	5,565	49.5	49.6	4,582	50.0	50.1	983	47.3	47.4
Bajo	2,653	23.6	23.6	2,155	23.5	23.6	498	23.9	24.0
Pobreza extrema o marginación	74	0.7	0.7	60	0.7	0.7	14	0.7	0.7
<i>Sin información</i>	14	0.1	<i>Se omite</i>	10	0.1	<i>Se omite</i>	4	0.2	<i>Se omite</i>
<b>Total</b>	<b>11,238</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>9,158</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>2,080</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

**FACTORES ASOCIADOS A LA DEMANDA DE TRATAMIENTO EN PACIENTES DE PRIMER INGRESO A TRATAMIENTO EN CIJ EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2019**

**Cuadro 9. Motivos de consulta**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Consumo de drogas ilícitas	9,822	87.4	8,121	88.7	1,701	81.8
Consumo de bebidas alcohólicas	4,962	44.2	4,082	44.6	880	42.3
Consumo de tabaco	4,179	37.2	3,435	37.5	744	35.8
Otro motivo	628	5.6	461	5.0	167	8.0
<i>Ningún motivo específico reportado</i>	21	0.2	13	0.1	8	0.4
<i>Usuarios que reportaron dos o más motivos de consulta</i>	5,326	47.4	4,398	48.0	928	44.6

**Cuadro 10. Condicionantes de la solicitud de tratamiento**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Por propia iniciativa	4,955	44.1	4,026	44.0	929	44.7
Por condicionamiento o recomendación familiar	4,922	43.8	4,052	44.2	870	41.8
Por recomendación de pares	124	1.1	101	1.1	23	1.1
Por condicionamiento o recomendación escolar	1,963	17.5	1,615	17.6	348	16.7
Por condicionamiento legal	1,005	8.9	824	9.0	181	8.7
Por condicionamiento o recomendación laboral	240	2.1	212	2.3	28	1.3
Por indicación médica	1,136	10.1	904	9.9	232	11.2
Por solicitud de novia(o)	34	0.3	24	0.3	10	0.5
Otros condicionantes de solicitud de tratamiento	314	2.8	235	2.6	79	3.8
<i>Ningún condicionante reportado</i>	161	1.4	125	1.4	36	1.7
<i>Pacientes que reportaron dos o más condicionantes de la solicitud de tratamiento</i>	3,187	28.4	2,601	28.4	586	28.2

**Cuadro 11. Antecedentes de acciones contra el consumo de sustancias**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Juramento	767	6.8	675	7.4	92	4.4
Grupo de ayuda mutua	862	7.7	727	7.9	135	6.5
Internamiento en anexo	1,459	13.0	1,276	13.9	183	8.8
Intervención de emergencia	88	0.8	69	0.8	19	0.9
Programa de mantenimiento	84	0.7	71	0.8	13	0.6
Tratamiento médico no especializado	95	0.8	79	0.9	16	0.8
Tratamiento psiquiátrico o psicoterapéutico ambulatorio	694	6.2	559	6.1	135	6.5
Tratamiento psiquiátrico o psicoterapéutico residencial	239	2.1	181	2.0	58	2.8
Medicina tradicional o alternativa	75	0.7	56	0.6	19	0.9
Intento de interrupción voluntaria del consumo, sin apoyo	3,562	31.7	2,940	32.1	622	29.9
Otras acciones	2,679	23.8	2,131	23.3	548	26.3
<i>Ninguna acción previa reportada</i>	2,786	24.8	2,203	24.1	583	28.0
<i>Pacientes que reportaron dos o más acciones contra el consumo de sustancias antes de solicitar tratamiento en CIJ</i>	1,516	13.5	1,270	13.9	246	11.8

**Cuadro 12. Problemas asociados al consumo de sustancias**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Problemas de salud	5,202	46.3	4,231	46.2	971	46.7
Accidentes o lesiones	1,611	14.3	1,376	15.0	235	11.3
Problemas familiares	8,906	79.2	7,284	79.5	1,622	78.0
Problemas escolares	3,916	34.8	3,161	34.5	755	36.3
Problemas laborales	3,067	27.3	2,692	29.4	375	18.0
Problemas psicológicos	5,141	45.7	4,080	44.6	1,061	51.0
Problemas legales	2,177	19.4	1,889	20.6	288	13.8
Conducta antisocial o delictiva	1,651	14.7	1,441	15.7	210	10.1
Otros problemas	536	4.8	424	4.6	112	5.4
<i>Ningún problema asociado reportado</i>	564	5.0	432	4.7	132	6.3
<i>Pacientes que reportaron dos o más problemas asociados</i>	8,777	78.1	7,160	78.2	1,617	77.7

**CARACTERÍSTICAS DEL CONSUMO DE DROGAS EN PACIENTES DE PRIMER INGRESO A TRATAMIENTO EN CIJ EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2019**

**Cuadro 13. Edad de inicio del consumo de tabaco**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Hasta 9 años	304	2.7	3.2	258	2.8	3.3	46	2.2	2.7
10 a 14 años	4,521	40.2	47.3	3,737	40.8	47.6	784	37.7	45.8
15 a 19 años	4,122	36.7	43.1	3,393	37.0	43.3	729	35.0	42.6
20 a 24 años	389	3.5	4.1	310	3.4	4.0	79	3.8	4.6
25 a 29 años	118	1.1	1.2	83	.9	1.1	35	1.7	2.0
30 a 34 años	54	0.5	0.6	33	0.4	0.4	21	1.0	1.2
35 a 39 años	30	0.3	0.3	18	0.2	0.2	12	0.6	0.7
40 a 44 años	7	0.1	0.1	7	0.1	0.1	0	0.0	0.0
45 años y más	9	0.1	0.1	4	0.0	0.1	5	0.2	0.3
<i>No consumió</i>	1,676	14.9	<i>Se omite</i>	1,310	14.3	<i>Se omite</i>	366	17.6	<i>Se omite</i>
<i>Sin información</i>	8	0.1	100.0	5	0.1	100.0	3	0.1	100.0
<b>Total</b>	<b>11,238</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>9,158</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>2,080</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
Media (DE)	14.8 (3.7) años			14.7 (3.5) años			15.3 (4.5) años		
Mediana	14 años			14 años			15 años		
Moda	15 años			15 años			15 años		
Decil1	11 años			11 años			12 años		

DE= Desviación Estándar

**Cuadro 14. Edad de inicio del consumo de alcohol**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Hasta 9 años	328	2.9	3.3	274	3.0	3.4	54	2.6	3.0
10 a 14 años	4,279	38.1	43.1	3,463	37.8	42.7	816	39.2	44.6
15 a 19 años	4,824	42.9	48.6	3,991	43.6	49.2	833	40.0	45.6
20 a 24 años	369	3.3	3.7	290	3.2	3.6	79	3.8	4.3
25 a 29 años	87	0.8	0.9	60	0.7	0.7	27	1.3	1.5
30 a 34 años	23	0.2	0.2	16	0.2	0.2	7	0.3	0.4
35 a 39 años	13	0.1	0.1	9	0.1	0.1	4	0.2	0.2
40 a 44 años	4	0.0	0.0	2	0.0	0.0	2	0.1	0.1
45 años y más	8	0.1	0.1	2	0.0	0.0	6	0.3	0.3
<i>No consumió</i>	1,293	11.5	<i>Se omite</i>	1,045	11.4	<i>Se omite</i>	248	11.9	<i>Se omite</i>
<i>Sin información</i>	10	0.1	100.0	6	0.1	100.0	4	0.2	100.0
<b>Total</b>	<b>11,238</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>9,158</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>2,080</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
Media (DE)	14.8 (3.3) años			14.7 (3.1) años			15 (4.0) años		
Mediana	15 años			15 años			15 años		
Moda	15 años			15 años			15 años		
Decil1	12 años			12 años			12 años		

DE= Desviación Estándar

**Cuadro 15. Edad de inicio del consumo de drogas ilícitas**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Hasta 9 años	144	1.3	1.3	127	1.4	1.4	17	0.8	0.8
10 a 14 años	4,197	37.3	37.4	3,439	37.6	37.7	758	36.4	36.5
15 a 19 años	5,238	46.6	46.7	4,326	47.2	47.4	912	43.8	43.9
20 a 24 años	868	7.7	7.7	690	7.5	7.6	178	8.6	8.6
25 a 29 años	357	3.2	3.2	275	3.0	3.0	82	3.9	3.9
30 a 34 años	162	1.4	1.4	115	1.3	1.3	47	2.3	2.3
35 a 39 años	115	1.0	1.0	80	0.9	0.9	35	1.7	1.7
40 a 44 años	57	0.5	0.5	37	0.4	0.4	20	1.0	1.0
45 años y más	71	0.6	0.6	44	0.5	0.5	27	1.3	1.3
<i>Sin información</i>	29	0.3	100.0	25	0.3	100.0	4	0.2	100.0
<b>Total</b>	<b>11,238</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>9,158</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>2,080</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
Media (DE)	16.4 (5.5) años			16.2 (5.1) años			17.3 (6.8) años		
Mediana	15 años			15 años			15 años		
Moda	15 años			15 años			15 años		
Decil1	12 años			12 años			13 años		

DE= Desviación Estándar

**Cuadro 16. Drogas ilícitas de inicio, según menciones**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Mariguana	8,308	73.9	6,900	75.3	1,408	67.7
Hachís	14	0.1	10	0.1	4	0.2
Cocaína (Clorhidrato)	934	8.3	777	8.5	157	7.5
<i>Crack</i>	187	1.7	158	1.7	29	1.4
Otra presentación de cocaína	3	0.0	2	0.0	1	0.0
Solventes y removedores	531	4.7	435	4.7	96	4.6
Pegamentos	101	0.9	84	0.9	17	0.8
Esmaltes o pinturas	49	0.4	39	0.4	10	0.5
Otros inhalables	21	0.2	17	0.2	4	0.2
Benzodiazepinas	203	1.8	92	1.0	111	5.3
<i>Rohypnol</i> <sup>®</sup>	2	0.0	2	0.0	0	0.0
Otros depresores del SNC	7	0.1	7	0.1	0	0.0
Anfetamina	53	0.5	49	0.5	4	0.2
Metanfetaminas	631	5.6	450	4.9	181	8.7
Éxtasis (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas	29	0.3	21	0.2	8	0.4
Otros estimulantes del SNC	12	0.1	12	0.1	0	0.0
LSD	27	0.2	17	0.2	10	0.5
Plantas alucinógenas y derivados	14	0.1	14	0.2	0	0.0
Otras drogas alucinógenas y disociativas	1	0.0	0	0.0	1	0.0
Heroína	18	0.2	16	0.2	2	0.1
Opioides sintéticos	27	0.2	14	0.2	13	0.6
Opio y otros opiáceos	12	0.1	11	0.1	1	0.0
Sustancias con utilidad médica	11	0.1	7	0.1	4	0.2
Otras sustancias de abuso	43	0.4	24	0.3	19	0.9
<b>Total</b>	<b>11,238</b>	<b>100.0</b>	<b>9,158</b>	<b>100.0</b>	<b>2,080</b>	<b>100.0</b>



**Cuadro 17. Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de tabaco y el ingreso a tratamiento a CIJ**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
< de un año	538	4.8	5.6	415	4.5	5.3	123	5.9	7.2
1 a 5 años	3,995	35.5	41.8	3,193	34.9	40.7	802	38.6	46.9
6 a 10 años	1,773	15.8	18.6	1,455	15.9	18.6	318	15.3	18.6
11 a 15 años	1,033	9.2	10.8	868	9.5	11.1	165	7.9	9.6
16 a 20 años	746	6.6	7.8	628	6.9	8.0	118	5.7	6.9
21 a 25 años	594	5.3	6.2	513	5.6	6.5	81	3.9	4.7
26 o más años	875	7.8	9.2	771	8.4	9.8	104	5.0	6.1
No consumió	1,676	14.9	Se omite	1,310	14.3	Se omite	366	17.6	Se omite
Sin información	8	0.1	100.0	5	0.1	100.0	3	0.1	100.0
<b>Total</b>	<b>11,238</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>9,158</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>2,080</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
Media (DE)	9.9 (10.3) años			10.2 (10.5) años			8.4 (9.4) años		
Mediana	6 años			6 años			5 años		
Moda	1 año			1 año			1 año		
Decil1	1 año			1 año			1 año		

DE= Desviación Estándar

**Cuadro 18. Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de alcohol y el ingreso a tratamiento a CIJ**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
< de un año	535	4.8	5.4	421	4.6	5.2	114	5.5	6.2
1 a 5 años	4,085	36.3	41.1	3,236	35.3	39.9	849	40.8	46.4
6 a 10 años	1,831	16.3	18.4	1,498	16.4	18.5	333	16.0	18.2
11 a 15 años	1,148	10.2	11.6	942	10.3	11.6	206	9.9	11.3
16 a 20 años	831	7.4	8.4	696	7.6	8.6	135	6.5	7.4
21 a 25 años	600	5.3	6.0	526	5.7	6.5	74	3.6	4.0
26 o más años	905	8.1	9.1	788	8.6	9.7	117	5.6	6.4
No consumió	1,293	11.5	Se omite	1,045	11.4	Se omite	248	11.9	Se omite
Sin información	10	0.1	100.0	6	0.1	100.0	4	0.2	100.0
<b>Total</b>	<b>11,238</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>9,158</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>2,080</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
Media (DE)	10.0 (10.2) años			10.3 (10.4) años			8.5 (9.2) años		
Mediana	6 años			7 años			5 años		
Moda	1 año			1 año			1 año		
Decil1	1 año			1 año			1 año		

DE= Desviación Estándar

**Cuadro 19. Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de drogas ilícitas y el ingreso a tratamiento en CIJ**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
< de un año	1,441	12.8	12.9	1,062	11.6	11.6	379	18.2	18.3
1 a 5 años	4,967	44.2	44.3	3,963	43.3	43.4	1,004	48.3	48.4
6 a 10 años	1,823	16.2	16.3	1,518	16.6	16.6	305	14.7	14.7
11 a 15 años	1,085	9.7	9.7	938	10.2	10.3	147	7.1	7.1
16 a 20 años	736	6.5	6.6	618	6.7	6.8	118	5.7	5.7
21 a 25 años	493	4.4	4.4	427	4.7	4.7	66	3.2	3.2
26 o más años	664	5.9	5.9	607	6.6	6.6	57	2.7	2.7
<i>Sin información</i>	29	0.3	<i>Se omite</i>	25	0.3	<i>Se omite</i>	4	0.2	<i>Se omite</i>
<b>Total</b>	<b>11,238</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>9,158</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>2,080</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
Media (DE)	7.8 (9.2) años			8.2 (9.4) años			5.9 (7.8) años		
Mediana	4 años			4 años			3 años		
Moda	1 año			1 año			< un año		
Decil1	< un año			< un año			< un año		

DE= Desviación Estándar

**Cuadro 20. Tipo de consumo de drogas ilícitas**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Experimental	1,007	9.0	9.0	718	7.8	7.9	289	13.9	13.9
Social u ocasional	1,486	13.2	13.2	1,181	12.9	12.9	305	14.7	14.7
Funcional	5,780	51.4	51.5	4,808	52.5	52.6	972	46.7	46.8
Disfuncional	2,652	23.6	23.6	2,189	23.9	23.9	463	22.3	22.3
En remisión	295	2.6	2.6	245	2.7	2.7	50	2.4	2.4
<i>Sin información</i>	18	0.2	<i>Se omite</i>	17	0.2	<i>Se omite</i>	1	0.0	<i>Se omite</i>
<b>Total</b>	<b>11,238</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>9,158</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>2,080</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

**Cuadro 21. Total de drogas consumidas alguna vez en la vida  
(Incluye alcohol o tabaco)**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
1 sustancia	570	5.1	458	5.0	112	5.4
2 sustancias	1,004	8.9	767	8.4	237	11.4
3 sustancias	2,938	26.1	2,372	25.9	566	27.2
4 sustancias	2,180	19.4	1,757	19.2	423	20.3
5 sustancias	1,682	15.0	1,413	15.4	269	12.9
6 sustancias	1,098	9.8	911	9.9	187	9.0
7 sustancias	690	6.1	563	6.1	127	6.1
8 sustancias	431	3.8	370	4.0	61	2.9
9 sustancias	285	2.5	238	2.6	47	2.3
10 sustancias	164	1.5	136	1.5	28	1.3
11-19 sustancias	196	1.7	173	1.9	23	1.1
<b>Total</b>	<b>11,238</b>	<b>100.0</b>	<b>9,158</b>	<b>100.0</b>	<b>2,080</b>	<b>100.0</b>
Media (DE)	4.4 (2.2) drogas		4.4 (2.2) drogas		4.2 (2.1) drogas	
Mediana	4 drogas		4 drogas		4 drogas	
Moda	3 drogas		3 drogas		3 drogas	
Decil1	2 drogas		2 drogas		2 drogas	

DE= Desviación Estándar

**Cuadro 22. Total de drogas ilícitas consumidas alguna vez en la vida  
(No incluye ni alcohol ni tabaco)**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
1 sustancia	4,039	35.9	3,208	35.0	831	40.0
2 sustancias	2,466	21.9	1,998	21.8	468	22.5
3 sustancias	1,782	15.9	1,490	16.3	292	14.0
4 sustancias	1,148	10.2	953	10.4	195	9.4
5 sustancias	702	6.2	571	6.2	131	6.3
6 sustancias	450	4.0	386	4.2	64	3.1
7 sustancias	286	2.5	239	2.6	47	2.3
8 sustancias	167	1.5	138	1.5	29	1.4
9 sustancias	93	0.8	80	0.9	13	0.6
10 sustancias	56	0.5	50	0.5	6	0.3
11-17 sustancias	49	0.4	45	0.5	4	0.2
<b>Total</b>	<b>11,238</b>	<b>100.0</b>	<b>9,158</b>	<b>100.0</b>	<b>2,080</b>	<b>100.0</b>
Media (DE)	2.7 (2.0) drogas		2.8 (2.0) drogas		2.5 (1.9) drogas	
Mediana	2 drogas		2 drogas		2 drogas	
Moda	1 droga		1 droga		1 droga	
Decil1	1 droga		1 droga		1 droga	

DE= Desviación Estándar

**Cuadro 23. Consumo de drogas alguna vez en la vida por sustancia**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
<b>Tabaco</b>	<b>9,562</b>	<b>85.1</b>	<b>7,848</b>	<b>85.7</b>	<b>1,714</b>	<b>82.4</b>
<b>Alcohol</b>	<b>9,945</b>	<b>88.5</b>	<b>8,113</b>	<b>88.6</b>	<b>1,832</b>	<b>88.1</b>
<b>Cannabis</b>	<b>9,745</b>	<b>86.7</b>	<b>8,055</b>	<b>88.0</b>	<b>1,690</b>	<b>81.3</b>
Mariguana	9,743	86.7	8,053	87.9	1,690	81.3
Hachís	729	6.5	611	6.7	118	5.7
<b>Cocaína</b>	<b>5,370</b>	<b>47.8</b>	<b>4,525</b>	<b>49.4</b>	<b>845</b>	<b>40.6</b>
Cocaína (Clorhidrato)	4,818	42.9	4,050	44.2	768	36.9
<i>Crack</i>	2,302	20.5	2,002	21.9	300	14.4
Otra presentación de cocaína	86	0.8	69	0.8	17	0.8
<b>Inhalables</b>	<b>2,364</b>	<b>21.0</b>	<b>2,004</b>	<b>21.9</b>	<b>360</b>	<b>17.3</b>
Solventes o removedores	1,808	16.1	1,535	16.8	273	13.1
Pegamentos	587	5.2	505	5.5	82	3.9
Esmaltes o pinturas	274	2.4	226	2.5	48	2.3
Otros inhalables	118	1.1	105	1.1	13	0.6
<b>Depresores</b>	<b>1,799</b>	<b>16.0</b>	<b>1,409</b>	<b>15.4</b>	<b>390</b>	<b>18.8</b>
Benzodiacepinas	1,750	15.6	1,361	14.9	389	18.7
<i>Rohypnol</i>	52	0.5	48	0.5	4	0.2
Otros depresores	28	0.2	26	0.3	2	0.1
<b>Estimulantes</b>	<b>4,783</b>	<b>42.6</b>	<b>3,873</b>	<b>42.3</b>	<b>910</b>	<b>43.8</b>
Anfetamina	243	2.2	208	2.3	35	1.7
Metanfetaminas	4,343	38.6	3,522	38.5	821	39.5
<i>Éxtasis</i> (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas	752	6.7	584	6.4	168	8.1
Otros estimulantes	58	0.5	48	0.5	10	0.5
<b>Drogas alucinógenas y disociativas</b>	<b>1,642</b>	<b>14.6</b>	<b>1,336</b>	<b>14.6</b>	<b>306</b>	<b>14.7</b>
LSD	1,349	12.0	1,077	11.8	272	13.1
Plantas alucinógenas y derivados	624	5.6	546	6.0	78	3.8
Otras drogas alucinógenas y disoc.	42	0.4	33	0.4	9	0.4
<b>Opiáceos</b>	<b>459</b>	<b>4.1</b>	<b>370</b>	<b>4.0</b>	<b>89</b>	<b>4.3</b>
Heroína	263	2.3	214	2.3	49	2.4
Opioides sintéticos	141	1.3	104	1.1	37	1.8
Opio y otros opiáceos	80	0.7	73	0.8	7	0.3
<b>Otras sustancias de abuso</b>	<b>250</b>	<b>2.2</b>	<b>195</b>	<b>2.1</b>	<b>55</b>	<b>2.6</b>
Con utilidad médica	75	0.7	60	0.7	15	0.7
Otras sustancias de abuso	180	1.6	140	1.5	40	1.9

**Cuadro 24. Total de drogas consumidas en el último año  
(Incluye alcohol o tabaco)**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Ninguna	134	1.2	102	1.1	32	1.5
1 sustancia	1,046	9.3	837	9.1	209	10.0
2 sustancias	1,964	17.5	1,537	16.8	427	20.5
3 sustancias	3,232	28.8	2,686	29.3	546	26.3
4 sustancias	2,070	18.4	1,711	18.7	359	17.3
5 sustancias	1,242	11.1	1,033	11.3	209	10.0
6 sustancias	675	6.0	546	6.0	129	6.2
7 sustancias	379	3.4	290	3.2	89	4.3
8 sustancias	246	2.2	208	2.3	38	1.8
9 sustancias	120	1.1	99	1.1	21	1.0
10 sustancias	61	0.5	49	0.5	12	0.6
11-19 sustancias	69	0.6	60	0.7	9	0.4
<b>Total</b>	<b>11,238</b>	<b>100.0</b>	<b>9,158</b>	<b>100.0</b>	<b>2,080</b>	<b>100.0</b>
Media (DE)	3.6 (1.9) drogas		3.6 (1.9) drogas		3.5 (1.9) drogas	
Mediana	3 drogas		3 drogas		3 drogas	
Moda	3 drogas		3 drogas		3 drogas	
Decil1	1 droga		1 droga		1 droga	

DE= Desviación Estándar

**Cuadro 25. Total de drogas ilícitas consumidas en el último año  
(No incluye ni alcohol ni tabaco)**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Ninguna	806	7.2	619	6.8	187	9.0
1 sustancia	4,858	43.2	3,951	43.1	907	43.6
2 sustancias	2,542	22.6	2,107	23.0	435	20.9
3 sustancias	1,373	12.2	1,140	12.4	233	11.2
4 sustancias	733	6.5	595	6.5	138	6.6
5 sustancias	406	3.6	313	3.4	93	4.5
6 sustancias	257	2.3	216	2.4	41	2.0
7 sustancias	128	1.1	103	1.1	25	1.2
8 sustancias	64	0.6	52	0.6	12	0.6
9 sustancias	28	0.2	23	0.3	5	0.2
10 sustancias	21	0.2	19	0.2	2	0.1
11-17 sustancias	22	0.2	20	0.2	2	0.1
<b>Total</b>	<b>11,238</b>	<b>100.0</b>	<b>9,158</b>	<b>100.0</b>	<b>2,080</b>	<b>100.0</b>
Media (DE)	2.0 (1.7) drogas		2.0 (1.7) drogas		2.0 (1.6) drogas	
Mediana	1 droga		2 drogas		1 droga	
Moda	1 droga		1 droga		1 droga	
Decil1	1 droga		1 droga		1 droga	

DE= Desviación Estándar

**Cuadro 26. Consumo de drogas en los últimos 12 meses por sustancia**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
<b>Tabaco</b>	<b>8,553</b>	<b>76.1</b>	<b>7,010</b>	<b>76.5</b>	<b>1,543</b>	<b>74.2</b>
<b>Alcohol</b>	<b>9,115</b>	<b>81.1</b>	<b>7,458</b>	<b>81.4</b>	<b>1,657</b>	<b>79.7</b>
<b>Cannabis</b>	<b>8,137</b>	<b>72.4</b>	<b>6,740</b>	<b>73.6</b>	<b>1,397</b>	<b>67.2</b>
Mariguana	8,132	72.4	6,735	73.5	1,397	67.2
Hachís	495	4.4	417	4.6	78	3.8
<b>Cocaína</b>	<b>3,827</b>	<b>34.1</b>	<b>3,206</b>	<b>35.0</b>	<b>621</b>	<b>29.9</b>
Cocaína (Clorhidrato)	3,183	28.3	2,643	28.9	540	26.0
<i>Crack</i>	1,661	14.8	1,442	15.7	219	10.5
Otra presentación de cocaína	60	0.5	47	.5	13	0.6
<b>Inhalables</b>	<b>1,481</b>	<b>13.2</b>	<b>1,244</b>	<b>13.6</b>	<b>237</b>	<b>11.4</b>
Solventes y removedores	1,176	10.5	991	10.8	185	8.9
Pegamentos	293	2.6	250	2.7	43	2.1
Esmaltes o pinturas	124	1.1	95	1.0	29	1.4
Otros inhalables	59	0.5	55	0.6	4	0.2
<b>Depresores</b>	<b>1,243</b>	<b>11.1</b>	<b>931</b>	<b>10.2</b>	<b>312</b>	<b>15.0</b>
Benzodiacepinas	1,213	10.8	902	9.8	311	15.0
<i>Rohypnol</i>	24	0.2	21	0.2	3	0.1
Otros depresores	21	0.2	19	0.2	2	0.1
<b>Estimulantes</b>	<b>4,184</b>	<b>37.2</b>	<b>3,361</b>	<b>36.7</b>	<b>823</b>	<b>39.6</b>
Anfetamina	156	1.4	130	1.4	26	1.3
Metanfetaminas	3,873	34.5	3,117	34.0	756	36.3
<i>Éxtasis</i> (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas	450	4.0	337	3.7	113	5.4
Otros estimulantes	39	0.3	33	0.4	6	0.3
<b>Drogas alucinógenas y disociativas</b>	<b>1,049</b>	<b>9.3</b>	<b>823</b>	<b>9.0</b>	<b>226</b>	<b>10.9</b>
LSD	915	8.1	708	7.7	207	10.0
Plantas alucinógenas y derivados	292	2.6	255	2.8	37	1.8
Otras drogas alucinógenas y disoc.	25	0.2	18	0.2	7	0.3
<b>Opiáceos</b>	<b>320</b>	<b>2.8</b>	<b>251</b>	<b>2.7</b>	<b>69</b>	<b>3.3</b>
Heroína	176	1.6	138	1.5	38	1.8
Opioides sintéticos	103	0.9	73	.8	30	1.4
Opio y otros opiáceos	53	0.5	48	0.5	5	0.2
<b>Otras sustancias de abuso</b>	<b>180</b>	<b>1.6</b>	<b>132</b>	<b>1.4</b>	<b>48</b>	<b>2.3</b>
Con utilidad médica	52	0.5	39	0.4	13	0.6
Otras sustancias de abuso	131	1.2	96	1.0	35	1.7

**Cuadro 27. Droga de preferencia en los últimos 12 meses, según menciones**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Tabaco	1,064	9.5	9.6	811	8.9	9.0	253	12.2	12.4
Alcohol	1,805	16.1	16.3	1,433	15.6	15.9	372	17.9	18.3
Mariguana	4,442	39.5	40.1	3,829	41.8	42.4	613	29.5	30.1
Hachís	16	0.1	0.1	12	0.1	0.1	4	0.2	0.2
Cocaína (Clorhidrato)	430	3.8	3.9	364	4.0	4.0	66	3.2	3.2
<i>Crack</i>	539	4.8	4.9	482	5.3	5.3	57	2.7	2.8
Otra presentación de cocaína	10	0.1	0.1	7	0.1	0.1	3	0.1	0.1
Solventes y removedores	237	2.1	2.1	187	2.0	2.1	50	2.4	2.5
Pegamentos	28	0.2	0.3	23	0.3	0.3	5	0.2	0.2
Esmaltes o pinturas	11	0.1	0.1	7	0.1	0.1	4	0.2	0.2
Otros inhalables	3	0.0	0.0	3	0.0	0.0	0	0.0	0.0
Benzodiazepinas	119	1.1	1.1	54	0.6	0.6	65	3.1	3.2
<i>Rohypno</i> <sup>®</sup>	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
Otros depresores del SNC	6	0.1	0.1	2	0.0	0.0	4	0.2	0.2
Anfetamina	24	0.2	0.2	20	0.2	0.2	4	0.2	0.2
Metanfetaminas	1,981	17.6	17.9	1,538	16.8	17.0	443	21.3	21.7
Éxtasis (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas	9	0.1	0.1	4	0.0	0.0	5	0.2	0.2
Otros estimulantes del SNC	11	0.1	0.1	9	0.1	0.1	2	0.1	0.1
LSD	46	0.4	0.4	38	0.4	0.4	8	0.4	0.4
Plantas alucinógenas y derivados	5	0.0	0.0	3	0.0	0.0	2	0.1	0.1
Otras drogas alucinógenas y disociativas.	3	0.0	0.0	1	0.0	0.0	2	0.1	0.1
Heroína	84	0.7	0.8	67	0.7	0.7	17	0.8	0.8
Opioides sintéticos	29	0.3	0.3	21	0.2	0.2	8	0.4	0.4
Opio y otros opiáceos	10	0.1	0.1	8	0.1	0.1	2	0.1	0.1
Sustancias con utilidad médica	11	0.1	0.1	7	0.1	0.1	4	0.2	0.2
Otras sustancias de abuso	11	0.1	0.1	6	0.1	0.1	5	0.2	0.2
Ninguna	131	1.2	1.2	91	1.0	1.0	40	1.9	2.0
<i>No consumió en el último año</i>	134	1.2	<i>Se omite</i>	102	1.1	<i>Se omite</i>	32	1.5	<i>Se omite</i>
<i>Sin Información</i>	39	0.3	100.0	29	0.3	100.0	10	0.5	100.0
<b>Total</b>	<b>11,238</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>9,158</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>2,080</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

**Cuadro 28. Droga de mayor impacto en los últimos 12 meses, según menciones**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Tabaco	611	5.4	5.5	458	5.0	5.1	153	7.4	7.5
Alcohol	1,508	13.4	13.6	1,194	13.0	13.2	314	15.1	15.4
Mariguana	3,915	34.8	35.4	3,360	36.7	37.2	555	26.7	27.2
Hachís	18	0.2	0.2	15	0.2	0.2	3	0.1	0.1
Cocaína (Clorhidrato)	563	5.0	5.1	465	5.1	5.2	98	4.7	4.8
<i>Crack</i>	675	6.0	6.1	610	6.7	6.8	65	3.1	3.2
Otra presentación de cocaína	11	0.1	0.1	8	0.1	0.1	3	0.1	0.1
Solventes y removedores	313	2.8	2.8	250	2.7	2.8	63	3.0	3.1
Pegamentos	43	0.4	0.4	39	0.4	0.4	4	0.2	0.2
Esmaltes o pinturas	13	0.1	0.1	8	0.1	0.1	5	0.2	0.2
Otros inhalables	7	0.1	0.1	7	0.1	0.1	0	0.0	0.0
Benzodiacepinas	164	1.5	1.5	82	0.9	0.9	82	3.9	4.0
<i>Rohypnol</i> <sup>®</sup>	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
Otros depresores del SNC	9	0.1	0.1	3	0.0	0.0	6	0.3	0.3
Anfetamina	40	0.4	0.4	35	0.4	0.4	5	0.2	0.2
Metanfetaminas	2,815	25.0	25.4	2,227	24.3	24.7	588	28.3	28.8
Éxtasis (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas	23	0.2	0.2	16	0.2	0.2	7	0.3	0.3
Otros estimulantes del SNC	8	0.1	0.1	5	0.1	0.1	3	0.1	0.1
LSD	62	0.6	0.6	47	0.5	0.5	15	0.7	0.7
Plantas alucinógenas y derivados	13	0.1	0.1	10	0.1	0.1	3	0.1	0.1
Otras drogas alucinógenas y disociativas	4	0.0	0.0	0	0.0	0.0	4	0.2	0.2
Heroína	93	0.8	0.8	76	0.8	0.8	17	0.8	0.8
Opioides sintéticos	35	0.3	0.3	25	0.3	0.3	10	0.5	0.5
Opio y otros opiáceos	9	0.1	0.1	8	0.1	0.1	1	0.0	0.0
Sustancias con utilidad médica	14	0.1	0.1	8	0.1	0.1	6	0.3	0.3
Otras sustancias de abuso	12	0.1	0.1	7	0.1	0.1	5	0.2	0.2
Ninguna	88	0.8	0.8	64	0.7	0.7	24	1.2	1.2
<i>No consumió en el último año</i>	134	1.2	<i>Se omite</i>	102	1.1	<i>Se omite</i>	32	1.5	<i>Se omite</i>
<i>Sin Información</i>	38	0.3	100.0	29	0.3	100.0	9	0.4	100.0
<b>Total</b>	<b>11,238</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>9,158</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>2,080</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>



**Cuadro 29. Uso combinado de drogas en los últimos 12 meses  
(No incluye tabaco)**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Si combinó drogas	4,299	38.3	47.4	3,546	38.7	47.7	753	36.2	46.2
No combinó drogas	4,766	42.4	52.6	3,890	42.5	52.3	876	42.1	53.8
<i>No aplica</i>	<i>2,173</i>	<i>19.3</i>	<i>Se omite</i>	<i>1,722</i>	<i>18.8</i>	<i>Se omite</i>	<i>451</i>	<i>21.7</i>	<i>Se omite</i>
<b>Total</b>	<b>11,238</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>9,158</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>2,080</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

**Cuadro 30. Total de drogas consumidas en los últimos 30 días  
(Incluye alcohol o tabaco)**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Ninguna	1,012	9.0	774	8.5	238	11.4
1 sustancia	2,614	23.3	2,088	22.8	526	25.3
2 sustancias	3,121	27.8	2,539	27.7	582	28.0
3 sustancias	2,753	24.5	2,301	25.1	452	21.7
4 sustancias	1,177	10.5	1,008	11.0	169	8.1
5 sustancias	368	3.3	298	3.3	70	3.4
6 sustancias	123	1.1	99	1.1	24	1.2
7 sustancias	44	0.4	32	0.3	12	0.6
8 sustancias	15	0.1	10	0.1	5	0.2
9 sustancias	9	0.1	7	0.1	2	0.1
10 sustancias	2	0.0	2	0.0	0	0.0
<b>Total</b>	<b>11,238</b>	<b>100.0</b>	<b>9,158</b>	<b>100.0</b>	<b>2,080</b>	<b>100.0</b>
Media (DE)	2.2 (1.4) drogas		2.2 (1.4) drogas		2.1 (1.4) drogas	
Mediana	2 drogas		2 drogas		2 drogas	
Moda	2 drogas		2 drogas		2 drogas	
Decil1	Ninguna		1 droga		Ninguna	

DE= Desviación Estándar

**Cuadro 31. Total de drogas ilícitas consumidas en los últimos 30 días  
(No incluye ni alcohol ni tabaco)**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Ninguna	3,218	28.6	2,528	27.6	690	33.2
1 sustancia	5,433	48.3	4,486	49.0	947	45.5
2 sustancias	1,839	16.4	1,546	16.9	293	14.1
3 sustancias	511	4.5	415	4.5	96	4.6
4 sustancias	154	1.4	122	1.3	32	1.5
5 sustancias	53	0.5	38	0.4	15	0.7
6 sustancias	19	0.2	14	0.2	5	0.2
7 sustancias	8	0.1	6	0.1	2	0.1
8 sustancias	2	0.0	2	0.0	0	0.0
9 sustancias	1	0.0	1	0.0	0	0.0
<b>Total</b>	<b>11,238</b>	<b>100.0</b>	<b>9,158</b>	<b>100.0</b>	<b>2,080</b>	<b>100.0</b>
Media (DE)	1.0 (1.0) droga		1.0 (0.9) droga		1.0 (1.0) droga	
Mediana	1 droga		1 droga		1 drogas	
Moda	1 droga		1 droga		1 drogas	
Decil1	Ninguna		Ninguna		Ninguna	

DE= Desviación Estándar

**Cuadro 32. Consumo de drogas en los últimos 30 días por sustancia**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
<b>Tabaco</b>	<b>6,842</b>	<b>60.9</b>	<b>5,668</b>	<b>61.9</b>	<b>1,174</b>	<b>56.4</b>
<b>Alcohol</b>	<b>6,368</b>	<b>56.7</b>	<b>5,252</b>	<b>57.3</b>	<b>1,116</b>	<b>53.7</b>
<b>Cannabis</b>	<b>5,453</b>	<b>48.5</b>	<b>4,607</b>	<b>50.3</b>	<b>846</b>	<b>40.7</b>
Mariguana	5,450	48.5	4,605	50.3	845	40.6
Hachís	102	0.9	83	0.9	19	0.9
<b>Cocaína</b>	<b>1,710</b>	<b>15.2</b>	<b>1,457</b>	<b>15.9</b>	<b>253</b>	<b>12.2</b>
Cocaína (Clorhidrato)	1,118	9.9	936	10.2	182	8.8
<i>Crack</i>	805	7.2	712	7.8	93	4.5
Otra presentación de cocaína	13	0.1	9	0.1	4	0.2
<b>Inhalables</b>	<b>614</b>	<b>5.5</b>	<b>503</b>	<b>5.5</b>	<b>111</b>	<b>5.3</b>
Solventes y removedores	500	4.4	408	4.5	92	4.4
Pegamentos	83	0.7	71	0.8	12	0.6
Esmaltes o pinturas	37	0.3	27	0.3	10	0.5
Otros inhalables	12	0.1	11	0.1	1	0.0
<b>Depresores</b>	<b>549</b>	<b>4.9</b>	<b>374</b>	<b>4.1</b>	<b>175</b>	<b>8.4</b>
Benzodiacepinas	541	4.8	366	4.0	175	8.4
<i>Rohypnol</i>	2	0.0	2	0.0	0	0.0
Otros depresores	9	0.1	8	0.1	1	0.0
<b>Estimulantes</b>	<b>2,542</b>	<b>22.6</b>	<b>2,036</b>	<b>22.2</b>	<b>506</b>	<b>24.3</b>
Anfetamina	49	0.4	44	0.5	5	0.2
Metanfetaminas	2,418	21.5	1,934	21.1	484	23.3
<i>Éxtasis (MDMA)</i> y Metanfetaminas alucinógenas	104	0.9	76	0.8	28	1.3
Otros estimulantes	16	0.1	16	0.2	0	0.0
<b>Drogas alucinógenas y disociativas</b>	<b>197</b>	<b>1.8</b>	<b>150</b>	<b>1.6</b>	<b>47</b>	<b>2.3</b>
LSD	173	1.5	131	1.4	42	2.0
Plantas alucinógenas y derivados	28	0.2	23	0.3	5	0.2
Otras drogas alucinógenas y disoc.	7	0.1	3	0.0	4	0.2
<b>Opiáceos</b>	<b>161</b>	<b>1.4</b>	<b>123</b>	<b>1.3</b>	<b>38</b>	<b>1.8</b>
Heroína	95	0.8	76	0.8	19	0.9
Opioides sintéticos	55	0.5	36	0.4	19	0.9
Opio y otros opiáceos	16	0.1	14	0.2	2	0.1
<b>Otras sustancias de abuso</b>	<b>86</b>	<b>0.8</b>	<b>60</b>	<b>0.7</b>	<b>26</b>	<b>1.3</b>
Con utilidad médica	22	0.2	17	0.2	5	0.2
Otras sustancias de abuso	65	0.6	44	0.5	21	1.0

**Cuadro 33. Frecuencia de episodios de abuso del consumo de tabaco<sup>1</sup> en los últimos 30 días**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Sin consumo abusivo	1,855	16.5	27.6	1,521	16.6	27.3	334	16.1	29.0
< de 1 vez a la semana	850	7.6	12.6	706	7.7	12.7	144	6.9	12.5
1 o 2 veces a la semana	763	6.8	11.3	635	6.9	11.4	128	6.2	11.1
Cada tercer día	498	4.4	7.4	426	4.7	7.6	72	3.5	6.2
Diario	2,758	24.5	41.0	2,283	24.9	41.0	475	22.8	41.2
<i>No consumió en los últimos 30 días</i>	4,396	39.1	<i>Se omite</i>	3,490	38.1	<i>Se omite</i>	906	43.6	<i>Se omite</i>
<i>Sin información</i>	118	1.1	100.0	97	1.1	100.0	21	1.0	100.0
<b>Total</b>	<b>11,238</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>9,158</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>2,080</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

<sup>1</sup> Consumo de seis o más cigarrillos en un solo día.

**Cuadro 34. Frecuencia de episodios de abuso del consumo de alcohol<sup>1</sup> en los últimos 30 días**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Sin consumo abusivo	1,039	9.2	16.6	835	9.1	16.2	204	9.8	18.7
< de 1 vez a la semana	2,262	20.1	36.2	1,892	20.7	36.7	370	17.8	33.9
1 o 2 veces a la semana	1,869	16.6	29.9	1,532	16.7	29.7	337	16.2	30.9
Cada tercer día	539	4.8	8.6	443	4.8	8.6	96	4.6	8.8
Diario	534	4.8	8.6	449	4.9	8.7	85	4.1	7.8
<i>No consumió en los últimos 30 días</i>	4,870	43.3	<i>Se omite</i>	3,906	42.7	<i>Se omite</i>	964	46.3	<i>Se omite</i>
<i>Sin información</i>	125	1.1	100.0	101	1.1	100.0	24	1.2	100.0
<b>Total</b>	<b>11,238</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>9,158</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>2,080</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

<sup>1</sup> Consumo de más de cuatro copas en un día para los hombres y de más de tres copas en un día para las mujeres.

**Cuadro 35. Frecuencia de episodios de abuso del consumo de drogas ilícitas<sup>1</sup> en los últimos 30 días**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
< de 1 vez a la semana	1,463	13.0	22.3	1,133	12.4	20.9	330	15.9	29.2
1 o 2 veces a la semana	1,236	11.0	18.9	1,023	11.2	18.9	213	10.2	18.8
Cada tercer día	1,130	10.1	17.2	959	10.5	17.7	171	8.2	15.1
Diario	2,725	24.2	41.6	2,309	25.2	42.6	416	20.0	36.8
<i>No consumió en los últimos 30 días</i>	3,218	28.6	<i>Se omite</i>	2,528	27.6	<i>Se omite</i>	690	33.2	<i>Se omite</i>
<i>Sin información</i>	1,466	13.0	100.0	1,206	13.2	100.0	260	12.5	100.0
<b>Total</b>	<b>11,238</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>9,158</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>2,080</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

<sup>1</sup> Consumo de cualquier dosis.

## GLOSARIO

<b>Droga ilícita de inicio</b>	<p>Es la sustancia ilegal que el usuario refirió como la droga con la cual inicio el consumo de drogas. No incluye el inicio del consumo con alcohol o tabaco.</p>
<b>Droga de mayor impacto</b>	<p>Sustancia por la que acuden los pacientes a tratamiento, a cuyo consumo los pacientes atribuyen problemas personales, de salud, familiares, escolares, laborales o sociales, en el transcurso del último año.</p>
<b>Droga de preferencia</b>	<p>Sustancia que el propio usuario solicitante de tratamiento ha elegido o preferido consumir en el transcurso del último año.</p>
<b>Estrato social</b>	<p>Estimación que hace el terapeuta, según su percepción, del estrato al que pertenece el usuario de drogas, considerando aspectos como lugar de residencia, escolaridad, empleo y características manifiestas como higiene y aliño, calidad del vestido, expresión verbal y vocabulario, etc.</p>
<b>Tipo de consumo de drogas ilícitas</b>	<p>Características de consumo de sustancias ilegales según motivo, frecuencia y problemas asociados. No incluye el uso de alcohol y/o tabaco y se clasifica como: experimental, social u ocasional, funcional, disfuncional y en remisión.</p>
<b>Total de drogas consumidas</b>	<p>Número de drogas consumidas (se incluyen las 26 sustancias de seguimiento) en las siguientes categorías: alguna vez en la vida, en el último año y en los últimos 30 días.</p>
<b>Uso combinado de drogas</b>	<p>Consumo de dos o más sustancias (incluyendo alcohol y cualquier droga ilícita o de uso médico, utilizada sin prescripción, pero excluyendo tabaco) en el transcurso de un mismo día, en el año previo a la solicitud de tratamiento en CIJ.</p>