



Salud
Secretaría de Salud



Centros de
Integración
Juvenil, A.C.

REPORTE DE INFORMACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DEL CONSUMO DE DROGAS

CONSUMO DE DROGAS EN SOLICITANTES DE TRATAMIENTO EN CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL.

USUARIOS DE DROGAS ILÍCITAS PRIMER SEMESTRE DE 2026

Dirección de Investigación y Enseñanza
Subdirección de Investigación
México, septiembre de 2026

Reporte técnico 26-2a



Reporte de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas. Consumo de drogas en solicitantes de tratamiento en Centros de Integración Juvenil. Usuarios de drogas ilícitas. Primer semestre de 2026.

Cita sugerida:

Centros de Integración Juvenil, A.C. (2026). Reporte de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas. *Consumo de drogas en solicitantes de tratamiento en Centros de Integración Juvenil. Usuarios de drogas Ilícitas. Primer semestre de 2026*. Ciudad de México, México: CIJ.

Disponible en: <http://www.cij.gob.mx/programas/Investigacion/Epidemiologica.asp>

DIRECTORIO

PRESIDENTE DEL PATRONATO NACIONAL

Dr. Roberto Tapia Conyer

FUNDADORA DE CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL, A.C.

Y VICEPRESIDENTA VITALICIA DEL PATRONATO NACIONAL

Sra. Kena Moreno

DIRECTORA GENERAL

Dra. Carmen Fernández Cáceres

DIRECTOR OPERATIVO Y DE PATRONATOS

Dr. José Ángel Prado García

DIRECTOR NORMATIVO

Mtro. David Bruno Díaz Negrete

DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA

Dr. Miguel Ángel Mendoza Meléndez

CRÉDITOS

Elaboración de informe

Mtra. Alma Delia Gutiérrez López

Mtra. Karina Jiménez Silvestre

Mtro. Omar Leonardo Ruiz Orona

Diseño

Mtra. Alma Delia Gutiérrez López

Procesamiento estadístico

Mtra. Alma Delia Gutiérrez López

Supervisión

Dr. Miguel Ángel Mendoza Meléndez

Dr. José Nahum Rangel Villafaña

AGRADECIMIENTO

La Dirección de Investigación y Enseñanza agradece los continuos esfuerzos del equipo médico-técnico y de los voluntarios responsables de recopilar y reportar los datos de los solicitantes de tratamiento en el Sistema de planeación, registro, seguimiento y consulta CIJ 3.0, a través del formato de entrevista inicial.

Acapulco: Imelda González Espinobarros, Lorena Salinas Acevedo, María de Lourdes Barrientos Solís, Miriam Galeana Valente, Salvio Vargas Ramírez; **Acuña:** Adolfo Edel González Pérez, Yurieth Daniela Lira Ortiz; **Aguascalientes:** Baciliza Castañeda Briones, Martín de Jesús Paredes García, Norma Araceli Terán Reyes, Octavio Israel Rangel Rodríguez, Rodrigo Martínez Odgers, Sandra Gaytán Delgado; **Álvaro Obregón Centro:** Alejandra Arias Mejía, Clemente García Rojas, Gloria Islas Rodríguez, Jocelyn Sarasuadi Reyes Martínez, Ricardo Fajardo Ortiz, Silvia María Canul Sánchez, María del Carmen López Jaimes; **Álvaro Obregón Oriente:** Agnely Guadalupe Contreras Ávila, Ana Laura Guzmán López, Bryan Antonio Carrillo Lazcano, Karla Magdalena Vargas Pisaña, Sara Elisa Gracia Gutiérrez de Velasco; **Apatzingán:** Ismael Hernández Juárez, Jennifer Guadalupe Fernández Medina; **Atizapán:** Alma Nidia López González, Claudia Beatriz Salas González, Leticia Baza Cruz, Viridiana Ramírez Martínez, Yadira Jiménez García; **Azcapotzalco:** Cristhian Dávila Quinto, José Luis Castillo Fontés, Juan Francisco Ramírez Estrada, Leonor Quecholac García, Xochitl Nava Martínez, Yezmín Estrella Briseño Pérez; **Benito Juárez:** Alma Alicia García Alcaraz, César Mendoza Vázquez, Edith Ledesma Martínez, Luz Gabriela Olmos Velázquez, Néstor Leopoldo Soto Pueyo, Martha Patricia Alvarado Tello; **Cancún:** Alfredo Hatchett Anaya, Ana Beatriz Espinosa de los Reyes Novelo, Ayde Meléndez Ruiz, Juan Bernardo Helguera Carmona, Keyla Esther Segovia Sánchez, Marcela Antonio Joaquín, Rosa Concepción Vázquez Pérez; **Celaya:** Alejandra Pérez Cabrera, Daniela Centeno Mancera, Karina María del Rosario González Sánchez, Laura Virginia Estrada Juárez, Liliana Espinosa Mondragón, Sofía Lorenia Herrera Cuéllar; **Chalco:** Hassibe Hernández Vega, Ivonne Ascona Hidalgo, José Luis Cervantes Flores, María de Lourdes Estévez Encarnación, María del Rocío Silverio Torres, María Guadalupe Solís Luna, Rodrigo Mora Barajas; **Chetumal:** Erick Gustavo Cruz Calderón, Omar Alejandro Trejo Corona, Sandra Raquel Caamal Chan; **Chihuahua:** Martha María García de La Cadena Lamelas, Miguel Ángel Rodríguez Pérez, Myrna Rojo González, Pablo Espinoza Rojas, Ricardo Eli Salcido Simental, Rosa Margarita Hernández Fierro, Virginia Cruz Holguín; **Chilpancingo:** Elvira Guadalupe Gregorio Ramírez, Julia Berenice Hernández Pérez, Miriam Rodríguez Mancilla, Nayeli Alvarado Andrade; **Ciudad del Carmen:** Cristina Juárez Luna, Omar Contreras Fuentes, Ronaldo Alexis Varguez Yamá, Rossana Mendicuti Chan; **Ciudad Juárez Norte:** Christian Ariel Rascón de la

Cruz, German Omar Scott Esparza, María Elizabeth Avendaño Ambrocio, Sonia Guzmán Mota; **Ciudad Victoria:** Ana Gabriela Méndez Gómez, Ana Laura Rodríguez Castillo, Dulce Ivette Aguilar Gámez, Martha Alicia Balderas Félix; **Colima:** Ana Anguiano Valdez, Frida Concepción Ávila Soto, Lilia Margarita Machuca Ayala, Rocío Selene Ramos Juárez, Sandra Ramírez López, Susana Selene Quintana Carrillo; **Coyoacán:** Erik Moreno Romero, Francisco Díaz González, Gabriela Alejandra Saucedo García, Judith Hernández Velasco, María de Lourdes Valverde Morales, Rebeca Morales Hernández, Sandra Rodríguez Sierra; **Cozumel:** Cynthia Cristina del Jesús Barroso Rodríguez, Eduardo Jiménez Cruz, José María Durán Ontiveros; **Cuajimalpa:** Jorge Alejandro Paredes Nava, Marco Antonio Toquero Hernández, María Magdalena Hernández López; **Cuauhtémoc Oriente:** Blanca Eloisa Moran Esquivel, Jonathan Israel Hernández Vargas, Martha Beatriz López Suastegui, Miguel Ángel Cortes Vera, Sergio Alejandro Morales Hernández, Yareli García Mares; **Cuauhtémoc Poniente:** Alma Julieta Garmendia Fonoll, Alma Rosa Cuevas Caballero, Antonio Isaac Olguín Rubio, Leoncio García Astudillo, Leticia Guadalupe Ortiz Ortiz, Lina Raquel Sotres Flores, María Isabel López Márquez; **Cuernavaca:** Andrea Guadalupe Rodríguez Ortega, Eduardo Raúl Herrera Fuentes, Elsa Román González, Kristal Rosales Ortiz, Laura Hernández Gama, Petra Alicia Ávila Loera, Rosalía Camarillo Moreno; **Culiacán:** Ana Gabriela García Rodríguez, Felipe de Jesús Ramírez, José Luis Araujo Meza, Lidia Irazema Flores Valenzuela, Rosa Isela Vázquez Cabrera, Víctor Abraham Gutiérrez Rivas; **Durango:** Argelia Reyes Fematt, Gabriela Flores Ibarra, Nayeli Selene Avalos García, Olga Patricia Molina Vargas; **Ecatepec:** Carlos Eduardo Cruz Rodríguez, Miryam Ruiz Alizota, Moisés Vazquez Ostiguin, Norma Virginia Hernández Olguín; **Escuinapa:** José de Jesús Rodríguez Flores, Maribel Tapia García, Tonantzi Toledo López; **Fresnillo:** Alejandra Leticia Vacio Adame, Juan Antonio Reyes López; **Guadalajara Centro,** Cindy Margarita Reynoso Carreño, Gilberto Heliel Nuñez Martínez, Gilberto Rodríguez de Alba, Hugo Alberto Lomelí Torres, Ileri Mariana González Arias, Laura Rocio Salcedo Fuentes, María Teresa Rosas Ortiz, Norma Angélica Gutiérrez Martínez, Silvestre Rivera Tamayo; **Guadalajara Sur,** Edgar Felipe Jileta Bogarín, Elvira Virgen Reyes, Federico Topete González, Juan Emilio López Méndez, Liliana Patricia Ramos Linares, Luis Manuel Lomelí López, Rosa María Ramírez Estrada; **Guadalupe:** Adriana Medina Rodríguez, Fanny García Perales, Humberto Ortiz Morales, Laura Hernández Martínez, María Magdalena González Sánchez; **Guadalupe Zacatecas:** Suheyth Sánchez Ramírez; **Guamúchil:** Liliana Guadalupe Cruz Montoya, Yesenia Camacho Armenta; **Guanajuato:** Azael Rojas Macías, Carolina Elizabeth Rocha García, María Ofelia Gómez Gutiérrez, Paola Guadalupe Solís Moreno; **Guasave:** Diana Lizeth Rubio Arce, José Carlos Soto Ayala, Julio Cesar González Rochín, Yessica María Morales Pardini; **Gustavo A. Madero Azagón:** Diana Elizabeth Tinoco Pérez, Fernando Eliseo Rodríguez Espinosa, Heidi Aldana Montero, María Evelyn Ruiz Méndez, María Roxana Negrete Lepe, Silvia Olguín Rubio, Verónica Martínez Mejía; **Gustavo A. Madero Norte:** Eduardo Antonio Montero Flores, Leticia Barroso Anaya, María del Consuelo González Vargas, María Georgina Radilla Ortiz, Miguel Ángel Corona Dorantes, Rebeca Corona Candelaria, Verónica García Portillo; **Hermosillo:** Alan Fabián Sánchez Ayala, Ariel Sebastián Monroy Eliosa, Manuel Molina Peralta, María Guadalupe Rodríguez García; **Huatulco:** Evelin Odette Casiano Jaimes, Guillermina Martínez Pacheco, Jonathan López Hernández; **Ixbalanqué:** Juan Carlos Coutiño Molina, Victoria Isabel Escobedo Vidal; **Ixtapa-Zihuatanejo:** Erik Fernando Mendoza Melchor, Gloelia Gallardo Rivera, Laura Yarerí Salgado Vega, Minerva García Rentería; **Iztapalapa Poniente:** Elibeth Cortez López, Elizabeth López Sotres, Margarita Mares Nava, María del Pilar Ávila Cabrera, María Elena Ramírez Luna, Reyna Alejandra Salazar Espíritu, Víctor Jesús Peña Calixco; **Iztapalapa Oriente:** Betzabe Martínez Ávila, Jessica Alejandra Amador García, Jesús Bautista Reyes, Jesús Iván Yerena González, Julieta Espinosa Carmen, Leticia Martínez Urbina, Manuel Salvador Alcocer Jiménez, María de La Luz Macías Montes, Mariana Contreras Granillo, Yazmín Alcántara Chavarría; **La Paz:** Fresni Yoliver Smith Mayoral, Ma. Isabel Estrada Carbajal, María del Socorro Ramirez Cota, Myrna Gallegos Ortiz, Nehiva Jetzabel Arauza Rosas, Yessica Jahel Tintore Flores; **Laguna Durango:** Silvia Esther Duarte Rangel; **León:** Ana Luz Hernández Jaramillo, Eva Velázquez Luna, Herlinda López Hernández, Lino Hernández Hernández, María del Socorro Rangel Rodríguez, María Goretti Amador Rocha, Silvia Margarita Aragón de Luna; **Los Cabos:** Adriana Araceli Martínez Savín, Dulce Karely Castro Lugo, Juan Rubén Rivera Cabrera, María de Jesús Sainz Santillán; **Los Mochis:** Claudia Zulema Tirado Arredondo, Daniel Rodríguez León, María Elena López Rojo, Ramona Guadalupe Machado Pereida, Zulma Torres Audeves; **Manzanillo:** Alejandra Ramírez Flores, Alma Rosa Barrios del Valle, Ana Jaqueline Lomeli Mancilla, Norma Lorena Bravo García; **Mazatlán:** Alba Suguey Rodrigo Chavez, Alma Verónica Hernández Ruiz, Cesia Judith Cárdenas Viera, David Ontiveros Lizárraga, Rosa Herendida Uribe Chávez; **Mérida:** Carmen Lidia Zapata Martínez, Henry Tulio Ortiz Figueroa, María Isabel Delgado Centeno, Modesta del Carmen Rivero Cruz, Teresita May Baak; **Mexicali:** Gloria Estela Portillo García, Gloria Isabel Sotelo Ríos, María Isabel Viramontes Tostado, Raquel Felipe Pacheco, Refugio Adin Flores Angulo, Sadrach Jacob Ceja Altamirano; **Miguel Hidalgo:** Alejandro Zambrano González, Ana Belem Rodríguez Noriega, José Francisco Octavio Gómez González, Juan Carlos Martínez Islas, Lydia Gaona Márquez; **Monterrey:** Alma Delia Espinosa Treviño, Brisa Marinas Galván, Elisa Martínez Zapata, Graciela Martínez Arriaga, Luis Enrique Rodríguez Sánchez, María de los Ángeles Luévano Díaz, María Julia Aguilar Rosales, Rosario Leticia Alonso Martínez; **Morelia:** Isabel González Sánchez, Ivonne de Montserrat Galván Ayala, José Ramón Fernández Rius, Patricia González Martínez, René Ibarra Cisneros; **Naucalpan:** Abraham de Jesús Salas Peniche, Araceli Mijangos Medina, Elisa Martínez Herrera, Erika del Rocio López Fuertes, Isabel Rocio Silva Cervantes, Raquel Montes Castro, Rosa María Hernández de Jesús, Sandra Hernández Aldana; **Nezahualcóyotl:** Beatriz Sofía Rodríguez Jiménez, José Antonio González Duana, Lizeth Guadalupe Ruiz Pineda, Marisol Meza Moreno, Pamela Serrano Covarrubias, Samuel Arellano Chávez, Susana Jiménez Ortega; **Nogales:** Claudia Varela Jiménez, Laura Guadalupe Martínez Galaviz, Yanett Cortez Jaime; **Oaxaca:** Francisco Rolando Olivera Aguilar, Heriberto Alejandro Zárate Ochoa, Karla Irasema García Mendoza, Mariana Figueroa Reyes; **Pachuca:** Daniel Carbajal Barrón, Elsa Ivette Céspedes Camacho, Norma Chantal Reyes Montaño; **Playa del Carmen:** Carmen Elizabeth García Pérez, Christopher Manuel Cauich Moo, Hugo Quevedo Hernández, Nancy Pilar Sosa Ortega; **Poza Rica:** Alejandra Torres Bautista, Rosa Elena Márquez Rosas, Roxana Yarzell Espinosa López, Tania Pacheco Juárez, Zulma Bustos Vera; **Puebla:** Claudia Lozada Dircio, Estela Hernández López, Fernando Huadi Majluf Mendoza, Lucía Orato Gutiérrez; **Puerto Vallarta:** Ana Karina Llerenas Briceño, Julio César Curiel Pérez, Liz Anel Osuna Sandoval, Susana Gertrudis Linares Cu, Xochitl Montoy Guzmán; **Querétaro:** Ana Luisa Reynoso Rentería, Donaji Martínez Aguascalientes, María Estela Frías Borja, Olmo Espinosa Ortiz, Simón Honold Espinosa; **Ramos Arizpe:** Andrea Regina Dena Pecina, Dolores Aida García Charles; **Reynosa:** Claudia Patricia Cruz Cruz, Enith Marlenis Ramirez Morales, San Juana Guadalupe Valdez Aguiar, Sandra Jarumy Lozano Medina; **Salamanca:** Aldo Fernando Estrada Ortiz, Cecilia Vargas Palestina, Laura Beatriz López Palma, María Alejandra González Flores; **Saltillo:** Cristian Jesús Lozada Ríos, Isela Alejandra Montoya Ramón, María Concepción Jaramillo Flores, Norma Leticia Covarrubias Laureano; **San Luis Potosí:** Leticia Jaime Reyes, María Margarita Anguiano Izquierdo, Marisol Orocio Contreras, Norma Leticia Alonso Duque, Patricia Rangel Martínez, Rosa Martina Alferez Martínez; **San Nicolás de los Garza:** Miriam Guadalupe Armendáriz Bustos, Noe Gracia Sánchez, Otilia Violeta González Elizondo; **Tampico:** Alejandra Altamirano Vizcarra, Gerardo Hernández Lara, Giovana Marisol Medina Carreño, Jorge Ramón Portillo Velázquez, Ma. Guadalupe

Palacios Torres, Mary Carmen Cruz Islas; **Tapachula:** Ana Gabriela Gamboa Torres, Eduardo de Jesús Piedrasanta Velázquez, Ingrid Iliana Cueto García, Miguel Ángel Mancera Castillo; **Tecomán:** Ana Paulina Esparza Gutiérrez, Katya Elizabeth Rodríguez Reyes; **Tehuacán:** Mónica Vazquez Blanco, Sara Ramos Cuevas; **Tepic:** Eunice Chavarín Aragón, Iris Noemi Casillas Castellón, Martha Patricia Rodríguez Plascencia; **Texcoco:** Carmen Naly Santiago Fierro, Eusebia Rojas Herrera, José Juan Bautista Butrón, Laura Jiménez Méndez, María Magdalena Ramos Martínez, Sara Elvira Galicia Gutiérrez; **Tijuana Guaycura:** Ángela María Corona Nava, José Rosario Álvarez Álvarez, María del Carmen Zavala Monreal, Norma Angélica Guadalupe Moysen Vargas, Víctor Alfonso Guillén Chávez; **Tijuana Soler:** Cecilia Sarmiento Solano, Deborah Iovana Figueroa Castañeda, María del Carmen Velázquez Flores, Mónica Jazmín Salinas Sánchez, Ninfa Martínez García, Samantha Nieto Pérez; **Tlalnepantla:** Daniel Salinas García, Edgar Vera González, Ma. Imelda López Hernández, María del Rosario Cortés Téllez, Martha Patricia Vásquez Tapia, Paulina Sierra García; **Tlalpan:** Alejandra Avalos Torres, Olivia Jani Vega González, Virginia Ortiz González; **Tlaquepaque:** Daniel Cháirez Muñoz, Elizabeth Gómez Vargas, Jessica Monserrath Cervantes Hernández, Juan Antonio Chávez Vázquez, Juan Pablo Nungaray Gutiérrez, Laura Flores Fermín, Luis Jorge Ayala Mora, Miriam Esther Trejo Nuñez, Ramiro Cuevas Díaz; **Tlaxcala:** Adriana Guerrero Romero, Hilder Alberto Llanos Gutiérrez, Juan Octavio Rojas Cruz, Minerva Paola Moreno Caporal, Xochitl Janet Alonso Torres; **Toluca:** Araceli Olvera Verdeja, Cruz Cielo Piñón, Eloisa Medina Gutiérrez, Elvira Garduño Huertas, Juana Bernal Malvárez, Martha Susana Escobedo Galindo, Matilde Adriana Cambrón Gómez, Xochitl García Sánchez; **Torreón Oriente,** Cecilia Pineda Granados, Elvia Gabriela Sosa Urbina, Nadia Azucena Pedroza Verastegui, Paloma de Los Santos Ortega; **Tuxtla Gutiérrez:** Olga Rossana Gongora Garza, Samy Rubí Solís Méndez, Tania Sevilla Saucedo; **Venustiano Carranza,** Belén Victoria Santamaría Vera, Dulce Carolina Vega Bastida, Gloria Contreras Álvarez, Joaquín Zamora Escutia, José Adrián Herrera Sánchez, José Ulises Maldonado del Ángel, Miguel Ángel Morales Molina; **Villahermosa:** Ana Silvia Lázaro Valencia, Jorge Clemente Esponda, María del Rosario Mayo Tavares, Naun Hernández Hernández; **Xalapa:** Antonio de Jesús Álvarez Guillén, Brenda Yohaly Vivanco Herrera, Daniel Castañeda Enríquez, Dulce María Meza Loeza, Nayeli Castillo Quiroz, Norma Leticia Sánchez Arauz, Rafael Miguel Contreras Pérez, Reyna Elena Torres Hernández; **Yucatán:** Érica Vargas Sánchez, Julio Ernesto Moreno Rivero, Pedro Luis Arango Torrejón, Ruperta María de los Milagros Lugo y Pech; **Zacatecas:** Alfredo Álvarez Haro, Jazmín Angelica Treto Martínez, José Martín de León Cruz, Miguel Ángel Solís Ruvalcaba; **Zamora:** Adriana López Rodríguez, Fátima Esmeralda Valladolid Tamayo, José Manuel Cázarez Castillo, María del Pilar Espinoza Parra, Verónica Esperanza Ochoa Valencia; **Zapopan Norte:** José Alfredo Gustavo Fernando Martínez Vargas, Juan Alejandro Serrano Córdova, Martha Gabriela Sánchez Aguilar, Olga Lidia Acosta Nungaray; **Unidad de Hospitalización Ciudad Juárez:** David Alonso Gómez Melchor, Fátima Alejandra Maya Cabral, Jesús Alfredo Castro Ortiz, José Manuel Carrillo Avendaño, María Goretti Villalobos Chávez, Ricardo del Real Hernández; **Unidad de Hospitalización Culiacán:** Danny Eloir Meza Castro, José Noel Iribe Pérez; **Unidad de Hospitalización Ecatepec:** Arturo Contreras Mendoza, Víctor Hugo Zapata Barrera; **Unidad de Hospitalización Iztapalapa,** Carol Arroyo Ruano, Lourdes Claudia Chávez Peña, Marco Antonio León Espejel; **Unidad de Hospitalización Nuevo León:** Agustín Jaime Cadengo Jiménez, Gerardo Torres Estrada, Jorge Fernando Sierra Flores, Martín Isaac Salgado Guerrero; **Unidad de Hospitalización Punta Diamante:** Carina Blanco Bailón, Celia María Hernández Salmerón, Edwin Hernández Quinto, Pedro Daniel Quezada Juárez, Saúl Zeus Enriquez Rodríguez; **Unidad de Hospitalización Tijuana:** Marco Antonio Avendaño Velázquez, Miguel Abdías Ávalos Molina, Miguel Ángel Guardado Arvizu, Natali Acevo Rodríguez; **Unidad de Hospitalización Zapopan:** Enrique Nolasco Rodríguez, José Ibarra Serrano, Juan Pablo Preciado Aguirre; **Unidad de Hospitalización Zapotlán el Grande:** Erika Prado Pérez, Isis Anel Trejo Meza, Marco Fernando Espinoza García, Salvador Ramírez Hernández; **Unidad de Tratamiento para Usuarios de Heroína Ciudad Juárez:** David Alonso Gómez Melchor, Jesús Alfredo Castro Ortiz; **Unidad de Tratamiento para Usuarios de Heroína Tijuana:** Rubí Georgina González Serrano.

CONTENIDO

	PÁG.
Resumen	9
Antecedentes	10
Método	11
Resultados	14
Características sociodemográficas	15
Consumo de drogas	19
Nuevas sustancias de abuso o emergentes	30
Alerta epidemiológica	
Fentanilo y análogos	32
Referencias	33
Anexo	37
Glosario	70

ÍNDICE DE TABLAS

			PÁG.
Tabla 1	Personas de primer ingreso a tratamiento por unidad de atención (CIJ, UH y UTUH)	38	
Tabla 2	Principales motivos de consulta declarados	42	
Tabla 3	Sexo	41	
Tabla 4	Edad de ingreso a tratamiento	42	
Tabla 5	Estado civil	42	
Tabla 6	Escolaridad	43	
Tabla 7	Ocupación	43	
Tabla 8	Estrato social	44	
Tabla 9	Población en situación de vulnerabilidad	44	
Tabla 10	Sustancia que motiva la solicitud de tratamiento (droga de mayor impacto), según menciones	45	
Tabla 11	Edad de inicio del consumo de tabaco	47	
Tabla 12	Edad de inicio del consumo de alcohol	47	
Tabla 13	Edad de inicio del consumo de drogas ilícitas	48	
Tabla 14	Drogas ilícitas de inicio, según menciones	49	
Tabla 15	Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de tabaco y el ingreso a tratamiento a CIJ	51	
Tabla 16	Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de alcohol y el ingreso a tratamiento a CIJ	51	
Tabla 17	Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de drogas ilícitas y el ingreso a tratamiento a CIJ	52	
Tabla 18	Tipo de consumo de drogas ilícitas	52	
Tabla 19	Total de drogas consumidas alguna vez en la vida (incluye alcohol o tabaco)	53	
Tabla 20	Total de drogas ilícitas consumidas alguna vez en la vida (no incluye ni alcohol ni tabaco)	53	
Tabla 21	Consumo de drogas alguna vez en la vida por sustancia	54	
Tabla 22	Total de drogas consumidas en el último año (incluye alcohol o tabaco)	57	
Tabla 23	Total de drogas ilícitas consumidas en el último año (no incluye ni alcohol ni tabaco)	57	
Tabla 24	Consumo de drogas en los últimos 12 meses por sustancia	58	
Tabla 25	Droga de preferencia en los últimos 12 meses, según menciones	61	
Tabla 26	Uso combinado de drogas en los últimos 12 meses (no incluye tabaco)	63	
Tabla 27	Total de drogas consumidas en los últimos 30 días (incluye alcohol o tabaco)	63	
Tabla 28	Total de drogas ilícitas consumidas en los últimos 30 días (no incluye ni alcohol ni tabaco)	64	
Tabla 29	Consumo de drogas en los últimos 30 días por sustancia	65	
Tabla 30	Frecuencia de episodios de abuso del consumo de alcohol en los últimos 30 días	68	
Tabla 31	Frecuencia de episodios de abuso del consumo de drogas ilícitas en los últimos 30 días	68	
Tabla 32	Problemas asociados al consumo de sustancias	69	

RESUMEN

En el primer semestre de 2026, se presentaron **11,987 personas con consumo de drogas ilícitas** a solicitar tratamiento por primera vez en Centros de Integración Juvenil (CIJ), de las cuales, el 99.2% lo hizo de manera presencial. Los principales motivos de consulta declarados fueron el consumo de sustancias (89.9%) y otras condiciones de salud mental, principalmente por ansiedad (27.1%) y depresión (23.8%).

La solicitud de atención por consumo de sustancias se da en una proporción de 2.3 hombres por cada mujer. La edad media de ingreso a tratamiento se situó en 23.7 años. Los hombres tardan un poco más que las mujeres para acudir a solicitar atención en CIJ (24.5 años y 21.8 años, respectivamente).

La edad de inicio del consumo de tabaco se situó en los 14.8 años y la de alcohol en 14.7 años, en tanto que la edad de inicio del consumo de drogas ilícitas se situó en 16.5 años, tanto hombres como mujeres inician el consumo de sustancias a la misma edad.

Las drogas de mayor impacto, por las que se solicitó el tratamiento fueron: metanfetaminas (42.6%), cannabis (28.7%) y alcohol (10.1%). Las principales sustancias consumidas alguna vez fueron: alcohol (76.6%), cannabis (74.9%), tabaco (68.9%) y metanfetaminas (52.1%). Mientras que en el mes previo al ingreso a tratamiento se consumió principalmente: tabaco (42.3%), alcohol (41.3%), cannabis (33.7%), metanfetaminas (27.5%) y clorhidrato de cocaína (6.9%).

En cuanto al seguimiento de las llamadas Nuevas Sustancias de Abuso (NSA) o de uso poco común, se observó que el consumo alguna vez en la vida de nicotina en dispositivos electrónicos fue la sustancia más reportada (24.0%), seguida por marihuana modificada (5.7%), hachís en presentación de aceite o miel (1.8%) y dextrometorfano (1.2%). En tanto que, el consumo alguna vez en la vida de fentanilo y análogos fue referido por el 0.4% de los casos.

Los problemas asociados al consumo de drogas ilícitas más reportados fueron los familiares (76.1%), seguidos de los psicológicos (61.5%), escolares (47.9%), de salud (46.6%) y laborales (26.0%).

ANTECEDENTES

Centros de Integración Juvenil A.C. (CIJ) reporta información epidemiológica del consumo de drogas de las personas que solicitan tratamiento en sus unidades de atención desde el año de 1976 (Sanchez-Huesca y López, 1985). En 1983 inició la aplicación de una cédula homogénea a las personas de nuevo ingreso (Clarac y Wagner, 1987). No obstante, es a partir de 1990 que la recolección de datos se realiza de forma sistemática (García et al, 1999), lo que permitió la implementación del *Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas* (SIECD, actualmente, *Reporte de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas –RIECD–*), el cual se ha consolidado a través de los años, gracias al aprovechamiento de los avances tecnológicos, siendo su última modificación en el año 2021.

El RIECD realiza el seguimiento oportuno de un conjunto de variables que contribuyen a la toma de decisiones de los servicios institucionales, ofrece un panorama sobre la forma y tendencias del consumo de drogas y aporta información a los sistemas epidemiológicos de las adicciones en el país, a saber: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA) de la Secretaría de Salud (Secretaría de Salud [SS], 2009), Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas (SRID), perteneciente al Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz (INPRF)” (Ortiz et al, 2024) y el Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones a cargo de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (SS, 2018).

Por un lado, el RIECD ha apoyado en el desarrollo de diferentes estudios epidemiológicos especializados realizados por CIJ. Donde sobresalen los estudios de tendencias del consumo de sustancias (CIJ, 2025b; CIJ, 2025c; CIJ, 2025d; García, Díaz y Balanzario, 2001; García et al, 2018), el perfil de consumidores de drogas y su trayectoria de consumo (García et al, 1998), el consumo de drogas en mujeres (Castillo y Gutiérrez, 2008), el consumo de sustancias en población infantil (Gracia y Balanzario, 2003) o de acuerdo con las etapas de la vida (García et al, 2003). Información que, en su momento, permitió enfrentar de manera oportuna las problemáticas generadas por el creciente consumo de estimulantes, al mismo tiempo que ha servido de sustento en el diseño de estudios sobre características particulares de las personas con consumo de estos alcaloides (Jiménez et al, 2005; Jiménez y Castillo, 2014).

Por otro lado, la información reportada a través del RIECD ha permitido el desarrollo de estudios epidemiológicos particulares enfocados en profundizar en las características de las personas que consumen drogas legales solicitantes de tratamiento en CIJ. Así, desde el 2006 se genera un informe de las características de las personas que consumen tabaco y alcohol (Gutiérrez y Castillo, 2007), con lo cual se logró identificar una emergencia epidemiológica del consumo de alcohol entre las mujeres atendidas con relación a los años anteriores (CIJ, 2022a); suceso que ha motivado que CIJ profundice en esta problemática (Moreno, 2010). Estos hallazgos son consistentes con lo reportado por la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco

(Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones et al., 2025), sobre todo para el caso de las mujeres jóvenes.

Asimismo, la información generada por este Reporte, durante más de dos décadas ha sido consistente con la información de otras encuestas nacionales (Medina-Mora et al., 2012a; Medina-Mora et al., 2012b; ENCODAT, 2017a; ENCODAT, 2017b) y ha sido referente para el desarrollo de metodologías de investigación en variados estudios clínicos, psicosociales y evaluativos de la Institución, como es el caso del Estudio Básico de Comunidad Objetivo (CIJ, 2025) realizado por CIJ.

Cabe destacar que, a partir del primer semestre de 2021, CIJ inició el registro y seguimiento de las llamadas Nuevas Sustancias de Abuso (NSA) o sustancias de uso poco común. Esto debido a la proliferación de nuevas sustancias psicotrópicas de reciente creación o aparición en el mercado y que no están controladas por la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961 o la Convención de 1971, pero que pueden representar una amenaza para la salud pública (Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías, 2018; United Nations Office on Drugs and Crime, 2024).

El reporte se elaboró con base en la información obtenida del Sistema de planeación, registro, seguimiento y consulta CIJ 3.0, correspondiente al primer semestre de 2026. Su objetivo es proporcionar datos actualizados sobre las características sociodemográficas, el patrón de consumo de drogas y variables asociadas a la solicitud de tratamiento de las personas usuarias de drogas ilegales de primer ingreso a tratamiento en CIJ. A través de este, se aportan elementos para apoyar el diseño, planeación y ajuste de los programas institucionales de prevención, tratamiento y rehabilitación, además de colaborar con otros sistemas de información en drogas y brindar información para investigaciones en el campo de las adicciones.

MÉTODO

Diseño del estudio: estudio descriptivo, transversal-retrospectivo, con corte semestral.

Población: 11,987 personas con consumo de drogas ilícitas procedentes de 109 unidades de CIJ, que acudieron por primera vez a consulta entre enero y junio de 2026 (Anexo, Tabla 1).

Fuente de información: Base de datos recuperada el día 1 de julio de 2026 a las 9:45 hrs., correspondiente al formato electrónico de Entrevista Inicial que requisita el equipo médico-técnico en la primera consulta que tienen las personas en alguna unidad de CIJ. Este formato es parte del Expediente Clínico Electrónico que se captura en el Sistema de planeación, registro, seguimiento y consulta CIJ 3.0.

Variables de estudio: Las características sociodemográficas estudiadas comprenden: sexo, edad de ingreso a tratamiento, estado civil, escolaridad, ocupación, estrato social y población en situación de vulnerabilidad. Las variables de patrón de consumo incluyen: edad de inicio del consumo de sustancias (tabaco, alcohol y drogas ilícitas), tiempo transcurrido entre el inicio del

consumo de sustancias y el ingreso a tratamiento (tabaco, alcohol y drogas ilícitas), droga ilícita de inicio, consumo alguna vez en la vida, consumo en el último año, consumo en los últimos 30 días; drogas de preferencia en el último año, droga de mayor impacto (por la cual podría estar solicitando atención en CIJ), uso combinado de sustancias, tipo de consumo de drogas ilícitas, frecuencia de episodios de abuso, total de drogas consumidas, y el reporte de nuevas sustancias de abuso o de uso poco común. Finalmente, se incluyen variables asociadas a la solicitud de tratamiento, como son los motivos de consulta y los problemas asociados al consumo de sustancias.

El registro del consumo de drogas comprende 82 sustancias. Para las variables de consumo alguna vez en la vida, en el último año y en el último mes, además están disponibles 25 grupos de sustancias:

Grupo(s) de Sustancias		Sustancias
Tabaco		Tabaco; Nicotina en dispositivo electrónico
Alcohol		Bebidas fermentadas; Bebidas destiladas; Alcohol puro (alc. del 96)
Cannabis		Mariguana "estándar"; Mariguana modificada, con alto nivel de THC; Hachís – Resina; Hachís - Aceite o miel
Sustancias asociadas al cannabis		"Mariguana" sintética; Medicamentos con compuestos cannábicos
Inhalables		Solventes y removedores; Pegamentos; Esmaltes y pinturas; Gasolinas y combustibles; Otros inhalables
Cocaína	Cocaína (clorhidrato)	Cocaína en polvo blanco
	Crack	Crack
	Otra presentación de cocaína	Basuco (pasta base de cocaína); Otras presentaciones de cocaína
Metanfetaminas		Metanfetaminas: cristal, Hielo; "Metas"
Otros estimulantes		Sales de baño; Anfetaminas y derivados; Anorexígenos; Drogas de diseño con efectos estimulantes; Otros estimulantes
Éxtasis	Éxtasis (MDMA)	Éxtasis (MDMA)
	Sust. con efectos similares al éxtasis	Drogas de diseño con efectos similares al éxtasis; Piperazinas con efectos similares al éxtasis; Aminoindanos
Benzodiacepinas		Benzodiacepinas y sustancias relacionadas; Rohypnol
Otros depresores		GHB o similares; Sedantes hipnóticos; Otros depresores del SNC
Alucinógenos	LSD/LSA	LSD; LSA
	Plantas alucinógenas o disociativas	Hongos alucinógenos; Peyote (mezcalina); Salvia divinorum u otras variedades de salvia; Ololiuqui; Floripondio; Ayahuasca; Otras plantas con efectos alucinógenos o disociativos
	Otros alucinógenos	Fenciclidina (PCP, polvo de ángel); Análogos del PCP; Ketamina; Dextrometorfano; DMT; Triptaminas psicodélicas derivadas y análogas del DMT; Grupo 2C x; Grupo DO x;

Grupo(s) de Sustancias	Sustancias
	Grupo NBOMe; Otras drogas de diseño con efectos psicodélicos; Otras sustancias con efectos psicodélicos
Heroína	Heroína blanca; Heroína negra o morena
Opioides sintéticos	Oxicodona; Opioides sintéticos; Fentanilo y análogos; Derivados Opioides combinados con analgésicos; Desomorfina
Opio y derivados	Opio; Morfina; Codeína
Sustancias con utilidad médica, utilizadas fuera de prescripción	Anticolinérgicos; Antiespasmódicos; Antiparkinsonianos; Anticonvulsivos; Antidepresivos; Antipsicóticos o neurolepticos; Antihistamínicos; Otras sustancias de abuso con utilidad médica
Otras sustancias de abuso	Nitritos; Anestésicos; Bebidas energizantes; Drogas o bebidas inteligentes; Esteroides anabólicos; Sustancias no clasificadas; Sustancias sin especificar

Para el presente reporte las nuevas sustancias de abuso (NSA) o sustancias emergentes en seguimiento son: Nicotina en dispositivo electrónico, Marihuana modificada -con alto nivel de THC-, Hachís –Aceite o miel–, “Marihuana sintética”, Medicamentos con compuestos cannábicos, Sales de baño, Drogas de diseño con efectos estimulantes, Piperazinas con efectos similares al éxtasis, Aminoindanos, Fenciclidina –PCP, polvo de ángel– y análogos del PCP, Ketamina, Dextrometorfano, DMT y análogos, Fenitelaminas –Grupo 2C x; Grupo DO x; Grupo NBOMe–, Salvia divinorum, Ayahuasca, GHB o similares, Fentanilo y análogos y Desomorfina. El seguimiento de estas sustancias incluye el consumo alguna vez en la vida, la edad de inicio de cada una de estas sustancias y las entidades federativas donde se registró la solicitud de tratamiento de personas con consumo de estas sustancias.


Los resultados se presentan tanto en forma general como desagregada por sexo, en porcentajes válidos, excluyendo los casos “sin información” y aquellos que no cumplen con las condiciones requeridas para el análisis en cada variable de estudio. Cabe señalar que para contabilizar el total de sustancias consumidas se consideran las 82 sustancias en seguimiento.

RESULTADOS

Entre enero y junio de 2026 se registró a **11,987 personas con consumo de drogas ilícitas** solicitantes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil. 11,888 personas lo hicieron de manera presencial (99.2%) y 99 lo hicieron a distancia (telemática: 0.8%).

El principal motivo de consulta declarado fue el consumo de sustancias psicoactivas (89.9%), mientras que 43.0% reportó otras condiciones de salud, 48.0% de los casos declaró más de un motivo de consulta (Figura 1).

Figura 1. Principales motivos de consulta declarados



CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS¹

Sexo. La población se conformó por 8,400 hombres (70.1%) y 3,587 mujeres (29.9%); es decir, por dos hombres que solicitan tratamiento en CIJ (2.3 hombres) lo hace una mujer.

Edad de ingreso a tratamiento. Se registró un rango de edad de 7 a 82 años, con una media de 23.7 años (DE= 11.3 años), una mediana de 18 años y una moda de 16 años (1,329 personas). El 83.1% tenían entre 12 y 34 años (9,962 personas), mientras que el 44.6% de los casos eran menores de edad (5,345 personas).

Figura 2. Edad de ingreso a tratamiento por sexo


	 Años	 Años	
Rango	7 a 82	11 a 79	Los hombres ingresaron a tratamiento a mayor edad que las mujeres.
Media (Desviación estándar)	24.5 (11.6)	21.8 (10.3)	
Mediana	19	17	
Moda	16	15	
Decil₁	14	14	

¹ Cfr., Anexo, Tablas 1 a 9.

Estado civil. El 79.1% de la población refirió ser soltera; el 9.7% indicó que vivía en unión libre; el 6.0% dijo estar casada; el 3.5% estaba separada y el 1.3% ya se había divorciado.


Figura 3. Estado civil por sexo

Las mujeres refirieron en mayor proporción que los hombres estar solteras o viudas.



Escolaridad. El 42.8% de la población había cursado algún grado de bachillerato, el 36.3% algún grado de educación secundaria, el 13.6% tenía estudios superiores y el 4.5% había cursado solamente estudios de primaria.


Figura 4. Escolaridad por sexo



Los hombres y las mujeres cuentan con un nivel educativo similar.

Ocupación. El 40.8% reportó ser estudiante de tiempo completo, el 31.7% desempeñaba alguna actividad laboral y el 16.1% estaba desempleado.


Figura 5. Principal ocupación por sexo



Mientras que un mayor porcentaje de mujeres se dedicaba a estudiar o a tareas del hogar, más de una tercera parte de la población de hombres contaba con un trabajo remunerado, seguidos de los que se dedican a estudiar, no obstante, casi uno de cada cinco hombres no tenía ocupación.

Estrato social. De acuerdo con la percepción de los terapeutas, poco más de la mitad de los casos (53.3%) se ubicaban en el estrato medio bajo, un 36.5% en el nivel bajo, un 5.4% fue clasificado en el estrato medio alto y otro 4.4% en el estrato muy bajo.

Figura 6. Estrato social por sexo



Tanto hombres como mujeres presentaron condiciones sociales similares, predominando los estratos medio bajo y bajo.

Población en situación de vulnerabilidad. Entre las personas que se consideran en situación de vulnerabilidad se encuentran las **mujeres** (3,587 mujeres solicitaron tratamiento), de las cuales 44 refirió estar embarazada (1.2%) y 17 indicó no saber si se encontraba embarazada (0.5%).

El 5.7% de las personas refirió pertenecer a la **comunidad LGBTIQ+** (684 personas, de las cuales 319 refirió ser bisexual, 218 gays y 76 lesbianas).


El 1.2% dijo ser miembro de alguna **comunidad indígena** (142 personas) y 0.2% de la comunidad **afrodescendiente** (27 personas).

El 1.4% refirió tener algún tipo de **discapacidad**: 82 personas presentan discapacidad sensorial y de la comunicación, 77 discapacidad motriz y 8 discapacidad múltiple.

El 0.7% manifestó haber migrado a otro país en los últimos 12 meses (87 personas).

El 1.5% señaló haber vivido en Estados Unidos un año o más, principalmente en los estados de California (64 casos), Texas (32 casos) y Arizona (15 casos).

Figura 7. Población en situación de vulnerabilidad por sexo




En cuanto a las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres sobresalen en la categoría de pertenecer a la comunidad LGBTIQ+, en tanto que un mayor porcentaje de hombres es miembro de alguna comunidad indígena, tiene una discapacidad, ha migrado a otro país y ha vivido más de un año como migrante en Estados Unidos de Norteamérica.

CONSUMO DE DROGAS²

Sustancia que motiva la solicitud de tratamiento (droga de mayor impacto). 10,619 personas refirieron que la solicitud de tratamiento fue por el consumo de alguna sustancia (7,638 hombres y 2,981 mujeres). Las principales sustancias a las cuales atribuyeron los mayores daños a la salud, bienestar personal y familiar o en el desempeño escolar, laboral o social y por las que reportaron haber solicitado tratamiento fueron: metanfetaminas (42.6%, esencialmente cristal: 42.2%), cannabis (28.7%; básicamente marihuana estándar: 25.8%) y alcohol (10.1%); en menor medida se mencionó a la cocaína en clorhidrato (5.0%), al tabaco (5.6%) y al crack (2.4%).

Figura 8. Droga de mayor impacto por sexo



Las metanfetaminas y el cannabis son las principales sustancias por las que hombres y mujeres solicitan tratamiento. Sin embargo, los hombres acuden en mayor proporción que las mujeres por problemas asociados al consumo de alcohol, cannabis, cocaína, crack e inhalables; las mujeres acuden en mayor proporción que ellos, por lo que les ocasiona el uso de metanfetaminas, benzodicepinas y tabaco.

² Cfr., Tablas 10 a 32.

Edad de inicio del consumo de sustancias. La edad promedio de inicio del consumo de tabaco fue a los 14.8 años (DE= 3.6 años), la mediana se ubicó en los 14 años y la moda en los 15 años, mientras que la edad promedio de inicio del consumo de alcohol se ubicó en 14.7 años (DE= 3.3 años), la mediana y la moda fue a los 15 años. Mientras que la edad promedio de inicio del consumo de drogas ilícitas (incluyendo sustancias de uso médico sin prescripción) fue de 16.5 años (DE= 5.8 años), con una mediana y una moda de 15 años. Por otra parte, al considerar el primer decil como indicador de las edades más tempranas de inicio, se observa que tanto para el tabaco, el alcohol se ubica en los 11 años, en tanto que en las drogas ilícitas se ubica en los 12 años.


Figura 9. Edad de inicio del consumo de sustancias por sexo

	 Años			 Años		
	Tabaco	Alcohol	Drogas ilícitas	Tabaco	Alcohol	Drogas ilícitas
Media	14.8	14.7	16.5	14.8	14.6	16.6
(Desviación estándar)	(3.6)	(3.3)	(5.6)	(3.8)	(3.4)	(6.2)
Mediana	14	15	15	14	14	15
Moda	15	15	15	13	15	15
Decil₁	11	11	12	12	11	12

En general, hombres y mujeres inician el consumo sustancias (alcohol, tabaco y drogas ilícitas) a la misma edad.

Drogas ilícitas de inicio. Las sustancias más reportadas fueron: cannabis (61.7%, principalmente marihuana estándar: 58.6%); metanfetaminas (20.7%; principalmente cristal: 20.4%); cocaína (7.8%, básicamente en clorhidrato de cocaína: 6.6% y de crack: 1.0%); e inhalables (3.1%, mayormente en forma de solventes y removedores: 1.9%).

Figura 10. Principales drogas ilícitas de inicio por sexo



El cannabis es la principal droga ilegal de inicio en los hombres y las mujeres, seguida por el consumo de metanfetaminas y de cocaína en polvo blanco (clorhidrato).

Los hombres reportan en mayor proporción que las mujeres el haber iniciado el consumo de sustancias ilegales con cannabis, cocaína en polvo, crack, inhalables y heroína. En tanto que las mujeres iniciaron el consumo, en mayor proporción que los hombres, con metanfetaminas y benzodiacepinas.

Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de sustancias y el ingreso a tratamiento en CIJ. El promedio de años transcurrido entre el inicio de consumo y la solicitud de tratamiento se presentó de la siguiente forma: tabaco 9.3 años (DE=10.6 años), alcohol 10.1 años (DE=10.7 años) y drogas ilícitas 7.2 años (DE =9.3 años).

Cabe señalar que la mitad de las personas con consumo de drogas dejaron pasar hasta cuatro años desde que iniciaron el consumo de tabaco, hasta seis años desde el inicio de alcohol y hasta tres años desde el inicio de drogas ilícitas hasta que acudieron a solicitar tratamiento.


Figura 11. Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de sustancias y el ingreso a tratamiento en CIJ por sexo

	 Años			 Años		
	Tabaco	Alcohol	Drogas ilícitas	Tabaco	Alcohol	Drogas ilícitas
Promedio	10.0	10.9	8.1	7.6	8.1	5.2
(Desviación estándar)	(11.0)	(11.2)	(9.9)	(9.2)	(9.2)	(7.4)
Mediana	5	7	4	3	4	2
Moda	2	1	1	1	1	1
Decil₁	1	1	< 1	1	1	< 1

Los hombres tardan más tiempo que las mujeres para solicitar tratamiento.

Tipo de consumo de drogas ilícitas. De acuerdo con los terapeutas, el 42.7% de los solicitantes de tratamiento fue catalogado con consumo funcional, el 19.7% con consumo disfuncional, el 16.1% con consumo social u ocasional, el 13.4% con consumo experimental y el 8.1% presentaba remisión del consumo.

Figura 12. Tipo de consumo de drogas ilícitas según sexo




Si bien, la mayor proporción de hombres y mujeres son catalogados con un consumo de drogas funcional y disfuncional, ellas registran en mayor proporción que los hombres un consumo experimental, social u ocasional y en remisión

Total de drogas consumidas. El promedio de sustancias utilizadas alguna vez en la vida, incluyendo alcohol y tabaco, fue de 4.1 drogas (89.3% reportó el consumo de dos o más sustancias); en el último año fue de 3.0 drogas (78.7% consumió dos o más sustancias); y en los últimos 30 días fue de 1.8 drogas (51.1% reportó haber utilizado dos o más sustancias).

La media de sustancias consumidas alguna vez en la vida, sin incluir alcohol y tabaco fue de 2.2 drogas (55.6% reportó el consumo de dos o más sustancias); en el último año fue de 1.5 drogas (37.0% consumió dos o más sustancias); y en los últimos 30 días fue de 0.8 drogas (16.0% reportó haber utilizado dos o más sustancias).

Figura 13. Promedio de drogas consumidas por sexo




Mujeres y hombres han consumido prácticamente el mismo número de sustancias; siendo ligeramente mayor en los hombres.

Consumo de drogas alguna vez en la vida.³ Las sustancias de mayor consumo alguna vez en la vida fueron: alcohol (76.6%; principalmente bebidas fermentadas: 62.4%), cannabis (74.9%; principalmente marihuana estándar: 71.8%), tabaco (68.9%; 24.0% usó nicotina en dispositivo electrónico), metanfetaminas (52.1%, principalmente en su presentación de cristal: 51.3%), clorhidrato de cocaína (31.4%) y crack (7.4%); en menor medida se reportó el consumo de inhalables (11.1%; principalmente solventes y removedores: 6.9%), alucinógenos (11.1%; primordialmente LSD: 8.6% y plantas alucinógenas o disociativas: 4.0%), benzodiacepinas (7.4%), éxtasis y sustancias similares (2.5%), heroína (1.1%) y opioides sin prescripción médica (1.1%).

El 1.3% reportó el consumo de sustancias de uso médico sin prescripción (el 0.7% reportó el consumo de antidepresivos) y el 5.3% reportó otras sustancias de abuso⁴ (principalmente bebidas energizantes: 4.5%).

Figura 14. Consumo de drogas alguna vez en la vida por sexo



Las sustancias más consumidas por hombres y mujeres fueron el alcohol, el cannabis, el tabaco, las metanfetaminas y la cocaína en polvo (clorhidrato).

En general, sobresale un mayor consumo en los hombres. Sin embargo, las mujeres reportan en mayor proporción el consumo de metanfetaminas.


³ Las personas pudieron haber reportado el consumo de dos o más sustancias, por lo que el total de los porcentajes no suma 100.

⁴ Nitritos, anestésicos, bebidas energizantes, drogas o bebidas inteligentes, esteroides anabólicos y sustancias sin clasificar o sin especificar.

Consumo de drogas en los últimos 12 meses.⁵ 97.2% de las personas reportó haber consumido alguna sustancia en el año previo a su ingreso a tratamiento en CIJ.

En este lapso, las sustancias más consumidas fueron: alcohol (65.1%; principalmente bebidas fermentadas: 50.9%), tabaco (56.1%, nicotina en dispositivo electrónico: 16.7%), cannabis (54.3%; principalmente marihuana estándar: 51.4%), metanfetaminas (44.3%), clorhidrato de cocaína (17.4%), inhalables (5.3%), alucinógenos (4.3%; principalmente LSD: 3.1%), crack (3.9%) y benzodiazepinas (4.4%). En menor medida se reportó el consumo de otras sustancias de abuso⁶ (3.8%, principalmente bebidas energizantes: 3.3%), sustancias de uso médico sin prescripción (0.9%), éxtasis (0.9%), opioides sin prescripción médica (0.7%) y heroína (0.6%).

Figura 15. Consumo de drogas en los últimos 12 meses por sexo




Las drogas más consumidas en el último año por ambos sexos fueron alcohol, tabaco, cannabis, metanfetaminas y cocaína (clorhidrato). En general, los hombres reportaron en mayor proporción que las mujeres el consumo de sustancias, con excepción del consumo de metanfetaminas y benzodiazepinas.

⁵ Las personas pudieron haber reportado el consumo de dos o más sustancias, por lo que el total de los porcentajes no suma 100.

⁶ Nitritos, anestésicos, bebidas energizantes, drogas o bebidas inteligentes, esteroides anabólicos y sustancias sin clasificar o sin especificar.

Droga de preferencia en los últimos 12 meses. Las personas reportaron mayor preferencia por el consumo de cannabis (27.2%, principalmente marihuana estándar: 25.1%), metanfetaminas (29.7%), alcohol (12.3%; en su mayoría bebidas fermentadas: 8.23%) y tabaco (10.6%).


Figura 16. Droga de preferencia en los últimos 12 meses por sexo



En los últimos 12 meses, los hombres y las mujeres prefirieron el consumo de metanfetaminas y cannabis. Ellos reconocieron mayor preferencia que las mujeres por el consumo de alcohol, cannabis, cocaína, crack, inhalables, alucinógenos y heroína; mientras que la preferencia por el tabaco, metanfetaminas y benzodiazepinas fue mayor en las mujeres que en los hombres.

Uso combinado de drogas en los últimos 12 meses.⁷ De las personas con consumo de drogas que usaron sustancias en el último año, y sin tomar en cuenta el consumo de tabaco, 54.2% reportó el consumo de dos o más sustancias en un mismo día.

Figura 17. Uso combinado de drogas en los últimos 12 meses según sexo




Los hombres reportan en mayor proporción que las mujeres el consumo de dos o más sustancias (no se incluye el consumo de tabaco) en un mismo día.

⁷ No se toman en cuenta 4,129 casos (34.4%) que no cumplieron los criterios de inclusión de esta variable; 31.7% de los hombres y 40.9% de las mujeres (ver anexo, Tabla 26).

Consumo de drogas en los últimos 30 días.⁸ En este lapso, 81.7% de los casos reportó el consumo de alcohol, tabaco o drogas ilícitas. Las sustancias más consumidas fueron: tabaco (42.3%), alcohol (41.3%; principalmente bebidas fermentadas: 32.3%), cannabis (33.7%; principalmente marihuana estándar: 31.6%), metanfetaminas (27.5%; principalmente en presentación de cristal: 27.3%), clorhidrato de cocaína (6.9%), crack (2.2%), inhalables (2.3%; principalmente solventes y removedores: 1.4%), benzodiacepinas (2.3%), alucinógenos (1.0%; primordialmente LSD: 0.6%) y otras sustancias de abuso⁹ (1.8%; principalmente bebidas energizantes: 1.6%).

En menor medida se refirió el consumo de sustancias similares al cannabis (0.4%), opioides (0.4%), heroína (0.4%) y sustancias de uso médico sin prescripción (0.4%; principalmente antidepresivos: 0.2%).

Figura 18. Consumo de drogas en los últimos 30 días por sexo




Hombres y mujeres consumieron predominantemente alcohol, tabaco, cannabis y metanfetaminas. En general, los hombres reportaron en mayor proporción que las mujeres el consumo de diferentes sustancias, con excepción del consumo de metanfetaminas y benzodiacepinas.

⁸ Las personas pudieron haber reportado el consumo de dos o más sustancias, por lo que el total de los porcentajes no suma 100.

⁹ Nitritos, anestésicos, bebidas energizantes, drogas o bebidas inteligentes, esteroides anabólicos y sustancias sin clasificar o sin especificar.

Frecuencia de episodios de abuso en los últimos 30 días. El 39.2% de quienes reportaron consumo de alcohol en los últimos 30 días reportó consumo excesivo¹⁰ menos de una vez a la semana y 25.7% de una o dos veces a la semana. Por otra parte, 29.8% de las personas con consumo de drogas ilícitas durante el último mes reportaron consumirlas todos los días, 32.1% menos de una vez a la semana, 22.7% de una a dos veces a la semana y 15.3% cada tercer día.

Figura 19. Frecuencia de episodios de abuso en los últimos 30 días según sexo




En general, los hombres refieren mayor frecuencia de episodios de abuso en el consumo de alcohol y de drogas ilícitas que las mujeres.

¹⁰ Se refiere al consumo de más de cuatro copas en un día para los hombres y de más de tres copas en un día para las mujeres.

Problemas asociados al consumo de sustancias. El 89.4% de las personas con consumo de drogas ilícitas refirió haber tenido problemas asociados al consumo de sustancias; el 76.1% reconoció tener problemas familiares, el 61.5% presentó problemas psicológicos, el 47.9% escolares, el 46.6% de salud, el 26.0% laborales, el 20.8% tuvo accidentes o lesiones, el 19.2% problemas de conducta antisocial o delictiva y el 18.0% problemas legales. El 79.3% de las personas atendidas mencionaron dos o más problemas asociados al consumo de sustancias.

Figura 20. Problemas asociados al consumo de sustancias por sexo



En general, los hombres reportaron en mayor proporción que las mujeres problemas asociados al consumo de sustancias; mientras que las mujeres rebasan el porcentaje de hombres al no referir problemas asociados.


Entre hombres y mujeres, los problemas familiares y los problemas psicológicos son las problemáticas más frecuentemente relacionadas al consumo de drogas.

Los hombres reportan en mucha mayor proporción que las mujeres los problemas de tipo laboral, legal, los accidentes o lesiones y la conducta antisocial asociados al consumo de sustancias.

NUEVAS SUSTANCIAS DE ABUSO O SUSTANCIAS EMERGENTES (NSA)


En el presente reporte se da seguimiento a 19 sustancias consideradas de uso poco común o nuevas sustancias de abuso (Figura 21). En el primer semestre de 2026 la sustancia más reportada alguna vez en la vida fue la nicotina en dispositivos electrónicos fue (24.0%), seguida por la marihuana modificada (5.7%), el hachís en presentación de aceite o miel (1.8%), el dextrometorfano (1.2%), la marihuana sintética (0.8%), el DMT y análogos (0.5%), la ketamina (0.4%), la salvia divinorum (0.4%), el fentanilo y análogos (0.4%), la ayahuasca (0.4%), los medicamentos con compuestos cannábicos (0.3%) y drogas de diseño con efecto estimulante (0.3%). En menor medida se reportó el consumo de GHB y sustancias similares (0.1%), nueve casos con consumo de fenitelaminas, ocho casos con consumo de fenciclidina y análogos, dos casos con uso de sales de baño, un caso con consumo de piperazinas con efectos similares al éxtasis y un caso con consumo de aminoindanos. No se reportó el consumo de desomorfina.

Figura 21. Consumo alguna vez en la vida de nuevas sustancias de abuso o sustancias de uso poco común por sexo



El inicio del consumo de las nuevas sustancias de abuso o sustancias de uso poco común en seguimiento se presenta en promedio entre los 15 y 28 años (Figura 22).

Figura 22. Edad promedio de inicio de nuevas sustancias de abuso o sustancias de uso poco común



Los estados con mayor número de personas que reportan el consumo de estas sustancias son la Ciudad de México (604 personas) y el Estado de México (453 persona).

ALERTA EPIDEMIOLÓGICA

Fentanilo y análogos

Desde el primer semestre de 2021, el Reporte de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas de CIJ realiza el seguimiento del consumo alguna vez en la vida de fentanilo y sustancias análogas en la población de primer ingreso a tratamiento, lo que ha permitido dar cuenta del incremento del consumo, al pasar de 5 casos en el primer semestre de 2021 a 70 casos en el segundo semestre de 2025, para situarse en 53 casos en primer semestre de 2026 (Figura 23).

En el último semestre de seguimiento, 34 hombres y 19 mujeres reportaron el consumo de fentanilo y análogos, la edad promedio de inicio de uso de esta sustancia se ubicó en 21.7 años (D.E.=10.8 años). En esta población, las metanfetaminas fueron las principales sustancias que motivaron la solicitud de tratamiento (29 casos), seguidas por el fentanilo y análogos (10 casos) y en menor medida se refirió a la cannabis (4 casos).

El mayor número de personas que reportó el uso de fentanilo y análogos se ubicaron en el Estado de México, en la Ciudad de México y en el estado de Baja California (Figura 24).

Figura 23. Tendencia del consumo de fentanilo y análogos, 1er semestre de 2021 – 1er semestre de 2026.




Figura 24. Estados que reportan consumo alguna vez en la vida de fentanilo y análogos, 1er semestre de 2026.



REFERENCIAS

- Castillo, P. I., Gutiérrez, A. D. (2008). *Consumo de drogas en mujeres asistentes a centros de tratamiento especializado en la Ciudad de México*. Salud Mental 31 (5), 351-359. <http://scielo.unam.mx/pdf/sm/v31n5/v31n5a3.pdf>
- Centros de Integración Juvenil, A.C. (2025). *Estudio Básico de Comunidad Objetivo 2024-2030*. México: Centros de Integración Juvenil, A. C. <http://www.cij.gob.mx/ebco2024-2030/Index.html>
- Centros de Integración Juvenil, Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas. (2026a). *Consumo de drogas en solicitantes de tratamiento en Centros de Integración Juvenil. Consumidores de drogas ilícitas. Segundo semestre del 2026*. México: Centros de Integración Juvenil, A. C. <http://www.cij.gob.mx/programas/Investigacion/pdf/26-1d.pdf>
- Centros de Integración Juvenil, Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas. (2026b). *Tendencias del consumo de drogas alguna vez en la vida en personas con consumo de drogas ilícitas solicitantes de tratamiento en Centros de Integración Juvenil al 2° semestre de 2026. (Nivel nacional y entidades federativas) (Nivel Nacional y Entidades Federativas)*. México: Centros de Integración Juvenil, A. C. <http://www.cij.gob.mx/programas/Investigacion/pdf/26-1e.pdf>
- Centros de Integración Juvenil, Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas. (2026c). *Tendencias del consumo de drogas en los últimos 30 días en personas con consumo de drogas ilícitas solicitantes de tratamiento en Centros de Integración Juvenil al 2° semestre de 2026. (Nivel Nacional y Entidades Federativas)*. México: Centros de Integración Juvenil, A. C. <http://www.cij.gob.mx/programas/Investigacion/pdf/26-1f.pdf>
- Centros de Integración Juvenil, Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas. (2025d). *Droga de mayor impacto reportada por personas con consumo de drogas ilícitas solicitantes de tratamiento en Centros de Integración Juvenil al 2° semestre de 2026. (Nivel nacional y entidades federativas)*. México: Centros de Integración Juvenil, A. C. <http://www.cij.gob.mx/programas/Investigacion/pdf/26-1g.pdf>
- CEPAL (22 enero, 2025). Grupos en situación de vulnerabilidad. CEPAL. <https://comunidades.cepal.org/desarrollosocial/es/grupos/discusion/grupos-en-situacion-de-vulnerabilidad#:~:text=Los%20grupos%20en%20situaci%C3%B3n%20de%20vulnerabilidad%20abordados%20por%20la%20ARDSI,%3B%20las%20personas%20lesbianas%2C%20gais%2C>
- Clarac, P. y Wagner, F. (1987). *Análisis de algunas variables en una muestra de pacientes farmacodependientes* (1986). En Wagner, F. y Ortiz, R. (1990). *Estudios acerca de la farmacodependencia en México realizados por Paule Clarac*. México: Centros de

Integración Juvenil, A. C. (pp. 111-126).

Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, e Instituto Nacional de Salud Pública. (2025). *Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco ENCODAT 2025*. Secretaría de Salud / Instituto Nacional de Salud Pública. México.
[https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1044513/ENCODAT - COMPLETO.pdf](https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1044513/ENCODAT_-_COMPLETO.pdf)

García, V. R., Castillo, P. I. y Guerrero, J. A. (2003). *El consumo de drogas en pacientes atendidos en Centros de Integración Juvenil según la etapa de vida correspondiente al ingreso a tratamiento* (Informe de Investigación 03-13). México: Centros de Integración Juvenil, A. C.

García, V. R., Díaz, D. B. y Balanzario, M. C. (2001). *Tendencias del consumo de drogas en pacientes de primer ingreso a tratamiento en CIJ entre 1990 y 1999* (Informe de investigación 2000-06). México: Centros de Integración Juvenil, A.C.

García V. R., Díaz, D. B., Balanzario, M. C., Gutiérrez, A. D y Castillo, P. I. (1999). *Características sociodemográficas y de consumo de drogas en pacientes atendidos entre 1990 y 1997* (Informe de investigación 98-12). México: Centros de Integración Juvenil, A.C.

García-Aurrecoechea, V. R., Díaz-Negrete, D. B., Balanzario, M. C. y Castillo-Franco, P. I. (1998). *Perfil y trayectoria del consumo de drogas en pacientes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil en 1996*. En CD: D. B. Díaz, J. L. Arellanez, M. C. Balanzario y R. Sánchez, *Once años de estudios del consumo de drogas en México, Investigaciones realizadas en Centros de Integración Juvenil entre 1997 y 2007*. México: Centros de Integración Juvenil, A.C.

García-Aurrecoechea, V. R., Gutiérrez-López, A. D., Rodríguez-Kuri, S. E., Velázquez-Altamirano, M., & Fernández-Cáceres, C. (2018). *Increasing methamphetamine use trends alert among patients in Mexico*. Journal of Substance Use, 23(5), 500–505. doi:10.1080/14659891.2018.1430182

Gracia, S. E. y Balanzario, M. C. (2003). *El consumo de drogas en menores de 12 años en Centros de Integración Juvenil en el año 2002* (Informe de Investigación 03-17). México: Centros de Integración Juvenil, A. C.

Gutiérrez, A. D. y Castillo, P. I. (2007). *Estudio epidemiológico del consumo de alcohol y tabaco en pacientes usuarios de estas sustancias solicitantes de tratamiento en CIJ en 2006* (Informe de Investigación 07-13). México: Centros de Integración Juvenil, A. C.
<http://www.test.cij.gob.mx/ExtCIJ/programas/Investigacion/pdf/07-13.pdf>

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz; Instituto Nacional de Salud Pública, Comisión Nacional Contra las Adicciones, Secretaría de Salud. (2017a). *Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017: Reporte de Alcohol*. Villatoro-Velázquez JA, Reséndiz Escobar, E., Mujica Salazar, A., Bretón-Cirett, M., Cañas-Martínez,

V., Soto-Hernández, I., Fregoso-Ito, D., Fleiz-Bautista, C., Medina-Mora ME., Gutiérrez-Reyes, J., Franco-Núñez, A., Romero-Martínez, M. y Mendoza-Alvarado, L. Ciudad de México, México: INPRFM.

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz; Instituto Nacional de Salud Pública, Comisión Nacional Contra las Adicciones, Secretaría de Salud (2017b). *Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017: Reporte de Drogas*. Villatoro-Velázquez JA, Reséndiz Escobar, E., Mujica Salazar, A., Bretón-Cirett, M., Cañas-Martínez, V., Soto-Hernández, I., Fregoso-Ito, D., Fleiz-Bautista, C., Medina-Mora ME., Gutiérrez-Reyes, J., Franco-Núñez, A., Romero-Martínez, M. y Mendoza-Alvarado, L. Ciudad de México, México: INPRFM.

Jiménez, K. y Castillo, N. L. (2014). *Factores de reincidencia en usuarios de cocaína, crack y metanfetaminas en fase de recuperación* (Informe de Investigación 04-14). México: Centros de Integración Juvenil, A. C.

Jiménez, K., García, V. R. y González, J. D. (2005). *Patrón de consumo de cocaína y crack en pacientes que ingresan a tratamiento* (Informe de investigación 05-07). México: Centros de Integración Juvenil, A. C.

Medina-Mora, M. E. Villatoro J. A., Fleiz, C., Téllez, M. M., Mendoza, L. R., Romero, M., Gutiérrez, J. P., Castro, M., Hernández, M., Tena, C., Alvear, C. y Guisa, V. (2012a). *Encuesta Nacional de Adicciones 2011: Reporte de Alcohol*. México: Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

Medina-Mora, M. E. Villatoro J. A., Fleiz, C., Téllez, M. M., Mendoza, L. R., Romero, M., Gutiérrez, J. P., Castro, M., Hernández, M., Tena, C., Alvear, C. y Guisa, V. (2012b). *Encuesta Nacional de Adicciones 2011: Reporte de Drogas*. México: Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

Moreno, K. (2010). *Los jóvenes y el alcohol en México. Un problema emergente en mujeres*. México: Centros de Integración Juvenil, A.C.

Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (2018). *Informe Europeo sobre Drogas 2018: Tendencias y novedades*. Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, Luxemburgo.

Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones. (2024). *Informe de la demanda y oferta de Fentanilo en México: generalidades y situación actual*. México.
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/946040/Informe_Fentanilo_abril_2024.pdf

Ortiz, A., Fuentes, P., Rodríguez, E., Galván, J. y Ramos-Cruz, M. (2024). *Tendencias de Uso de Sustancias Psicoactivas en la Ciudad de México*. Reporte No. 76, Junio 2024.
https://inprf.gob.mx/psicosociales/archivos/srid/rep_76_pdf.pdf

Sánchez-Huesca, R. y López, L. M. (1985). *Características demográficas y patrones de inicio en el consumo de drogas en asistentes a los Centros Locales; recuperación de los archivos de siete años (1976-1982)*. México: Centros de Integración Juvenil, A.C.

Secretaría de Salud (2009). *Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA)*. México. Dirección General de Epidemiología.

Secretaría de Salud, Comisión Nacional contra las Adicciones (2019). *Observatorio Mexicano de Salud Mental y Consumo de Drogas*. <https://www.gob.mx/salud/conadic/acciones-y-programas/observatorio-mexicano-de-drogas-omd>

United Nations Office on Drugs and Crime (2024). *World Drug Report 2024*. New York: United Nations. <https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/world-drug-report-2024.html>

Anexo

Características sociodemográficas de las personas con consumo de drogas ilícitas de primer ingreso a tratamiento a CIJ en el primer semestre de 2026

Tabla 1. Personas de primer ingreso por unidad de atención (CIJ, UH y UTUH)

Unidad de atención	General		Hombres		Mujeres		Hombres por cada mujer
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	
Álvaro Obregón Centro	84	0.7	61	0.7	23	0.6	2.7
Álvaro Obregón Oriente	113	0.9	77	0.9	36	1.0	2.1
Atizapán	217	1.8	135	1.6	82	2.3	1.6
Azcapotzalco	125	1.0	80	1.0	45	1.3	1.8
Benito Juárez	172	1.4	130	1.5	42	1.2	3.1
Chalco	407	3.4	274	3.3	133	3.7	2.1
Coyoacán	133	1.1	86	1.0	47	1.3	1.8
Cuajimalpa	115	1.0	57	0.7	58	1.6	1.0
Cuauhtémoc Oriente	158	1.3	118	1.4	40	1.1	3.0
Cuauhtémoc Poniente	88	0.7	64	0.8	24	0.7	2.7
Ecatepec	179	1.5	116	1.4	63	1.8	1.8
Gustavo A. Madero Aragón	292	2.4	211	2.5	81	2.3	2.6
Gustavo A. Madero Norte	266	2.2	156	1.9	110	3.1	1.4
Iztapalapa Oriente	370	3.1	277	3.3	93	2.6	3.0
Iztapalapa Poniente	139	1.2	94	1.1	45	1.3	2.1
Miguel Hidalgo	94	0.8	66	0.8	28	0.8	2.4
Naucalpan	125	1.0	86	1.0	39	1.1	2.2
Nezahualcóyotl	326	2.7	209	2.5	117	3.3	1.8
Texcoco	239	2.0	160	1.9	79	2.2	2.0
Tlalnepantla	212	1.8	136	1.6	76	2.1	1.8
Tlalpan	209	1.7	144	1.7	65	1.8	2.2
Venustiano Carranza	138	1.2	97	1.2	41	1.1	2.4
UH Ecatepec	56	0.5	56	0.7	0	0.0	---
UH Iztapalapa	55	0.5	42	0.5	13	0.4	3.2
UH Naucalpan	38	0.3	33	0.4	5	0.1	6.6
Acapulco	100	0.8	83	1.0	17	0.5	4.9
Acuña	47	0.4	37	0.4	10	0.3	3.7
Aguascalientes	238	2.0	195	2.3	43	1.2	4.5
Apatzingán	19	0.2	14	0.2	5	0.1	2.8
Apodaca	3	0.0	3	0.0	0	0.0	---
Cancún	159	1.3	96	1.1	63	1.8	1.5
Celaya	181	1.5	133	1.6	48	1.3	2.8
Chetumal	42	0.4	32	0.4	10	0.3	3.2
Chihuahua	241	2.0	175	2.1	66	1.8	2.7
Chilpancingo	94	0.8	62	0.7	32	0.9	1.9

Continúa

Tabla 1. Personas de primer ingreso a tratamiento por unidad de atención (CIJ, UH y UTUH)
(Continuación)

Unidad de atención	General		Hombres		Mujeres		Hombres por cada mujer
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	
Ciudad del Carmen	42	0.4	30	0.4	12	0.3	2.5
Ciudad Juárez Norte	259	2.2	179	2.1	80	2.2	2.2
Ciudad Victoria	55	0.5	42	0.5	13	0.4	3.2
Colima	62	0.5	32	0.4	30	0.8	1.1
Cozumel	58	0.5	36	0.4	22	0.6	1.6
Cuernavaca	137	1.1	82	1.0	55	1.5	1.5
Culiacán	109	0.9	87	1.0	22	0.6	4.0
Durango	102	0.9	74	0.9	28	0.8	2.6
Escuinapa	24	0.2	13	0.2	11	0.3	1.2
Fresnillo	32	0.3	28	0.3	4	0.1	7.0
Guadalajara Centro	196	1.6	130	1.5	66	1.8	2.0
Guadalajara Sur	116	1.0	79	0.9	37	1.0	2.1
Guadalupe	70	0.6	49	0.6	21	0.6	2.3
Guadalupe Zacatecas	11	0.1	9	0.1	2	0.1	4.5
Guamúchil	41	0.3	30	0.4	11	0.3	2.7
Guanajuato	75	0.6	49	0.6	26	0.7	1.9
Guasave	42	0.4	36	0.4	6	0.2	6.0
Hermosillo	137	1.1	106	1.3	31	0.9	3.4
Huatulco	35	0.3	26	0.3	9	0.3	2.9
Ixbalanqué	11	0.1	10	0.1	1	0.0	10.0
Ixtapa Zihuatanejo	66	0.6	50	0.6	16	0.4	3.1
La Paz	60	0.5	30	0.4	30	0.8	1.0
La Piedad	67	0.6	42	0.5	25	0.7	1.7
Laguna Durango	88	0.7	60	0.7	28	0.8	2.1
León	166	1.4	136	1.6	30	0.8	4.5
Los Cabos	56	0.5	31	0.4	25	0.7	1.2
Los Mochis	67	0.6	46	0.5	21	0.6	2.2
Manzanillo	33	0.3	22	0.3	11	0.3	2.0
Mazatlán	59	0.5	47	0.6	12	0.3	3.9
Mérida	128	1.1	92	1.1	36	1.0	2.6
Mexicali	107	0.9	76	0.9	31	0.9	2.5
Monterrey	139	1.2	110	1.3	29	0.8	3.8
Morelia	84	0.7	49	0.6	35	1.0	1.4
Nogales	136	1.1	86	1.0	50	1.4	1.7
Oaxaca	132	1.1	102	1.2	30	0.8	3.4
Pachuca	184	1.5	119	1.4	65	1.8	1.8
Playa del Carmen	138	1.2	74	0.9	64	1.8	1.2
Poza Rica	37	0.3	26	0.3	11	0.3	2.4
Puebla	186	1.6	118	1.4	68	1.9	1.7

Continúa

Tabla 1. Personas de primer ingreso a tratamiento por unidad de atención (CIJ, UH y UTUH)
(Continuación)

Unidad de atención	General		Hombres		Mujeres		Hombres por cada mujer
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	
Puerto Vallarta	75	0.6	63	0.8	12	0.3	5.3
Querétaro	103	0.9	69	0.8	34	0.9	2.0
Ramos Arizpe	45	0.4	36	0.4	9	0.3	4.0
Reynosa	88	0.7	67	0.8	21	0.6	3.2
Salamanca	64	0.5	44	0.5	20	0.6	2.2
Saltillo	152	1.3	129	1.5	23	0.6	5.6
San Luis Potosí	140	1.2	105	1.3	35	1.0	3.0
San Nicolás de los Garza	129	1.1	97	1.2	32	0.9	3.0
Tampico	119	1.0	88	1.0	31	0.9	2.8
Tapachula	67	0.6	49	0.6	18	0.5	2.7
Tecomán	36	0.3	29	0.3	7	0.2	4.1
Tehuacán	86	0.7	57	0.7	29	0.8	2.0
Tepic	13	0.1	6	0.1	7	0.2	0.9
Tijuana Guaycura	173	1.4	104	1.2	69	1.9	1.5
Tijuana Soler	133	1.1	95	1.1	38	1.1	2.5
Tlaquepaque	134	1.1	101	1.2	33	0.9	3.1
Tlaxcala	117	1.0	82	1.0	35	1.0	2.3
Toluca	249	2.1	184	2.2	65	1.8	2.8
Torreón Oriente	157	1.3	100	1.2	57	1.6	1.8
Tuxtla Gutiérrez	44	0.4	35	0.4	9	0.3	3.9
Villahermosa	54	0.5	43	0.5	11	0.3	3.9
Xalapa	113	0.9	76	0.9	37	1.0	2.1
Yucatán	81	0.7	66	0.8	15	0.4	4.4
Zacatecas	57	0.5	41	0.5	16	0.4	2.6
Zamora	59	0.5	40	0.5	19	0.5	2.1
Zapopan Norte	201	1.7	141	1.7	60	1.7	2.4
UH Cd. Juárez	13	0.1	12	0.1	1	0.0	12.0
UH Culiacán	4	0.0	4	0.0	0	0.0	---
UH Nuevo León	58	0.5	45	0.5	13	0.4	3.5
UH Punta Diamante	53	0.4	46	0.5	7	0.2	6.6
UH Tijuana	21	0.2	16	0.2	5	0.1	3.2
UH Zapopan	61	0.5	49	0.6	12	0.3	4.1
UH Zapotlán el Grande	35	0.3	16	0.2	19	0.5	0.8
UTUH Cd. Juárez	13	0.1	12	0.1	1	0.0	12.0
UTUH Tijuana	19	0.2	15	0.2	4	0.1	3.8
Total	11,987	100.0	8,400	100.0	3,587	100.0	2.3

UH=Unidad de Hospitalización

UTUH=Unidad de Tratamiento para Usuarios de Heroína

Tabla 2. Principales motivos de consulta declarados

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Consumo de drogas	9,930	82.8	7,144	85.0	2,786	77.7
Consumo de alcohol	2,613	21.8	1,953	23.3	660	18.4
Consumo de tabaco	2,141	17.9	1,597	19.0	544	15.2
Trastornos mentales y conductuales del niño y el adolescente	649	5.4	458	5.5	191	5.3
Ludopatía	57	0.5	49	0.6	8	0.2
Depresión	2,847	23.8	1,623	19.3	1,224	34.1
Ansiedad	3,252	27.1	2,024	24.1	1,228	34.2
Psicosis	124	1.0	105	1.3	19	0.5
Epilepsia	18	0.2	7	0.1	11	0.3
Demencia	19	0.2	16	0.2	3	0.1
Autolesión	411	3.4	129	1.5	282	7.9
Suicidio (ideación o intento)	538	4.5	280	3.3	258	7.2
Otro motivo de consulta	262	2.2	202	2.4	60	1.7
<i>2 o más motivos reportados</i>	<i>5,614</i>	<i>46.8</i>	<i>3,768</i>	<i>44.9</i>	<i>1,846</i>	<i>51.5</i>

Tabla 3. Sexo

	Frec.	%	Razón H:M
Hombres	8,400	70.1	2.3 : 1
Mujeres	3,587	29.9	
Total	11,987	100.0	

Tabla 4. Edad de ingreso a tratamiento

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Hasta 9 años	1	0.0	1	0.0	0	0.0
10 a 14 años	1,536	12.8	920	11.0	616	17.2
15 a 19 años	4,929	41.1	3,304	39.3	1,625	45.3
20 a 24 años	1,428	11.9	1,032	12.3	396	11.0
25 a 29 años	1,098	9.2	816	9.7	282	7.9
30 a 34 años	975	8.1	745	8.9	230	6.4
35 a 39 años	648	5.4	515	6.1	133	3.7
40 a 44 años	511	4.3	390	4.6	121	3.4
45 años y más	861	7.2	677	8.1	184	5.1
Total	11,987	100.0	8,400	100.0	3,587	100.0
Media (DE)	23.7 (11.3) años		24.5 (11.6) años		21.8 (10.3) años	
Mediana	18 años		19 años		17 años	
Moda	16 años		16 años		15 años	
Decil ₁	14 años		14 años		14 años	

DE= Desviación Estándar

Tabla 5. Estado civil

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Soltero	9,485	79.1	79.1	6,476	77.1	77.1	3,009	83.9	83.9
Casado	725	6.0	6.0	592	7.0	7.0	133	3.7	3.7
Unión libre	1,158	9.7	9.7	864	10.3	10.3	294	8.2	8.2
Separado	421	3.5	3.5	326	3.9	3.9	95	2.6	2.6
Divorciado	157	1.3	1.3	119	1.4	1.4	38	1.1	1.1
Viudo	39	0.3	0.3	21	0.3	0.3	18	0.5	0.5
<i>Sin información</i>	2	0.0	Se omite	2	0.0	Se omite	0	0.0	Se omite
Total	11,987	100.0	100.0	8,400	100.0	100.0	3,587	100.0	100.0

Tabla 6. Escolaridad

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Sin estudios	31	0.3	0.3	21	0.3	0.3	10	0.3	0.3
Primaria no concluida	150	1.3	1.3	122	1.5	1.5	28	0.8	0.8
Primaria concluida	392	3.3	3.3	300	3.6	3.6	92	2.6	2.6
Secundaria no concluida	2,461	20.5	20.5	1,576	18.8	18.8	885	24.7	24.7
Secundaria concluida	1,894	15.8	15.8	1,421	16.9	16.9	473	13.2	13.2
Bachillerato no concluido	3,822	31.9	31.9	2,604	31.0	31.0	1,218	34.0	34.0
Bachillerato concluido	1,314	11.0	11.0	1,015	12.1	12.1	299	8.3	8.3
Estudios técnicos o comerciales no concluidos	69	0.6	0.6	50	0.6	0.6	19	0.5	0.5
Estudios técnicos o comerciales concluidos	133	1.1	1.1	85	1.0	1.0	48	1.3	1.3
Estudios superiores no concluidos	1,023	8.5	8.5	714	8.5	8.5	309	8.6	8.6
Estudios superiores concluidos	607	5.1	5.1	431	5.1	5.1	176	4.9	4.9
Estudios de posgrado no concluidos	37	0.3	0.3	28	0.3	0.3	9	0.3	0.3
Estudios de posgrado concluidos	53	0.4	0.4	32	0.4	0.4	21	0.6	0.6
Sin información	1	0.0	Se omite	1	0.0	Se omite	0	0.0	Se omite
Total	11,987	100.0	100.0	8,400	100.0	100.0	3,587	100.0	100.0

Tabla 7. Ocupación

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Estudiante	4,856	40.5	40.8	2,931	34.9	35.2	1,925	53.7	54.0
Estudiante que trabaja	911	7.6	7.7	718	8.5	8.6	193	5.4	5.4
Trabaja	3,773	31.5	31.7	3,104	37.0	37.3	669	18.7	18.8
Desempleado(a)	1,910	15.9	16.1	1,435	17.1	17.2	475	13.2	13.3
Tareas del hogar	365	3.0	3.1	76	0.9	0.9	289	8.1	8.1
Pensionado	79	0.7	0.7	68	0.8	0.8	11	0.3	0.3
Sin información	93	0.8	Se omite	68	0.8	Se omite	25	0.7	Se omite
Total	11,987	100.0	100.0	8,400	100.0	100.0	3,587	100.0	100.0

Tabla 8. Estrato social

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Alto	41	0.3	32	0.4	9	0.3
Medio alto	648	5.4	475	5.7	173	4.8
Medio bajo	6,387	53.3	4,449	53.0	1,938	54.0
Bajo	4,380	36.5	3,064	36.5	1,316	36.7
Muy bajo	531	4.4	380	4.5	151	4.2
Total	11,987	100.0	8,400	100.0	3,587	100.0

Tabla 9. Población en situación de vulnerabilidad

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Pertenece a la comunidad LGBTI	684	5.7	329	3.9	355	9.9
Se considera miembro de alguna comunidad indígena	142	1.2	111	1.3	31	0.9
Se considera miembro de alguna población afrodescendiente	27	0.2	20	0.2	7	0.2
Tiene alguna discapacidad	167	1.4	131	1.6	36	1.0
Ha migrado a otro país en los últimos 12 meses	87	0.7	65	0.8	22	0.6
Ha vivido en condición de migrante en Estados Unidos un año o más	178	1.5	148	1.8	30	0.8

Características del consumo de drogas en personas de primer ingreso a tratamiento en CIJ en el primer semestre de 2026

Tabla 10. Sustancia que motiva la solicitud de tratamiento (droga de mayor impacto), según menciones

Sustancia		General			Hombres			Mujeres		
		Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Tabaco	Tabaco	393	3.3	3.7	283	3.4	3.7	110	3.1	3.7
	Nicotina en dispositivo electrónico	198	1.7	1.9	138	1.6	1.8	60	1.7	2.0
Alcohol	Bebidas fermentadas	679	5.7	6.4	524	6.2	6.9	155	4.3	5.2
	Bebidas destiladas	384	3.2	3.6	273	3.3	3.6	111	3.1	3.7
	Alcohol puro ("alcohol del 96")	12	0.1	0.1	11	0.1	0.1	1	0.0	0.0
Cannabis	Mariguana "estándar"	2,744	22.9	25.8	2,201	26.2	28.8	543	15.1	18.2
	Mariguana modificada, con alto nivel de THC	218	1.8	2.1	160	1.9	2.1	58	1.6	1.9
	Hachís - Resina	21	0.2	0.2	14	0.2	0.2	7	0.2	0.2
	Hachís – Aceite o miel	59	0.5	0.6	40	0.5	0.5	19	0.5	0.6
Sus. Asociadas al cannabis	"Mariguana" sintética	17	0.1	0.2	14	0.2	0.2	3	0.1	0.1
	Medicamentos con compuestos cannábicos	3	0.0	0.0	3	0.0	0.0	0	0.0	0.0
Inhalables	Solventes y removedores	109	0.9	1.0	93	1.1	1.2	16	0.4	0.5
	Pegamentos	30	0.3	0.3	28	0.3	0.4	2	0.1	0.1
	Esmaltes y pinturas	8	0.1	0.1	8	0.1	0.1	0	0.0	0.0
	Gasolinas y combustibles	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	Otros inhalables	35	0.3	0.3	28	0.3	0.4	7	0.2	0.2
Cocaína	Cocaína en polvo blanco	536	4.5	5.0	436	5.2	5.7	100	2.8	3.4
	Crack	257	2.1	2.4	231	2.8	3.0	26	0.7	0.9
	Basuco (pasta base de cocaína)	13	0.1	0.1	10	0.1	0.1	3	0.1	0.1
	Otras presentaciones de cocaína	7	0.1	0.1	6	0.1	0.1	1	0.0	0.0
Metanfetaminas	Metanfetaminas: cristal	4,476	37.3	42.2	2,842	33.8	37.2	1,634	45.6	54.8
	Metanfetaminas: hielo	22	0.2	0.2	14	0.2	0.2	8	0.2	0.3
	Metanfetaminas: "Metas"	24	0.2	0.2	16	0.2	0.2	8	0.2	0.3
Otros estimulantes	Anfetaminas y derivados	34	0.3	0.3	32	0.4	0.4	2	0.1	0.1
	Anorexígenos	10	0.1	0.1	8	0.1	0.1	2	0.1	0.1
	Drogas de diseño con efectos estimulantes	4	0.0	0.0	2	0.0	0.0	2	0.1	0.1
	Otros estimulantes	6	0.1	0.1	6	0.1	0.1	0	0.0	0.0

Continúa

Tabla 10. Sustancia que motiva la solicitud de tratamiento (droga de mayor impacto), según menciones

(Continuación)

Sustancia		General			Hombres			Mujeres		
		Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Alucinógenos	LSD	28	0.2	0.3	22	0.3	0.3	6	0.2	0.2
	Hongos alucinógenos	4	0.0	0.0	2	0.0	0.0	2	0.1	0.1
	Floripondio	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1	0.0	0.0
	Ayahuasca	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	Fenciclidina (PCP, polvo de ángel)	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	Ketamina	5	0.0	0.0	5	0.1	0.1	0	0.0	0.0
	Dextrometorfano (uso fuera de prescripción)	10	0.1	0.1	6	0.1	0.1	4	0.1	0.1
Éxtasis	Éxtasis (MDMA)	3	0.0	0.0	1	0.0	0.0	2	0.1	0.1
	Piperazinas con efectos similares al éxtasis	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0
Benzodiacepinas	Benzodiacepinas y sustancias relacionadas	111	0.9	1.0	62	0.7	0.8	49	1.4	1.6
	Sedantes hipnóticos	4	0.0	0.0	3	0.0	0.0	1	0.0	0.0
Otros depresores	Otros depresores del SNC	4	0.0	0.0	4	0.0	0.1	0	0.0	0.0
Heroína	Heroína blanca	5	0.0	0.0	4	0.0	0.1	1	0.0	0.0
	Heroína negra o morena	54	0.5	0.5	44	0.5	0.6	10	0.3	0.3
Opioides	Oxicodona	2	0.0	0.0	2	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	Opioides sintéticos	16	0.1	0.2	14	0.2	0.2	2	0.1	0.1
	Fentanilo y análogos	10	0.1	0.1	6	0.1	0.1	4	0.1	0.1
	Derivados opioides combinados con analgésicos	9	0.1	0.1	6	0.1	0.1	3	0.1	0.1
Opiáceos	Morfina (uso fuera de prescripción)	2	0.0	0.0	0	0.0	0.0	2	0.1	0.1
	Codeína (uso fuera de prescripción)	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0
Sustancias de abuso con utilidad médica	Antidepresivos	12	0.1	0.1	7	0.1	0.1	5	0.1	0.2
	Otras sustancias de abuso con utilidad médica	11	0.1	0.1	5	0.1	0.1	6	0.2	0.2
Otras sustancias de abuso	Anestésicos	2	0.0	0.0	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
	Bebidas energizantes	14	0.1	0.1	11	0.1	0.1	3	0.1	0.1
	Sustancias no clasificadas	2	0.0	0.0	2	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	Sustancias sin especificar	6	0.1	0.1	5	0.1	0.1	1	0.0	0.0
Ninguna		1,368	11.4	Se omite	762	9.1	Se omite	606	16.9	Se omite
Total		11,987	100.0	100.0	8,400	100.0	100.0	3,587	100.0	100.0

Tabla 11. Edad de inicio del consumo de tabaco

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Hasta 9 años	246	2.1	3.0	207	2.5	3.5	39	1.1	1.7
10 a 14 años	4,085	34.1	49.5	2,839	33.8	47.9	1,246	34.7	53.5
15 a 19 años	3,348	27.9	40.6	2,470	29.4	41.7	878	24.5	37.7
20 a 24 años	390	3.3	4.7	278	3.3	4.7	112	3.1	4.8
25 a 29 años	102	0.9	1.2	75	0.9	1.3	27	0.8	1.2
30 a 34 años	54	0.5	0.7	39	0.5	0.7	15	0.4	0.6
35 a 39 años	14	0.1	0.2	6	0.1	0.1	8	0.2	0.3
40 a 44 años	8	0.1	0.1	5	0.1	0.1	3	0.1	0.1
45 años y más	6	0.1	0.1	3	0.0	0.1	3	0.1	0.1
No consumió	3,732	31.1	Se omite	2,477	29.5	Se omite	1,255	35.0	Se omite
Sin información	2	0.0	Se omite	1	0.0	Se omite	1	0.0	Se omite
Total	11,987	100.0	100.0	8,400	100.0	100.0	3,587	100.0	100.0
Media (DE)	14.8 (3.6) años			14.8 (3.6) años			14.8 (3.8) años		
Mediana	14 años			14 años			14 años		
Moda	15 años			15 años			13 años		
Decil ₁	11 años			11 años			12 años		

DE= Desviación Estándar

Tabla 12. Edad de inicio del consumo de alcohol

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Hasta 9 años	378	3.2	4.1	276	3.3	4.2	102	2.8	3.8
10 a 14 años	4,008	33.4	43.7	2,757	32.8	42.3	1,251	34.9	47.2
15 a 19 años	4,316	36.0	47.1	3,143	37.4	48.2	1,173	32.7	44.2
20 a 24 años	335	2.8	3.7	254	3.0	3.9	81	2.3	3.1
25 a 29 años	86	0.7	0.9	60	0.7	0.9	26	0.7	1.0
30 a 34 años	28	0.2	0.3	17	0.2	0.3	11	0.3	0.4
35 a 39 años	11	0.1	0.1	7	0.1	0.1	4	0.1	0.2
40 a 44 años	4	0.0	0.0	3	0.0	0.0	1	0.0	0.0
45 años y más	5	0.0	0.1	2	0.0	0.0	3	0.1	0.1
No consumió	2,808	23.4	Se omite	1,874	22.3	Se omite	934	26.0	Se omite
Sin información	8	0.1	Se omite	7	0.1	Se omite	1	0.0	Se omite
Total	11,987	100.0	100.0	8,400	100.0	100.0	3,587	100.0	100.0
Media (DE)	14.7 (3.3) años			14.7 (3.3) años			14.6 (3.4) años		
Mediana	15 años			15 años			14 años		
Moda	15 años			15 años			15 años		
Decil ₁	11 años			11 años			11 años		

DE= Desviación Estándar

Tabla 13. Edad de inicio del consumo de drogas ilícitas

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Hasta 9 años	120	1.0	1.0	98	1.2	1.2	22	0.6	0.6
10 a 14 años	4,695	39.2	39.2	3,215	38.3	38.3	1,480	41.3	41.3
15 a 19 años	5,385	44.9	44.9	3,827	45.6	45.6	1,558	43.4	43.4
20 a 24 años	857	7.1	7.2	627	7.5	7.5	230	6.4	6.4
25 a 29 años	418	3.5	3.5	309	3.7	3.7	109	3.0	3.0
30 a 34 años	220	1.8	1.8	145	1.7	1.7	75	2.1	2.1
35 a 39 años	120	1.0	1.0	73	0.9	0.9	47	1.3	1.3
40 a 44 años	80	0.7	0.7	50	0.6	0.6	30	0.8	0.8
45 años y más	88	0.7	0.7	53	0.6	0.6	35	1.0	1.0
<i>Sin información</i>	4	0.0	<i>Se omite</i>	3	0.0	<i>Se omite</i>	1	0.0	<i>Se omite</i>
Total	11,987	100.0	100.0	8,400	100.0	100.0	3,587	100.0	100.0
Media (DE)	16.5 (5.8) años			16.5 (5.6) años			16.6 (6.2) años		
Mediana	15 años			15 años			15 años		
Moda	15 años			15 años			15 años		
Decil ₁	12 años			12 años			12 años		

DE= Desviación Estándar

Tabla 14. Drogas ilícitas de inicio, según menciones

Sustancia		General		Hombres		Mujeres	
		Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Cannabis	Mariguana "estándar"	7,023	58.6	5,233	62.3	1,790	49.9
	Mariguana modificada, con alto nivel de THC	281	2.3	194	2.3	87	2.4
	Hachís - Resina	20	0.2	12	0.1	8	0.2
	Hachís - Aceite o miel	72	0.6	51	0.6	21	0.6
Sus. asociadas al cannabis	"Mariguana" sintética	47	0.4	38	0.5	9	0.3
	Medicamentos con compuestos cannábicos	10	0.1	8	0.1	2	0.1
Inhalables	Solventes y removedores	222	1.9	186	2.2	36	1.0
	Pegamentos	60	0.5	49	0.6	11	0.3
	Esmaltes y pinturas	16	0.1	12	0.1	4	0.1
	Gasolinas y combustibles	5	0.0	4	0.0	1	0.0
	Otros inhalables	69	0.6	53	0.6	16	0.4
Cocaína	Cocaína en polvo blanco	791	6.6	638	7.6	153	4.3
	Crack	115	1.0	94	1.1	21	0.6
	Basuco (pasta base de cocaína)	10	0.1	8	0.1	2	0.1
	Otras presentaciones de cocaína	9	0.1	6	0.1	3	0.1
Metanfetaminas	Metanfetaminas: cristal	2,448	20.4	1,307	15.6	1,141	31.8
	Metanfetaminas: hielo	17	0.1	7	0.1	10	0.3
	Metanfetaminas: "Metas"	24	0.2	15	0.2	9	0.3
Otros estimulantes	Anfetaminas y derivados	54	0.5	47	0.6	7	0.2
	Anorexígenos	12	0.1	10	0.1	2	0.1
	Drogas de diseño con efecto estimulante	4	0.0	4	0.0	0	0.0
	Otros estimulantes	7	0.1	7	0.1	0	0.0
Alucinógenos	LSD	33	0.3	22	0.3	11	0.3
	Hongos alucinógenos	11	0.1	8	0.1	3	0.1
	Peyote (mezcalina)	6	0.1	6	0.1	0	0.0
	Salvia divinorum u otras variedades de salvia	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	Floripondio	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	Ayahuasca	2	0.0	0	0.0	2	0.1
	Dextrometorfano (uso fuera de prescripción)	16	0.1	11	0.1	5	0.1
	Ketamina	2	0.0	1	0.0	1	0.0
	DMT	1	0.0	0	0.0	1	0.0

Continúa

Tabla 14. Drogas ilícitas de inicio, según menciones
 (Continuación)

Sustancia		General		Hombres		Mujeres	
		Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Éxtasis	Éxtasis (MDMA)	9	0.1	7	0.1	2	0.1
	Drogas de diseño con efectos similares al éxtasis	2	0.0	0	0.0	2	0.1
Benzodiacepinas	Benzodiacepinas y sustancias relacionadas	149	1.2	66	0.8	83	2.3
Otros depresores	Sedantes hipnóticos	4	0.0	1	0.0	3	0.1
	Otros depresores del SNC	9	0.1	5	0.1	4	0.1
Heroína	Heroína blanca	2	0.0	2	0.0	0	0.0
	Heroína negra o morena	15	0.1	13	0.2	2	0.1
Opioides	Oxicodona	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	Opioides sintéticos (uso fuera de prescripción)	10	0.1	7	0.1	3	0.1
	Fentanilo y análogos (uso fuera de prescripción)	2	0.0	0	0.0	2	0.1
	Derivados Opioides combinados con analgésicos	7	0.1	3	0.0	4	0.1
Opiáceos	Opio	1	0.0	0	0.0	1	0.0
	Codeína (uso fuera de prescripción)	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Sustancias de abuso con utilidad médica	Anticonvulsivos	1	0.0	0	0.0	1	0.0
	Antidepresivos	20	0.2	8	0.1	12	0.3
	Antipsicóticos o neurolépticos	2	0.0	1	0.0	1	0.0
	Antihistamínicos	3	0.0	1	0.0	2	0.1
	Otras sustancias de abuso con utilidad médica	12	0.1	8	0.1	4	0.1
Otras sustancias de abuso	Nitritos	6	0.1	5	0.1	1	0.0
	Anestésicos	3	0.0	1	0.0	2	0.1
	Bebidas energizantes	321	2.7	226	2.7	95	2.6
	Drogas o bebidas inteligentes	6	0.1	2	0.0	4	0.1
	Sustancias no clasificadas	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	Sustancias sin especificar	11	0.1	8	0.1	3	0.1
Total		11,987	100.0	8,400	100.0	3,587	100.0

Tabla 15. Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de tabaco y el ingreso a tratamiento a CIJ

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
< de un año	394	3.3	4.8	262	3.1	4.4	132	3.7	5.7
1 a 5 años	4,122	34.4	49.9	2,797	33.3	47.2	1,325	36.9	56.8
6 a 10 años	1,141	9.5	13.8	838	10.0	14.2	303	8.4	13.0
11 a 15 años	757	6.3	9.2	577	6.9	9.7	180	5.0	7.7
16 a 20 años	611	5.1	7.4	463	5.5	7.8	148	4.1	6.3
21 a 25 años	427	3.6	5.2	344	4.1	5.8	83	2.3	3.6
26 o más años	801	6.7	9.7	641	7.6	10.8	160	4.5	6.9
No consumió	3,732	31.1	Se omite	2,477	29.5	Se omite	1,255	35.0	Se omite
Sin información	2	0.0	Se omite	1	0.0	Se omite	1	0.0	Se omite
Total	11,987	100.0	100.0	8,400	100.0	100.0	3,587	100.0	100.0
Media (DE)	9.3 (10.6) años			10.0 (11.0) años			7.6 (9.2) años		
Mediana	4 años			5 años			3 años		
Moda	1 año			2 años			1 año		
Decil ₁	1 año			1 año			1 año		

DE= Desviación Estándar

Tabla 16. Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de alcohol y el ingreso a tratamiento a CIJ

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
< de un año	452	3.8	4.9	276	3.3	4.2	176	4.9	6.6
1 a 5 años	4,057	33.8	44.2	2,730	32.5	41.9	1,327	37.0	50.0
6 a 10 años	1,449	12.1	15.8	1,009	12.0	15.5	440	12.3	16.6
11 a 15 años	959	8.0	10.5	707	8.4	10.8	252	7.0	9.5
16 a 20 años	770	6.4	8.4	606	7.2	9.3	164	4.6	6.2
21 a 25 años	516	4.3	5.6	399	4.8	6.1	117	3.3	4.4
26 o más años	968	8.1	10.6	792	9.4	12.1	176	4.9	6.6
No consumió	2,808	23.4	Se omite	1,874	22.3	Se omite	934	26.0	Se omite
Sin información	8	0.1	Se omite	7	0.1	Se omite	1	0.0	Se omite
Total	11,987	100.0	100.0	8,400	100.0	100.0	3,587	100.0	100.0
Media (DE)	10.1 (10.7) años			10.9 (11.2) años			8.1 (9.2) años		
Mediana	6 años			7 años			4 años		
Moda	1 año			1 año			1 año		
Decil ₁	1 año			1 año			1 año		

DE= Desviación Estándar

Tabla 17. Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de drogas ilícitas y el ingreso a tratamiento en CIJ

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
< de un año	1,535	12.8	12.8	932	11.1	11.1	603	16.8	16.8
1 a 5 años	6,036	50.4	50.4	4,036	48.0	48.1	2,000	55.8	55.8
6 a 10 años	1,512	12.6	12.6	1,107	13.2	13.2	405	11.3	11.3
11 a 15 años	1,038	8.7	8.7	781	9.3	9.3	257	7.2	7.2
16 a 20 años	681	5.7	5.7	558	6.6	6.6	123	3.4	3.4
21 a 25 años	414	3.5	3.5	336	4.0	4.0	78	2.2	2.2
26 o más años	767	6.4	6.4	647	7.7	7.7	120	3.3	3.3
<i>Sin información</i>	4	0.0	<i>Se omite</i>	3	0.0	<i>Se omite</i>	1	0.0	<i>Se omite</i>
Total	11,987	100.0	100.0	8,400	100.0	100.0	3,587	100.0	100.0
Media (DE)	7.2 (9.3) años			8.1 (9.9) años			5.2 (7.4) años		
Mediana	3 años			4 años			2 años		
Moda	1 año			1 año			1 año		
Decil ₁	Menos de 1 año			Menos de 1 año			Menos de 1 año		

DE= Desviación Estándar

Tabla 18. Tipo de consumo de drogas ilícitas

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Experimental	1,605	13.4	13.4	971	11.6	11.6	634	17.7	17.7
Social u ocasional	1,923	16.0	16.1	1,270	15.1	15.1	653	18.2	18.2
Funcional	5,115	42.7	42.7	3,697	44.0	44.1	1,418	39.5	39.6
Disfuncional	2,362	19.7	19.7	1,793	21.3	21.4	569	15.9	15.9
En remisión	969	8.1	8.1	659	7.8	7.9	310	8.6	8.6
<i>Sin información</i>	13	0.1	<i>Se omite</i>	10	0.1	<i>Se omite</i>	3	0.1	<i>Se omite</i>
Total	11,987	100.0	100.0	8,400	100.0	100.0	3,587	100.0	100.0

**Tabla 19. Total de drogas consumidas alguna vez en la vida
(Incluye alcohol o tabaco)**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
1 sustancia	1,279	10.7	796	9.5	483	13.5
2 sustancias	1,656	13.8	1,084	12.9	572	15.9
3 sustancias	2,351	19.6	1,578	18.8	773	21.6
4 sustancias	2,380	19.9	1,663	19.8	717	20.0
5 sustancias	1,662	13.9	1,215	14.5	447	12.5
6 sustancias	1,068	8.9	799	9.5	269	7.5
7 sustancias	649	5.4	501	6.0	148	4.1
8 sustancias	411	3.4	326	3.9	85	2.4
9 sustancias	215	1.8	172	2.0	43	1.2
10 sustancias	117	1.0	101	1.2	16	0.4
11-31 sustancias	199	1.7	165	2.0	34	0.9
Total	11,987	100.0	8,400	100.0	3,587	100.0
Media (DE)	4.1 (2.3) drogas		4.3 (2.4) drogas		3.7 (2.1) drogas	
Mediana	4 drogas		4 drogas		3 drogas	
Moda	4 drogas		4 drogas		3 drogas	
Decil ₁	1 droga		2 drogas		1 droga	

DE= Desviación Estándar

**Tabla 20. Total de drogas ilícitas consumidas alguna vez en la vida
(No incluye ni alcohol ni tabaco)**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
1 sustancia	5,327	44.4	3,442	41.0	1,885	52.6
2 sustancias	2,956	24.7	2,095	24.9	861	24.0
3 sustancias	1,711	14.3	1,283	15.3	428	11.9
4 sustancias	880	7.3	678	8.1	202	5.6
5 sustancias	510	4.3	398	4.7	112	3.1
6 sustancias	269	2.2	223	2.7	46	1.3
7 sustancias	127	1.1	106	1.3	21	0.6
8 sustancias	97	0.8	79	0.9	18	0.5
9 sustancias	46	0.4	43	0.5	3	0.1
10 sustancias	29	0.2	24	0.3	5	0.1
11-27 sustancias	35	0.3	29	0.3	6	0.2
Total	11,987	100.0	8,400	100.0	3,587	100.0
Media (DE)	2.2 (1.7) drogas		2.4 (1.8) drogas		1.9 (1.4) drogas	
Mediana	2 drogas		2 drogas		1 droga	
Moda	1 droga		1 droga		1 droga	
Decil ₁	1 droga		1 droga		1 droga	

DE= Desviación Estándar

Tabla 21. Consumo de drogas alguna vez en la vida por sustancia

Sustancia	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Tabaco	8,255	68.9	5,923	70.5	2,332	65.0
Tabaco	7,257	60.5	5,371	63.9	1,886	52.6
Nicotina en dispositivo electrónico	2,879	24.0	1,914	22.8	965	26.9
Alcohol	9,179	76.6	6,526	77.7	2,653	74.0
Bebidas fermentadas	7,481	62.4	5,464	65.0	2,017	56.2
Bebidas destiladas	4,726	39.4	3,248	38.7	1,478	41.2
Alcohol puro ("alcohol del 96")	104	0.9	81	1.0	23	0.6
Cannabis	8,984	74.9	6,614	78.7	2,370	66.1
Mariguana "estándar"	8,610	71.8	6,351	75.6	2,259	63.0
Mariguana modificada, con alto nivel de THC	681	5.7	500	6.0	181	5.0
Hachís - Resina	134	1.1	105	1.3	29	0.8
Hachís - Aceite o miel	220	1.8	174	2.1	46	1.3
Sustancias similares al cannabis	132	1.1	101	1.2	31	0.9
"Mariguana" sintética	98	0.8	76	0.9	22	0.6
Medicamentos con compuestos cannábicos	35	0.3	26	0.3	9	0.3
Inhalables	1,335	11.1	1,101	13.1	234	6.5
Solventes y removedores	829	6.9	689	8.2	140	3.9
Pegamentos	261	2.2	223	2.7	38	1.1
Esmaltes y pinturas	106	0.9	85	1.0	21	0.6
Gasolinas y combustibles	24	0.2	19	0.2	5	0.1
Otros inhalables	225	1.9	182	2.2	43	1.2
Cocaína	4,115	34.3	3,255	38.8	860	24.0
Cocaína (clorhidrato)	3,761	31.4	2,966	35.3	795	22.2
Crack	893	7.4	765	9.1	128	3.6
Otro tipo de cocaína	149	1.2	107	1.3	42	1.2
Basuco (pasta base de cocaína)	50	0.4	39	0.5	11	0.3
Otras presentaciones de cocaína	100	0.8	69	0.8	31	0.9
Metanfetaminas	6,247	52.1	4,194	49.9	2,053	57.2
Metanfetaminas: cristal	6,145	51.3	4,127	49.1	2,018	56.3
Metanfetaminas: hielo	43	0.4	28	0.3	15	0.4
Metanfetaminas: "Metas"	167	1.4	119	1.4	48	1.3
Otros estimulantes del SNC	220	1.8	171	2.0	49	1.4
Sales de baño	2	0.0	2	0.0	0	0.0
Anfetaminas y derivados	142	1.2	111	1.3	31	0.9
Anorexígenos	15	0.1	12	0.1	3	0.1
Drogas de diseño con efectos estimulantes	37	0.3	23	0.3	14	0.4
Otros estimulantes	29	0.2	27	0.3	2	0.1

Continúa

Tabla 21. Consumo de drogas alguna vez en la vida por sustancia
(Continuación)

Sustancia	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
MDMA y similares	298	2.5	224	2.7	74	2.1
Éxtasis (MDMA)	275	2.3	208	2.5	67	1.9
Sustancias con efectos similares a MDMA	27	0.2	19	0.2	8	0.2
Drogas de diseño con efectos similares	25	0.2	17	0.2	8	0.2
Piperazinas con efectos similares	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Aminoindanos	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Benzodiacepinas	893	7.4	634	7.5	259	7.2
Benzodiacepinas y sustancias relacionadas	883	7.4	625	7.4	258	7.2
Rohypnol	15	0.1	14	0.2	1	0.0
Otros depresores del SNC	78	0.7	60	0.7	18	0.5
GHB o similares	11	0.1	11	0.1	0	0.0
Sedantes hipnóticos	34	0.3	26	0.3	8	0.2
Otros depresores del SNC	33	0.3	23	0.3	10	0.3
Alucinógenos	1,327	11.1	993	11.8	334	9.3
LSD /LSA	1,032	8.6	773	9.2	259	7.2
LSD	1,026	8.6	769	9.2	257	7.2
LSA	7	0.1	5	0.1	2	0.1
Plantas alucinógenas o disociativas	474	4.0	376	4.5	98	2.7
Hongos alucinógenos	357	3.0	278	3.3	79	2.2
Peyote (mezcalina)	104	0.9	92	1.1	12	0.3
Salvia divinorum u otras variedades de salvia	47	0.4	41	0.5	6	0.2
Ololiuqui	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Floripondio	17	0.1	14	0.2	3	0.1
Ayahuasca	42	0.4	25	0.3	17	0.5
Otras plantas con efectos alucinógenos o disociativos	11	0.1	9	0.1	2	0.1
Alucinógenos sintéticos	247	2.1	193	2.3	54	1.5
Fenciclidina (PCP, polvo de ángel)	7	0.1	6	0.1	1	0.0
Análogos del PCP	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Ketamina	52	0.4	44	0.5	8	0.2
Dextrometorfano	139	1.2	104	1.2	35	1.0
DMT	54	0.5	45	0.5	9	0.3
Triptaminas psicodélicas derivadas y análogas del DMT	5	0.0	5	0.1	0	0.0
Grupo 2C x	9	0.1	7	0.1	2	0.1
Grupo DO x	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Grupo NBOMe	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Otras drogas de diseño con efectos psicodélicos	10	0.1	6	0.1	4	0.1
Otras sustancias con efectos psicodélicos	2	0.0	2	0.0	0	0.0

Continúa

Tabla 21. Consumo de drogas alguna vez en la vida por sustancia
(Continuación)

Sustancia	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Heroína	133	1.1	105	1.3	28	0.8
Heroína blanca	40	0.3	30	0.4	10	0.3
Heroína negra o morena	95	0.8	75	0.9	20	0.6
Opioides (uso fuera de prescripción)	123	1.0	91	1.1	32	0.9
Oxicodona	7	0.1	6	0.1	1	0.0
Opioides sintéticos	36	0.3	32	0.4	4	0.1
Fentanilo y análogos	53	0.4	34	0.4	19	0.5
Derivados opioides combinados con analgésicos	29	0.2	21	0.3	8	0.2
Desomorfina	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Opiáceos	33	0.3	29	0.3	4	0.1
Opio	9	0.1	7	0.1	2	0.1
Morfina (uso fuera de prescripción)	7	0.1	5	0.1	2	0.1
Codeína (uso fuera de prescripción)	17	0.1	17	0.2	0	0.0
Sustancias de uso médico	151	1.3	97	1.2	54	1.5
Anticolinérgicos	2	0.0	2	0.0	0	0.0
Antiespasmódicos	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Antiparkinsonianos	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Anticonvulsivos	5	0.0	2	0.0	3	0.1
Antidepresivos	83	0.7	51	0.6	32	0.9
Antipsicóticos o neurolepticos	9	0.1	4	0.0	5	0.1
Antihistamínicos	7	0.1	4	0.0	3	0.1
Otras sustancias de abuso con utilidad médica	48	0.4	35	0.4	13	0.4
Otras sustancias de abuso	632	5.3	465	5.5	167	4.7
Nitritos	63	0.5	55	0.7	8	0.2
Anestésicos	8	0.1	4	0.0	4	0.1
Bebidas energizantes	535	4.5	387	4.6	148	4.1
Drogas o bebidas inteligentes	6	0.1	2	0.0	4	0.1
Esteroides anabólicos	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Sustancias no clasificadas	13	0.1	9	0.1	4	0.1
Sustancias sin especificar	17	0.1	14	0.2	3	0.1

**Tabla 22. Total de drogas consumidas en el último año
(Incluye alcohol o tabaco)**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Ninguna	331	2.8	197	2.3	134	3.7
1 sustancia	2,214	18.5	1,384	16.5	830	23.1
2 sustancias	2,793	23.3	1,910	22.7	883	24.6
3 sustancias	2,751	22.9	1,941	23.1	810	22.6
4 sustancias	1,858	15.5	1,389	16.5	469	13.1
5 sustancias	1,052	8.8	809	9.6	243	6.8
6 sustancias	520	4.3	400	4.8	120	3.3
7 sustancias	229	1.9	181	2.2	48	1.3
8 sustancias	115	1.0	91	1.1	24	0.7
9 sustancias	64	0.5	51	0.6	13	0.4
10 sustancias	32	0.3	27	0.3	5	0.1
11-18 sustancias	28	0.2	20	0.2	8	0.2
Total	11,987	100.0	8,400	100.0	3,587	100.0
Media (DE)	3.0 (1.8) drogas		3.1 (1.8) drogas		2.7 (1.7) drogas	
Mediana	3 drogas		3 drogas		2 drogas	
Moda	3 drogas		3 drogas		2 drogas	
Decil ₁	1 droga		1 droga		1 droga	

DE= Desviación Estándar

**Tabla 23. Total de drogas ilícitas consumidas en el último año
(No incluye ni alcohol ni tabaco)**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Ninguna	1,564	13.0	983	11.7	581	16.2
1 sustancia	5,999	50.0	4,099	48.8	1,900	53.0
2 sustancias	2,661	22.2	1,954	23.3	707	19.7
3 sustancias	1,075	9.0	817	9.7	258	7.2
4 sustancias	396	3.3	318	3.8	78	2.2
5 sustancias	147	1.2	115	1.4	32	0.9
6 sustancias	84	0.7	70	0.8	14	0.4
7 sustancias	38	0.3	28	0.3	10	0.3
8 sustancias	9	0.1	6	0.1	3	0.1
9 sustancias	8	0.1	5	0.1	3	0.1
10 sustancias	1	0.0	0	0.0	1	0.0
11-14 sustancias	5	0.0	5	1.0	0	0.0
Total	11,987	100.0	8,400	100.0	3,587	100.0
Media (DE)	1.5 (1.2) drogas		1.6 (1.2) drogas		1.3 (1.1) drogas	
Mediana	1 droga		1 droga		1 droga	
Moda	1 droga		1 droga		1 droga	
Decil ₁	Ninguna		Ninguna		Ninguna	

DE= Desviación Estándar

Tabla 24. Consumo de drogas en los últimos 12 meses por sustancia

Sustancia	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Tabaco	6,723	56.1	4,917	58.5	1,806	50.3
Tabaco	5,826	48.6	4,397	52.3	1,429	39.8
Nicotina en dispositivo electrónico	2,006	16.7	1,346	16.0	660	18.4
Alcohol	7,801	65.1	5,589	66.5	2,212	61.7
Bebidas fermentadas	6,102	50.9	4,539	54.0	1,563	43.6
Bebidas destiladas	3,760	31.4	2,577	30.7	1,183	33.0
Alcohol puro ("alcohol del 96")	78	0.7	62	0.7	16	0.4
Cannabis	6,509	54.3	4,900	58.3	1,609	44.9
Mariguana "estándar"	6,166	51.4	4,647	55.3	1,519	42.3
Mariguana modificada, con alto nivel de THC	543	4.5	410	4.9	133	3.7
Hachís - Resina	71	0.6	56	0.7	15	0.4
Hachís - Aceite o miel	170	1.4	133	1.6	37	1.0
Sustancias similares al cannabis	93	0.8	70	0.8	23	0.6
"Mariguana" sintética	69	0.6	53	0.6	16	0.4
Medicamentos con compuestos cannábicos	24	0.2	17	0.2	7	0.2
Inhalables	641	5.3	525	6.3	116	3.2
Solventes y removedores	394	3.3	324	3.9	70	2.0
Pegamentos	105	0.9	89	1.1	16	0.4
Esmaltes y pinturas	40	0.3	33	0.4	7	0.2
Gasolinas y combustibles	12	0.1	11	0.1	1	0.0
Otros inhalables	120	1.0	95	1.1	25	0.7
Cocaína	2,392	20.0	1,917	22.8	475	13.2
Cocaína (clorhidrato)	2,082	17.4	1,650	19.6	432	12.0
Crack	469	3.9	413	4.9	56	1.6
Otro tipo de cocaína	80	0.7	57	0.7	23	0.6
Basuco (pasta base de cocaína)	19	0.2	14	0.2	5	0.1
Otras presentaciones de cocaína	62	0.5	44	0.5	18	0.5
Metanfetaminas	5,307	44.3	3,498	41.6	1,809	50.4
Metanfetaminas: cristal	5,242	43.7	3,451	41.1	1,791	49.9
Metanfetaminas: hielo	31	0.3	25	0.3	6	0.2
Metanfetaminas: "Metas"	66	0.6	43	0.5	23	0.6
Otros estimulantes del SNC	123	1.0	99	1.2	24	0.7
Sales de baño	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Anfetaminas y derivados	80	0.7	64	0.8	16	0.4
Anorexígenos	8	0.1	7	0.1	1	0.0
Drogas de diseño con efectos estimulantes	20	0.2	14	0.2	6	0.2
Otros estimulantes	15	0.1	14	0.2	1	0.0

Continúa

Tabla 24. Consumo de drogas en los últimos 12 meses por sustancia
(Continuación)

Sustancia	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
MDMA y similares	103	0.9	73	0.9	30	0.8
Éxtasis (MDMA)	94	0.8	66	0.8	28	0.8
Sustancias con efectos similares a MDMA	10	0.1	8	0.1	2	0.1
Drogas de diseño con efectos similares	9	0.1	7	0.1	2	0.1
Piperazinas con efectos similares	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Aminoindanos	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Benzodiacepinas	528	4.4	361	4.3	167	4.7
Benzodiacepinas y sustancias relacionadas	525	4.4	359	4.3	166	4.6
Rohypnol	3	0.0	2	0.0	1	0.0
Otros depresores del SNC	52	0.4	42	0.5	10	0.3
GHB o similares	7	0.1	7	0.1	0	0.0
Sedantes hipnóticos	23	0.2	20	0.2	3	0.1
Otros depresores del SNC	22	0.2	15	0.2	7	0.2
Alucinógenos	520	4.3	372	4.4	148	4.1
LSD /LSA	376	3.1	267	3.2	109	3.0
LSD	374	3.1	265	3.2	109	3.0
LSA	2	0.0	2	0.0	0	0.0
Plantas alucinógenas o disociativas	97	0.8	70	0.8	27	0.8
Hongos alucinógenos	83	0.7	61	0.7	22	0.6
Peyote (mezcalina)	4	0.0	4	0.0	0	0.0
Salvia divinorum u otras variedades de salvia	9	0.1	8	0.1	1	0.0
Ololiuqui	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Floripondio	2	0.0	1	0.0	1	0.0
Ayahuasca	5	0.0	0	0.0	5	0.1
Otras plantas con efectos alucinógenos o disociativos	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Alucinógenos sintéticos	118	1.0	91	1.1	27	0.8
Fenciclidina (PCP, polvo de ángel)	2	0.0	2	0.0	0	0.0
Análogos del PCP	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Ketamina	28	0.2	23	0.3	5	0.1
Dextrometorfano	77	0.6	56	0.7	21	0.6
DMT	15	0.1	14	0.2	1	0.0
Triptaminas psicodélicas derivadas y análogas del DMT	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Grupo 2C x	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Grupo DO x	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Grupo NBOMe	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Otras drogas de diseño con efectos psicodélicos	5	0.0	3	0.0	2	0.1
Otras sustancias con efectos psicodélicos	2	0.0	2	0.0	0	0.0

Continúa

Tabla 24. Consumo de drogas en los últimos 12 meses por sustancia
 (Continuación)

Sustancia	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Heroína	66	0.6	52	0.6	14	0.4
Heroína blanca	12	0.1	7	0.1	5	0.1
Heroína negra o morena	55	0.5	45	0.5	10	0.3
Opioides (uso fuera de prescripción)	88	0.7	64	0.8	24	0.7
Oxicodona	3	0.0	2	0.0	1	0.0
Opioides sintéticos	27	0.2	23	0.3	4	0.1
Fentanilo y análogos	35	0.3	23	0.3	12	0.3
Derivados opioides combinados con analgésicos	25	0.2	18	0.2	7	0.2
Desomorfina	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Opiáceos	15	0.1	11	0.1	4	0.1
Opio	4	0.0	2	0.0	2	0.1
Morfina (uso fuera de prescripción)	5	0.0	3	0.0	2	0.1
Codeína (uso fuera de prescripción)	6	0.1	6	0.1	0	0.0
Sustancias de uso médico	105	0.9	62	0.7	43	1.2
Anticolinérgicos	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Antiespasmódicos	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Antiparkinsonianos	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Anticonvulsivos	5	0.0	2	0.0	3	0.1
Antidepresivos	57	0.5	30	0.4	27	0.8
Antipsicóticos o neurolépticos	6	0.1	2	0.0	4	0.1
Antihistamínicos	5	0.0	3	0.0	2	0.1
Otras sustancias de abuso con utilidad médica	34	0.3	25	0.3	9	0.3
Otras sustancias de abuso	461	3.8	350	4.2	111	3.1
Nitritos	38	0.3	35	0.4	3	0.1
Anestésicos	5	0.0	3	0.0	2	0.1
Bebidas energizantes	398	3.3	298	3.5	100	2.8
Drogas o bebidas inteligentes	6	0.1	2	0.0	4	0.1
Esteroides anabólicos	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Sustancias no clasificadas	8	0.1	6	0.1	2	0.1
Sustancias sin especificar	9	0.1	8	0.1	1	0.0

Tabla 25. Droga de preferencia en los últimos 12 meses, según menciones

Sustancia		General			Hombres			Mujeres		
		Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Tabaco	Tabaco	879	7.3	7.6	629	7.5	7.7	250	7.0	7.3
	Nicotina en dispositivo electrónico	348	2.9	3.0	226	2.7	2.8	122	3.4	3.6
Alcohol	Bebidas fermentadas	950	7.9	8.2	718	8.5	8.8	232	6.5	6.8
	Bebidas destiladas	464	3.9	4.0	313	3.7	3.8	151	4.2	4.4
	Alcohol puro ("alcohol del 96")	12	0.1	0.1	9	0.1	0.1	3	0.1	0.1
Cannabis	Mariguana "estándar"	2,897	24.2	25.1	2,342	27.9	28.7	555	15.5	16.2
	Mariguana modificada, con alto nivel de THC	186	1.6	1.6	143	1.7	1.8	43	1.2	1.3
	Hachís - Resina	21	0.2	0.2	14	0.2	0.2	7	0.2	0.2
	Hachís – Aceite o miel	32	0.3	0.3	26	0.3	0.3	6	0.2	0.2
Sus. Asociadas al cannabis	"Mariguana" sintética	15	0.1	0.1	13	0.2	0.2	2	0.1	0.1
	Medicamentos con compuestos cannábicos	2	0.0	0.0	2	0.0	0.0	0	0.0	0.0
Inhalables	Solventes y removedores	81	0.7	0.7	69	0.8	0.8	12	0.3	0.4
	Pegamentos	20	0.2	0.2	18	0.2	0.2	2	0.1	0.1
	Esmaltes y pinturas	6	0.1	0.1	6	0.1	0.1	0	0.0	0.0
	Gasolinas	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	Otros inhalables	25	0.2	0.2	21	0.3	0.3	4	0.1	0.1
Cocaína	Cocaína en polvo blanco	405	3.4	3.5	339	4.0	4.2	66	1.8	1.9
	Crack	186	1.6	1.6	168	2.0	2.1	18	0.5	0.5
	Basuco (pasta base de cocaína)	11	0.1	0.1	8	0.1	0.1	3	0.1	0.1
	Otras presentaciones de cocaína	6	0.1	0.1	6	0.1	0.1	0	0.0	0.0
Metanfetaminas	Metanfetaminas: cristal	3,393	28.3	29.3	2,090	24.9	25.7	1,303	36.3	38.1
	Metanfetaminas: hielo	19	0.2	0.2	13	0.2	0.2	6	0.2	0.2
	Metanfetaminas: "Metas"	17	0.1	0.1	9	0.1	0.1	8	0.2	0.2
Otros estimulantes	Anfetaminas y derivados	19	0.2	0.2	17	0.2	0.2	2	0.1	0.1
	Anorexígenos	7	0.1	0.1	6	0.1	0.1	1	0.0	0.0
	Drogas de diseño con efectos estimulantes	6	0.1	0.1	3	0.0	0.0	3	0.1	0.1
	Otros estimulantes	2	0.0	0.0	2	0.0	0.0	0	0.0	0.0

Continúa

Tabla 25. Droga de preferencia en los últimos 12 meses, según menciones
(Continuación)

Sustancia		General			Hombres			Mujeres		
		Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Alucinógenos	LSD	20	0.2	0.2	14	0.2	0.2	6	0.2	0.2
	LSA	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	Hongos alucinógenos	3	0.0	0.0	3	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	Fenciclidina (PCP, polvo de ángel)	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	Ketamina	2	0.0	0.0	2	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	Dextrometorfano (uso fuera de prescripción)	6	0.1	0.1	4	0.0	0.0	2	0.1	0.1
Éxtasis	Éxtasis (MDMA)	5	0.0	0.0	5	0.1	0.1	0	0.0	0.0
	Drogas de diseño con efectos similares al éxtasis	2	0.0	0.0	2	0.0	0.0	0	0.0	0.0
Benzodiacepinas	Benzodiacepinas y sustancias relacionadas	67	0.6	0.6	34	0.4	0.4	33	0.9	1.0
	GHB o similares	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	Sedantes hipnóticos	4	0.0	0.0	2	0.0	0.0	2	0.1	0.1
Otros depresores	Otros depresores del SNC	3	0.0	0.0	3	0.0	0.0	0	0.0	0.0
Heroína	Heroína blanca	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	Heroína negra o morena	40	0.3	0.3	33	0.4	0.4	7	0.2	0.2
Opioides	Oxicodona	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	Opioides sintéticos	16	0.1	0.1	13	0.2	0.2	3	0.1	0.1
	Fentanilo y análogos	8	0.1	0.1	4	0.0	0.0	4	0.1	0.1
	Derivados opioides combinados con analgésicos	9	0.1	0.1	6	0.1	0.1	3	0.1	0.1
Opiáceos	Morfina (uso fuera de prescripción)	2	0.0	0.0	0	0.0	0.0	2	0.1	0.1
	Codeína (uso fuera de prescripción)	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0
Sustancias de abuso con utilidad médica	Anticonvulsivos	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1	0.0	0.0
	Antidepresivos	10	0.1	0.1	4	0.0	0.0	6	0.2	0.2
	Antipsicóticos o neurolépticos	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1	0.0	0.0
	Otras sustancias de abuso con utilidad médica	7	0.1	0.1	3	0.0	0.0	4	0.1	0.1
Otras sustancias de abuso	Nitritos	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	Anestésicos	2	0.0	0.0	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
	Bebidas energizantes	40	0.3	0.3	24	0.3	0.3	16	0.4	0.5
	Sustancias no clasificadas	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	Sustancias sin especificar	2	0.0	0.0	2	0.0	0.0	0	0.0	0.0
Ninguna		1,295	10.8	11.2	769	9.2	9.4	526	14.7	15.4
No aplica (Sin consumo en los últimos 12 meses)		331	2.8	Se omite	197	2.3	Se omite	134	3.7	Se omite
Sin información		93	0.8	Se omite	56	0.7	Se omite	37	1.0	Se omite
Total		11,987	100.0	100.0	8,400	100.0	100.0	3,587	100.0	100.0

**Tabla 26. Uso combinado de drogas en los últimos 12 meses
(No incluye tabaco)**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Si combinó drogas	4,260	35.5	54.2	3,248	38.7	56.6	1,012	28.2	47.8
No combinó drogas	3,598	30.0	45.8	2,491	29.7	43.4	1,107	30.9	52.2
No aplica	4,129	34.4	Se omite	2,661	31.7	Se omite	1,468	40.9	Se omite
Total	11,987	100.0	100.0	8,400	100.0	100.0	3,587	100.0	100.0

**Tabla 27. Total de drogas consumidas en los últimos 30 días
(Incluye alcohol o tabaco)**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Ninguna	2,191	18.3	1,359	16.2	832	23.2
1 sustancia	3,668	30.6	2,420	28.8	1,248	34.8
2 sustancias	2,897	24.2	2,110	25.1	787	21.9
3 sustancias	1,869	15.6	1,429	17.0	440	12.3
4 sustancias	872	7.3	703	8.4	169	4.7
5 sustancias	322	2.7	247	2.9	75	2.1
6 sustancias	114	1.0	87	1.0	27	0.8
7 sustancias	35	0.3	31	0.4	4	0.1
8 sustancias	10	0.1	7	0.1	3	0.1
9 sustancias	6	0.1	4	0.0	2	0.1
10 sustancias	1	0.0	1	0.0	0	0.0
11-14 sustancias	2	0.0	2	0.0	0	0.0
Total	11,987	100.0	8,400	100.0	3,587	100.0
Media (DE)	1.8 (1.4) drogas		1.9 (1.4) drogas		1.5 (1.3) drogas	
Mediana	2 drogas		2 drogas		1 droga	
Moda	1 droga		1 droga		1 droga	
Decil ₁	Ninguna		Ninguna		Ninguna	

DE= Desviación Estándar

**Tabla 28. Total de drogas ilícitas consumidas en los últimos 30 días
 (No incluye ni alcohol ni tabaco)**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Ninguna	4,676	39.0	3,082	36.7	1,594	44.4
1 sustancia	5,389	45.0	3,825	45.5	1,564	43.6
2 sustancias	1,458	12.2	1,128	13.4	330	9.2
3 sustancias	352	2.9	273	3.3	79	2.2
4 sustancias	82	0.7	69	0.8	13	0.4
5 sustancias	21	0.2	16	0.2	5	0.1
6 sustancias	6	0.1	5	0.1	1	0.0
7 sustancias	1	0.0	0	0.0	1	0.0
8 sustancias	1	0.0	1	0.0	0	0.0
11 sustancias	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Total	11,987	100.0	8,400	100.0	3,587	100.0
Media (DE)	0.8 (0.8) drogas		1.0 (0.9) drogas		0.7 (0.8) drogas	
Mediana	1 droga		1 droga		1 droga	
Moda	1 droga		1 droga		Ninguna	
Decil ₁	Ninguna		Ninguna		Ninguna	

DE= Desviación Estándar

Tabla 29. Consumo de drogas en los últimos 30 días por sustancia

Sustancia	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Tabaco	5,074	42.3	3,850	45.8	1,224	34.1
Tabaco	4,485	37.4	3,476	41.4	1,009	28.1
Nicotina en dispositivo electrónico	1,053	8.8	721	8.6	332	9.3
Alcohol	4,949	41.3	3,656	43.5	1,293	36.0
Bebidas fermentadas	3,868	32.3	2,943	35.0	925	25.8
Bebidas destiladas	1,957	16.3	1,360	16.2	597	16.6
Alcohol puro ("alcohol del 96")	46	0.4	35	0.4	11	0.3
Cannabis	4,045	33.7	3,146	37.5	899	25.1
Mariguana "estándar"	3,788	31.6	2,954	35.2	834	23.3
Mariguana modificada, con alto nivel de THC	314	2.6	240	2.9	74	2.1
Hachís - Resina	34	0.3	27	0.3	7	0.2
Hachís - Aceite o miel	89	0.7	69	0.8	20	0.6
Sustancias similares al cannabis	50	0.4	39	0.5	11	0.3
"Mariguana" sintética	34	0.3	26	0.3	8	0.2
Medicamentos con compuestos cannábicos	16	0.1	13	0.2	3	0.1
Inhalables	276	2.3	236	2.8	40	1.1
Solventes y removedores	165	1.4	142	1.7	23	0.6
Pegamentos	48	0.4	41	0.5	7	0.2
Esmaltes y pinturas	12	0.1	10	0.1	2	0.1
Gasolinas y combustibles	6	0.1	5	0.1	1	0.0
Otros inhalables	51	0.4	43	0.5	8	0.2
Cocaína	1,063	8.9	886	10.5	177	4.9
Cocaína (clorhidrato)	830	6.9	678	8.1	152	4.2
Crack	266	2.2	238	2.8	28	0.8
Otro tipo de cocaína	24	0.2	20	0.2	4	0.1
Basuco (pasta base de cocaína)	10	0.1	10	0.1	0	0.0
Otras presentaciones de cocaína	14	0.1	10	0.1	4	0.1
Metanfetaminas	3,301	27.5	2,180	26.0	1,121	31.3
Metanfetaminas: cristal	3,268	27.3	2,157	25.7	1,111	31.0
Metanfetaminas: hielo	17	0.1	14	0.2	3	0.1
Metanfetaminas: "Metas"	20	0.2	13	0.2	7	0.2
Otros estimulantes del SNC	54	0.5	39	0.5	15	0.4
Sales de baño	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Anfetaminas y derivados	34	0.3	24	0.3	10	0.3
Anorexígenos	4	0.0	4	0.0	0	0.0
Drogas de diseño con efectos estimulantes	11	0.1	6	0.1	5	0.1
Otros estimulantes	5	0.0	5	0.1	0	0.0

Continúa

Tabla 29. Consumo de drogas en los últimos 30 días por sustancia
 (Continuación)

Sustancia	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
MDMA y similares	19	0.2	14	0.2	5	0.1
Éxtasis (MDMA)	17	0.1	13	0.2	4	0.1
Sustancias con efectos similares a MDMA	2	0.0	1	0.0	1	0.0
Drogas de diseño con efectos similares	2	0.0	1	0.0	1	0.0
Piperazinas con efectos similares	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Aminoindanos	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Benzodiacepinas	274	2.3	173	2.1	101	2.8
Benzodiacepinas y sustancias relacionadas	273	2.3	173	2.1	100	2.8
Rohypnol	1	0.0	0	0.0	1	0.0
Otros depresores del SNC	26	0.2	22	0.3	4	0.1
GHB o similares	3	0.0	3	0.0	0	0.0
Sedantes hipnóticos	10	0.1	8	0.1	2	0.1
Otros depresores del SNC	13	0.1	11	0.1	2	0.1
Alucinógenos	119	1.0	89	1.1	30	0.8
LSD /LSA	75	0.6	56	0.7	19	0.5
LSD	74	0.6	55	0.7	19	0.5
LSA	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Plantas alucinógenas o disociativas	15	0.1	10	0.1	5	0.1
Hongos alucinógenos	9	0.1	7	0.1	2	0.1
Peyote (mezcalina)	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Salvia divinorum u otras variedades de salvia	4	0.0	3	0.0	1	0.0
Ololiuqui	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Floripondio	1	0.0	0	0.0	1	0.0
Ayahuasca	1	0.0	0	0.0	1	0.0
Otras plantas con efectos alucinógenos o disociativos	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Alucinógenos sintéticos	37	0.3	29	0.3	8	0.2
Fenciclidina (PCP, polvo de ángel)	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Análogos del PCP	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Ketamina	11	0.1	9	0.1	2	0.1
Dextrometorfano	25	0.2	19	0.2	6	0.2
DMT	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Triptaminas psicodélicas derivadas y análogas del DMT	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Grupo 2C x	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Grupo DO x	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Grupo NBOMe	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Otras drogas de diseño con efectos psicodélicos	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Otras sustancias con efectos psicodélicos	1	0.0	1	0.0	0	0.0

Continúa

Tabla 29. Consumo de drogas en los últimos 30 días por sustancia
 (Continuación)

Sustancia	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Heroína	45	0.4	36	0.4	9	0.3
Heroína blanca	3	0.0	2	0.0	1	0.0
Heroína negra o morena	42	0.4	34	0.4	8	0.2
Opioides (uso fuera de prescripción)	48	0.4	33	0.4	15	0.4
Oxicodona	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Opioides sintéticos	18	0.2	15	0.2	3	0.1
Fentanilo y análogos	10	0.1	5	0.1	5	0.1
Derivados opioides combinados con analgésicos	19	0.2	12	0.1	7	0.2
Desomorfina	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Opiáceos	6	0.1	3	0.0	3	0.1
Opio	2	0.0	1	0.0	1	0.0
Morfina (uso fuera de prescripción)	4	0.0	2	0.0	2	0.1
Codeína (uso fuera de prescripción)	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Sustancias de uso médico	53	0.4	29	0.3	24	0.7
Anticolinérgicos	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Antiespasmódicos	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Antiparkinsonianos	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Anticonvulsivos	2	0.0	1	0.0	1	0.0
Antidepresivos	27	0.2	13	0.2	14	0.4
Antipsicóticos o neurolepticos	3	0.0	1	0.0	2	0.1
Antihistamínicos	4	0.0	3	0.0	1	0.0
Otras sustancias de abuso con utilidad médica	18	0.2	11	0.1	7	0.2
Otras sustancias de abuso	218	1.8	168	2.0	50	1.4
Nitritos	10	0.1	10	0.1	0	0.0
Anestésicos	2	0.0	2	0.0	0	0.0
Bebidas energizantes	196	1.6	149	1.8	47	1.3
Drogas o bebidas inteligentes	3	0.0	1	0.0	2	0.1
Esteroides anabólicos	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Sustancias no clasificadas	3	0.0	2	0.0	1	0.0
Sustancias sin especificar	4	0.0	4	0.0	0	0.0

Tabla 30. Frecuencia de episodios de abuso del consumo de alcohol¹ en los últimos 30 días

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Sin consumo abusivo	805	6.7	18.6	584	7.0	18.0	221	6.2	20.4
< de 1 vez a la semana	1,695	14.1	39.2	1,230	14.6	37.9	465	13.0	43.0
1 o 2 veces a la semana	1,111	9.3	25.7	868	10.3	26.8	243	6.8	22.5
Cada tercer día	318	2.7	7.4	248	3.0	7.6	70	2.0	6.5
Diario	395	3.3	9.1	312	3.7	9.6	83	2.3	7.7
No consumió en los últimos 30 días	7,038	58.7	Se omite	4,744	56.5	Se omite	2,294	64.0	Se omite
Sin información	625	5.2	Se omite	414	4.9	Se omite	211	5.9	Se omite
Total	11,987	100.0	100.0	8,400	100.0	100.0	3,587	100.0	100.0

¹ Consumo de más de cuatro copas en un día para los hombres y de más de tres copas en un día para las mujeres.

Tabla 31. Frecuencia de episodios de abuso del consumo de drogas ilícitas¹ en los últimos 30 días

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
< de 1 vez a la semana	2,188	18.3	32.1	1,521	18.1	30.6	667	18.6	36.2
1 o 2 veces a la semana	1,549	12.9	22.7	1,153	13.7	23.2	396	11.0	21.5
Cada tercer día	1,044	8.7	15.3	796	9.5	16.0	248	6.9	13.4
Diario	2,030	16.9	29.8	1,496	17.8	30.1	534	14.9	28.9
No consumió en los últimos 30 días	4,676	39.0	Se omite	3,082	36.7	Se omite	1,594	44.4	Se omite
Sin información	500	4.2	Se omite	352	4.2	Se omite	148	4.1	Se omite
Total	11,987	100.0	100.0	8,400	100.0	100.0	3,587	100.0	100.0

¹ Consumo de cualquier dosis.

Tabla 32. Problemas asociados al consumo de sustancias

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Problemas de salud	5,591	46.6	3,945	47.0	1,646	45.9
Problemas familiares	9,120	76.1	6,551	78.0	2,569	71.6
Accidentes o lesiones	2,495	20.8	1,861	22.2	634	17.7
Problemas escolares	5,742	47.9	3,903	46.5	1,839	51.3
Problemas laborales	3,113	26.0	2,618	31.2	495	13.8
Problemas psicológicos	7,376	61.5	5,170	61.5	2,206	61.5
Problemas legales	2,161	18.0	1,770	21.1	391	10.9
Conducta antisocial o delictiva	2,304	19.2	1,779	21.2	525	14.6
Otros problemas	1,779	14.8	1,291	15.4	488	13.6
<i>Ningún problema asociado reportado</i>	<i>1,265</i>	<i>10.6</i>	<i>733</i>	<i>8.7</i>	<i>532</i>	<i>14.8</i>
<i>Personas que reportaron dos o más problemas asociados</i>	<i>9,511</i>	<i>79.3</i>	<i>6,820</i>	<i>81.2</i>	<i>2,691</i>	<i>75.0</i>

GLOSARIO

Decil	En estadística descriptiva, es cualquiera de los nueve valores que dividen a un grupo de datos ordenados en diez partes iguales, de manera que cada parte representa 1/10 de la muestra o población.
Droga ilícita de inicio	Es la sustancia ilegal que la persona refirió como la droga con la cual inicio el consumo de drogas. No incluye el inicio del consumo con alcohol o tabaco.
Droga de mayor impacto	Sustancia por la que acuden a tratamiento las personas.
Droga de preferencia	Sustancia que la persona solicitante de tratamiento ha elegido o preferido consumir en el transcurso del último año.
Estrato social	Estimación que hace el profesional de la salud, según su percepción, del estrato al que pertenece el usuario de drogas, considerando aspectos como lugar de residencia, escolaridad, empleo y características manifiestas como higiene y aliño, calidad del vestido, expresión verbal y vocabulario, etc.
Nuevas sustancias de abuso o de uso poco común	Sustancias psicoactivas que han sido conocidas en el mercado por términos tales como “drogas de diseño”, “euforizantes legales”, “hierbas euforizantes”, “sales de baño”, “productos químicos de investigación” y “reactivos de laboratorio” y que no son controladas por la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes ni por el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971, pero que pueden suponer una amenaza para la salud pública. El término “nuevas” no se refiere necesariamente a nuevas invenciones, sino que son sustancias que han aparecido recientemente en el mercado o que su consumo ha cobrado relevancia en los últimos años.
Otras condiciones de salud mental	De acuerdo con la indagación de las personas profesionales de la salud, las personas pueden solicitar atención por otros trastornos mentales y del comportamiento o condiciones asociadas a estos, como son: trastornos mentales y conductuales del niño y el adolescente, depresión, ansiedad, psicosis, demencia, epilepsia, ludopatía, autolesiones, ideación o intento suicida (suicidio) u otro motivo de consulta.
Población en situación de vulnerabilidad	De acuerdo con la Agenda Regional de Desarrollo Social Inclusivo (ARDSI) de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2025), dentro de los grupos en situación de vulnerabilidad se encuentran las mujeres; los pueblos indígenas; la población afrodescendiente; las personas con discapacidad; las personas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+ y personas migrantes. Señalan que las personas que pertenecen a estos grupos poblacionales suelen sufrir desigualdades entrecruzadas.
Tipo de consumo de drogas ilícitas	Características de consumo de sustancias ilegales según motivo, frecuencia y problemas asociados. No incluye el consumo de alcohol y/o tabaco y se clasifica como: experimental, social u ocasional, funcional, disfuncional y en remisión.
Total de drogas consumidas	Número de drogas consumidas (se incluyen las 82 sustancias de seguimiento) en las siguientes categorías: alguna vez en la vida, en el último año y en los últimos 30 días.