

Éxtasis tacha, píldora del amor, happy face, ferrari

Clasificación: droga estimulante combinada con sustancias de acción alucinógena

Definición: sustancia química sintética denominada Metilendioximetanfetamina (MDMA) que libera al cerebro otras sustancias químicas neurotransmisoras como la serotonina y la dopamina que alteran el estado de ánimo. Con efectos alucinógenos.

Presentación: píldoras de diferentes tamaños y colores con logotipos impresos. Generalmente están adulteradas con comprimidos antiparasitarios para perros, talco, anfetaminas o anestésicos y fentanilo para aumentar su tamaño y efectos.

Vía de administración: oral.



Efectos inmediatos

Comienzan después de 30 minutos y alcanzan el punto máximo después de una hora; duran de dos a tres horas.

- Se alteran los sentidos.
- Cosquilleo y aumento de la temperatura corporal.
- Se agudizan la percepción y la energía de manera temporal.
- Pareciera no haber cansancio.
- Puede haber alucinaciones auditivas, visuales o táctiles.

Señales de alerta

- Inquietud permanente.
- Sudoración.
- Temblores.
- Palidez.
- Dilatación pupilar.
- Rechinido de dientes.
- Hiperactividad e insomnio.

- Verborrea.
- Ansiedad y ataques de pánico.
- Conductas agresivas.
- Aislamiento social.
- Descuido de la higiene personal.
- Pérdida de apetito y peso corporal.
- Confusión.



Consecuencias del consumo



- Pérdida repentina de la memoria.
- Conducta alterada.
- Fallas en la coordinación.
- Taquicardia.
- Náusea y vómito.



- Rigidez muscular.
- Tensión en mandíbula y cara.
- Golpe de calor.
- Cansancio extremo.

Otros riesgos



- Inflamación cerebral.
- Se puede interrumpir el flujo sanguíneo hacia el cerebro y causar lesiones permanentes como derrames o embolias.
- Insuficiencia renal y hepática en personas propensas.
- Ataques de pánico y ansiedad por los altos niveles de estimulación.



- El uso crónico puede resultar en un trastorno depresivo.
- Pueden presentarse alucinaciones.
- Deshidratación, convulsiones, coma.
- Desinhibición sexual y propenso a tener sexo sin protección.

Síndrome de abstinencia



- Urgencia incontrolable por consumir.
- Depresión, irritabilidad y paranoia.
- Alteraciones del sueño.
- Fatiga.

