



Cuadro 5.4. Características y patrón de consumo de pacientes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil entre julio y diciembre de 2016.

		CIJ Querétaro (N=138)	Nacional (N=12,096)
Sexo	Hombres	80.4%	82.5%
	Mujeres	19.6%	17.5%
	Razón H:M	4.1 hombres por cada mujer	4.7 hombres por cada mujer
Edad de ingreso	15 a 19 años	45.7%	39.2%
	20 a 24 años	8.7%	14.2%
	25 a 29 años	5.8%	10.1%
	Promedio	19.5 años	22.9 años
Edad de inicio del uso de drogas ilícitas	10 a 14 años	50.4%	43.1%
	15 a 19 años	42.3%	43.0%
	20 a 24 años	2.2%	6.9%
	Promedio	15.5 años	16.0 años
Principales drogas ilícitas de inicio		1. Cannabis (77.5%)	1. Cannabis (74.0%)
		2. Inhalables (13.0%)	2. Inhalables (9.6%)
		3. Cocaína (5.1%)	3. Cocaína (7.3%)
Principales drogas de mayor impacto en el último año		1. Cannabis (45.7%)	1. Cannabis (41.4%)
		2. Inhalables (17.4%)	2. Metanfetaminas (16.1%)
		3. Alcohol (10.1%)	3. Alcohol (11.5%)
		4. Crack (9.4%)	4. Inhalables (7.8%)
		5. Tabaco (6.5%)	5. Crack (6.5%)
Principales drogas consumidas en el último mes		1. Tabaco (63.8%)	1. Tabaco (64.0%)
		2. Alcohol (63.0%)	2. Alcohol (54.4%)
		3. Cannabis (47.8%)	3. Cannabis (52.8%)
		4. Inhalables (19.6%)	4. Metanfetaminas (14.5%)
		5. Crack (13.0%)	5. Inhalables (10.9%)

Fuente:

Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación. **Estadística del consumo de drogas en pacientes de primer ingreso a tratamiento. Segundo semestre del 2016.** México, 2017.

Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación, **Sistema Institucional de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas.** México, 2017.