



Cuadro 5.3. Tendencias del consumo de drogas alguna vez en la vida entre pacientes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil, del primer semestre de 2005 al segundo semestre de 2016, CIJ Xalapa (%).

| Semestre | Total de casos | Sustancias | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|------------|---------|----------|------------|---------|-------|---------------------|---------|----------------------|---------|-------------------|
| | | Tabaco | Alcohol | Cannabis | Inhalables | Cocaína | Crack | Metanfeta- minas | Éxtasis | Benzodiace- pinas | Heroína | Alucinó- genos |
| 2005-1 | 108 | 69.4 | 78.7 | 73.1 | 36.1 | 54.6 | 17.6 | 2.8 | 0.9 | 10.2 | 0.9 | 6.5 |
| 2005-2 | 110 | 73.6 | 81.8 | 68.2 | 36.4 | 59.1 | 26.4 | 2.7 | 4.5 | 10.0 | 1.8 | 4.5 |
| 2006-1 | 113 | 61.9 | 77.9 | 68.1 | 30.1 | 57.5 | 26.5 | 3.5 | 3.5 | 19.5 | 1.8 | 7.1 |
| 2006-2 | 108 | 72.2 | 75.9 | 71.3 | 35.2 | 61.1 | 38.0 | 0.9 | 6.5 | 15.7 | 1.9 | 13.0 |
| 2007-1 | 119 | 71.4 | 82.4 | 63.9 | 39.5 | 51.3 | 30.3 | 4.2 | 4.2 | 13.4 | 0.8 | 12.6 |
| 2007-2 | 113 | 77.0 | 87.6 | 73.5 | 36.3 | 61.1 | 28.3 | 2.7 | 0.9 | 10.6 | 2.7 | 9.7 |
| 2008-1 | 86 | 79.1 | 88.4 | 62.8 | 46.5 | 40.7 | 31.4 | 1.2 | 1.2 | 8.1 | 1.2 | 7.0 |
| 2008-2 | 71 | 77.5 | 83.1 | 74.6 | 35.2 | 39.4 | 15.5 | 2.8 | 5.6 | 7.0 | 2.8 | 8.5 |
| 2009-1 | 91 | 70.3 | 80.2 | 69.2 | 49.5 | 39.6 | 20.9 | 0.0 | 2.2 | 16.5 | 1.1 | 9.9 |
| 2009-2 | 89 | 76.4 | 83.1 | 74.2 | 25.8 | 47.2 | 28.1 | 5.6 | 6.7 | 14.6 | 0.0 | 13.5 |
| 2010-1 | 81 | 66.7 | 70.4 | 70.4 | 34.6 | 38.3 | 13.6 | 2.5 | 1.2 | 12.3 | 1.2 | 3.7 |
| 2010-2 | 75 | 69.3 | 84.0 | 76.0 | 41.3 | 45.3 | 26.7 | 1.3 | 2.7 | 9.3 | 0.0 | 13.3 |
| 2011-1 | 91 | 72.5 | 74.7 | 74.7 | 37.4 | 35.2 | 23.1 | 3.3 | 3.3 | 13.2 | 1.1 | 7.7 |
| 2011-2 | 81 | 71.6 | 84.0 | 80.2 | 43.2 | 49.4 | 23.5 | 4.9 | 4.9 | 7.4 | 1.2 | 9.9 |
| 2012-1 | 67 | 65.7 | 83.6 | 91.0 | 35.8 | 32.8 | 17.9 | 6.0 | 4.5 | 13.4 | 0.0 | 16.4 |
| 2012-2 | 69 | 56.5 | 62.3 | 72.5 | 29.0 | 29.0 | 18.8 | 2.9 | 2.9 | 4.3 | 0.0 | 7.2 |
| 2013-1 | 80 | 63.8 | 71.3 | 81.3 | 28.8 | 27.5 | 17.5 | 1.3 | 7.5 | 11.3 | 0.0 | 10.0 |
| 2013-2 | 55 | 58.2 | 72.7 | 89.1 | 25.5 | 23.6 | 18.2 | 1.8 | 5.5 | 3.6 | 0.0 | 9.1 |
| 2014-1 | 91 | 63.7 | 68.1 | 92.3 | 28.6 | 25.3 | 14.3 | 2.2 | 1.1 | 6.6 | 0.0 | 5.5 |
| 2014-2 | 80 | 58.8 | 62.5 | 90.0 | 36.3 | 18.8 | 10.0 | 2.5 | 5.0 | 16.3 | 0.0 | 6.3 |
| 2015-1 | 71 | 64.8 | 69.0 | 91.5 | 32.4 | 19.7 | 5.6 | 0.0 | 4.2 | 4.2 | 1.4 | 9.9 |
| 2015-2 | 96 | 55.2 | 56.3 | 92.7 | 20.8 | 13.5 | 5.2 | 4.2 | 2.1 | 6.3 | 0.0 | 3.1 |
| 2016-1 | 73 | 67.1 | 69.9 | 94.5 | 30.1 | 12.3 | 8.2 | 4.1 | 4.1 | 5.5 | 1.4 | 4.1 |
| 2016-2 | 107 | 83.2 | 89.7 | 93.5 | 36.4 | 29.9 | 14.0 | 3.7 | 4.7 | 20.6 | 0.0 | 13.1 |

Fuente: Centros de Integración Juvenil, Sistema Institucional de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas. **Tendencias del consumo de drogas alguna vez en la vida en Centros de Integración Juvenil. Primer semestre de 2005 – Segundo semestre de 2016 (Nivel Nacional y Entidades Federativas).** México, 2017.