



**Cuadro 5.4. Características y patrón de consumo de pacientes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil entre julio y diciembre de 2016.**

		<b>CIJ Villahermosa (N=68)</b>	<b>Nacional (N=12,096)</b>
<b>Sexo</b>	Hombres	80.9%	82.5%
	Mujeres	19.1%	17.5%
	Razón H:M	4.2 hombres por cada mujer	4.7 hombres por cada mujer
<b>Edad de ingreso</b>	15 a 19 años	45.6%	39.2%
	20 a 24 años	17.6%	14.2%
	25 a 29 años	7.4%	10.1%
	Promedio	20.3 años	22.9 años
<b>Edad de inicio del uso de drogas ilícitas</b>	10 a 14 años	42.6%	43.1%
	15 a 19 años	44.1%	43.0%
	20 a 24 años	8.8%	6.9%
	Promedio	16 años	16.0 años
<b>Principales drogas ilícitas de inicio</b>		1. Cannabis (85.3%)	1. Cannabis (74.0%)
		2. Cocaína (10.3%)	2. Inhalables (9.6%)
		3. Crack (2.9%)	3. Cocaína (7.3%)
<b>Principales drogas de mayor impacto en el último año</b>		1. Cannabis (45.6%)	1. Cannabis (41.4%)
		2. Crack (16.2%)	2. Metanfetaminas (16.1%)
		3. Alcohol (14.7%)	3. Alcohol (11.5%)
		4. Tabaco (10.3%)	4. Inhalables (7.8%)
		5. Cocaína (10.3%)	5. Crack (6.5%)
<b>Principales drogas consumidas en el último mes</b>		1. Alcohol (61.8%)	1. Tabaco (64.0%)
		2. Tabaco (60.3%)	2. Alcohol (54.4%)
		3. Cannabis (55.9%)	3. Cannabis (52.8%)
		4. Cocaína (26.5%)	4. Metanfetaminas (14.5%)
		5. Crack (22.1%)	5. Inhalables (10.9%)

**Fuente:**

Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación. **Estadística del consumo de drogas en pacientes de primer ingreso a tratamiento. Segundo semestre del 2016.** México, 2017.

Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación, **Sistema Institucional de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas.** México, 2017.