



Cuadro 5.4. Características y patrón de consumo de pacientes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil entre julio y diciembre de 2016.

		CIJ Acapulco (N=124)	Estado de Guerrero (N=263)	Nacional (N=12,096)
<b>Sexo</b>	Hombres	79.0%	79.1%	82.5%
	Mujeres	21.0%	20.9%	17.5%
	Razón H:M	3.8 hombres por cada mujer	3.8 hombres por cada mujer	4.7 hombres por cada mujer
<b>Edad de ingreso</b>	15 a 19 años	46.8%	44.5%	39.2%
	20 a 24 años	21.0%	16.7%	14.2%
	25 a 29 años	5.6%	8.0%	10.1%
	Promedio	20.6 años	21.4 años	22.9 años
<b>Edad de inicio del uso de drogas ilícitas</b>	10 a 14 años	41.1%	43.7%	43.1%
	15 a 19 años	49.2%	42.6%	43.0%
	20 a 24 años	4.0%	6.8%	6.9%
	Promedio	15.6 años	15.8 años	16.0 años
<b>Principales drogas ilícitas de inicio</b>	1. Cannabis (77.4%)	1. Cannabis (77.2%)	1. Cannabis (74.0%)	
	2. Inhalables (7.3%)	2. Cocaína (7.6%)	2. Inhalables (9.6%)	
	3. Cocaína (4.8%)	3. Inhalables (6.8%)	3. Cocaína (7.3%)	
	3. Benzodiacepinas (4.8%)			
<b>Principales drogas de mayor impacto en el último año</b>	1. Cannabis (52.8%)	1. Cannabis (48.8%)	1. Cannabis (41.4%)	
	2. Alcohol (14.6%)	2. Alcohol (16.2%)	2. Metanfetaminas (16.1%)	
	3. Tabaco (10.6%)	3. Inhalables (7.7%)	3. Alcohol (11.5%)	
	4. Inhalables (5.7%)	3. Metanfetaminas (7.7%)	4. Inhalables (7.8%)	
	4. Metanfetaminas (5.7%)	5. Tabaco (7.3%)	5. Crack (6.5%)	
<b>Principales drogas consumidas en el último mes</b>	1. Cannabis (59.7%)	1. Cannabis (60.1%)	1. Tabaco (64.0%)	
	2. Tabaco (50.8%)	2. Tabaco (59.7%)	2. Alcohol (54.4%)	
	3. Alcohol (46.0%)	3. Alcohol (54.4%)	3. Cannabis (52.8%)	
	4. Cocaína (8.9%)	4. Cocaína (11.8%)	4. Metanfetaminas (14.5%)	
	5. Inhalables (8.1%)	5. Inhalables (11.4%)	5. Inhalables (10.9%)	

Fuente: Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación, Sistema Institucional de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas. México, 2017.