



**Cuadro 5.4. Características y patrón de consumo de pacientes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil entre julio y diciembre de 2016.**

		CIJ Gustavo A. Madero Aragón (N=194)	Delegación Gustavo A. Madero (N=359)	Ciudad de México (N=2,267)	Nacional (N=12,096)
<b>Sexo</b>	Hombres	89.7%	89.1%	83.1%	82.5%
	Mujeres	10.3%	10.9%	16.9%	17.5%
	Razón H:M	8.7 hombres por cada mujer	8.2 hombres por cada mujer	4.9 hombres por cada mujer	4.7 hombres por cada mujer
<b>Edad de ingreso</b>	15 a 19 años	27.8%	34.5%	35.5%	39.2%
	20 a 24 años	14.4%	16.4%	17.6%	14.2%
	25 a 29 años	12.4%	10.6%	10.0%	10.1%
	Promedio	29.3 años	25.9 años	24.0 años	22.9 años
<b>Edad de inicio del uso de drogas ilícitas</b>	10 a 14 años	18.6%	31.5%	37.9%	43.1%
	15 a 19 años	42.8%	44.0%	45.7%	43.0%
	20 a 24 años	11.3%	7.8%	7.2%	6.9%
	Promedio	21.5 años	18.6 años	16.7 años	16.0 años
<b>Principales drogas ilícitas de inicio</b>	1. Cannabis (49.5%)	1. Cannabis (63.0%)	1. Cannabis (70.0%)	1. Cannabis (74.0%)	
	2. Otras drogas/Otros estimulantes (22.7%)	2. Inhalables (12.3%)	2. Inhalables (14.4%)	2. Inhalables (9.6%)	
	3. Inhalables (11.3%)	3. Cocaína (6.7%)	3. Cocaína (6.3%)	3. Cocaína (7.3%)	
<b>Principales drogas de mayor impacto en el último año</b>	1. Cannabis (33.3%)	1. Cannabis (38.7%)	1. Cannabis (41.1%)	1. Cannabis (41.4%)	
	2. Otras drogas/Otros estimulantes (17.2%/16.5%)	2. Alcohol (12.6%)	2. Crack (15.1%)	2. Metanfetaminas (16.1%)	
	3. Crack (13.0%)	3. Crack (11.5%)	3. Alcohol (13.3%)	3. Alcohol (11.5%)	
	4. Alcohol (9.9%)	4. Inhalables (8.7%)	4. Inhalables (11.6%)	4. Inhalables (7.8%)	
	5. Inhalables (8.3%)	5. Tabaco (8.1%)	5. Tabaco (6.8%)	5. Crack (6.5%)	
	5. Cocaína (8.3%)				
<b>Principales drogas consumidas en el último mes</b>	1. Tabaco (48.5%)	1. Tabaco (56.8%)	1. Tabaco (62.4%)	1. Tabaco (64.0%)	
	2. Alcohol (40.7%)	2. Alcohol (51.0%)	2. Alcohol (57.4%)	2. Alcohol (54.4%)	
	3. Cannabis (36.6%)	3. Cannabis (44.8%)	3. Cannabis (51.6%)	3. Cannabis (52.8%)	
	4. Inhalables (12.4%)	4. Inhalables (14.2%)	4. Inhalables (17.3%)	4. Metanfetaminas (14.5%)	
	5. Cocaína (12.4%)	5. Crack (12.5%)	5. Crack (16.6%)	5. Inhalables (10.9%)	
	6. Crack (12.4%)				

**Fuentes:** Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación. **Estadística del consumo de drogas en pacientes de primer ingreso a tratamiento. Segundo semestre del 2016.** México, 2017. Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación, **Sistema Institucional de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas.** México, 2017.