


Cuadro 5.2. Tendencias del consumo de drogas alguna vez en la vida entre pacientes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil, del primer semestre de 2005 al segundo semestre de 2016, Ciudad de México (%).

Semestre	Total de casos	Sustancias										
		Tabaco	Alcohol	Cannabis	Inhalables	Cocaína	Crack	Metanfetaminas	Éxtasis	Benzodiacepinas	Heroína	Alucinógenos
2005-1	2,467	83.5	85.6	68.6	38.4	41.7	51.2	4.0	4.5	16.8	1.5	9.5
2005-2	2,165	83.8	87.5	69.1	42.9	41.3	52.7	2.6	5.5	17.6	1.5	10.3
2006-1	2,250	83.0	86.0	69.9	45.6	38.3	50.5	3.1	5.7	17.4	1.0	11.0
2006-2	2,008	84.4	86.5	66.1	43.5	38.0	51.5	2.9	5.4	15.7	1.3	9.7
2007-1	2,367	81.5	86.9	65.6	46.9	35.9	48.0	3.8	6.0	14.7	1.1	10.6
2007-2	2,229	83.0	87.3	66.1	49.6	36.6	46.7	2.9	5.0	13.5	0.8	10.0
2008-1	2,782	81.0	85.8	63.7	52.5	32.6	42.0	2.6	5.2	12.0	1.4	9.5
2008-2	2,516	79.3	86.1	63.0	58.3	31.8	38.4	2.5	4.8	11.4	1.1	9.5
2009-1	2,974	76.7	84.5	65.2	57.1	27.6	32.9	2.6	4.8	9.3	0.8	9.3
2009-2	2,886	78.4	85.1	69.0	54.0	29.2	32.7	3.5	5.1	9.0	1.1	10.2
2010-1	3,596	72.9	82.5	65.0	55.7	22.1	26.1	3.1	4.3	7.8	0.8	9.3
2010-2	3,491	76.3	83.4	68.4	55.1	25.8	28.1	3.1	4.8	8.2	0.9	10.3
2011-1	3,641	78.6	84.9	69.7	54.2	24.9	26.9	4.0	6.2	9.8	0.8	10.5
2011-2	3,304	80.2	87.3	72.5	52.8	26.8	29.1	4.1	6.2	9.1	1.0	11.5
2012-1	3,267	83.1	88.7	74.0	53.0	27.8	29.6	4.8	7.1	9.4	1.0	12.6
2012-2	2,849	81.3	88.3	78.3	45.5	26.9	26.1	5.4	7.1	7.8	0.7	11.0
2013-1	3,141	79.9	87.3	82.2	39.8	26.5	27.0	4.2	7.5	8.1	0.7	12.2
2013-2	2,774	79.1	85.4	83.6	38.2	26.7	24.7	4.8	7.3	8.3	0.6	13.2
2014-1	2,690	79.5	85.6	84.9	35.0	26.3	24.1	5.0	7.7	7.1	0.5	12.1
2014-2	2,324	80.4	85.2	85.6	36.7	28.4	25.2	4.7	7.2	7.3	0.5	12.4
2015-1	2,468	78.9	83.9	85.4	36.4	28.9	24.0	5.3	6.8	7.7	0.6	13.7
2015-2	2,024	80.6	86.3	86.4	35.3	30.2	25.5	5.2	7.8	8.0	0.5	14.1
2016-1	2,164	78.9	85.1	85.6	32.7	32.7	26.2	6.3	7.4	9.1	0.5	13.2
2016-2	2,267	84.4	88.5	84.8	35.5	36.7	32.7	6.8	8.6	10.1	0.7	16.9

Fuente: Centros de Integración Juvenil, Sistema Institucional de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas. **Tendencias del consumo de drogas alguna vez en la vida en Centros de Integración Juvenil. Primer semestre de 2005 – Segundo semestre de 2016 (Nivel Nacional y Entidades Federativas).** México, 2017.

Gráfica E. Tendencias del consumo de drogas alguna vez en la vida entre pacientes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil, del primer semestre de 2005 al segundo semestre de 2016, CIJ Venustiano Carranza (%)



Fuente: Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación, **Sistema Institucional de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas**. México, 2017.

Cuadro 5.4. Características y patrón de consumo de pacientes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil entre julio y diciembre de 2016.

		CIJ Venustiano Carranza (N=153)	Ciudad de México (N=2,267)	Nacional (N=12,096)
Sexo	Hombres	80.4%	83.1%	82.5%
	Mujeres	19.6%	16.9%	17.5%
	Razón H:M	4.1 hombres por cada mujer	4.9 hombres por cada mujer	4.7 hombres por cada mujer
Edad de ingreso	15 a 19 años	33.3%	35.5%	39.2%
	20 a 24 años	14.4%	17.6%	14.2%
	25 a 29 años	13.1%	10.0%	10.1%
Edad de inicio del uso de drogas ilícitas	Promedio	24.1 años	24.0 años	22.9 años
	10 a 14 años	39.5%	37.9%	43.1%
	15 a 19 años	47.4%	45.7%	43.0%
	Promedio	16.7 años	16.7 años	16.0 años
Principales drogas ilícitas de inicio	1. Cannabis (71.3%)	1. Cannabis (70.0%)	1. Cannabis (74.0%)	
	2. Inhalables (13.7%)	2. Inhalables (14.4%)	2. Inhalables (9.6%)	
	3. Cocaína (7.2%)	3. Cocaína (6.3%)	3. Cocaína (7.3%)	
Principales drogas de mayor impacto en el último año	1. Cannabis (43.3%)	1. Cannabis (41.1%)	1. Cannabis (41.4%)	
	2. Crack (12.7%)	2. Crack (15.1%)	2. Metanfetaminas (16.1%)	
	3. Alcohol (11.3%)	3. Alcohol (13.3%)	3. Alcohol (11.5%)	
	3. Inhalables (11.3%)	4. Inhalables (11.6%)	4. Inhalables (7.8%)	
	5. Cocaína (10.0%)	5. Tabaco (6.8%)	5. Crack (6.5%)	
Principales drogas consumidas en el último mes	1. Tabaco (60.8%)	1. Tabaco (62.4%)	1. Tabaco (64.0%)	
	2. Alcohol (58.2%)	2. Alcohol (57.4%)	2. Alcohol (54.4%)	
	3. Cannabis (47.7%)	3. Cannabis (51.6%)	3. Cannabis (52.8%)	
	4. Cocaína (16.3%)	4. Inhalables (17.3%)	4. Metanfetaminas (14.5%)	
	5. Inhalables (15.0%)	5. Crack (16.6%)	5. Inhalables (10.9%)	

Fuentes: Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación. **Estadística del consumo de drogas en pacientes de primer ingreso a tratamiento. Segundo semestre del 2016.** México, 2017.

Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación, **Sistema Institucional de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas.** México, 2017.