

Cuadro 5.2. Tendencias del consumo de drogas alguna vez en la vida entre pacientes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil, del primer semestre de 2005 al segundo semestre de 2016, Ciudad de México (%).

| Semestre | Total de casos | Sustancias | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|------------|---------|----------|------------|---------|-------|-----------------|---------|------------------|---------|----------------|
| | | Tabaco | Alcohol | Cannabis | Inhalables | Cocaína | Crack | Metanfeta-minas | Éxtasis | Benzodiace-pinas | Heroína | Alucinó-ge-nos |
| 2005-1 | 2,467 | 83.5 | 85.6 | 68.6 | 38.4 | 41.7 | 51.2 | 4.0 | 4.5 | 16.8 | 1.5 | 9.5 |
| 2005-2 | 2,165 | 83.8 | 87.5 | 69.1 | 42.9 | 41.3 | 52.7 | 2.6 | 5.5 | 17.6 | 1.5 | 10.3 |
| 2006-1 | 2,250 | 83.0 | 86.0 | 69.9 | 45.6 | 38.3 | 50.5 | 3.1 | 5.7 | 17.4 | 1.0 | 11.0 |
| 2006-2 | 2,008 | 84.4 | 86.5 | 66.1 | 43.5 | 38.0 | 51.5 | 2.9 | 5.4 | 15.7 | 1.3 | 9.7 |
| 2007-1 | 2,367 | 81.5 | 86.9 | 65.6 | 46.9 | 35.9 | 48.0 | 3.8 | 6.0 | 14.7 | 1.1 | 10.6 |
| 2007-2 | 2,229 | 83.0 | 87.3 | 66.1 | 49.6 | 36.6 | 46.7 | 2.9 | 5.0 | 13.5 | 0.8 | 10.0 |
| 2008-1 | 2,782 | 81.0 | 85.8 | 63.7 | 52.5 | 32.6 | 42.0 | 2.6 | 5.2 | 12.0 | 1.4 | 9.5 |
| 2008-2 | 2,516 | 79.3 | 86.1 | 63.0 | 58.3 | 31.8 | 38.4 | 2.5 | 4.8 | 11.4 | 1.1 | 9.5 |
| 2009-1 | 2,974 | 76.7 | 84.5 | 65.2 | 57.1 | 27.6 | 32.9 | 2.6 | 4.8 | 9.3 | 0.8 | 9.3 |
| 2009-2 | 2,886 | 78.4 | 85.1 | 69.0 | 54.0 | 29.2 | 32.7 | 3.5 | 5.1 | 9.0 | 1.1 | 10.2 |
| 2010-1 | 3,596 | 72.9 | 82.5 | 65.0 | 55.7 | 22.1 | 26.1 | 3.1 | 4.3 | 7.8 | 0.8 | 9.3 |
| 2010-2 | 3,491 | 76.3 | 83.4 | 68.4 | 55.1 | 25.8 | 28.1 | 3.1 | 4.8 | 8.2 | 0.9 | 10.3 |
| 2011-1 | 3,641 | 78.6 | 84.9 | 69.7 | 54.2 | 24.9 | 26.9 | 4.0 | 6.2 | 9.8 | 0.8 | 10.5 |
| 2011-2 | 3,304 | 80.2 | 87.3 | 72.5 | 52.8 | 26.8 | 29.1 | 4.1 | 6.2 | 9.1 | 1.0 | 11.5 |
| 2012-1 | 3,267 | 83.1 | 88.7 | 74.0 | 53.0 | 27.8 | 29.6 | 4.8 | 7.1 | 9.4 | 1.0 | 12.6 |
| 2012-2 | 2,849 | 81.3 | 88.3 | 78.3 | 45.5 | 26.9 | 26.1 | 5.4 | 7.1 | 7.8 | 0.7 | 11.0 |
| 2013-1 | 3,141 | 79.9 | 87.3 | 82.2 | 39.8 | 26.5 | 27.0 | 4.2 | 7.5 | 8.1 | 0.7 | 12.2 |
| 2013-2 | 2,774 | 79.1 | 85.4 | 83.6 | 38.2 | 26.7 | 24.7 | 4.8 | 7.3 | 8.3 | 0.6 | 13.2 |
| 2014-1 | 2,690 | 79.5 | 85.6 | 84.9 | 35.0 | 26.3 | 24.1 | 5.0 | 7.7 | 7.1 | 0.5 | 12.1 |
| 2014-2 | 2,324 | 80.4 | 85.2 | 85.6 | 36.7 | 28.4 | 25.2 | 4.7 | 7.2 | 7.3 | 0.5 | 12.4 |
| 2015-1 | 2,468 | 78.9 | 83.9 | 85.4 | 36.4 | 28.9 | 24.0 | 5.3 | 6.8 | 7.7 | 0.6 | 13.7 |
| 2015-2 | 2,024 | 80.6 | 86.3 | 86.4 | 35.3 | 30.2 | 25.5 | 5.2 | 7.8 | 8.0 | 0.5 | 14.1 |
| 2016-1 | 2,164 | 78.9 | 85.1 | 85.6 | 32.7 | 32.7 | 26.2 | 6.3 | 7.4 | 9.1 | 0.5 | 13.2 |
| 2016-2 | 2,267 | 84.4 | 88.5 | 84.8 | 35.5 | 36.7 | 32.7 | 6.8 | 8.6 | 10.1 | 0.7 | 16.9 |

Fuente: Centros de Integración Juvenil, Sistema Institucional de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas. **Tendencias del consumo de drogas alguna vez en la vida en Centros de Integración Juvenil. Primer semestre de 2005 – Segundo semestre de 2016 (Nivel Nacional y Entidades Federativas).** México, 2017.