

Cuadro 5.4. Características y patrón de consumo de pacientes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil entre julio y diciembre de 2016.

	CIJ Venustiano Carranza (N=153)	Ciudad de México (N=2,267)	Nacional (N=12,096)
Sexo	Hombres	80.4%	82.5%
	Mujeres	19.6%	17.5%
	Razón H:M	4.1 hombres por cada mujer	4.9 hombres por cada mujer
Edad de ingreso	15 a 19 años	33.3%	39.2%
	20 a 24 años	14.4%	14.2%
	25 a 29 años	13.1%	10.1%
Edad de inicio del uso de drogas ilícitas	Promedio	24.1 años	22.9 años
	10 a 14 años	39.5%	43.1%
	15 a 19 años	47.4%	43.0%
	Promedio	16.7 años	16.0 años
Principales drogas ilícitas de inicio	1. Cannabis (71.3%)	1. Cannabis (70.0%)	1. Cannabis (74.0%)
	2. Inhalables (13.7%)	2. Inhalables (14.4%)	2. Inhalables (9.6%)
	3. Cocaína (7.2%)	3. Cocaína (6.3%)	3. Cocaína (7.3%)
Principales drogas de mayor impacto en el último año	1. Cannabis (43.3%)	1. Cannabis (41.1%)	1. Cannabis (41.4%)
	2. Crack (12.7%)	2. Crack (15.1%)	2. Metanfetaminas (16.1%)
	3. Alcohol (11.3%)	3. Alcohol (13.3%)	3. Alcohol (11.5%)
	3. Inhalables (11.3%)	4. Inhalables (11.6%)	4. Inhalables (7.8%)
	5. Cocaína (10.0%)	5. Tabaco (6.8%)	5. Crack (6.5%)
Principales drogas consumidas en el último mes	1. Tabaco (60.8%)	1. Tabaco (62.4%)	1. Tabaco (64.0%)
	2. Alcohol (58.2%)	2. Alcohol (57.4%)	2. Alcohol (54.4%)
	3. Cannabis (47.7%)	3. Cannabis (51.6%)	3. Cannabis (52.8%)
	4. Cocaína (16.3%)	4. Inhalables (17.3%)	4. Metanfetaminas (14.5%)
	5. Inhalables (15.0%)	5. Crack (16.6%)	5. Inhalables (10.9%)

Fuentes: Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación. **Estadística del consumo de drogas en pacientes de primer ingreso a tratamiento. Segundo semestre del 2016.** México, 2017.

Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación, **Sistema Institucional de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas.** México, 2017.