



## **DIAGNÓSTICO DEL CONSUMO DE DROGAS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL CIJ ECATEPEC**

El conocimiento de la magnitud, forma, distribución y tendencias del uso de sustancias psicoactivas constituye un referente necesario para el desarrollo y aplicación de los programas de atención. Por lo anterior, en esta sección se presentan datos epidemiológicos recientes, complementados con una revisión bibliográfica de factores psicosociales de riesgo, los cuales ofrecen igualmente un parámetro útil para el diseño de programas, tanto preventivos como de tratamiento y rehabilitación.

El siguiente panorama epidemiológico fue elaborado con datos nacionales, estatales y locales de prevalencia del consumo de drogas, alcohol y tabaco, provenientes de fuentes disponibles, atendiendo particularmente a la forma en que éste se presenta en el área de influencia del CIJ Ecatepec.

La información comprende datos de tres fuentes: la Encuesta Nacional del Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017 (ENCODAT 2016-2017); la Encuesta Nacional del Consumo de Drogas en Estudiantes 2014 (ENCODE 2014) y el Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas de Centros de Integración Juvenil (CIJ), mismos que se describen a continuación.

### **Encuesta Nacional del Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017 (ENCODAT 2016-2017)**

Esta encuesta ofrece datos nacionales y estatales que representan la fuente más confiable para determinar la magnitud, forma y tendencias del problema en la población general de nuestro país (población de 12 a 65 años captada en hogares).

Para contextualizar el problema del consumo de drogas ilícitas, conviene citar en primera instancia algunos datos sobre el uso alcohol, tabaco y de sustancias lícitas.

Así, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Adicciones 2011, el porcentaje de la población entre 12 y 65 años que había fumado alguna vez en la vida ascendía a 48%, mientras que en la Encuesta Nacional del Consumo de Drogas, alcohol y tabaco 2016-2017 (ENCODAT 2016-2017), indica que en el año 2016 el 51% había fumado alguna vez en la vida, estos datos indica un incremento en el consumo de tabaco de la población entre 12 y 65 años en 3 puntos porcentuales (**Gráfica A**).



En tanto que el porcentaje del consumo de alcohol a nivel nacional, alcanzo un 71% en la ENA 2011 y el mismo porcentaje en la ENCODAT 2016, indicandono que en la población entre 12 y 65 años se ha mantenido el porcentaje de las personas que han consumido alcohol **(Gráfica B)**.

En lo referente a drogas ilícitas alguna vez en la vida a nivel nacional, en la población de 12 a 65 años encontramos que en el consumo de cualquier droga, la ENA 2008 arrojó el porcentaje de 5.7%, en la ENA 2011 7.8% y en la ENCODAT 2016 10.3%, indicando un crecimiento a nivel nacional de personas que consumen cualquier droga, alguna vez en la vida en edades de 12 a 65 años. Siguiendo con el mismo análisis, pero en el rubro de drogas ilegales encontramos en la ENA 2008 un porcentaje de 5.2%, en la ENA 2011, 7.2% y en la ENCODAT 2016 9.9%, indicandonos de igual manera un incremento en el número de personas que consumen drogas. Y en el rubro de drogas médicas encontramos en la ENA 2008 un porcentaje de 1%, en la ENA 2011, 1.4% y en la ENCODAT 2016 1.3% destacando un ligero decremento en 0.1 porcentual de las personas que alguna vez en la vida de 12 a 65 años han consumido drogas de uso médico **(Gráfica C)**.

Por último, el consumo de drogas alguna vez en la vida en edades de 12 a 65 años por región que abarca los estados de Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Hidalgo, Querétaro y Guanajuato, en el rubro de consumo de cualquier droga arrojó resultados de consumo de 5.3 % en el año 2008, 6.2 % en el año 2011 y 9.4 % en el 2016, indicandonos un crecimiento en el número de personas que han consumido cualquier droga, lo mismo sucede en el consumo de drogas ilegales pues se observan datos de 4.8% en el año 2008, 6.2 % en el año 2011 y 9.1 % en el 2016, reflejando también un incremento en el consumo de drogas ilegales, sin embargo, en lo que se refiere al consumo de drogas de uso médico alguna vez en la vida en edades de 12 a 65 años se observa un decremento en el consumo de estas drogas de 0.2 porcentual siendo los porcentajes los siguientes: año 2008, 0.7 %, en el año 2011 1.2 % y 1 % en el 2016 **(Gráfica D)**.

### Tabaco

De acuerdo con la Encuesta Nacional del Consumo de Tabaco 2016-2017 (ENCODAT 2016 2017), el porcentaje de la población entre 12 y 65 años que había fumado alguna vez en la vida a nivel nacional, ascendía a 51% (65.7% de los hombres y 37.4 % de las mujeres), los que habían fumado más de 100 cigarrillos ascendía a 21.5 % (33% de los



hombres y 10.7 % de las mujeres), los que tuvieron consumo de tabaco en el último año ascendía a 20.8 % (31.4 % de los hombres y 10.9 % de las mujeres), y los que son fumadores actuales arroja el porcentaje de 17.6 % (27.1% de los hombres y 8.7 % de las mujeres) **(Cuadro 1.1)**.

En tanto que el porcentaje de fumadores en la población del Estado de México entre 12 y 65 años alcanzó un 24.5 % (35.8 % de los hombres y 14.1 % de las mujeres), en lo referente a las personas que fuman mas de 100 cigarros, datos por encima de la media nacional (21.5%), 3 puntos porcentuales por arriba del consumo a nivel nacional y destacando el porcentaje de consumo en mujeres con un aumento de casi un 4 %, lo mismo sucede en lo referente al consumo de tabaco en el último año, que arrojo resultados de 23.8 % (35.7 % de los hombres y 12.8 % de las mujeres), datos por encima de la media nacional en 3 puntos porcentuales y en el consumo de tabaco actual el porcentaje es de 19.9 % (31.1 % de los hombres y 9.6 % de las mujeres). Lo anterior no permite observar que estos datos de consumo de tabaco están por arriba de la media nacional, observando altos porcentajes de consumo en hombres que en mujeres, lo que nos indica lo importante que es la prevención del consumo de tabaco en instituciones educativas, de salud y en la comunidad **(Cuadro 1.2)**.

En lo que respecta al consumo actual de tabaco en población de 12 a 65 años por sexo a nivel nacional y estado de México (absolutos), nos indica que a nivel nacional el consumo de tabaco total es de 14.9 millones de personas fumadoras (11.1 millones de hombres y 3.8 millones de mujeres) y en el Estado de México 2.3 millones de personas fumadoras (1.8 millones de hombres y 586 mil mujeres), datos por debajo de la media nacional, pero destaca que el numero de hombres fumadores supera en más del 300% al número de mujeres fumadoras. Y por sexo en el Estado de México el porcentaje es de 31.1% en hombres y de 9.6 % en mujeres de un total de 19.1% reforzando el análisis anteriormente dicho el consumo de hombres es tres veces mayor que el de mujeres **(Cuadros 1.3 y 1.4)**.

Por último, la edad promedio de inicio en el consumo de tabaco a nivel nacional fue de 19.3 años, y para el Estado de México de 19.6 años, estos datos nos indican que no hay variaciones significativas en la edad promedio de inicio, pero si nos indica la importancia de reforzar las actividades preventivas con niños y adolescentes en materia de tabaco.

## Alcohol

Con respecto al consumo de alcohol, nivel nacional según sexo y edad en la Población de 12 a 65 años de edad, se observa que la población de 12 a 17 años, respecto al consumo diario de alcohol, fue de 2.5%, para los hombres y 2.7% para las mujeres, al mismo tiempo, que los bebedores consuetudinarios representaban un 4.4% de los hombres y 3.9% de las mujeres, mientras que los consumidores de dependencia fue de 0.9% para los hombres y de 0.7% para las mujeres. En la población adulta de 18 a 65 años de edad, el porcentaje de bebedores de consumo diario, alcanzó un 5.0% de los varones y 1.2% de las mujeres, mientras que los bebedores consuetudinarios alcanzó 15.8% para los varones y 3.5% para las mujeres, mientras que los consumidores de dependencia fue de 3.5% en hombres y de 0.6% en mujeres **(Cuadro 2.1)**.

En el Estado de México la población adolescente de 12 a 17 años que tiene un consumo diario de alcohol en varones de 1.2% y en mujeres 3.8%, siendo más alto en mujeres que en los hombres; en lo que respecta al consumo consuetudinario en esta población el porcentaje de consumo en hombres es de 5.6% y mujeres es de 4.9% por lo que se observa más el consumo en varones contrario a lo que se observó en el consumo diario, sin embargo, en la población adulta de 18 a 65 años de edad, tiene un consumo diario de alcohol, de 3.7% en hombres y 0.7% en mujeres, donde el consumo es más significativo en hombres y en lo que respecta al consumo consuetudinario en adultos arrojó 12.9% en hombres y 2.1% en mujeres, también por encima en consumo de alcohol en hombres que en mujeres **(Cuadro 2.2)**.

En lo que respecta a la edad de inicio del consumo de alcohol en la población de 12 a 65 años según sexo y edad. Nivel nacional el total de adolescentes que iniciaron el consumo de alcohol de 17 años y menos es de 53.1% de este el 61.5% corresponde a los hombres y el 43.1% a las mujeres, en el rango de edad de 18 a 25 años el total de adultos que iniciaron consumo de alcohol en este rango de edad es de 41.3% en donde el 36.5% corresponde a los hombres y el 47.1% a las mujeres; y en el rango de edad de 26 a 65 años el total de personas que iniciaron el consumo de alcohol es de 5.6%, de este el 2.0% corresponde a los hombres y el 9.8% a las mujeres **(Cuadro 2.3)**.

A partir de lo anterior cabe destacar que si bien conforma se va aumentando la edad de las personas se reduce el porcentaje de inicio del consumo de alcohol, pero cabe destacar que en los rangos de 18 a 25 años y de 26 a 65 años el inicio del consumo de alcohol es más alto en las mujeres, por lo que es de suma importancia que las actividades



preventivas y de tratamiento contemplen a la población adolescente con el enfoque de género.

Ahora bien en cuanto a las necesidades de atención por el consumo de alcohol en la población de 12 a 65 años, según sexo y edad a nivel nacional se observa lo siguiente: el total de personas que cumplen con un criterio de dependencia en la población de 12 a 17 años es de 2.2%, de este, el porcentaje de hombres es de 0.9% y en mujeres es de 0.7% los que tienen necesidad de atención con un criterio de consumo de abuso en la misma población el total de consumidores corresponde al 4%, siendo el 1.7% para los hombres y de 1.5% para las mujeres y para los que cumplen con un criterio de consumo excesivo el total es de 27.6%, el 13.% para los hombres y 12.8% para las mujeres.

Para la población de 18 a 65 años el porcentaje de consumidores con dependencia es de 4.6% para los hombres y 0.7% para las mujeres, los que cumplen un criterio de consumo de abuso son 7.3% para los hombres y 1.8% para las mujeres y los que son consumidores de con criterio de consumo excesivo son 40.2% para los hombres y 21.6% para las mujeres (**Cuadro 2.4**). Estos datos nos indican que existe un porcentaje alto de la población que tienen un consumo excesivo de alcohol en las edades de 12 a 65 años por lo que son los que deben recibir la atención preventiva para retardar o evitar el consumo de alcohol y el tratamiento para que puedan lograr abstinencia de consumo.

Por último, en cuanto al consumo *per cápita* en la población de 12 a 65 años, por litros de alcohol a nivel nacional observamos que el rango de edad donde se presenta el mayor consumo es el de 18 a 29 años con un promedio de 7.2 litros por persona, de estos, 11.8 litros de alcohol consumen en promedio los hombres y 3.4 litros de alcohol consumen en promedio las mujeres, otro dato relevante es que el mayor consumo de alcohol se da en hombres de todas las edades que en las mujeres, dándonos un total de litros de consumo de litros de alcohol en la población de 12 a 65 años de 4.5 litros de estos, 7.2 litros en promedio consumen los hombres y 2.0 litros de consumo de alcohol consumen las mujeres (**Cuadro 2.5**).

Comparando estos datos con el consumo *per cápita* de la población del estado de México vemos que en la población de 15 a 65 años el promedio de litros de alcohol que se consume es de 2.9 litros, de estos en promedio los hombres toman 4.4 litros de alcohol y las mujeres 1.6 litros de alcohol, datos por debajo de la media nacional, pero manteniéndose más consumo de litros de alcohol en hombres que en mujeres (**Cuadro 2.5**).



Con los datos anteriores se puede observar que el consumo diario de alcohol en el Estado de México en la población Adolescente 12 a 17 años de edad en hombres se encuentra por debajo del consumo nacional, sin embargo, en lo que respecta al consumo de mujeres se observa que el consumo de alcohol diario está por encima de los datos nacionales en un porcentaje de 1.1%. En el consumo consuetudinario en la misma población existe un mayor consumo diario de alcohol en los adolescentes varones del estado de México que a nivel nacional, por encima de un 1.2%, mientras que en las mujeres también se presenta un mayor porcentaje de consumo de 1%.

Por otro lado, en la población adulta de 18 a 65 años de edad, con consumo diario de alcohol, se observó que el consumo en el Estado de México es más bajo que a nivel nacional en 1.3% en varones y 0.7% en mujeres, en lo que respecta al consumo consuetudinario se observa que se consume por debajo del consumo nacional.

Lo anterior, que indica que el consumo de alcohol, se da con más porcentaje en criterio de consumo diario en la población de mujeres adolescentes y en consumo consuetudinario en las población en varones y mujeres adolescentes y conforme se vuelven adultos va a la baja, por lo que la atención en materia de prevención de alcohol de vuelve imprescindible con los adolescentes, sin dejar de trabajar con la población adulta que presenta también altos porcentajes de consumo de alcohol, además de que el alcohol permite la entrada a otras drogas. Siendo la población más vulnerable aquella que se encuentra en un rango de edad de 17 años y menos pues es la que presenta mayor porcentaje en la edad de inicio del consumo de alcohol y que al mismo tiempo presenta mayor consumo excesivo de alcohol.

### **Drogas Ilegales.**

La prevalencia total del Consumo de drogas alguna vez en la vida en la población de 12 a 65 años de edad por sexo a nivel nacional arroja resultados de consumo total de cualquier droga de 10.3% con un consumo en hombres de 16.2% y en mujeres de 4.8%, mientras que el consumo de drogas ilegales, alguna vez en la vida total fue de 9.9%, 15.8% para los hombres y 4.3% para las mujeres; asimismo, el consumo de drogas de uso médico total fue de 1.3%, 1.7% para los hombres y 0.9% para las mujeres. Esto nos indica que el consumo de drogas a nivel nacional se presenta más en hombres que en mujeres sin importar el tipo de droga que se consuma (**Cuadro 3.1**).

En lo que respecta al Estado de México en el mismo rubro, observamos que el consumo de drogas alguna vez en la vida en la población de 15 a 65 años nos indica que el total de



la población que consume cualquier droga que se refiere al uso de una o más sustancias médicas fuera de prescripción o por más tiempo del indicado por el médico (como opiáceos, tranquilizantes, sedantes y barbitúricos y anfetaminas o estimulantes) o ilegales (tales como marihuana, cocaína, crack, alucinógenos, inhalables, heroína, metanfetaminas y otras drogas como ketamina, GHB, etc., es de 10%, de estos el 15.5% corresponde a los hombres y el 5% corresponde a las mujeres, para el consumo de drogas ilegales en donde se incluyen las siguientes sustancias: marihuana, cocaína, pasta de cocaína, crack o piedra, alucinógenos, inhalables, heroína, metanfetaminas y otras drogas como ketamina, GHB, etc., el total de consumidores es del 9.7%, correspondiendo el 15.4% para los hombres y el 4.5% para las mujeres y el total de personas que consumen drogas de uso médico que son aquellas sustancias que se prescriben médicamente como opiáceos, tranquilizantes, sedantes, barbitúricos y anfetaminas o estimulantes. Para considerar que el consumo de estas sustancias es con el fin de intoxicarse, el uso debe ser fuera de prescripción o por mayor tiempo o cantidad a la indicada por el médico. Es de 0.9%, 1.3% para los hombres y 0.65 para las mujeres. **(Cuadro 3.2).**

Comparando los resultados con el consumo a nivel nacional, se observa lo siguiente: el consumo de cualquier droga suele ser mayor en hombres aunque por debajo de los porcentajes nacionales, En lo que respecta a las mujeres se observa que existe mayor consumo en el rubro de cualquier droga y drogas ilegales en 0.2% en ambos rubros.

En relación con la prevalencia del consumo de marihuana, cocaína y estimulantes tipo anfetamínico alguna vez en la vida de 12 de 65 años de edad a nivel nacional, se observa un total de consumidores de marihuana de 8.6%, (14% para los hombres y 3.7% para las mujeres), de cocaína un total de 3.5 (6.2% para los hombres y 1.1% para las mujeres), y estimulantes de tipo anfetamínico con un total de 0.9% (1.4% para los hombres y 0.4% para las mujeres **(Cuadro 3.3).**

A nivel estatal en relación la prevalencia de consumo de marihuana, cocaína y estimulantes tipo anfetamínico alguna vez en la vida de 12 de 65 años de edad es de, marihuana con un total de consumidores de 9.0% (14.4% para los hombres y 3.9% para las mujeres), cocaína con un total de consumidores de 2.2% (4.2% para los hombres y 0.3% para las mujeres), y estimulantes de tipo anfetamínico con un total de 0.3% (0.2% para los hombres y 0.4% para las mujeres **(Cuadro 3.4).**



Comparando los datos con los resultados a nivel nacional se destaca que hay mayor consumo de marihuana tanto en el consumo total y hombres como en mujeres en el Estado de México, sin embargo en lo que respecta al consumo de cocaína y estimulantes tipo anfetamínico se encuentra por debajo de los porcentajes nacionales.

Como podemos ver en el a nivel nacional y en el Estado de Mexico el uso de drogas ilegales es mayor en hombres, teniendo como droga de mayor consumo la marihuana, habiendo mayores porcentajes de consumo en el Estado de México por encima de los datos nacionales, sin dejar de lado que el consumo tambien esta aumentando en mujeres, en particular en adolescentes.

Otro aspecto relevante es que existe tambien un incremento en la utilizacion de drogas de uso médico que suele ser mayor en mujeres, destacando que el problema suele ser mayor en jóvenes adultos (18 a 34 años) porque la exposición a la oferta de drogas es más alta en la población joven; sin embargo, debe también tenerse presente que el dato de prevalencia alguna vez en la vida es acumulativo (lo que explica por qué el dato de jóvenes adultos suele ser mayor que el de adolescentes, quienes no dejan de estar en situación de alto riesgo), es ahí donde se debe intervenir en estrategias de prevención selectiva, con actividades de Prevención del consumo de drogas en la educación escolar, Prevención del consumo perjudicial de alcohol y tabaco, además de prevención de la violencia intrafamiliar.

## **Encuesta Nacional del Consumo de Drogas en Estudiantes 2014**

### **(ENCODE 2014)**

#### **Tabaco**

Adicionalmente, de acuerdo a la Encuesta Nacional del Consumo de Drogas de Estudiantes 2014, que da información respecto al consumo de alcohol tabaco y drogas en la población estudiantil, observamos que con respecto al consumo de tabaco alguna vez en la vida por nivel educativo y sexo, en el Estado de México en los estudiantes de secundaria el total de fumadores fue de 212, 523 estudiantes que representa el 24% de la población, de estos 123, 853 estudiantes son varones, 26.5% y 88, 670 estudiantes son mujeres, 21.6%. Los datos no indican que se encuentran por debajo de los porcentajes nacionales que corresponden a un total de fumadores de 1, 349, 491, estudiantes que representa un 20.8% de fumadores, de estos 778, 193 estudiantes son varones, 23.8% y 571, 298 estudiantes son mujeres, 17.7%.





A nivel Bachillerato el total de fumadores fue de 311, 333 estudiantes que representa el 56.5% de la población, de estos 165, 8797 estudiantes son varones, 60.4% y 145, 537 estudiantes son mujeres, 52.5%.

Los datos nos indican que se encuentran por encima de los porcentajes nacionales que corresponden a un total de fumadores de 1, 827, 640, estudiantes que representa un 46.2% de fumadores, de estos 991, 308 estudiantes son varones, 51.4% y 836, 2332 estudiantes son mujeres, 41.3%.

Reforzando lo anterior, si tomamos en cuenta el total de los estudiantes fumadores de secundaria y bachillerato encontramos que el total de consumidores de tabaco son 523, 857 estudiantes, un 36.6% de estos datos 289, 650 estudiantes son hombres, 39% y 234, 207 estudiantes son mujeres, 34.1%; vemos que existe mayor porcentaje de consumo de tabaco en el Estado de México que a nivel nacional pues de un total de 3, 177, 132 estudiantes fumadores, 30%, 1, 765, 502 son hombres que corresponde a un 34% y 1, 407, 630 estudiantes son mujeres, 26.8% **(Cuadro 4.1)**.

### Alcohol

Según la Encuesta Nacional del Consumo de Drogas en Estudiantes 2014, la Prevalencia de consumo de alcohol en secundaria y bachillerato por sexo, Estado de México y Nacional, nos indica que en el Estado de México a nivel de secundaria el total de estudiantes que había consumido alcohol alguna vez en la vida fue de 47.3%, (48.2% son hombres y 46.4% son mujeres), el total de los estudiantes que habían consumido alcohol en el último año fue de 28.8% (28.1% son hombres y 29.6% son mujeres), el total de los estudiantes que habían consumido alcohol en el último mes fue de 20.1% (18.2% son hombres y 22.2% son mujeres), y el total de los estudiantes que presentaban consumo excesivo de alcohol en el último mes fue de 10.3% (10.1% son hombres y 10.6% son mujeres).

A nivel Bachillerato, el total de estudiantes que había consumido alcohol alguna vez en la vida fue de 81.9%, (81.6% son hombres y 82.1% son mujeres), el total de los estudiantes que habían consumido alcohol en el último año fue de 62.4% (64.6% son hombres y 60.1% son mujeres), el total de los estudiantes que habían consumido alcohol en el último mes fue de 49% (50.3% son hombres y 47.8% son mujeres), y el total de los estudiantes que presentaban consumo excesivo de alcohol en el último mes fue de 26.7% (30% son hombres y 23.5% son mujeres).

En el mismo rubro, los datos nacionales nos indican que en el nivel de secundaria el total de

estudiantes que había consumido alcohol alguna vez en la vida fue de 40.7%, (41.9% son hombres y 39.4% son mujeres), el total de los estudiantes que habían consumido alcohol en el último año fue de 24.2% (24.3% son hombres y 24% son mujeres), el total de los estudiantes que habían consumido alcohol en el último mes fue de 16.9% (16.4% son hombres y 17.4% son mujeres), y el total de los estudiantes que presentaban consumo excesivo de alcohol en el último mes fue de 8.6% (8.9% son hombres y 8.3% son mujeres). Estos datos nos indican que respecto al consumo de alcohol en estudiantes de secundaria en el Estado de México, los porcentajes de consumo en todos los rubros (alguna vez en la vida, último año, último mes y consumo excesivo), se encuentran por encima de los datos nacionales.

Lo mismo sucede con el consumo de alcohol en estudiantes de bachillerato a nivel nacional que presenta porcentajes por debajo de los del Estado de México. Dichos datos fueron el total de estudiantes que había consumido alcohol alguna vez en la vida fue de 73.9%, (74.3% son hombres y 73.3% son mujeres), el total de los estudiantes que habían consumido alcohol en el último año fue de 54.3% (56.1% son hombres y 52.1% son mujeres), el total de los estudiantes que habían consumido alcohol en el último mes fue de 41.9% (43.8% son hombres y 40% son mujeres), y el total de los estudiantes que presentaban consumo excesivo de alcohol en el último mes fue de 24.2% (27.3% son hombres y 21.3% son mujeres) **(Cuadro 4.2)**.

### **Drogas Ilegales**

La prevalencia de consumo de drogas en estudiantes de secundaria y bachillerato en el Estado de México a nivel nacional en el año 2014 nos indicaba que los estudiantes del Estado de México que habían consumido drogas alguna vez en la vida fue de 14.2%, cualquier droga, 4.5% drogas médicas y 12.4% drogas ilegales. En último año fue de 10.6%, 3.4% y 8.9% y en el último mes 5.9%, 1.9% y 4.8% respectivamente.

Comparando estos datos con los nacionales, observamos que en el consumo alguna vez en la vida son más altos en el rubro de cualquier droga y drogas ilegales (12.5% cualquier droga, 4.7% Drogas médicas y 10.1% drogas ilegales).

El consumo de drogas en estudiantes de secundaria en el último año también fue más alto en el Estado de México que a nivel nacional en todos los tipos de drogas (8.9% cualquier droga, 3.2% Drogas médicas y 7.1% drogas ilegales).

Por último, en referencia al consumo de drogas en el último mes observamos que en el consumo son más altos en el rubro de cualquier droga y drogas ilegales (5.4% cualquier droga, 1.9% Drogas médicas y 4.3% drogas ilegales).

Ahora bien, el consumo de drogas en estudiantes de nivel bachillerato en el Estado de México, indica que los estudiantes que habían consumido drogas alguna vez en la vida fue de 32.1%, cualquier droga, 8.5% drogas médicas y 29.1% drogas ilegales. En último año fue de 23.4%, 5.8% y 20.6% y en el último mes 12.1%, 2.4% y 10.9% respectivamente.

Comparando estos datos con los nacionales, observamos que en el consumo alguna vez en la vida son más altos en todos los tipos de drogas (25.1% cualquier droga, 7.5% Drogas médicas y 21.8% drogas ilegales). El consumo de drogas en el en el último año también indica que los porcentajes de consumo son mayores en el Estado de México que a nivel nacional (17.6% cualquier droga, 4.9% Drogas médicas y 15.1% drogas ilegales). Lo mismo sucede en el rubro de consumo en el último mes, pues todos los porcentajes de consumo en el Estado de México son mayores que a nivel nacional (8.1% cualquier droga, 2.1% Drogas médicas y 6.7% drogas ilegales) **(Cuadro 4.3)**.

En lo que respecta a la Prevalencia de consumo de drogas en estudiantes de secundaria y bachillerato por sexo a nivel nacional 2014 dio como resultados de consumo total de cualquier droga alguna vez en la vida de 17.2% con un consumo en hombres de 18.6% y en mujeres de 15.9%, mientras que el consumo total de drogas médicas, alguna vez en la vida total fue de 5.8%, 5.1% para los hombres y 6.5% para las mujeres; asimismo, el consumo total de drogas ilegales fue de 14.5% 16.6% para los hombres y 12.5% para las mujeres.

El consumo total de cualquier drogas en el último año fue de 12.2% con un consumo en hombres de 13.2% y en mujeres de 11.2% mientras que el consumo total de drogas médicas, en el último año fue de 3.9%, 3.3% para los hombres y 4.4% para las mujeres; asimismo, el consumo total de drogas ilegales total en el último año fue de 10.1% 11.6% para los hombres y 8.7% para las mujeres.

Al mismo tiempo, el consumo total de cualquier droga en el último mes fue de 6.7% con un consumo en hombres de 7.6% y en mujeres de 5.8% mientras que el consumo total de drogas médicas, en el último mes fue de 2%, 1.8% para los hombres y 2.1% para las mujeres; asimismo, el consumo total de drogas ilegales en el último mes fue de 5.6%, 6.7% para los hombres y 4.5% para las mujeres **(Cuadro 4.4)**.

Los resultados Estatales indican que el consumo total de cualquier droga alguna vez en la vida fue de 21.1% con un consumo en hombres de 21.3% y en mujeres de 20.9%, mientras que el consumo total de drogas médicas, alguna vez en la vida total fue de 6.1%,



4.4% para los hombres y 7.8% para las mujeres; asimismo, el consumo total de drogas ilegales fue de 18.8% 19.9% para los hombres y 17.7% para las mujeres.

El consumo de total de cualquier droga en el último año fue de 15.6% con un consumo en hombres de 15.7% y en mujeres de 15.4%, mientras que el consumo total de drogas médicas, en el último año fue de 4.3%, 3.1% para los hombres y 5.6% para las mujeres; asimismo, el consumo de total de drogas ilegales en el último año fue de 13.4% 14.2% para los hombres y 12.6% para las mujeres.

Al mismo tiempo el consumo total de cualquier droga en el último mes fue de 8.3% con un consumo en hombres de 8.6% y en mujeres de 7.9% mientras que el consumo total de drogas médicas, en el último mes fue de 2.1%, 1.6% para los hombres y 2.6% para las mujeres; asimismo, el consumo total de drogas ilegales en el último mes fue de 7.2%, 7.7% para los hombres y 6.6% para las mujeres (**Cuadro 4.5**).

Si comparamos los resultados estatales con los nacionales podremos ver con claridad que los porcentajes estatales están por encima de los datos nacionales, lo que nos da indicios de que existe un mayor consumo de drogas en los estudiantes de secundaria y bachillerato del Estado de México, con excepción del consumo de drogas de uso médico ya que solo en hombres se encuentran ligeramente por debajo de los datos nacionales.

En lo que se refiere al tipo de droga que consumen los estudiantes de secundaria y bachillerato por sexo en el año 2014 a nivel nacional encontramos que el consumo total de marihuana alguna vez en la vida fue de 10.6% (12.9% son hombres y 8.4% mujeres), el consumo total en el último año fue de 7.6% (9.2% hombres y 6.1% mujeres), y en el consumo total del último mes fue de 3.9% (4.9% hombres y 2.9% mujeres).

El consumo total de cocaína alguna vez en la vida fue de 3.3% (4.2% son hombres y 2.5% mujeres), el consumo total en el último año fue de 1.7% (2.2% hombres y 1.2% mujeres), y en el consumo total del último mes fue de 0.9% (1.2% hombres y 0.6% mujeres).

El consumo total de Crack, solo se tienen datos de alguna vez en la vida y fue de 1.6%, 2.2% son hombres y 1.1% mujeres.

El consumo total de alucinógenos alguna vez en la vida fue de 1.9% (2.5% son hombres y 1.3% mujeres), el consumo total en el último año fue de 1.2% (1.6% hombres y 0.9% mujeres), y en el consumo total del último mes fue de 0.6% (0.8% hombres y 0.4% mujeres).

El consumo total de inhalables alguna vez en la vida fue de 5.8% (5.9% son hombres y



5.8% mujeres), el consumo total en el último año fue de 3.6% (3.6% hombres y 3.6% mujeres), y en el consumo total del último mes fue de 1.9% (1.9% hombres y 1.8% mujeres).

El consumo total de Metanfetaminas alguna vez en la vida fue de 2.0% (2.3% son hombres y 1.7% mujeres), el consumo total en el último año fue de 1.3% (1.5% hombres y 1.1% mujeres), y en el consumo total del último mes fue de 0.7% (0.9% hombres y 0.6% mujeres).

El consumo total de heroína alguna vez en la vida fue de 0.9% (1% son hombres y 0.7% mujeres), el consumo total en el último año fue de 0.5% (0.6% hombres y 0.3% mujeres), y en el consumo total del último mes fue de 0.3% (0.5% hombres y 0.2% mujeres).

El consumo total de anfetaminas alguna vez en la vida fue de 2.5% (2.3% son hombres y 2.7% mujeres), el consumo total en el último año fue de 1.8% (1.6% hombres y 1.9% mujeres), y en el consumo total del último mes fue de 0.9% (0.8% hombres y 0.9% mujeres).

El consumo total de tranquilizantes alguna vez en la vida fue de 3.7% (4.2% son hombres y 4.3% mujeres), el consumo total en el último año fue de 2.6% (2.6% hombres y 3.0% mujeres), y en el consumo total del último mes fue de 1.3% (1.3% hombres y 1.4% mujeres) **(Cuadro 4.4)**.

A nivel estatal, encontramos consumos por tipo de droga de la siguiente manera, el consumo total de marihuana alguna vez en la vida fue de 13.8% (15.9% son hombres y 11.5% mujeres), el consumo total en el último año fue de 10.1% (11.6% hombres y 8.6% mujeres), y en el consumo total del último mes fue de 5% (5.9% hombres y 4.1% mujeres).

El consumo total de cocaína alguna vez en la vida fue de 4.2% (4.9% son hombres y 3.5% mujeres), el consumo total en el último año fue de 1.9% (2.2% hombres y 1.6% mujeres), y en el consumo total del último mes fue de 1.2% (1.4% hombres y 0.9% mujeres).

El consumo total de Crack, solo se tienen datos de alguna vez en la vida y fue de 2.3%, 3.1% son hombres y 1.3% mujeres.

El consumo total de alucinógenos alguna vez en la vida fue de 3.1% (3.7% son hombres y 2.3% mujeres), el consumo total en el último año fue de 1.9% (2.2% hombres y 1.7% mujeres), y en el consumo total del último mes fue de 0.7% (0.8% hombres y 0.6% mujeres).



El consumo total de inhalables alguna vez en la vida fue de 8.8% (8% son hombres y 9.6% mujeres), el consumo total en el último año fue de 5.7% (5.1% hombres y 6.4% mujeres), y en el consumo total del último mes fue de 3% (2.8% hombres y 3.2% mujeres).

El consumo total de Metanfetaminas alguna vez en la vida fue de 2.7% (3.1% son hombres y 2.3% mujeres), el consumo total en el último año fue de 1.5% (1.8% hombres y 1.2% mujeres), y en el consumo total del último mes fue de 0.1% (1.1% hombres y 0.6% mujeres).

El consumo total de Heroína alguna vez en la vida fue de 0.8% (0.6% son hombres y 1% mujeres), el consumo total en el último año fue de 0.4% (0.3% hombres y 0.4% mujeres), y en el consumo total del último mes fue de 0.2% (0.2% hombres y 0.2% mujeres).

El consumo total de anfetaminas alguna vez en la vida fue de 3.1% (2% son hombres y 4.3% mujeres), el consumo total en el último año fue de 2.2% (1.3% hombres y 3.1% mujeres), y en el consumo total del último mes fue de 1% (0.6% hombres y 1.4% mujeres).

El consumo total de tranquilizantes alguna vez en la vida fue de 3.4% (2.5% son hombres y 4.4% mujeres), el consumo total en el último año fue de 2.6% (2.0% hombres y 3.2% mujeres), y en el consumo total del último mes fue de 1.4% (1.1% hombres y 1.6% mujeres) **(Cuadro 4.5)**.

En conclusión, la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes de nivel de secundaria y bachillerato 2014, nos permite tener en cuenta lo siguiente: Existe un alto porcentaje de estudiantes de secundaria que son consumidores de tabaco, destacando que es en el nivel de bachillerato donde los porcentajes de consumo aumentan, tanto a nivel estatal como nacional, sin embargo, se observan consumos mayores en el estado de Mexico que a nivel nacional, de ahí la importancia del trabajo preventivo y de tratamiento en esos niveles educativos.

En cuanto a consumo de alcohol, también se observan porcentajes altos en estudiantes de secundaria, desde aquellos que han consumido alguna vez en la vida, en el último año y en el último mes, con consumos parecidos entre hombres y mujeres, pero que va aumentando conforme tienen más grado académico, pues en el bachillerato los porcentajes aumentan hasta llegar al 80% de estudiantes que han consumido alcohol alguna vez en la vida de 60% en el último año y de 50% en el último mes, además de tener porcentajes altos en el

consumo excesivo de alcohol en el último mes. Estos datos estatales, también están por encima de los datos nacionales, indicándonos que también es importante abordar los daños y riesgos asociados a fumar y tomar en las actividades preventivas, además de consejos breves para usuarios experimentales de alcohol y tabaco.

Por último, el consumo de drogas ilegales en estudiantes de secundaria y bachillerato también muestra datos parecidos en cuanto al consumo de alcohol y tabaco, aquí se observa que el consumo de drogas ilegales es mayor en el estado de México que a nivel nacional, encontrando como droga de mayor consumo la marihuana, seguida de los inhalables y cocaína, con consumos también por encima de los datos nacionales.

### **Datos del Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas del CIJ**

Los datos de pacientes de CIJ constituyen una fuente complementaria a los de la ENCODAT y a la ENCODE; comprenden datos del total de usuarios de drogas ilícitas alguna vez en la vida que solicitan tratamiento en CIJ por primera ocasión, a nivel nacional.

Si bien la información de estos pacientes tiene limitaciones (no puede extrapolarse a población general ni siquiera a usuarios de drogas no solicitantes de tratamiento o atendidos en otros sistemas u organizaciones), resulta útil para la descripción de las características del problema en un grupo significativo de la población afectada, así como para la identificación de problemas emergentes, detección de diferencias regionales, de nuevas sustancias o sustancias con baja prevalencia.

Adicionalmente, de acuerdo con los datos del sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas del CIJ, en la población atendida en CIJ entre el primer semestre de 2005 y el segundo semestre de 2016. A nivel nacional, se observan una ligera disminución en el consumo de tabaco de tan solo un 0.3% (de 86.3% a 86.0%), así como del uso de alcohol en 0.7% (de 87.5% a 86.8%), Sin embargo, hay un aumento significativo en el consumo de cannabis de 15.5% (de 71.7% a 87.2%), en cuanto a Inhalables hubo una disminución del 6.5% (de 34.2% a 28.2%), lo mismo sucede con el uso de cocaína en donde disminuyó significativamente su consumo en 20.3% (de 57.2% a 36.8%), al igual que el crack en 20.3% (de 34.6% a 20.3%). Por el contrario, el consumo de metanfetaminas incrementó en un 11.2% (de 15.9% a 27.1%) y MDMA (éxtasis) en 3.6% (3.3% a 6.9%) y Alucinógenos (de 7.4% a 11.5%); Por el contrario, Benzodiazepinas disminuyó en 5.2% (de 19.7% a 14.5%) y en el uso de heroína en 1.6% (entre 5.1% y 3.5%) **(Cuadro 5.1)**.



En lo que se refiere al Estado de México se observan tendencias de disminución del consumo de Tabaco en 3.5% (de 86% a 82.5%), alcohol en 1.7% (de 88.2% a 86.5%), inhalables en 4.5% (de 42.4% a 37.9%), Cocaína en 11.3% (de 43.8% a 32.5%), Crack en 22.8% (de 52.3% a 29.5%), Benzodicepinas en 10.1% (de 18.2% a 8.1%) y de Heroína en 0.9% (de 1.6% a 0.7%). Por el contrario las drogas que se tuvieron un incremento fueron la Marihuana en 18.1% (de 70.9% a 89%), Metanfetaminas en 5.9% (de 4% a 9.9%) Éxtasis en 2.8% (de 3.8% a 6.6%) y de Alucinógenos en 6.4% (de 8.7% a 15.1%) **(Cuadro 5.2).**

El contexto municipal, las principales drogas ilícitas de uso alguna vez en la vida en pacientes atendidos en el CIJ Ecatepec del primer semestre de 2005 al el segundo semestre de 2016, muestran consumo en altos porcentajes, aunque con una ligera baja en el consumo fueron alcohol (87.4%), tabaco (83.3%), las drogas que se usaron menos pero también con un decremento fueron inhalables (43.9%), cocaína (30.1%). crack (27.2%), Por abajo del 7.5% se ubicaron en éxtasis (5%), las benzodicepinas (7.1%) y heroína que no reporto consumo (0%). Por otro lado, las drogas que registraron un aumento en el consumo fueron Marihuana siendo la droga ilegal de mayor consumo en Ecatepec (91.6%), Metanfetaminas (6:3%) y Alucinógenos (12.1%) **(Gráfica E y Cuadro 5.3).**

Con base a lo anterior se observa que las drogas licitas que más se han consumido alguna vez en la vida, son el tabaco y el alcohol, con consumos de más de 80 %, y aunque se ha visto disminuido su consumo a nivel nacional, estatal y municipal, el consumo de alcohol presentas mayores consumos en el municipio de Ecatepec, comparados con los datos nacionales y estatales, referente al consumo de tabaco los datos nos indican la misma tendencia, es decir, una disminución en el consumo nacional, estatal y municipal, aunque con menor consumo en el estado y el municipio, comparados con los datos nacionales, pero En Ecatepec con mayor consumo que los datos estatales.

En lo que respecta a las drogas ilícitas se observan consumos que van en aumento: marihuana, destacando el consumo más alto en el municipio de Ecatepec por encima del Estado de México y los datos nacionales, Metanfetaminas, que creció a nivel nacional, estatal, y municipal, pero con datos por debajo de los datos Nacionales y del Estado de México, Éxtasis, que creció su consumo a nivel Nacional y estatal, con una ligera disminución en Ecatepec, y Alucinógenos, que registran consumo por debajo de los datos nacionales, pero por arriba de los datos estatales.



En cuanto a las drogas que experimentaron una disminución, de consumo en los pacientes atendidos en CIJ, destacan Inhalables que tiene una tendencia de menor consumo, pero con consumos mayores en el municipio de Ecatepec, por encima de los datos estatales y nacionales, Crack por debajo de los datos nacionales y estatales, Cocaína, ubicándose por encima de los datos estatales, pero por debajo de los nacionales, Benzodicepinas y Heroína, por debajo de los datos nacionales y estatales.

### **Características Sociodemográficas y del Consumo de Drogas de Pacientes**

#### **Atendidos**

Entre julio y junio de 2016, CIJ recibió por primera vez en tratamiento a 12, 096 usuarios de drogas a nivel nacional. El 82.5% de estos casos fueron hombres y 17.5% mujeres (con una razón de 4.7 hombres por cada mujer); 39.2% contaban entre 15 y 19 años, 14.2% entre 20 y 24 años y 10.1% entre 25 y 29 años (con un promedio en la edad de ingreso a tratamiento de 22.9 años). El 43.0% había iniciado el consumo de drogas ilícitas entre los 15 y 19 años; 43.1% entre los 10 y 14 años y 6.9% entre los 20 y 24 años; con un promedio en la edad de inicio de 16 años. Las principales drogas ilícitas de inicio fueron marihuana (74%), inhalables (9.6%) y cocaína (7.3%). Las principales sustancias de mayor impacto reportadas en el último año fueron cannabis (14.4%), Metanfetaminas (16.1%), alcohol (11.1%), inhalables (7.8%) y crack (6.1%), mientras que las drogas con proporciones más altas de uso en los últimos 30 días fueron tabaco (64%), alcohol (54.4%), cannabis (52.8%), Metanfetaminas (14.5%), e inhalables (10.9%).

En lo que respecta al Estado de México se observa que CIJ recibió por primera vez en tratamiento a 1, 540 usuarios de drogas. El 85.7% de estos casos fueron hombres y 14.3% mujeres (con una razón de 6 hombres por cada mujer); 39.2% contaban entre 15 y 19 años, 14.2% entre 20 y 24 años y 11.1% entre 25 y 29 años (con un promedio en la edad de ingreso a tratamiento de 22.2 años). El 43% había iniciado el consumo de drogas ilícitas entre los 15 y 19 años; 43.1% entre los 10 y 14 años y 6.9% entre los 20 y 24 años; con un promedio en la edad de inicio de 15.9 años. Las principales drogas ilícitas de inicio fueron cannabis (75.6%), inhalables (12.9%) y cocaína (5.5%). Las principales sustancias de mayor impacto reportadas en el último año fueron cannabis (46.1%), inhalables (14.3%), alcohol (13.2%), crack (10.8%) y tabaco (5.9%), mientras que las drogas con proporciones más altas de uso en los últimos 30 días fueron tabaco (62.8%), alcohol (56.2%), cannabis (53.3%), inhalables (16.7%) y crack (12.7%).

En el mismo lapso de 2016, el CIJ Ecatepec atendió a un total de 239 pacientes, de los cuales 87.9% eran hombres, mientras que las mujeres atendidas ascendió a 12.1%. El número de hombres por cada mujer atendida en la unidad fue de 7.2%.

El 44.4% contaban entre 15 y 19 años, 14.2% entre 20 y 24 años y 9.2% entre 25 y 29 años (con un promedio en la edad de ingreso a tratamiento de 24 años). El 43.5% había iniciado el consumo de drogas ilícitas entre los 15 y 19 años; 43.5% entre los 10 y 14 años y 8.4% entre los 20 y 24 años; con un promedio en la edad de inicio de 16.3 años. Las principales drogas ilícitas de inicio fueron cannabis (73.2%), inhalables (17.6%) y crack (3.8%). Las principales sustancias de mayor impacto reportadas en el último año fueron cannabis (44.3%), alcohol (14.8%), inhalables (13.9%), tabaco (10.9%), y crack (7%), mientras que las drogas con tasas más altas de uso en los últimos 30 días fueron tabaco (57.7%), alcohol (45.2%), cannabis (37.7%), inhalables (15.1%), cocaína (6.3%) y crack (6.3%) (**Cuadro 5.4**).

A partir de lo anterior, se observa que las drogas consideradas por los pacientes como sustancias de mayor impacto a nivel nacional, es decir, aquellas que les han ocasionado mayores problemas de salud o de ajuste psicosocial en el transcurso del año previo al tratamiento en CIJ, fueron: cannabis (41.4%), metanfetaminas (16.1%), alcohol (11.5%), inhalables (7.8%) y crack (6.5%), sustancias similares a las registradas en el consumo de los pacientes del CIJ Ecatepec y en el nivel estatal, concordando que la droga de mayor impacto reportada con mayor frecuencia es la marihuana, dejando en segundo sitio al alcohol. Por último, entre las drogas de mayor uso reportadas en los últimos 30 días previos a tratamiento (consumo actual) por los pacientes atendidos en el Centro de Integración Juvenil Ecatepec, destacan: tabaco (57.7%), alcohol (45.2%), cannabis (37.7%), inhalables (15.1%), y cocaína (6.3%), las mismas sustancias que las registradas en el nivel estatal, pero con la diferencia de que a nivel nacional se encuentra el consumo de metanfetaminas.

### Síntesis

La atención de las adicciones representa un enorme reto, por su magnitud e impacto, en el Municipio de Ecatepec las tendencias del consumo de drogas indican que si bien el consumo de drogas es alto en hombres, en las mujeres se percibe un incremento.

El problema del uso de drogas legales alcohol y tabaco se ha ubicado como una grave amenaza pues es el estado de México en donde se experimentan consumos por encima de la media Nacional, convirtiéndose en la puerta de entrada de otras drogas.



Por último en Ecatepec, se observa el consumo de cannabis como droga de mayor consumo en jóvenes adolescentes, destacando el consumo de inhalables como segunda droga, y un uso creciente de mujeres, además de la reducción del consumo de cocaína y Crack, y consumos altos de alcohol y tabaco, aunque con una ligera reducción; concordando con las Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017 (ENCODAT 2016-2017) y la Encuesta Nacional del Consumo de Drogas en Estudiantes 2014, a nivel nacional y en el Estado de México que presentan el consumo de cannabis como droga de mayor consumo.

### **Zonas de Alto Riesgo y de Atención Prioritaria**

La identificación de colonias o zonas de alto riesgo para el consumo de drogas ilícitas y el establecimiento de una lista de zonas de atención prioritaria representan referentes necesarios para la planeación y aplicación estratégica de programas, en el contexto particular del área de influencia de CIJ. Para este efecto, se llevó a cabo una clasificación de las colonias que integran el municipio de Ecatepec en función de determinados factores o condiciones de riesgo, identificando aquéllas que presentan necesidades y características propicias para el desarrollo y operación de programas institucionales, lo anterior se logró con la colaboración del equipo médico técnico que a partir de su experiencia en actividades preventivas han tenido la oportunidad de estar inmersos en esas colonias y con el conocimiento previo de recorridos que se hicieron en estudios anteriores (**Listado de Asentamientos por Nivel de Riesgo**).

Con objeto de identificar Zonas de Alto Riesgo, se llevó a cabo una estratificación tomando en cuenta, factores que fueron evaluados a partir de problemática familiar y escolar, deterioro de la calidad de vida, desintegración social e inseguridad pública. La calificación de riesgo obtenida fue posteriormente ponderada en función del peso relativo atribuible a cada uno de estos factores, estableciéndose tres estratos: zonas de alto riesgo, ZAR de mediano riesgo y de bajo riesgo. Finalmente, se elaboraron las correspondientes listas de colonias. Con base en estos procedimientos y criterios, en el Municipio de Ecatepec se identificaron 465 *colonias de alto riesgo* para el consumo de drogas. Ello implica la prevalencia e interacción de problemáticas sociales y comunitarias diversas, entre las cuales se encuentra una serie de problemas familiares, tales como desintegración familiar, con separación, ausencia de alguno de los padres o ruptura del grupo familiar; situaciones relativamente frecuentes de violencia y maltrato intrafamiliar.



Una vez establecidas las zonas de alto riesgo, se identificaron aquéllas que presentaban, no sólo mayores niveles de riesgo sino también condiciones propicias para la aplicación de servicios (accesibilidad, recursos organizados, apoyo interinstitucional viable, antecedentes de trabajo preventivo, condiciones mínimas de seguridad, etc.), a fin de conformar una lista de zonas de atención prioritaria (ZAP). Para realizar esta selección, se tomaron en cuenta el número y extensión de las ZAR, su problemática, la capacidad operativa de la unidad y el diseño de los programas institucionales, entre otros factores. Se identificaron **29** zonas de alto Riesgo de Atención Prioritaria, la cual podrá ser ajustada de acuerdo con las modificaciones de la capacidad operativa de CIJ, la transformación de las condiciones y problemática del área de influencia, así como con el avance logrado en cobertura y atención de las zonas comprendidas en esta lista. Diversos estudios realizados en México, incluyendo estudios efectuados en CIJ, han contribuido a esta área de conocimiento (**Factores Psicosociales de Riesgo del Uso Drogas**).