



Cuadro 5.4. Características y patrón de consumo de pacientes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil entre julio y diciembre de 2016.

		CIJ Xochimilco (N=7)	Ciudad de México (N=2,267)	Nacional (N=12,096)
Sexo	Hombres	71.4%	83.1%	82.5%
	Mujeres	28.6%	16.9%	17.5%
	Razón H:M	2.5 hombres por cada mujer	4.9 hombres por cada mujer	4.7 hombres por cada mujer
Edad de ingreso	15 a 19 años	28.6%	35.5%	39.2%
	20 a 24 años	28.6%	17.6%	14.2%
	25 a 29 años	0.0%	10.0%	10.1%
	Promedio	16.6 años	24.0 años	22.9 años
Edad de inicio del uso de drogas ilícitas	10 a 14 años	42.9%	37.9%	43.1%
	15 a 19 años	57.1%	45.7%	43.0%
	20 a 24 años	0.0%	7.2%	6.9%
	Promedio	14.7 años	16.7 años	16.0 años
Principales drogas ilícitas de inicio		1. Cannabis (85.7%)	1. Cannabis (70.0%)	1. Cannabis (74.0%)
		2. Inhalables (14.3%)	2. Inhalables (14.4%)	2. Inhalables (9.6%)
			3. Cocaína (6.3%)	3. Cocaína (7.3%)
Principales drogas de mayor impacto en el último año		1. Cannabis (42.9%)	1. Cannabis (41.1%)	1. Cannabis (41.4%)
		2. Alcohol (28.6%)	2. Crack (15.1%)	2. Metanfetaminas (16.1%)
		3. Tabaco (14.3%)	3. Alcohol (13.3%)	3. Alcohol (11.5%)
		3. Inhalables (14.3%)	4. Inhalables (11.6%)	4. Inhalables (7.8%)
			5. Tabaco (6.8%)	5. Crack (6.5%)
Principales drogas consumidas en el último mes		1. Cannabis (42.9%)	1. Tabaco (62.4%)	1. Tabaco (64.0%)
		2. Tabaco (28.6%)	2. Alcohol (57.4%)	2. Alcohol (54.4%)
		2. Alcohol (28.6%)	3. Cannabis (51.6%)	3. Cannabis (52.8%)
		4. Inhalables (14.3%)	4. Inhalables (17.3%)	4. Metanfetaminas (14.5%)
			5. Crack (16.6%)	5. Inhalables (10.9%)

Fuentes:

Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación. **Estadística del consumo de drogas en pacientes de primer ingreso a tratamiento. Segundo semestre del 2016.** México, 2017.

Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación, **Sistema Institucional de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas.** México, 2017.