

**Cuadro 5.4. Características y patrón de consumo de pacientes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil entre julio y diciembre de 2016.**

		CIJ Álvaro Obregón Oriente (N=54)	Delegación Álvaro Obregón (N=127)	Ciudad de México (N=2,267)	Nacional (N=12,096)
<b>Sexo</b>	Hombres	81.5%	85.0%	83.1%	82.5%
	Mujeres	18.5%	15.0%	16.9%	17.5%
	Razón H:M	4.4 hombres por cada mujer	5.7 hombres por cada mujer	4.9 hombres por cada mujer	4.7 hombres por cada mujer
<b>Edad de ingreso</b>	15 a 19 años	38.9%	36.2%	35.5%	39.2%
	20 a 24 años	22.2%	15.7%	17.6%	14.2%
	25 a 29 años	5.6%	12.6%	10.0%	10.1%
	Promedio	24.8 años	24.5 años	24.0 años	22.9 años
<b>Edad de inicio del uso de drogas ilícitas</b>	10 a 14 años	33.3%	31.5%	37.9%	43.1%
	15 a 19 años	59.3%	56.7%	45.7%	43.0%
	20 a 24 años	3.7%	7.9%	7.2%	6.9%
	Promedio	16.3 años	16.1 años	16.7 años	16.0 años
<b>Principales drogas ilícitas de inicio</b>	1. Cannabis (70.4%)	1. Cannabis (70.4%)	1. Cannabis (67.7%)	1. Cannabis (70.0%)	1. Cannabis (74.0%)
	2. Inhalables (16.7%)	2. Inhalables (16.7%)	2. Inhalables (14.2%)	2. Inhalables (14.4%)	2. Inhalables (9.6%)
	3. Cocaína (7.4%)	3. Cocaína (7.4%)	3. Crack (9.4%)	3. Cocaína (6.3%)	3. Cocaína (7.3%)
<b>Principales drogas de mayor impacto en el último año</b>	1. Cannabis (40.8%)	1. Cannabis (40.8%)	1. Cannabis (40.2%)	1. Cannabis (41.1%)	1. Cannabis (41.4%)
	2. Crack (14.3%)	2. Crack (14.3%)	2. Crack (21.3%)	2. Crack (15.1%)	2. Metanfetaminas (16.1%)
	3. Inhalables (12.2%)	3. Inhalables (12.2%)	3. Inhalables (13.1%)	3. Alcohol (13.3%)	3. Alcohol (11.5%)
	4. Alcohol (10.2%)	4. Alcohol (10.2%)	4. Alcohol (9.0%)	4. Inhalables (11.6%)	4. Inhalables (7.8%)
	4. Tabaco (10.2%)	4. Tabaco (10.2%)	5. Tabaco (7.4%)	5. Tabaco (6.8%)	5. Crack (6.5%)
<b>Principales drogas consumidas en el último mes</b>	1. Tabaco (57.4%)	1. Tabaco (57.4%)	1. Tabaco (53.5%)	1. Tabaco (62.4%)	1. Tabaco (64.0%)
	2. Alcohol (48.1%)	2. Alcohol (48.1%)	2. Alcohol (52.0%)	2. Alcohol (57.4%)	2. Alcohol (54.4%)
	3. Cannabis (44.4%)	3. Cannabis (44.4%)	3. Cannabis (51.2%)	3. Cannabis (51.6%)	3. Cannabis (52.8%)
	4. Inhalables (14.8%)	4. Inhalables (14.8%)	4. Crack (21.3%)	4. Inhalables (17.3%)	4. Metanfetaminas (14.5%)
	5. Cocaína (11.1%)	5. Cocaína (11.1%)	5. Inhalables (18.1%)	5. Crack (16.6%)	5. Inhalables (10.9%)

**Fuentes:**

Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación. **Estadística del consumo de drogas en pacientes de primer ingreso a tratamiento. Segundo semestre del 2016.** México, 2017.

Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación, **Sistema Institucional de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas.** México, 2017.