



Cuadro 5.3. Tendencias del consumo de drogas alguna vez en la vida entre pacientes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil, del primer semestre de 2005 al segundo semestre de 2016, CIJ Iztapalapa Poniente (%).

| Semestre | Total de casos | Sustancias | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|------------|---------|----------|------------|---------|-------|---------------------|---------|----------------------|---------|-------------------|
| | | Tabaco | Alcohol | Cannabis | Inhalables | Cocaína | Crack | Metanfeta- minas | Éxtasis | Benzodiace- pinas | Heroína | Alucinó- genos |
| 2005-1 | 156 | 87.8 | 85.9 | 69.2 | 54.5 | 35.3 | 44.9 | 4.5 | 5.1 | 14.1 | 1.9 | 11.5 |
| 2005-2 | 120 | 85.0 | 88.3 | 64.2 | 46.7 | 33.3 | 45.0 | 8.3 | 10.0 | 13.3 | 2.5 | 10.0 |
| 2006-1 | 148 | 85.8 | 85.8 | 68.9 | 52.0 | 30.4 | 43.2 | 2.0 | 5.4 | 15.5 | 2.0 | 7.4 |
| 2006-2 | 118 | 84.7 | 85.6 | 68.6 | 61.9 | 28.8 | 42.4 | 0.8 | 4.2 | 18.6 | 0.8 | 6.8 |
| 2007-1 | 167 | 82.6 | 85.0 | 66.5 | 54.5 | 25.7 | 39.5 | 3.0 | 5.4 | 13.2 | 0.6 | 9.0 |
| 2007-2 | 137 | 83.9 | 84.7 | 61.3 | 58.4 | 35.0 | 43.1 | 2.2 | 4.4 | 10.2 | 0.7 | 3.6 |
| 2008-1 | 221 | 73.8 | 81.0 | 51.6 | 69.7 | 23.1 | 28.5 | 2.7 | 2.7 | 8.1 | 0.5 | 6.8 |
| 2008-2 | 201 | 77.1 | 77.1 | 52.2 | 72.6 | 21.4 | 27.9 | 1.5 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 11.9 |
| 2009-1 | 214 | 75.2 | 84.1 | 55.1 | 72.9 | 21.0 | 24.8 | 0.9 | 2.3 | 7.5 | 0.5 | 5.6 |
| 2009-2 | 185 | 82.7 | 79.5 | 56.2 | 65.4 | 27.6 | 22.7 | 1.1 | 5.9 | 6.5 | 1.1 | 7.0 |
| 2010-1 | 222 | 65.3 | 75.7 | 46.8 | 71.2 | 12.6 | 18.5 | 1.8 | 2.7 | 6.3 | 0.5 | 6.8 |
| 2010-2 | 202 | 79.7 | 82.2 | 63.9 | 65.3 | 19.8 | 25.7 | 2.0 | 5.0 | 3.5 | 1.0 | 9.4 |
| 2011-1 | 200 | 71.5 | 79.5 | 58.0 | 71.5 | 16.0 | 23.0 | 3.5 | 5.5 | 8.0 | 1.0 | 10.0 |
| 2011-2 | 209 | 68.4 | 78.9 | 56.0 | 65.6 | 16.7 | 22.5 | 1.9 | 6.2 | 5.3 | 0.0 | 8.6 |
| 2012-1 | 158 | 68.4 | 79.7 | 62.7 | 61.4 | 15.2 | 22.2 | 2.5 | 7.0 | 10.1 | 0.6 | 10.8 |
| 2012-2 | 143 | 72.0 | 85.3 | 76.2 | 46.2 | 28.7 | 21.0 | 5.6 | 3.5 | 3.5 | 0.0 | 11.2 |
| 2013-1 | 159 | 74.8 | 76.7 | 76.7 | 48.4 | 18.2 | 22.6 | 2.5 | 5.7 | 3.8 | 0.0 | 10.1 |
| 2013-2 | 135 | 68.9 | 78.5 | 74.8 | 47.4 | 17.8 | 17.0 | 2.2 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 3.7 |
| 2014-1 | 138 | 64.5 | 74.6 | 80.4 | 39.9 | 19.6 | 13.8 | 5.1 | 6.5 | 4.3 | 0.7 | 10.9 |
| 2014-2 | 145 | 75.2 | 79.3 | 82.1 | 37.9 | 29.7 | 19.3 | 3.4 | 3.4 | 2.8 | 0.7 | 6.2 |
| 2015-1 | 148 | 73.0 | 73.6 | 79.7 | 41.2 | 19.6 | 16.9 | 2.7 | 3.4 | 4.7 | 0.7 | 8.1 |
| 2015-2 | 110 | 76.4 | 84.5 | 84.5 | 32.7 | 17.3 | 26.4 | 2.7 | 8.2 | 4.5 | 0.0 | 9.1 |
| 2016-1 | 121 | 76.9 | 76.0 | 85.1 | 33.1 | 26.4 | 21.5 | 8.3 | 4.1 | 6.6 | 0.8 | 10.7 |
| 2016-2 | 125 | 79.2 | 83.2 | 84.0 | 38.4 | 22.4 | 28.0 | 3.2 | 3.2 | 4.0 | 0.8 | 9.6 |

Fuente: Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación, Sistema Institucional de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas. México, 2017.