

DIAGNÓSTICO DEL CONSUMO DE DROGAS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL CIJ PIEDRAS NEGRAS

El Estudio Básico de Comunidad Objetivo (EBCO) constituye un diagnóstico actualizado del problema del consumo de drogas y de su contexto que Centros de Integración Juvenil (CIJ) realiza desde mediados de los años ochenta.

El siguiente documento plasma un diagnóstico de consumo de drogas, específicamente en la localidad de Piedras Negras y los diversos sectores de este municipio, la finalidad es secundar la oportuna planeación y aplicación de los proyectos y funciones en las poblaciones a nivel nacional en donde se encuentra una unidad de CIJ.

Para elaborar el diagnóstico del consumo de drogas se consideraron, para esta versión del EBCO, tres fuentes: la Encuesta Nacional del Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017 (ENCODAT 2016-2017); la Encuesta Nacional del Consumo de Drogas en Estudiantes 2014 (ENCODE 2014) y el Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas de Centros de Integración Juvenil (CIJ), mismos que se describen a continuación.

Encuesta Nacional del Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

(ENCODAT 2016-2017)

Consumo de Tabaco

El consumo Alguna Vez en la Vida de Tabaco en la Población de 12 a 65 años a nivel nacional. 2011 Y 2016. Se visualiza en el primer pilar ENA 2011 el 48%, en una siguiente columna ENCODAT 2016 informa una población de 51%, lo que aumenta son 3 puntos esto en aproximadamente 5 años. En donde cada vez existe mayor consumo de tabaco por ser una droga legal, además de accesible en todos los hogares (**Gráfica A**).

En el rubro de “Ha fumado tabaco alguna vez en la vida” los hombres tienen un 65.7% y las mujeres aunque con menor porcentaje tienen un 37.4% ellas siguen apareciendo y lentamente aumentando el porcentaje en las estadísticas; haciendo un total en ambos géneros de 51.0%. En el segundo rubro “Ha fumado más de 100 cigarrillos” con el 33% aparecen los hombres y las mujeres con 10.7% aunque su consumo no es tan predominante como el de los hombres, el porcentaje total de ambos es de 21.5%. Existe un tercer recuadro “Fumador en el último año” los hombres tienen el 31.4% y las mujeres tienen el 10.9% alrededor de menos de 20 puntos en comparación con los hombres, por lo que las mujeres se visualizan muy por debajo del porcentaje de los hombres, el porcentaje total de ambos es de 20.8%. Un último recuadro “Fumador actual de tabaco” informa que los hombres tienen el 27.1% y las mujeres con el

8.7% con 18 puntos abajo, lo que describe que la preferencia de uso de tabaco no es común en este género; el total es estos porcentajes son del 17.6% **(Cuadro 1.1)**.

En el rubro de “Ha fumado más de 100 cigarros” los hombres tienen un 40.6% y las mujeres se encuentran con un porcentaje del 13.4%; los recuadros reflejan un total en ambos géneros de 26.8%. En el segundo rubro “Fumador en el último año” con el 39.2% aparecen los hombres y las mujeres con 14.1% su consumo es bajo en comparación con el género opuesto, el porcentaje total de ambos es de 26.4%. Existe un tercer recuadro “Fumador actual de tabaco” los hombres tienen el 34.5% y las mujeres tienen el 12.7% existe aún gran diferencia en comparación con los hombres, el porcentaje total de ambos es de 23.5% **(Cuadro 1.2)**.

A nivel nacional se contabilizan el 11.1 millones de hombres, en el género femenino describe a 3.8 millones, haciendo un total 14.9 millones. Ahora que, en el estado de Coahuila se contabilizan a los hombres con 362 mil consumidores, en cambio las mujeres consumidoras son 137 mil, lo que hace un total en este estado de 499 mil **(Cuadro 1.3)**. El inicio del consumo de tabaco a nivel nacional el promedio de edad es 19.3 años y el de Coahuila con una edad similar se encuentra 19.9 años

Consumo de Alcohol

El Consumo Alguna Vez en la Vida de Alcohol en Población de 12 a 65 años a nivel nacional. 2011 Y 2016 describe dos columnas, una de ella ENA 2011 con el 71% de la población, la otra ENCODAT 2016 con el mismo porcentaje 71%, lo que se visualiza es que después de 5 años el consumo de Alcohol de mantiene o existe una supervisión estricta por las instancias correspondientes y los menores de edad están más expuestos a riesgos más graves **(Gráfica B)**.

En el recuadro del “Consumo Diario” los hombres de 12 a 17 años describen el 2.5%, además las edades de 18 a 65 años con el 5.0% y las mujeres en las edades de 12 a 17 están con el 2.7% en este recuadro también aparece el género femenino en edades de 18 a 65 años con el 1.2%; haciendo un porcentaje total de 2.9%. Otro de los recuadros es el “Consumo Consuetudinario” los hombres de 12 a 17 años describen el 4.4%, otras edades son de 18 a 65 años con el 15.8% y las mujeres en las edades de 12 a 17 están con el 3.9%; un recuadro más describe al género femenino en edades de 18 a 65 años con el 3.5%; haciendo un porcentaje total de 8.5%. La última columna “Dependencia” están los hombres de 12 a 17 años con 0.9%; otras edades son de 18 a 65 años con el 4.6% y las mujeres en las edades de 12 a 17 están con el 0.7% en este recuadro también aparece el género femenino en edades de 18 a 65 años con el 0.6%; haciendo un porcentaje total de 2.2% **(Cuadro 2.1)**.



En el recuadro del “Consumo Diario” los hombres de 12 a 17 años describen el 2.4%, además las edades de 18 a 65 años con el 7.5% y las mujeres en las edades de 12 a 17 están con el 0.7% en este recuadro también aparece el género femenino en edades de 18 a 65 años con el 2.9%; haciendo un porcentaje total de 4.6%. Otro recuadro de “Consumo Consuetudinario” los hombres de 12 a 17 años describen el 3.4%, otras edades son de 18 a 65 años con el 27.0% y las mujeres en las edades de 12 a 17 están con el 3.6% un recuadro más describe al género femenino en edades de 18 a 65 años con el 7.1%; haciendo un porcentaje total de 14.6% **(Cuadro 2.2)**.

En hombres de 17 años y menos 61.5%, además las edades de 18 a 25 años con el 36.5% y de 26 a 65 años el 2.0%. Pero en mujeres describe a la edad de 17 años y menos 43.1%, además las edades de 18 a 25 años con el 47.1% y de 26 a 65 años el 9.8%. El total de las columnas en edades de 17 años y menos esta en 53.1%, en las edades de 18 a 25 años el 41.3% y de 26 a 65 años el 5.6% **(Cuadro 2.3)**.

En hombres de 12 a 17 años describen el 0.9%, además las edades de 18 a 65 años con el 4.6%, en las mujeres en edades de 12 a 17 están con el 0.7% en este recuadro también aparece el género femenino en edades de 18 a 65 años con el 0.6%; haciendo un porcentaje total de 2.2%. En la siguiente columna el “Abuso” los hombres de 12 a 17 años describen el 1.7%, otras edades son de 18 a 65 años con el 7.3%, en las mujeres en las edades de 12 a 17 están con el 1.5% un recuadro más describe al género femenino en edades de 18 a 65 años con el 1.8%; haciendo un porcentaje total de 4.0%. Además en la última columna de “Consumo Excesivo” los hombres de 12 a 17 años con 13.0% otras edades son de 18 a 65 años con el 40.2%, las mujeres en edades de 12 a 17 están con el 12.8% en este recuadro también aparece el género femenino en edades de 18 a 65 años con el 21.6%; haciendo un porcentaje total de 27.6% **(Cuadro 2.4)**.

En hombres de 12 a 17 años 3.784 litros consumen de alcohol al año, además las edades de 18 a 29 años con el 11.827 y de 30 a 39 años 7.482 litros. En edades de 40 a 49 años 6.214, de 50 años y más es de 3.978; haciendo un total/litros de 7.269. Las mujeres de 12 a 17 años 3.439, además las edades de 18 a 29 años con el 3.468 y de 30 a 39 años el 1.220. En edades de 40 a 49 años 0.820; de 50 años y más es de 0.785; el total/litros es de 2.076. En ambos sexos en la edad de 12 a 17 años el total es de 3.613; en edades de 18 a 29 años de 7.612, en edades de 30 a 39 años es de 4.054 y en la siguiente línea 3.285 y en la última línea 2.362, para cerrar con un total en estos dos géneros 4.853 **(Cuadro 2.5)**. El Consumo *per cápita* en

la población de 12 a 65 años, por litros de alcohol en el estado de Coahuila. Los hombres consumen 10.862 litros y las mujeres el 2.563 haciendo un total de 6.666.

El Consumo Alguna Vez en la Vida de Drogas en Población de 12 a 65 años a nivel nacional 2008, 2011 y 2016. En esta gráfica destacan tres líneas una que abarcan desde el año 2008 al 2016; la línea aparentemente vertical color verde (drogas medicas) tiene una leve ascendencia en aproximadamente 8 años. Así también se encuentra una línea roja con una ascendencia de hasta 10 puntos, esto en Drogas Ilegales el incremento en las personas, es por la desinformación que manejan los pares, para alentar el consumo sobre todo en los menores de edad que son más vulnerables en esta etapa de vida. Por último aparece una línea azul similar a la línea roja pero esta sobrepasa los diez puntos, es referente al uso de cualquier droga, lo que incrementa el consumo de las diversas drogas tanto legales como ilegales, de igual manera se encuentran disponibles en internet, esto hace un uso más frecuente debido al fácil acceso de su obtención, sin embargo son los jóvenes los más afectados debido a que en futuro puede ser multiusuarios de drogas **(Grafica C)**.

En hombres el uso de “Cualquier Droga” es de 16.2%; en Drogas ilegales es 15.8%; en Drogas médicas de 1.7%. En cambio en las mujeres con un porcentaje más bajo en el uso de “Cualquier droga” 4.8%, en “Drogas ilegales” 4.3% y en Drogas médicas el 0.9%. En la última línea específica el total de ambos géneros en el pilar de “Cualquier droga” es el 10.3%; en Drogas ilegales el 9.9% y en Drogas médicas” 1.3% **(Cuadro 3.1)**.

El uso de “Cualquier droga” en hombres es el 17.1%; en Drogas ilegales es 16.8%; en Drogas médicas de 1.9%. En las mujeres con un porcentaje más bajo en el uso de “Cualquier droga” 5.8%; en “Drogas ilegales” 4.9% y en Drogas médicas el 0.9%. En la último recuadro específica el total de ambos géneros en la columna de “Cualquier Droga” es el 11.4%, en Drogas ilegales el 10.8% y en Drogas médicas” 1.4% **(Cuadro 3.2)**.

El uso de “Mariguana” en hombres es el 14.0%; en “Cocaína” es 6.2%; en Estimulantes tipo anfetamínico de 1.4%. En mujeres el uso de “Mariguana” 3.7%; en “Cocaína” 1.1% y en “Estimulantes tipo anfetamínico” es de 0.4%. En la última línea horizontal describe el total de ambos géneros de “Mariguana” es 8.6%, en “Cocaína” el 3.5% y en “Estimulantes anfetamínicos” 0.9% **(Cuadro 3.3)**.

El uso de “Mariguana” en hombres es el 14.4%; en “Cocaína” es 6.7% en Estimulantes tipo anfetamínico de 0.8%. En mujeres el uso de “Mariguana” 4.1%; en “Cocaína” 0.8% y en “Estimulantes tipo anfetamínico” no aparece ningún porcentaje. En la última línea horizontal



describe el total de ambos géneros de “Mariguana” es 9.2%; en “Cocaína” el 3.7% y en “Estimulantes anfetamínicos” aparece el 0.4% **(Cuadro 3.4)**.

En hombres de edad de 12 a 17 años es de 4 591,123 con el 63.3%. En las edades de 18 a 34 años es de 7,514,596 con el 45.7% y por último en las edades de 35 a 65 años es de 6,315,595 con el 36.1%. El subtotal de la cantidad de personas expuestas es de 18,421,314 y el porcentaje es de 44.7%. En la línea de las Mujeres en la edades de 12 a 17 años es de 5,054,925 con el 71.3%. En las edades 18 a 34 años es de 8,911,656 con el 50.7% y por último en las edades de 35 a 65 años es de 7,799,269 con el 40.2%, el subtotal de la cantidad de personas expuestas es de 21,765,849 y el porcentaje es de 49.4%. El total de estos dos géneros en población expuesta es de 40,187,163 y el porcentaje es de 47.1% **(Cuadro 3.5)**. En población de 12 a 65 años que ha sido expuesta a algún programa de prevención según sexo estado de Coahuila. Los hombres describen en la línea el 40.4% y las mujeres el 41.8%, lo que hace un total de 41.1%.

El Consumo Alguna Vez en la Vida de Drogas en Población de 12 a 65 años a nivel nacional por Regiones 2008, 2011 y 2016. En esta gráfica incluye a la Región Norcentral específicamente en los años de 2008, 2011 y 2016, en los pilares que destacan son tres en el 2008, el color azul (Uso de Cualquier droga) sobre pasa el porcentaje 6, en cambio el pilar rojo (Drogas Ilegales) llega al punto número 6 sin rebasar esta línea, un tercer pilar verde (drogas medicas) sobre sale el 0.5% de uso. Alguna Vez en la Vida. En el 2011 las líneas se plasman de la siguiente manera, en los pilares se encuentra el color azul (Uso de Cualquier droga) rebasando el porcentaje 8, en cambio el pilar rojo (Drogas Ilegales) se encuentra arriba del 7.5%, el tercer pilar verde (drogas médicas) alcanza el 0.9% el uso de estas sustancias. En 2016 los pilares se describen de la siguiente manera el color azul (Uso de Cualquier droga) rebasando los 11 puntos, en el pilar rojo (Drogas Ilegales) se encuentra en los 11 puntos, pero el tercer pilar color verde (drogas medicas) alcanza el 0.9% por el consumo de drogas en la población antes descrita **(Gráfica D)**.

Encuesta de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014

Consumo de Tabaco

Los fumadores de tabaco en el estado de Coahuila en la etapa de Secundaria existen un número mayor en hombres con un porcentaje de 28.6% en comparación con las mujeres que



tienen el 22.9% en un total de personas de 39,452 y el porcentaje total es 25.6%. En cambio a nivel Bachillerato, encontramos un porcentaje de 53.6% en hombres y en mujeres se registra un porcentaje de 41.9% en una población total de 43,249 estudiantes; el total del porcentaje es 48.0%. En esta misma tabla, anuncia que a nivel Nacional están los estudiantes de Secundaria fumadores de tabaco; el porcentaje mayor lo tienen los hombres con un 23.8% del total de 778,193, aunque en menor porcentaje se subraya a las mujeres con 17.7% en un total de 571,298 adolescentes; con un total del 20.8%. En el siguiente recuadro están los estudiantes de Bachillerato con 51.4% los hombres con 991,308 y las mujeres con menor porcentaje 41.3% en un total de población de 836,332 estudiantes, con el 46.2% en total; descritos en el año 2014 **(Cuadro 4.1)**.

Consumo de Alcohol

Usuarios de alcohol, se describe al estado de Coahuila en el nivel de Secundaria, los hombres con consumo excesivo en el último mes con el 10.1% y en mujeres es menor con 7.8% y el porcentaje total es 8.9%. Sin embargo en Bachillerato en el recuadro de consumo excesivo de esta bebida el porcentaje en hombres es 34.8%, en mujeres es el 23.7% y el total del porcentaje en ambos géneros es de 29.5% en el año 2014. A nivel nacional en el año 2014 el consumo excesivo de alcohol en el último mes en estudiantes de Secundaria; en hombres se refleja con el 8.9%, en cambio las mujeres con 8.3% que en total ambos rubros suman el 8.6%. Los estudiantes de Bachillerato los hombres tienen el 27.3% en cambio las mujeres con un porcentaje menor de 21.3%, en un total de estas cifras arroja el 24.2% **(Cuadro 4.2)**.

Consumo de drogas ilegales

Consumo de Drogas ilegales, en Coahuila en alumnos de Secundaria el uso de cualquier droga es de 12.1%; en drogas médicas el porcentaje está en 4.8% y el consumo de drogas ilegales alcanza un 9.4 % estos descritos en el rubro de alguna vez en la vida. Ahora que, en el último año el porcentaje de cualquier droga es de 8.9%, en drogas médicas apenas con el 3.0% y en el uso de drogas ilegales es del 6.9% y en el recuadro del último mes de consumo, describe a cualquier droga con el 5.2 %, en drogas médicas el 1.6% y en drogas ilegales se visualiza el 4.0%. En alumnos de Secundaria pero a nivel nacional, el uso de cualquier droga describe 12.5%, en drogas médicas es del 4.7% y en drogas ilegales se encuentra el 10.1%. En cambio en el último año el uso de cualquier droga es de 8.9%, en drogas médicas el 3.2% y en drogas ilegales es de 7.1%. También describe el último mes de consumo en cualquier droga es de 5.4%, en drogas médicas 1.9% y en drogas ilegales señalan el 4.3%. En alumnos de Bachillerato en alguna vez en la vida, se encuentra el uso de cualquier droga es de 23.4%, en



drogas médicas el porcentaje está en 7.6% y el consumo de drogas ilegales esta con el 20.0%. Pero en el último año el porcentaje de cualquier droga es de 16.3%, en drogas médicas apenas con el 4.9% y en el uso de drogas ilegales es de 14.1%. Y en el recuadro del último mes de consumo, en cualquier droga con el 7.4%, en drogas médicas el 2.1% y en drogas ilegales se visualiza el 6.4%. En Bachillerato pero a nivel nacional, el uso de cualquier droga describe 25.1%, en drogas médicas esta el 7.5% y en drogas ilegales se encuentra el 21.8%. En el último año el uso de cualquier droga es de 17.6%, en drogas médicas el 4.9% y en drogas ilegales es de 15.1%. También describe en el último mes de consumo en cualquier droga es de 9.0%, en drogas médicas 2.1% y en drogas ilegales señalan el 7.7% **(Cuadro 4.3)**.

La Prevalencia de Consumo de Drogas en estudiantes Secundaria y Bachillerato en Coahuila, uso de sustancia en hombres en alguna vez de cualquier droga es 18.5%; en el último año es de 13.6% y el último mes de 6.7%. En drogas médicas, alguna vez está en 4.7%; el último año 3.2% y el 1.6% en el último mes. En Drogas ilegales, alguna vez es de 16.4%, el último año 12.0% y en el último mes 6.1%. En las drogas siguientes como la Mariguana se encuentra el 13.6% en el consumo de alguna vez en la vida, el ultimo año 10.2% y en el último mes 4.9%. En el uso de Cocaína alguna vez en la vida 2.6%, en el último año 1.2% y en el último mes 0.7%. En el uso de Crack únicamente describe el rubor alguna vez en la vida con 1.0%. Alucinógenos con el 2.1% en alguna vez en la vida, 1.3% el último año y 0.6% en el último mes. Inhalables alguna vez esta el 4.9%, en el último año 3.1% y el 1.4% en el último mes. Metanfetaminas se encuentra el 1.3% en alguna vez en la vida y en el último año 0.6% y 0.3% en el último mes. En el consumo de Heroína en el rubro de alguna vez en la vida 0.5%, el 0.3% en el último año y el 0.3% en el último mes. Anfetaminas se encuentra el 2.0% en el consumo alguna vez en la vida, en el último año 1.6% y en el último mes con el 0.4%. Entre las sustancias también describe a los Tranquilizantes con el 3.1% alguna vez en la vida, 2.2% en el último año y en el último mes 1.2%. El uso de sustancias en mujeres en alguna vez de cualquier droga es 14.1% en el último año es de 9.7% y el último mes 5.3%. En drogas médicas, alguna vez está en 7.0%, el último año 4.2% y el 2.0% en último mes. En Drogas ilegales, alguna vez es de 10.3%, el último año 7.1% y en último mes 3.7%. El consumo en mujeres es el siguiente: Mariguana se encuentra el 6.3% en el consumo de alguna vez en la vida, el último año 4.6% y en el último mes 2.3%. En el uso de Cocaína 1.9%, en el último año 1.1% y en el último mes 0.5%. En el uso de Crack únicamente describe el rubro alguna vez en la vida con 0.5%. Alucinógenos con el 1.8% en alguna vez en la vida; 1.2% el último año y 0.2% en el último mes. Inhalables alguna vez esta el 4.3%, en el último año 2.8% y el 1.3% en el último mes. Metanfetaminas se encuentra el 0.9% en alguna vez en la vida y en el último año 0.7% y 0.5%



en el último mes. En Heroína en el rubro de alguna vez en la vida 0.6%, el 0.2% en el último año y el 0.2% en el último mes. Anfetaminas se encuentra el 1.9% en el consumo alguna vez en la vida, en el último año 1.2% y en el último mes con el 0.6%. Entre las sustancias también describe a los Tranquilizantes con el 4.9% alguna vez, 3.2% en el último año y en el último mes 1.6%. El total del porcentaje de uso sustancias en ambos géneros, está en alguna vez en la vida de cualquier droga 16.3%; en el último año es de 11.6% y el último mes 6.0%. En drogas médicas, alguna vez está en 5.8 %, el último año 3.7% y el 1.8% en último mes. En Drogas ilegales, alguna vez es de 13.3%, el último año 9.5% y en último mes 4.9%. En las drogas siguientes como la Marihuana se encuentra el 9.9% en el consumo de alguna vez en la vida, el último año 7.4% y en el último mes 3.6%. En el uso de Cocaína 2.2%, en el último año 1.2% y en el último mes 0.6%. En el uso de Crack únicamente describe el rubro alguna vez en la vida con 0.7%. Alucinógenos con el 1.9% en alguna vez en la vida; 1.2% el último año y 0.4% en el último mes; Inhalables alguna vez en la vida 4.6%, en el último año 3.0% y el 1.3% en el último mes. Metanfetaminas se encuentra el 1.1% en alguna vez en la vida y en el último año 0.7% y 0.4% en el último mes. En la sustancia de Heroína en el rubro de alguna vez en la vida 0.6%, el 0.3% en el último año y el 0.2% en el último mes. Anfetaminas se encuentra el 2.0% en el consumo alguna vez en la vida, en el último año 1.4% y en el último mes con el 0.5%. En los tranquilizantes alguna vez en la vida el 4.0%, 2.7% en el último año y en el último mes 1.4 % **(Cuadro 4.4).**

La Prevalencia de Consumo de Drogas en estudiantes Secundaria y Bachillerato a Nivel Nacional, uso de sustancia en hombres en alguna vez de cualquier droga es 18.6%; en el último año es de 13.2% y el último mes 7.6%. En drogas médicas, alguna vez está en 5.1%, el último año 3.3% y el 1.8% en último mes. En Drogas ilegales, alguna vez es de 16.6%, el último año 11.6% y en último mes 6.7%. En las drogas siguientes como la Marihuana se encuentra el 12.9% en el consumo de alguna vez en la vida, el último año 9.2% y en el último mes 4.9%. En el uso de Cocaína alguna vez en la vida 4.2%, en el último año 2.2% y en el último mes 1.2%. En el uso de Crack únicamente se describe el rubro alguna vez en la vida con 2.2%. Alucinógenos con el 2.5% en alguna vez en la vida, 1.6% el último año y 0.8% en el último mes. Inhalables alguna vez esta el 5.9%, en el último año 3.6% y el 1.9% en el último mes. Metanfetaminas se encuentra el 2.3% en alguna vez en la vida y en el último año 1.5% y 0.9% en el último mes. En la sustancia de Heroína en el rubro de alguna vez en la vida 1.0%, el 0.6% en el último año y el 0.5% en el último mes. Anfetaminas se encuentra el 2.3% en el consumo alguna vez en la vida, en el último año 1.6% y en el último mes con el 0.8%. Entre las sustancias también describe a los Tranquilizantes con el 3.2%, 2.2% en el último año y en el último mes



1.2%. El uso de sustancias en mujeres en alguna vez de cualquier droga es 15.9%, en el último año es de 11.2% y el último mes 5.8%. En drogas médicas, alguna vez está en 6.5 %, el último año 4.4% y el 2.1% en último mes. En Drogas ilegales, alguna vez es de 12.5%, el último año 8.7% y en último mes 4.5%. En las drogas siguientes como la Marihuana se encuentra el 8.4% en el consumo de alguna vez en la vida, el último año 6.1% y en el último mes 2.9%. En el uso de Cocaína 2.5%, en el último año 1.2% y en el último mes 0.6%. En el uso de crack únicamente describe el rubro alguna vez en la vida con 1.1%. Alucinógenos con el 1.3% en alguna vez en la vida ,0.9% el último año y 0.4% en el último mes. Inhalables alguna vez esta el 5.8%, en el último año 3.6% y el 1.8% en el último mes. Metanfetaminas se encuentra el 1.7% en alguna vez en la vida y en el último año 1.1% y 0.6% en el último mes. En la sustancia de Heroína en el rubro de alguna vez en la vida 0.7%, el 0.3% en el último año y el 0.2% en el último mes. Anfetaminas se encuentra el 2.7% en el consumo alguna vez en la vida, en el último año 1.9% y en el último mes con el 0.9%. Entre las sustancias también se describen a los Tranquilizantes con el 4.3% alguna vez en la vida, 3.0% en el último año y en el último mes 1.4%. El total del porcentaje de uso sustancias en ambos géneros, está en alguna vez en la vida de cualquier droga es 17.2%; en el último año es de 12.2% y el último mes 6.7%. En drogas médicas, alguna vez está en 5.8%, el último año 3.9% y el 2.0% en último mes. En Drogas ilegales, alguna vez es de 14.5%, el último año 10.1 % y en último mes 5.6%. En las drogas siguientes como la Marihuana se encuentra el 10.6% en el consumo de alguna vez en la vida, el último año 7.6% y en el último mes 3.9%. En el uso de Cocaína 3.3%, en el último año 1.7% y en el último mes 0.9%. En el uso de Crack únicamente describe el rubro alguna vez en la vida con 1.6%. Alucinógenos con el 1.9% en alguna vez en la vida 1.2% el último año y 0.6% en el último mes. Inhalables alguna vez esta el 5.8%, en el último año 3.6% y el 1.9% en el último mes. Metanfetaminas se encuentra el 2.0% en alguna vez en la vida, en el último año 1.3% y 0.7% en el último mes. En la sustancia de Heroína en el rubro de alguna vez en la vida 0.9%, el 0.5% en el último año y el 0.3% en el último mes. Anfetaminas se encuentra el 2.5% en el consumo alguna vez en la vida, en el último año 1.8% y en el último mes con el 0.9%. Entre las sustancias también se describen a los Tranquilizantes con el 3.7% alguna vez, 2.6% en el último año y en el último mes 1.3 % **(Cuadro 4.5)**.

Información Epidemiológica del Consumo de Drogas en CIJ Piedras Negras

El **Cuadro 5.1** describe el porcentaje de consumo de drogas en pacientes alguna vez en la vida, entre pacientes de primer ingreso a tratamientos en Centros de Integración Juvenil, del primer semestre del 2005 al primer semestre de 2019 a nivel nacional (%).

Iniciando con un total de casos 10,075; cerrando con un total de 11,596 pacientes. Respecto a la primera droga legal “Tabaco” este porcentaje de consumo solo cambio el 1%. Algo similar se observa en la segunda droga legal “Alcohol” con un aumento del 1%. Ahora que, en la sustancia del “Cannabis” aparece con 71.1% e incrementa hasta un 14%. En cuanto a los “Inhalables” el porcentaje inicial era del 34.7%, pero este se reduce al 13%. Otra sustancia que describe este cuadro es la “Cocaína” de inicio aparece con un porcentaje de 57.2%, sin embargo se acorta hasta un 17%. Aparece también en la lista de sustancias el “Crack” tenía un porcentaje de 34.6%, sin embargo este porcentaje se reduce al 14%. Otra de las sustancias son las “Metanfetaminas” con el 15.9%, pero este porcentaje se incrementó a más del 19%, siendo el porcentaje final 35.6%. El “Éxtasis” se encuentra incluida en esta lista de uno de los porcentajes más bajo alcanzando el 6.5%. Las “Benzodiacepinas” describen un porcentaje 19.7%, reduciendo el porcentaje hasta el 15.1%. Respecto a la “Heroína” siendo la más baja en porcentaje de esta lista de sustancias con 5.1%, cayendo hasta el 2.5% en el consumo de drogas de pacientes alguna vez en la vida y por último se encuentran los “Alucinógenos” con el 7.4%, sumando puntos y quedando un total de 13.6%.

El siguiente **Cuadro 5.2** se refiere las tendencias del consumo de drogas alguna vez en la vida entre pacientes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil del estado de Coahuila, del primer trimestre 2005 al primer semestre del 2019 (%). El cual inicia en la primera línea con 316 casos, cerrando con un total de 551 pacientes. Se visualiza en la sustancia de “Tabaco” en el porcentaje de consumo de sustancias alguna vez en la vida, solo cambio 89.6%, subiendo aproximadamente dos puntos. Sin embargo en la segunda línea del “Alcohol” con el 87.3% obtuvo un incremento de 3 puntos. Ahora que, en la sustancia del “Cannabis” aparece con 69% e incrementando más de 20 puntos. En cuanto a los “Inhalables” el porcentaje de inicio es de 50% pero baja 23 puntos. Otra sustancia es la “Cocaína” aparece al inicio con un porcentaje de 58.2%, sin embargo disminuye su consumo hasta más de 20 puntos. También se observa en el “Crack” con un porcentaje de 12%, sin embargo este porcentaje se reduce en 2 décimas. Otra sustancia son las “Metanfetaminas” con el 3.8%, pero incrementó casi 40 puntos porcentuales. El “Éxtasis” esta con un porcentaje bajo de 3.8%, pero alcanzan solo el 5.8%. Las “Benzodiacepinas” tenían un porcentaje

26.6%, disminuyó el consumo quedando el porcentaje en 16.9%. Respecto a la “Heroína” con un porcentaje de 2.2%, disminuyendo y quedando al final en 1.5%. La última sustancia es los “Alucinógenos” con el 2.8%, aumentando su consumo a 10%.

En la **Gráfica E** respecto a la tendencias del consumo de drogas alguna vez en la vida entre pacientes de primer ingreso a tratamientos en Centros de Integración Juvenil, del primer semestre de 2012 al segundo semestre del 2014, CIJ, Piedras Negras (%). El “Alcohol” se visualiza una línea azul que corresponde al 100% siendo la sustancia más consumida por pacientes que solicitan atención en CIJ en este periodo. Otra línea que resalta es el color verde que pertenece a la sustancia del “Cannabis”, sustancia que también alcanza el porcentaje máximo del 100%. Por consiguiente se encuentra una línea azul con intervalos, que corresponde a la sustancia “Crack”, esta droga alcanza un porcentaje del 75%. Una más que se acentúa es de color rojo siendo la droga de menos impacto la “Cocaína” con el 25% de preferencia de los pacientes. Aunque solo 4 drogas en este cuadro son las que más destacan, existen más sustancias que pudieran también formar parte en este recuadro como son el Tabaco, Benzodiacepinas, Heroína, Metanfetaminas, Alucinógenos, Inhalables y Éxtasis.

El **Cuadro 5.3.** Tendencias del consumo de drogas alguna vez en la vida entre pacientes de primer ingreso a tratamiento de Centros de Integración Juvenil, del primer semestre 2012 al segundo semestre de 2014, CIJ, Piedras Negras (%). El total del casos inicia con 4, para concluir con un paciente; la sustancias en primera línea es el “Tabaco” con un porcentaje 100%, no existe ninguna modificación en esta línea y continua con el mismo porcentaje. En la siguiente línea está el “Alcohol” también con el porcentaje total de 100%, tampoco existe cambio y se mantiene igual.

Tercera línea se encuentra el “Cannabis” con el 75% de tendencias de consumo, pero el porcentaje sube hasta el máximo siendo el 100%. La cuarta línea son los “Inhalables” en este recuadro no se visualiza ningún porcentaje al inicio, tampoco al final de esta línea. En el trazo cinco esta la “Cocaína con el 25% de inicio, sin embargo al final de este año 2014 no se observa ningún porcentaje. Continúa otra sustancia que es el “Crack” con el 75%, pero al final de la línea aparece en ceros el porcentaje. La “Metanfetamina” otra de las drogas de este cuadro describe el porcentaje en ceros

al inicio y termino; de igual manera aparecen las siguientes sustancias “Éxtasis”, “Benzodiacepinas”, “Heroína” y “Alucinógenos” con porcentaje en ceros.

El último **Cuadro 5.4** las características y patrón de consumo de pacientes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil AC entre enero y junio de 2019. En la línea que describe el “Sexo” en pacientes de estado de Coahuila en un total de 551, el 77% son hombres y el 22.3% son mujeres, siendo la razón H:M 3.5 por cada mujer. En un segundo recuadro esta la “Edad de ingreso” describe a las edades de 10 a 14 años con el 28.9%, de 15 a 19 años de 40.7% y de 20 a 24 años de 10.9%; en edad promedio esta 19.55 años. Otro recuadro que anexa es “Edad de inicio del uso de drogas ilícitas” edades de 10 a 14 años con el 55.7%, de 15 a 19 años de 36.5% y de 20 a 24 años de 3.1%, con el promedio de 14.76 años. En un cuarto recuadro esta “Principales drogas ilícitas de inicio” la primera es “Mariguana” 80%, el siguiente son los “Inhalables” 10.3% y “Benzodiacepinas” con el 2.4%. Otro cuadro presente es “Principales drogas de mayor impacto en el último año” con la “Mariguana 48.5%”, “Metanfetaminas 28.4% y el Alcohol 7.3% y el último recuadro es “Principales drogas consumidas en el último mes” se encuentra el “Tabaco” con el 60.6%, “Mariguana” 58.6% y el “Alcohol” con el 50.3%. En cambio a Nivel Nacional el número total es de 11, 596 el 81.3% son hombres, en cambio el 18.7% son mujeres y Razón H:M 4.3 por cada mujer. “Edad de ingreso” detalla edades 10 a 14 años con el 12.6%, de 15 a 19 años de 36.4% y de 20 a 24 años de 15.8%; el promedio de edad es 23.82 años. En el tercer recuadro es “Edad de inicio del uso de drogas ilícitas” en las edades de 10 a 14 años con el 39.7%, de 15 a 19 años de 44.9% y de 20 a 24 años de 7.6%, con el promedio de edad 16.31 años. Otro recuadro es “Principales drogas ilícitas de inicio” la primera es “Mariguana” 74.2%, la siguiente es “Cocaína” 7.7% e “Inhalables” con el 6.8%. Siguiendo cuadro presente están los “Principales drogas de mayor impacto en el último año” con la “Mariguana” 36.6%, “Metanfetaminas” 22.9% y el “Alcohol” 13.1% y el último recuadro es “Principales drogas consumidas en el último mes” se encuentra el “Tabaco” con el 59.5%, “Alcohol” 55.8% y “Mariguana” con el 47.9%.

Zonas de Alto Riesgo de Atención Prioritaria

La identificación de colonias o zonas de alto riesgo para el consumo de drogas y el establecimiento de una lista de zonas de atención prioritaria representan referentes necesarios



para la planeación y aplicación estratégica de programas, en el contexto particular del área de influencia de CIJ Piedras Negras. Para este efecto, se llevó a cabo una clasificación de las colonias que integran la zona de influencia del CIJ respectivo en función de determinados factores o condiciones de riesgo, identificando aquéllas que presentan necesidades y características propicias para el desarrollo y operación de programas institucionales. Para el caso de las zonas de atención prioritaria se tomó en cuenta, además de los factores señalados, que presentaran condiciones propicias para la aplicación de los servicios institucionales; fueran accesibles, contaran con recursos organizados, apoyo interinstitucional, antecedentes de trabajo preventivo y condiciones de seguridad. También se consideró el número y extensión, la capacidad operativa de la unidad y el diseño de una atención preventiva viable y adecuada, así como la aplicación diferenciada de estrategias universales, selectivas o indicadas.

A partir de la experiencia y conocimiento del equipo médico técnico se han identificado colonias y comunidades consideradas de alto riesgo de atención prioritaria para la intervención en el periodo 2018- 2024 (**Listado de Asentamientos por Nivel de Riesgo y Prioridad**).

Por otro lado, el desarrollo de estrategias de atención del consumo de drogas eficaces, necesarias, en particular en el caso de zonas de alto riesgo de atención prioritaria, debe considerar las variables psicosociales que la investigación empírica ha identificado como presuntos factores de riesgo o protección. Diversos estudios realizados en México, incluyendo estudios efectuados en CIJ, han contribuido a esta área de conocimiento (**Factores Psicosociales de Riesgo del Uso Drogas**).