



DIAGNÓSTICO DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL

CIJ TAMPICO

El diagnóstico del consumo de drogas permitirá tener una visión más clara del comportamiento de los datos epidemiológicos a nivel nacional, estatal y local, lo cual será de suma importancia ya que, en los últimos años se han observado cambios significativos en cuanto a la edad más temprana de inicio, el surgimiento de nuevas drogas con mayor poder adictivo, la permisividad y accesibilidad de las sustancias, así como el aumento del consumo en las mujeres, por lo tanto el diagnóstico resulta útil para la aplicación estratégica de programas y servicios.

Cabe señalar que para la integración del diagnóstico se analizaron tres fuentes, la Encuesta Nacional del Consumo de Drogas, alcohol y Tabaco (ENCODAT 2016-2017), la Encuesta Nacional del Consumo de Drogas a Estudiantes 2014 (ENCODE 2014); y el Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas de Centros de Integración Juvenil (CIJ).

Encuesta Nacional del Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

(ENCODAT 2016-2017)

Tabaco

De la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017 (ENCODAT 2016-2017) destaca el consumo de tabaco alguna vez en la vida en población de 12 a 65 años, encontrando un comparativo de la ENA 2011 donde el porcentaje es el 48% y en ENCODAT 2016-2017 el 51% de la población encuestada usuario de alguna vez en la vida de Tabaco (**Gráfica A**). Identificando la mayor prevalencia del consumo de tabaco en hombres siendo un 65.7% y el 37.4% en mujeres, en referencia al número de cigarros fumados encontramos que corresponde el 33.0% a los hombres y el 10.7% de mujeres refieren fumar más de 100 cigarros, siendo el total nacional de 21.5%, de los cuales el 31.4% de hombre y 10.9 % de mujeres refieren haber fumado en el último año siendo el 20.8% la media nacional, así como en fumadores actuales se observa el 27.1% son hombres y el 8.7% son mujeres, siendo el 17.6 % la cifra a nivel nacional, por lo que se observa un mayor porcentaje en población de hombres fumadores (**Cuadro 1.1**).

En los datos a nivel estatal se observan los siguientes; fumador de más de 100 cigarros en hombre observamos el 28.5 % y en mujeres el 8.4%, fumador en el último año hombres 26.4 % y mujeres 10.6 %, en fumador actual el 22.0 % son hombres y 7.5 % son



mujeres, observándose una disminución de porcentajes a nivel estatal en comparación con los resultados nacionales **(Cuadro 1.2)**.

El consumo actual de tabaco en población de 12 a 65 años de edad por sexo a nivel nacional y estatal encontramos que el 11.1 millones de consumidores son hombres y el 3.8 millones son mujeres, siendo un total de 14.90 millones de población a nivel nacional, con una diferencia menor en el estado, siendo 264 mil hombres y 94 mil consumidoras mujeres, siendo un total de 358 mil personas usuarias actuales de tabaco en el estado. **(Cuadro 1.3)**.

En la edad promedio de inicio del consumo de tabaco a nivel nacional y en el estado de Tamaulipas se observa una mínima diferencia del 0.4 %, siendo menor el inicio del consumo a nivel nacional.

Alcohol

El consumo de alguna vez en la vida de alcohol en población de 12 a 65 años de la ENA 2011 (Encuesta Nacional de Adicciones) fue del 71 %, en igual porcentaje del 71% de la ENCODAT 2016 (Encuesta nacional del consumo de Alcohol y Tabaco) **(Gráfica B)**.

El consumo del alcohol en la población de 12 a 65 años a nivel nacional se observa un porcentaje del 7.5% de hombres y 3.9% en mujeres en consumo diario de alcohol, el 20.2% hombres y 7.4% mujeres en consumo consuetudinario de alcohol, el 5.5% hombres y 1.3 % mujeres con dependencia al alcohol **(Cuadro 2.1)**.

Los datos del consumo de alcohol en la población de 12 a 65 años de edad en el estado de Tamaulipas se observa un 5.2 % de hombres y un 3.7 % mujeres en consumo diario y el 19.6 % hombres y el 9.4 % mujeres en consumo consuetudinario, observándose un comparativo de consumo mayor consumo a nivel nacional en el consumo diario y consuetudinario de alcohol **(Cuadro 2.2)**.

La edad de inicio del consumo de alcohol en la población de 12 a 65 años de edad a nivel Nacional encontramos en hombres el 61.5 % y el 43.1 % mujeres iniciaron su consumo a los 17 años y menos, el 36.5 % hombres y el 47.1 % mujeres iniciaron su consumo entre los 18 a 25 años de edad, el 2.0 % hombres y el 9.8 % mujeres iniciaron el consumo de alcohol entre los 26 a 65 años de edad **(Cuadro 2.3)**.

Las necesidades de atención por el consumo de alcohol en la población de 12 a 65 años de edad encontramos que en hombres la edad de 18 a 65 años indican un mayor porcentaje en el consumo excesivo con un 40.2 %, en el abuso de alcohol encontramos



un 7.3% y la dependencia en un 4.6% , en mujeres se observa un porcentaje menor a los hombres y entre la población de mayor necesidad de atención encontramos la población de 18 a 65 años de edad, siendo el de consumo excesivo con un 21.6%, en el abuso de alcohol se observa un porcentaje con poca diferencia entre la población de 12 a 17 años de edad con un porcentaje de 1.5%, y el 1.8% de mujeres en edad de 18 a 65 años de edad **(Cuadro 2.4)**.

El rango de edad de mayor consumo *per cápita* en la población de 12 a 65 años de edad a nivel nacional observamos que el mayor consumo *per cápita* se da entre la población de hombres en las edades de 18 a 29 años de edad siendo 11.827, siendo igual el rango de edad en mujeres encontrando un 3.468 consumo *per cápita* **(Cuadro 2.5)**.

Un comparativo del consumo *per cápita* entre la población de 12 a 65 años de edad, se observa una mayor cantidad de consumo *per cápita* a nivel nacional, siendo 7.269, con un 5.623 consumo *per cápita* a nivel estatal, en mujeres el nivel nacional es de 2.076 y a nivel estatal 2.958, observando un mayor consumo en mujeres a nivel estatal.

Observando en este apartado cifras mayores de consumo en los hombres, en su mayoría el consumo consuetudinario, con edad de inicio de 17 años y menos, y la población con mayor nivel de atención es de los 18 a 65 años.

Drogas Ilegales

El porcentaje del consumo alguna vez en la vida de drogas ilegales en población de 12 a 65 años de edad a nivel nacional, el presente comparativo es del consumo de cualquier droga, drogas ilegales y drogas médicas, donde se observa del 2008, 2011 y 2016 existe un incremento a partir del 2008 de cualquier droga, así como de drogas ilegales por encima del punto 6, llegando hasta el punto 10, en estos 10 años.

Revisando por regiones, las que se observan con un incremento a partir de 2011 por encima del punto 8 son: zona norcentral, noroccidental, nororiental, occidental. La zona centro, centro sur y sur, su incremento fue a partir del 2011 y la Cd. de México sobrepaso el punto 8 en la gráfica desde el 2008 **(Gráficas C y D)**.

El consumo de drogas alguna vez en la vida en la población de 12 a 65 años de edad a nivel nacional y por sexo se encuentra de esta manera; el consumo de cualquier droga en hombres el 16.2 % y en mujeres el 4.8 %, el consumo de drogas ilegales en hombres se observa el 15.8 % y en mujeres el 4.3 %, el consumo de drogas médicas en los hombres



se observa el 1.7 % y en mujeres el 0.9 %, observándose un porcentaje mayor de consumo en el sexo masculino **(Cuadro 3.1)**.

El comparativo del consumo de drogas alguna vez en la vida en la población de 12 a 65 años de edad, los resultados a nivel estatal se observa lo siguiente; en hombres el 15.8 % consume cualquier droga y mujeres el 5.0 %, el consumo de drogas ilegales en hombres es del 15.4 % y mujeres 4.7 %, el consumo de drogas medicas se observa en hombres el 2.0% y mujeres el 0.8%, observando que a nivel nacional el consumo de cualquier droga y drogas ilegales en hombres es mayor el consumo y el las mujeres sobresale el porcentaje a nivel estatal,

en el uso de drogas medicas consumen más lo hombres del estado de Tamaulipas y las mujeres en mayor porcentaje a nivel nacional **(Cuadro 3.2)**.

El consumo de marihuana, cocaína y estimulantes tipo anfetamínico alguna vez en la vida en la población de 12 a 65 años de edad se observa en hombres el uso de la marihuana un 14.0 % en hombres y un 3.7 % en mujeres, cocaína el 6.2% en hombres y 1.1% en mujeres, estimulante tipo anfetamínico 1.4% en hombres y el 0.4% mujeres, observando un mayor porcentaje de consumo en la población masculina **(Cuadro 3.3)**.

El consumo de drogas alguna vez en la vida en población de 12 a 65 años de edad por sustancias principales en el estado de Tamaulipas es de marihuana 13.4% en hombres, y el 4.2% en mujeres, el consumo de cocaína en hombres es de 6.2% y en mujeres 1.6% , el consumo de estimulante tipo anfetamínico, en hombres es de 0.7 % y en mujeres el 0.1%, observando un mayor consumo de sustancias a nivel nacional en hombres, encontrando que a nivel estatal sobresale el consumo de mujeres en sustancias como la marihuana y la cocaína en comparación a nivel nacional **(Cuadro 3.4)**.

La población de 12 a 65 años de edad que ha sido expuesta a algún programa de prevención es la población en hombre el 63.3% de la población en edad de 12 a 17 años de edad, y en mujeres el 71.3% de la población de 12 a 17 años de edad a nivel nacional. **(Cuadro 3.5)**.

En el estado de Tamaulipas la población expuesta a algún programa de prevención es del 44.5% hombres y 45.1% mujeres.

Observándose que las mujeres a nivel nacional y estatal son las que más han estado expuestas a programas preventivos.



Observándose todos estos datos la población más expuesta en el consumo de drogas ilegales es la población de hombres.

Encuesta Nacional del Consumo de Drogas en Estudiantes 2014

(ENCODE 2014)

Tabaco

Los porcentajes del consumo de tabaco alguna vez en la vida por nivel educativo y por sexo encontramos los siguientes datos; en el estado de Tamaulipas, en el nivel de secundaria el porcentaje de usuarios de tabaco en hombres es el 19.1% y mujeres el 14.4%, a nivel nacional el porcentaje en hombres es de 23.8% y en mujeres el 17.7%, a nivel de bachillerato los porcentajes encontrados fueron en el estado, hombres el 46.4% y el consumo en mujeres el 34.5%, a nivel nacional fue del 51.4% hombres y 41.3% mujeres **(Cuadro 4.1)**.

Alcohol

El porcentaje de consumidores de alcohol por nivel educativo y sexo a nivel nacional y estado se observa; a nivel de secundaria el consumo el porcentaje de usuarios de alguna vez en la vida (AV) en el estado es; en hombres el 35.5% y mujeres el 32.6%, a nivel nacional en hombres es el 41.9% y en mujeres el 39.4%, el consumo en el último año (UA) en el estado es de 17.8% en hombres y el 21.5% mujeres, a nivel nacional el porcentaje en hombres es de 24.3% y el 24.0% mujeres, el consumo en el último mes (UM) en el estado es del 12.2% hombres y el 15.8% mujeres, a nivel nacional el 16.4% en hombres y el 17.4% mujeres, considerando el consumo excesivo de alcohol en el ultimo se observa a nivel estatal; el 5.2% en hombres y el 7.1% en mujeres a nivel nacional el consumo es de 8.9% en hombres y el 8.3% en mujeres. A nivel bachillerato se observa lo siguiente; el consumo de alguna vez en la vida (AV) en hombres es de 61.8% en hombres y el 62.3% en mujeres, el consumo a nivel nacional es de 74.3% en hombres y el 73.3% mujeres, el consumo en el último año (UA) a nivel estado es del 42.7% en hombres y el 40.6% en mujeres, a nivel nacional se observa el 56.5% en hombres y el 52.1% en mujeres, el consumo en el último mes (UM) a nivel estado es del 34.2% en hombres y el 28.5% en mujeres, el consumo a nivel nacional es de 43.8% en hombres y el 40.0% en mujeres, en el consumo excesivo de alcohol en el último mes se observa lo siguiente a nivel estado, en hombres el 21.7% y el 14.6% en mujeres, a nivel nacional el consumo en hombres es de 27.3% y mujeres el 21.3% **(Cuadro 4.2)**.



Drogas Ilegales

La prevalencia de consumo de drogas en secundarias y bachilleratos en el estado de Tamaulipas y a nivel nacional encontramos lo siguiente; a nivel secundaria en el estado el consumo de alguna vez en la vida de cualquier droga es del 9.9%, de drogas medicas el 3.5% y drogas ilegales el 8.7%, a nivel Nacional el consumo de cualquier droga es de 12.5%, drogas medicas el 4.7% y drogas ilegales el 10.1%. El consumo en el último año se observa a nivel estado en cualquier droga el 7.0 %, drogas medicas 2.5% y drogas ilegales el 5.8%, a nivel nacional el consumo de cualquier droga es de 8.9%, droga medica el 3.2%, drogas ilegales el 7.1%. El consumo en el último mes a nivel estado de cualquier droga es del 4.38%, drogas medicas el 1.6% y drogas ilegales el 4.0%, a nivel nacional el consumo de cualquier droga es del 5.4%, drogas medicas el 1.9% y drogas ilegales el 4.3% **(Cuadro 4.3)**.

A nivel bachillerato se observa lo siguiente; a nivel estado el consumo alguna vez en la vida de cualquier droga es del 20.4%, drogas medicas 6.9%, drogas de uso ilegal 17.9% a nivel nacional observamos el consumo de alguna vez en la vida de cualquier droga 25.1%, drogas medicas 7.5%, drogas ilegales 21.8%.

El consumo en el estado correspondiente al último año de cualquier droga es de 14.6%, el uso de drogas medicas 4.9%, drogas de uso ilegal 12.6%, a nivel nacional el consumo en el último año de cualquier droga es de 17.6 %, el consumo de drogas medicas 4.9%, drogas ilegales 15.1%.

En el estado el consumo en el último mes de cualquier droga es de 7.8%, de drogas medicas el 2.7%, de drogas ilegales el 6.8%. A nivel nacional el consumo en el último año de cualquier droga es 9.0%, drogas médicas el 2.1%, drogas ilegales el 7.7% **(Cuadro 4.3)**.

En cuanto a la prevalencia de consumo de drogas en estudiantes de secundaria y bachillerato por sexo en Tamaulipas se observa lo siguiente: el consumo de cualquier droga alguna vez en hombres es de 15.1%, en el último año es de 10.6% y en el último mes de 6.4%, en mujeres se observa el consumo de alguna vez es del 12.4%, en el último año 9.0%, en el último mes es de 5.4%.

El consumo de drogas médicas en hombres alguna vez es del 5.1%, en el ultimo año 3.5% y en el último mes el 2.0%, el consumo en mujeres se observa en alguna vez es de 4.4%, en el último año el 3.2% y en el último mes el 1.9%.



La prevalencia de drogas ilegales en hombres se observa alguna vez es el 13.8%, en el último año es el 9.6%, el consumo en el último mes es de 6.0%, en mujeres la prevalencia se observa alguna vez el 10.4%, en el último año el 7.0%, y en el último mes el 4.1%, observándose que predomina en ambos sexos y en todos los tipos de consumo, la sustancia de cualquier droga y encontrando mayor consumo en hombres.

La prevalencia del consumo de marihuana en hombres de alguna vez es de 10.7%, el consumo en el último año es de 7.8% y en el último meses el 4.6%, el consumo en mujeres alguna vez es de 7.0%, en el ultimo año 4.8%, en el último mes de 2.7%.

La prevalencia del consumo de cocaína en hombres alguna vez es de 5.5%, el consumo en el último año es de 3.3% y en el último mes de 1.8%, en mujeres se observa el consumo alguna vez el 2.8%, en el último año el 1.7% y en el último mes el 1.2%.

La prevalencia del consumo de crack en hombres es de alguna vez el 2.1% y en mujeres el consumo de alguna vez es de 0.8% no encontrando datos en otro tipo de consumo.

La prevalencia del consumo de alucinógenos se observa el consumo en hombres alguna vez es el 1.8%, en el ultimo año 1.3%, y en el último mes el 1.0%, el consumo en mujeres el consumo alguna vez es el 0.3%, en el último año el 0.2% y en el último mes el 0.2%.

La prevalencia del consumo de inhalables en hombres el consumo alguna vez es el 4.3%, en el último año el 2.7%, en el último mes 1.7%, el consumo mujeres alguna vez es de 3.7%, en el ultimo año 2.5% y en el último mes el 1.4%.

La prevalencia del uso de las metanfetaminas en hombres el consumo de alguna vez es de 2.3%, en el último año es de 1.8% y en el último mes el 1.1%, el consumo en mujeres alguna vez es de 1.3%, en el último año el 0.9 %y en el último mes el 0.4%.

La prevalencia del consumo de la heroína en hombres de alguna vez es de 1.7%, en el último año el 1.2%, y en el último mes el 0.8%, el consumo en mujeres de alguna vez es de 1.0%, en el último año el 0.4% y en el último mes el 0.3%.

La prevalencia del uso de anfetaminas en los hombres el consumo alguna vez es el 2.8%, el consumo en el último año es de 2.2%, en el último mes el 1.2%, el consumo en mujeres de alguna vez es del 2.2% en el último año, el 1.7% y en el último mes el 0.9%.

La prevalencia del uso de los tranquilizantes en hombres alguna vez es de 3.2%, en el último año el 2.4% y en el último mes el 1.6%, el consumo en mujeres de alguna vez es de 2.6%, en el último año el 2.0% y en el último mes el 1.3%. Observándose que



predomina el uso de la marihuana en ambos sexos y en los tres tipos de consumo, encontrando mayor porcentaje de consumo en hombres (**Cuadro 4.4**).

La prevalencia del consumo de drogas en estudiantes de secundaria y bachillerato por sexo a nivel nacional en hombres el consumo de cualquier droga alguna vez es el 18.6%, en el último año el 13.2%, en el último mes el 7.6%, el consumo en mujeres de alguna vez es del 15.9%, en el último año el 11.2% y en el último mes el 5.8%.

La prevalencia del consumo de drogas médicas en hombres alguna vez es de 5.1%, en el último año es del 3.3% y en el último año es del 1.8%, el consumo en mujeres de alguna vez es de 6.5%, en el último año el 4.4% y en el último mes el 2.1%.

La prevalencia del consumo de drogas ilegales en hombres alguna vez es del 16.6%, en el último año el 11.6% y en el último mes el 6.7%, el consumo en mujeres es de alguna vez el 12.5%, en el último año el 8.7% y en el último mes el 4.5%.

La prevalencia del consumo de marihuana en hombres alguna vez es de 12.9%, en el último año el 9.2% y en el último mes el 4.9%, el consumo en mujeres de alguna vez es del 8.4%, en el último año el 6.1% y en el último mes el 2.9%.

La prevalencia del consumo de cocaína en hombres de alguna vez es del 4.2%, en el último año el 2.2% y en el último mes el 1.2%, el consumo en mujeres de alguna vez es del 2.5%, en el último año el 1.2% y en el último mes el 0.6%.

La prevalencia del consumo de crack en hombres alguna vez es del 2.2% y en mujeres el 1.1%, no encontrando datos en el último año ni en el último mes.

La prevalencia del consumo de alucinógenos en hombres alguna vez es del 2.5%, en el último año el 1.6% y en el último mes el 0.8%, el consumo en mujeres de alguna vez es del 1.3%, en el último año el 0.9% y en el último mes del 0.4%.

La prevalencia del consumo de Inhalables en hombres alguna vez en la vida es del 5.9%, en el último año el 3.6%, en el último mes el 1.9%, el consumo en mujeres alguna vez es del 5.8%, en el último año el 3.6% y en el último mes el 1.8%.

La prevalencia del consumo de metanfetaminas en hombres alguna vez es del 2.3%, en el último año el 1.5% y en el último mes el 0.9%, el consumo en mujeres alguna vez es del 1.7%, en el último año el 1.1% y en el último mes el 0.6%.



La prevalencia del consumo de heroína en hombres alguna vez es del 1.0%, en el último año el 0.6% y en el último mes del 0.5%, el consumo en mujeres alguna vez es del 0.7%, en el último año el 0.3% y en el último mes del 0.3%.

La prevalencia del consumo de anfetaminas en hombres de alguna vez es del 2.8%, en el último año es del 1.9%, en el último mes del 1.0%, el consumo en mujeres alguna vez es del 2.7%, en el último año el 1.9% y en el último mes el 0.9%.

La prevalencia del consumo de tranquilizantes en hombres de alguna vez es del 4.2%, en el último año del 2.6% y en el último mes del 1.3%, el consumo en mujeres de alguna vez es del 4.3%, en el último año el 3.0% y en el último mes del 1.4%.

El comparativo de la prevalencia del consumo de drogas en estudiantes de secundaria y bachillerato en el estado como a nivel nacional sobrepasa que el porcentaje mayor del consumo fue en cualquier droga en ambos sexos, así como el uso de la marihuana en ambos sexos, siguiendo el consumo de los inhalables y por último con porcentajes iguales en hombres el consumo de cocaína y tranquilizantes, en mujeres este último fue tranquilizantes como 3ª. Sustancia de consumo en mujeres (**Cuadro 4.5**).

Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas de Centros de Integración Juvenil (CIJ)

Los datos que se presentan provienen del sistema de información epidemiológica del consumo de drogas de los Centros de Integración Juvenil, nos proporcionan datos recientes a nivel nacional, estado y a nivel de unidad del consumo alguna vez en la vida del uso de sustancias como tabaco, alcohol, cannabis, inhalables, cocaína, crack, metanfetaminas, éxtasis, benzodiazepinas, heroína y alucinógenos.

Respecto a la tendencia del consumo de alguna vez en la vida de alcohol y tabaco de pacientes atendidos en CIJ Tampico en el segundo semestre del 2016 se observa el porcentaje del consumo de alcohol en 93.5% y el tabaco en un 90.3%, siendo mayor el porcentaje de este semestre en comparación a los años anteriores.

Comparando los niveles y tendencias del consumo de alcohol y tabaco alguna vez en la vida en el segundo semestre del 2016 reportados por pacientes atendidos a nivel estatal observamos el consumo de alcohol en 90.1% y el 87.9% tabaco, a nivel nacional el consumo de alcohol alguna vez en la vida es del 86.8% y de tabaco el 86.0%.

Observamos un mayor porcentaje de consumo de alcohol y tabaco en este último semestre del 2016 en pacientes atendidos a nivel unidad Tampico, en comparación a nivel estatal y nacional y el aumento al paso de los años.

La tendencia de consumo alguna vez en la vida en pacientes atendidos en la unidad, a nivel estatal y nacional de drogas lícitas e ilícitas se observa que a nivel nacional las drogas lícitas han aumentado su consumo actualmente con un porcentaje de alcohol a nivel nacional del 86.8% y el tabaco el 86.0%, a nivel estatal el alcohol es de 90.1%, el tabaco con un 87.9% y a nivel local el porcentaje de alcohol es del 93.5% y el tabaco el 90.3%.

Dentro de las drogas ilícitas se observa el uso de marihuana quien no ha variado mucho su porcentaje sin embargo es la sustancia que más se consume a nivel nacional con un porcentaje de 87.2% de, 89.4% a nivel estatal y un 92.5% a nivel local, en segundo lugar el consumo de cocaína observándose a nivel nacional el 36.9%, a nivel estado el 36.9% y a nivel local el 31.2% esta sustancia una disminución de los porcentajes a lo largo de los años, en tercer lugar se observa a los inhalables a nivel nacional con un 28.2%, nivel estado el 22.7% y nivel local el 22.6%, como cuarta sustancia de porcentajes mayor, observamos a nivel nacional las metanfetaminas 27.1%, a nivel estado el éxtasis 13.5% y a nivel local el éxtasis con un 14.0%, el quinto lugar a nivel nacional se observa al Crack con un 20.3%, a nivel estado las benzodiazepinas con un 11.3%, y a nivel local las benzodiazepinas y alucinógenos con un 10.8%, en el sexto lugar se observa el consumo a nivel nacional de las benzodiazepinas con un 14.5%, a nivel estado encontramos al Crack y los alucinógenos con un 9.9%, a nivel local el Crack con un 7.5%.

Se observa el consumo de alcohol y tabaco a nivel nacional con porcentajes similares a los años anteriores, a nivel estado y local se observa un ligero crecimiento en los últimos años. Con respecto a las drogas de uso ilícitas se observa a la marihuana a nivel nacional y estado con un porcentaje igual, a nivel local la marihuana se observa un ligero aumento, mientras que las metanfetaminas, el éxtasis, las benzodiazepinas y los alucinógenos con un ligero aumento a nivel nacional estado y local, mientras que la cocaína, los inhalables se presentan con un porcentaje estable sin mucha variación de aumento (**Cuadros 5.1, 5.2 y 5.3 y Gráfica E**).

Características y Patrón de Consumo de Pacientes de Primer Ingreso a Tratamiento en Centros de Integración Juvenil entre julio y diciembre de 2016.

Las características y patrón de consumo de pacientes de primer ingreso a tratamiento en los CIJ entre julio y diciembre de 2006 son las siguientes.

Los usuarios de los servicios de los CIJ son en su mayoría hombres (88.2%) mujeres (11.8%), la edad de ingreso a tratamiento corresponde a las edades entre los 15 a 19 años, la edad promedio de inicio del uso de drogas ilícitas es de los 15 a 19 años, las principales drogas ilícitas de inicio son la cannabis (88.2%), inhalables (4.3%) y Cocaína (4.3%), las drogas de mayor impacto en el último año son cannabis, alcohol, tabaco, inhalables, cocaína y metanfetaminas, la principales drogas consumidas en el último mes son cannabis, tabaco, alcohol, inhalables, cocaína y metanfetaminas.

Las características de los usuarios a nivel estatal y nacional son las siguientes, pacientes en su mayoría hombres al igual que a nivel local, la edad de ingreso a tratamiento a nivel estatal y nacional es de los 15 a 19 años igual que a nivel local, la edad de inicio del consumo de drogas a nivel estatal es de 10 a 19 años de edad y a nivel nacional de 10 a 14 años, siendo las principales sustancias de inicio la cannabis, los inhalables y la cocaína a nivel estado y nacional, las drogas de mayor impacto en el último mes son tabaco, cannabis, alcohol inhalables, lo único diferente es la cocaína a nivel estado y metanfetaminas a nivel nacional (**Cuadro 5.4**).

Síntesis

La situación actual de nuestro municipio y estado se observa que la población de hombres es la que predomina en la asistencia a los servicios de tratamiento y dentro de las encuestas a usuarios de drogas, entre la edad de 15 a 19 años de edad, siendo la edad de riesgo para iniciarse en el consumo de sustancias entre los 15 a 19 años de edad, población que se encuentra en nivel de bachillerato, las sustancias de inicio son: drogas lícitas alcohol y tabaco, sustancias ilícitas observamos la cannabis, inhalables y cocaína, agregando sustancias consumidas en el último año y mes las metanfetaminas y éxtasis.

Zonas de Alto Riesgo de Atención Prioritaria

La identificación de colonias o zonas de alto riesgo para el consumo de drogas y el establecimiento de una lista de zonas de atención prioritaria representan referentes necesarios para la planeación y aplicación estratégica de programas, en el contexto particular del área de influencia de CIJ. Para este efecto, se llevó a cabo una clasificación de las colonias que integran la zona de influencia del CIJ Tampico en función de determinados factores o condiciones de riesgo, identificando aquéllas que presentan necesidades y características propicias para el desarrollo y operación de programas institucionales. Cabe aclarar que se actualizó la lista y las zonas de riesgo de atención prioritaria del Estudio Básico de la Comunidad Objetivo, a partir de la experiencia y



conocimiento del equipo médico técnico (**Listado de Asentamientos por Nivel de Riesgo**). Se han identificado **27** colonias consideradas de alto riesgo de atención prioritaria para la intervención en el periodo 2018 - 2024.

Por otro lado, el desarrollo de estrategias de atención del consumo de drogas eficaces, necesarias, en particular en el caso de zonas de alto riesgo de atención prioritaria, debe considerar las variables psicosociales que la investigación empírica ha identificado como presuntos factores de riesgo o protección. Diversos estudios realizados en México, incluyendo estudios efectuados en CIJ, han contribuido a esta área de conocimiento (**Factores Psicosociales de Riesgo del Uso Drogas**).