



Cuadro 5.3. Tendencias del consumo de drogas alguna vez en la vida entre pacientes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil, del primer semestre de 2005 al segundo semestre de 2016, CIJ Guasave (%).

| Semestre | Total de casos | Sustancias | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|------------|---------|----------|------------|---------|-------|---------------------|---------|----------------------|---------|-------------------|
| | | Tabaco | Alcohol | Cannabis | Inhalables | Cocaína | Crack | Metanfeta- minas | Éxtasis | Benzodiace- pinas | Heroína | Alucinó- genos |
| 2005-1 | 162 | 77.8 | 74.1 | 66.0 | 8.0 | 79.0 | 3.7 | 54.3 | 0.0 | 11.7 | 6.2 | 0.6 |
| 2005-2 | 122 | 83.6 | 82.0 | 63.1 | 4.9 | 80.3 | 3.3 | 50.8 | 0.8 | 9.0 | 4.1 | 0.0 |
| 2006-1 | 136 | 77.2 | 86.0 | 70.6 | 8.1 | 77.2 | 4.4 | 38.2 | 0.0 | 4.4 | 7.4 | 1.5 |
| 2006-2 | 85 | 78.8 | 84.7 | 72.9 | 4.7 | 72.9 | 1.2 | 38.8 | 0.0 | 7.1 | 5.9 | 0.0 |
| 2007-1 | 105 | 81.9 | 86.7 | 64.8 | 6.7 | 77.1 | 5.7 | 42.9 | 0.0 | 9.5 | 8.6 | 1.9 |
| 2007-2 | 58 | 70.7 | 93.1 | 58.6 | 8.6 | 81.0 | 5.2 | 34.5 | 0.0 | 3.4 | 6.9 | 0.0 |
| 2008-1 | 85 | 82.4 | 88.2 | 67.1 | 8.2 | 68.2 | 3.5 | 40.0 | 1.2 | 9.4 | 5.9 | 1.2 |
| 2008-2 | 69 | 82.6 | 91.3 | 68.1 | 7.2 | 72.5 | 0.0 | 49.3 | 1.4 | 10.1 | 2.9 | 1.4 |
| 2009-1 | 60 | 93.3 | 98.3 | 68.3 | 6.7 | 60.0 | 0.0 | 41.7 | 1.7 | 13.3 | 3.3 | 0.0 |
| 2009-2 | 68 | 72.1 | 95.6 | 64.7 | 8.8 | 70.6 | 0.0 | 41.2 | 0.0 | 7.4 | 2.9 | 0.0 |
| 2010-1 | 47 | 70.2 | 78.7 | 80.9 | 17.0 | 51.1 | 2.1 | 53.2 | 0.0 | 4.3 | 2.1 | 4.3 |
| 2010-2 | 84 | 78.6 | 86.9 | 67.9 | 8.3 | 57.1 | 1.2 | 54.8 | 0.0 | 7.1 | 9.5 | 0.0 |
| 2011-1 | 67 | 76.1 | 89.6 | 76.1 | 3.0 | 53.7 | 0.0 | 46.3 | 1.5 | 4.5 | 3.0 | 0.0 |
| 2011-2 | 94 | 88.3 | 88.3 | 81.9 | 8.5 | 58.5 | 1.1 | 58.5 | 0.0 | 8.5 | 4.3 | 2.1 |
| 2012-1 | 75 | 80.0 | 93.3 | 85.3 | 10.7 | 54.7 | 2.7 | 49.3 | 1.3 | 13.3 | 6.7 | 2.7 |
| 2012-2 | 77 | 88.3 | 92.2 | 83.1 | 3.9 | 62.3 | 0.0 | 53.2 | 1.3 | 6.5 | 2.6 | 0.0 |
| 2013-1 | 81 | 86.4 | 95.1 | 81.5 | 6.2 | 51.9 | 2.5 | 66.7 | 0.0 | 7.4 | 1.2 | 0.0 |
| 2013-2 | 85 | 78.8 | 83.5 | 80.0 | 3.5 | 43.5 | 0.0 | 42.4 | 0.0 | 9.4 | 0.0 | 0.0 |
| 2014-1 | 64 | 76.6 | 85.9 | 75.0 | 4.7 | 51.6 | 0.0 | 43.8 | 0.0 | 7.8 | 0.0 | 0.0 |
| 2014-2 | 67 | 74.6 | 79.1 | 71.6 | 3.0 | 46.3 | 0.0 | 47.8 | 3.0 | 13.4 | 6.0 | 0.0 |
| 2015-1 | 92 | 80.4 | 93.5 | 73.9 | 4.3 | 43.5 | 1.1 | 54.3 | 0.0 | 16.3 | 2.2 | 0.0 |
| 2015-2 | 89 | 88.8 | 89.9 | 84.3 | 2.2 | 51.7 | 0.0 | 46.1 | 0.0 | 13.5 | 3.4 | 0.0 |
| 2016-1 | 73 | 79.5 | 76.7 | 78.1 | 1.4 | 43.8 | 0.0 | 57.5 | 0.0 | 13.7 | 0.0 | 0.0 |
| 2016-2 | 85 | 74.1 | 82.4 | 69.4 | 2.4 | 41.2 | 0.0 | 61.2 | 2.4 | 7.1 | 1.2 | 0.0 |

Fuente: Centros de Integración Juvenil, Sistema Institucional de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas. **Tendencias del consumo de drogas alguna vez en la vida en Centros de Integración Juvenil. Primer semestre de 2005 – Segundo semestre de 2016 (Nivel Nacional y Entidades Federativas).** México, 2017.