



Cuadro 5.4. Características y patrón de consumo de pacientes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil entre julio y diciembre de 2016.

| | | CIJ Durango (N=105) | Estado de Durango (N=172) | Nacional (N=12,096) |
|---|---------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Sexo | Hombres | 75.2% | 77.3% | 82.5% |
| | Mujeres | 24.8% | 22.7% | 17.5% |
| | Razón H:M | 3 hombres por cada mujer | 3.4 hombres por cada mujer | 4.7 hombres por cada mujer |
| Edad de ingreso | 15 a 19 años | 36.2% | 37.8% | 39.2% |
| | 20 a 24 años | 12.4% | 13.4% | 14.2% |
| | 25 a 29 años | 3.8% | 7.0% | 10.1% |
| | Promedio | 20.7 años | 20.2 años | 22.9 años |
| Edad de inicio del uso de drogas ilícitas | 10 a 14 años | 51.4% | 48.3% | 43.1% |
| | 15 a 19 años | 39.0% | 42.4% | 43.0% |
| | 20 a 24 años | 5.7% | 7.0% | 6.9% |
| | Promedio | 15.2 años | 15.2 años | 16.0 años |
| Principales drogas ilícitas de inicio | 1. Cannabis (71.4%) | 1. Cannabis (68.6%) | 1. Cannabis (74.0%) | |
| | 2. Metanfetaminas (9.5%) | 2. Benzodicepinas (8.7%) | 2. Inhalables (9.6%) | |
| | 3. Cocaína (7.6%) | 3. Inhalables (7.6%) | 3. Cocaína (7.3%) | |
| | 4. Benzodicepinas (7.6%) | | | |
| Principales drogas de mayor impacto en el último año | 1. Metanfetaminas (37.5%) | 1. Cannabis (35.7%) | 1. Cannabis (41.4%) | |
| | 2. Cannabis (34.6%) | 2. Metanfetaminas (29.8%) | 2. Metanfetaminas (16.1%) | |
| | 3. Alcohol (12.5%) | 3. Alcohol (14.0%) | 3. Alcohol (11.5%) | |
| | 4. Cocaína (3.8%) | 4. Inhalables (7.6%) | 4. Inhalables (7.8%) | |
| | 5. Tabaco (3.8%) | | | |
| | 6. Benzodicepinas (2.9%) | 5. Benzodicepinas (4.1%) | 5. Crack (6.5%) | |
| Principales drogas consumidas en el último mes | 1. Tabaco (76.2%) | 1. Tabaco (70.3%) | 1. Tabaco (64.0%) | |
| | 2. Alcohol (61.0%) | 2. Alcohol (58.1%) | 2. Alcohol (54.4%) | |
| | 3. Cannabis (47.6%) | 3. Cannabis (46.5%) | 3. Cannabis (52.8%) | |
| | 4. Metanfetaminas (45.7%) | 4. Metanfetaminas (33.1%) | 4. Metanfetaminas (14.5%) | |
| | 5. Benzodicepinas (14.3%) | 5. Benzodicepinas (13.4%) | 5. Inhalables (10.9%) | |

Fuente: Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación. **Estadística del consumo de drogas en pacientes de primer ingreso a tratamiento. Segundo semestre del 2016.** México, 2017.

Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación, **Sistema Institucional de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas.** México, 2017.