



Cuadro 5.2. Tendencias del consumo de drogas alguna vez en la vida entre pacientes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil, del primer semestre de 2005 al segundo semestre de 2016, Estado de Chihuahua (%).

| Semestre | Total de casos | Sustancias | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|------------|---------|----------|------------|---------|-------|---------------------|---------|----------------------|---------|-------------------|
| | | Tabaco | Alcohol | Cannabis | Inhalables | Cocaína | Crack | Metanfeta- minas | Éxtasis | Benzodiace- pinas | Heroína | Alucinó- genos |
| 2005-1 | 530 | 93.8 | 91.5 | 81.9 | 42.8 | 83.6 | 14.3 | 4.7 | 4.9 | 32.8 | 45.8 | 6.2 |
| 2005-2 | 486 | 91.2 | 89.9 | 80.5 | 45.1 | 79.8 | 15.8 | 3.5 | 3.3 | 25.7 | 35.8 | 5.6 |
| 2006-1 | 462 | 90.5 | 92.0 | 80.1 | 40.5 | 81.2 | 13.2 | 3.0 | 2.8 | 23.2 | 25.5 | 7.1 |
| 2006-2 | 373 | 89.5 | 90.3 | 71.8 | 38.1 | 81.0 | 19.3 | 7.8 | 1.9 | 23.1 | 31.1 | 4.6 |
| 2007-1 | 511 | 88.6 | 89.2 | 73.4 | 35.0 | 79.3 | 17.0 | 5.9 | 3.3 | 21.7 | 25.8 | 5.9 |
| 2007-2 | 578 | 92.2 | 92.6 | 79.2 | 40.5 | 79.8 | 25.8 | 4.0 | 2.6 | 30.8 | 33.2 | 5.4 |
| 2008-1 | 571 | 89.0 | 91.6 | 79.9 | 42.0 | 75.0 | 28.2 | 6.5 | 5.3 | 32.7 | 39.8 | 7.9 |
| 2008-2 | 491 | 89.6 | 90.6 | 83.9 | 47.7 | 75.2 | 27.5 | 6.5 | 5.1 | 38.3 | 43.8 | 6.5 |
| 2009-1 | 501 | 89.4 | 88.8 | 79.0 | 45.1 | 68.1 | 22.0 | 3.8 | 3.4 | 38.1 | 43.3 | 7.0 |
| 2009-2 | 401 | 91.5 | 90.0 | 82.8 | 44.9 | 67.1 | 20.2 | 4.0 | 6.5 | 36.4 | 37.4 | 7.5 |
| 2010-1 | 432 | 85.9 | 87.0 | 76.4 | 34.5 | 58.3 | 18.3 | 5.6 | 4.4 | 28.2 | 32.6 | 7.4 |
| 2010-2 | 456 | 91.9 | 93.4 | 79.6 | 43.0 | 64.3 | 21.1 | 6.8 | 10.7 | 31.6 | 36.8 | 9.6 |
| 2011-1 | 361 | 89.5 | 93.1 | 84.8 | 40.2 | 57.9 | 17.7 | 4.7 | 10.2 | 33.5 | 24.1 | 7.2 |
| 2011-2 | 446 | 88.1 | 86.5 | 77.4 | 28.7 | 52.0 | 15.2 | 4.5 | 8.1 | 24.2 | 31.2 | 6.3 |
| 2012-1 | 455 | 87.0 | 84.2 | 81.8 | 29.5 | 50.1 | 13.0 | 4.8 | 8.1 | 34.1 | 30.3 | 6.8 |
| 2012-2 | 403 | 83.9 | 84.4 | 84.1 | 29.3 | 47.4 | 12.7 | 5.2 | 7.4 | 36.5 | 30.0 | 7.9 |
| 2013-1 | 480 | 82.3 | 79.4 | 82.9 | 27.1 | 43.1 | 12.9 | 5.8 | 6.5 | 34.6 | 25.8 | 4.4 |
| 2013-2 | 309 | 77.7 | 74.8 | 86.7 | 21.0 | 39.2 | 16.5 | 6.8 | 9.1 | 26.9 | 14.2 | 5.5 |
| 2014-1 | 343 | 85.1 | 78.7 | 90.7 | 28.6 | 44.3 | 16.3 | 14.3 | 7.3 | 37.9 | 26.5 | 5.2 |
| 2014-2 | 333 | 84.4 | 84.7 | 90.1 | 30.9 | 43.8 | 13.8 | 15.9 | 10.2 | 31.8 | 15.9 | 7.5 |
| 2015-1 | 439 | 85.6 | 84.5 | 92.0 | 27.6 | 49.0 | 13.4 | 22.6 | 10.0 | 33.3 | 17.3 | 6.6 |
| 2015-2 | 457 | 84.0 | 79.9 | 84.0 | 19.3 | 44.0 | 15.1 | 22.8 | 7.0 | 31.5 | 22.3 | 6.6 |
| 2016-1 | 458 | 84.5 | 79.7 | 86.0 | 19.4 | 44.1 | 10.5 | 28.2 | 7.0 | 27.3 | 18.8 | 4.1 |
| 2016-2 | 526 | 83.3 | 74.1 | 85.4 | 16.2 | 39.0 | 9.9 | 35.4 | 8.9 | 22.8 | 20.7 | 5.5 |

Fuente: Centros de Integración Juvenil, Sistema Institucional de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas. **Tendencias del consumo de drogas alguna vez en la vida en Centros de Integración Juvenil. Primer semestre de 2005 – Segundo semestre de 2016 (Nivel Nacional y Entidades Federativas).** México, 2017.