



**Cuadro 5.4. Características y patrón de consumo de pacientes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil entre julio y diciembre de 2016.**

		<b>CIJ San Luis Potosí (N=178)</b>	<b>Nacional (N=12,096)</b>
<b>Sexo</b>	Hombres	75.8%	82.5%
	Mujeres	24.2%	17.5%
	Razón H:M	3.1 hombres por cada mujer	4.7 hombres por cada mujer
<b>Edad de ingreso</b>	15 a 19 años	37.1%	39.2%
	20 a 24 años	11.8%	14.2%
	25 a 29 años	8.4%	10.1%
	Promedio	19.5 años	22.9 años
<b>Edad de inicio del uso de drogas ilícitas</b>	10 a 14 años	62.9%	43.1%
	15 a 19 años	29.2%	43.0%
	20 a 24 años	5.1%	6.9%
	Promedio	14.5 años	16.0 años
<b>Principales drogas ilícitas de inicio</b>	1. Cannabis (75.8%)	1. Cannabis (74.0%)	
	2. Inhalables (14.0%)	2. Inhalables (9.6%)	
	3. Benzodiacepinas (2.8%)	3. Cocaína (7.3%)	
<b>Principales drogas de mayor impacto en el último año</b>	1. Cannabis (53.7%)	1. Cannabis (41.4%)	
	2. Metanfetaminas (13.0%)	2. Metanfetaminas (16.1%)	
	3. Alcohol (11.3%)	3. Alcohol (11.5%)	
	4. Inhalables (11.3%)	4. Inhalables (7.8%)	
	5. Tabaco (4.5%)	5. Crack (6.5%)	
<b>Principales drogas consumidas en el último mes</b>	1. Cannabis (61.8%)	1. Tabaco (64.0%)	
	2. Alcohol (61.2%)	2. Alcohol (54.4%)	
	3. Tabaco (58.4%)	3. Cannabis (52.8%)	
	4. Inhalables (18.5%)	4. Metanfetaminas (14.5%)	
	5. Metanfetaminas (16.3%)	5. Inhalables (10.9%)	

**Fuentes:**

Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación. **Estadística del consumo de drogas en pacientes de primer ingreso a tratamiento. Segundo semestre del 2016.** México, 2017.

Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación, **Sistema Institucional de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas.** México, 2017.