

**Cuadro 5.4. Características y patrón de consumo de pacientes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil entre julio y diciembre de 2016.**

		CIJ Guadalajara Sur (N=117)	Municipio de Guadalajara (N=401)	Estado de Jalisco (N=1,038)	Nacional (N=12,096)
<b>Sexo</b>	Hombres	75.2%	77.6%	80.9%	82.5%
	Mujeres	24.8%	22.4%	19.1%	17.5%
	Razón H:M	3 hombres por cada mujer	3.5 hombres por cada mujer	4.2 hombres por cada mujer	4.7 hombres por cada mujer
<b>Edad de ingreso</b>	15 a 19 años	29.9%	33.9%	32.6%	39.2%
	20 a 24 años	15.4%	10.5%	12.4%	14.2%
	25 a 29 años	11.1%	10.0%	10.9%	10.1%
	Promedio	23.1 años	25.9 años	25.4 años	22.9 años
<b>Edad de inicio del uso de drogas ilícitas</b>	10 a 14 años	46.2%	42.4%	44.2%	43.1%
	15 a 19 años	31.6%	39.9%	38.2%	43.0%
	20 a 24 años	10.3%	8.2%	8.8%	6.9%
	Promedio	16.8 años	16.1 años	16 años	16.0 años
<b>Principales drogas ilícitas de inicio</b>	1. Cannabis (67.5%)	1. Cannabis (66.8%)	1. Cannabis (69.0%)	1. Cannabis (74.0%)	
	2. Inhalables (10.3%)	2. Inhalables (11.5%)	2. Cocaína (11.0%)	2. Inhalables (9.6%)	
	3. Cocaína (8.5%)	3. Cocaína (8.7%)	3. Inhalables (8.5%)	3. Cocaína (7.3%)	
<b>Principales drogas de mayor impacto en el último año</b>	1. Cannabis (35.7%)	1. Metanfetaminas (36.5%)	1. Metanfetaminas (36.5%)	1. Cannabis (41.4%)	
	2. Metanfetaminas (33.0%)	2. Cannabis (25.0%)	2. Cannabis (27.0%)	2. Metanfetaminas (16.1%)	
	3. Alcohol (13.0%)	3. Alcohol (14.1%)	3. Alcohol (12.2%)	3. Alcohol (11.5%)	
	4. Cocaína (5.2%)	4. Tabaco (8.1%)	4. Tabaco (6.0%)	4. Inhalables (7.8%)	
	5. Tabaco (4.3%)	5. Cocaína (6.6%)	5. Inhalables (5.1%)	5. Crack (6.5%)	
	6. Alcohol (4.3%)	6. Tabaco (6.6%)	6. Cocaína (5.1%)	6. Inhalables (5.1%)	
<b>Principales drogas consumidas en el último mes</b>	1. Tabaco (61.5%)	1. Tabaco (67.6%)	1. Tabaco (69.5%)	1. Tabaco (64.0%)	
	2. Alcohol (54.7%)	2. Alcohol (57.6%)	2. Alcohol (57.1%)	2. Alcohol (54.4%)	
	3. Cannabis (44.4%)	3. Cannabis (42.4%)	3. Cannabis (46.1%)	3. Cannabis (52.8%)	
	4. Metanfetaminas (23.1%)	4. Metanfetaminas (25.4%)	4. Metanfetaminas (31.1%)	4. Metanfetaminas (14.5%)	
	5. Inhalables (8.5%)	5. Cocaína (13.2%)	5. Inhalables (11.2%)	5. Inhalables (10.9%)	
	6. Cocaína (8.5%)	6. Tabaco (6.6%)	6. Cocaína (5.1%)	6. Inhalables (5.1%)	

**Fuente:** Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación. **Estadística del consumo de drogas en pacientes de primer ingreso a tratamiento. Segundo semestre del 2016.** México, 2017.

Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación, **Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas.** México, 2017.