



Tabla 6.7

*Características y principales drogas consumidas por personas de primer ingreso a tratamiento en el nivel nacional y la Ciudad de México.*

*Enero - junio de 2024.*

		CIJ Cuauhtémoc Oriente (N= 68)	Ciudad de México (N= 1,961)	Nacional (N= 9,938)
Sexo	Hombres	80.9%	69.7%	72.6%
	Mujeres	19.1%	30.3%	27.4%
	Razón H:M	4.2 hombres por cada mujer	2.3 hombres por cada mujer	2.7 hombres por cada mujer
Edad de ingreso	10 a 14 años	2.9%	10.8%	9.1%
	15 a 19 años	26.5%	34.7%	35.8%
	20 a 24 años	17.6%	13.9%	14.8%
	25 a 29 años	10.3%	11.6%	11.8%
	30 a 34 años	17.6%	9.9%	9.5%
	Promedio	28.1 años	25.0 años	25.1 años
Edad de inicio del uso de drogas ilícitas	10 a 14 años	38.2%	33.9%	34.1%
	15 a 19 años	41.2%	46.9%	46.4%
	20 a 24 años	7.4%	9.2%	9.0%
	25 a 29 años	7.4%	4.0%	4.3%
	Promedio	17.1 años	17.1 años	17.1 años
Drogas ilícitas de inicio	1. Cannabis (70.6%)	1. Cannabis (63.1%)	1. Cannabis (66.3%)	
	2. Cocaína (13.2%)	2. Cocaína (9.9%)	2. Metanfetaminas (13.2%)	
Drogas de mayor impacto	3. Metanfetaminas (7.4%)	3. Metanfetaminas (9.2%)	3. Cocaína (8.7%)	
	1. Cannabis (30.9%)	1. Metanfetaminas (20.9%)	1. Metanfetaminas (30.8%)	
	2. Alcohol (16.2%)	2. Cannabis (20.9%)	2. Cannabis (25.3%)	
	3. Metanfetaminas (11.8%)	3. Alcohol (15.6%)	3. Alcohol (12.4%)	
	4. Cocaína (10.3%)	4. Cocaína (8.0%)	4. Tabaco (5.5%)	
	5. Crack (7.4%)	5. Crack (6.5%)	5. Cocaína (5.0%)	
Consumo alguna vez en la vida	1. Cannabis (75.0%)	1. Alcohol (84.1%)	1. Alcohol (81.0%)	
	2. Alcohol (72.1%)	2. Cannabis (76.0%)	2. Cannabis (78.0%)	
	3. Tabaco (48.5%)	3. Tabaco (65.5%)	3. Tabaco (69.9%)	
	4. Cocaína (32.4%)	4. Cocaína (40.8%)	4. Metanfetaminas (45.3%)	
	5. Metanfetaminas (23.5%)	5. Metanfetaminas (33.9%)	5. Cocaína (34.6%)	
Consumo en el último mes	1. Cannabis (44.1%)	1. Alcohol (50.6%)	1. Alcohol (48.0%)	
	2. Alcohol (42.6%)	2. Tabaco (38.1%)	2. Tabaco (46.2%)	
	3. Tabaco (30.9%)	3. Cannabis (30.2%)	3. Cannabis (35.5%)	
	4. Cocaína (14.7%)	4. Metanfetaminas (15.9%)	4. Metanfetaminas (23.6%)	
	5. Metanfetaminas (8.8%)	5. Cocaína (11.9%)	5. Cocaína (8.4%)	

*Nota:* Información recuperada de CIJ (2024af).