

Tabla 6.2

Características y principales drogas consumidas por personas de primer ingreso a tratamiento en el nivel nacional y el estado de Coahuila de Zaragoza. Enero - junio de 2024.

		CIJ Torreón Oriente (N= 148)	Coahuila de Zaragoza (N= 448)	Nacional (N= 9,938)
Sexo	Hombres	64.2%	73.0%	72.6%
	Mujeres	35.8%	27.0%	27.4%
	Razón H:M	1.8 hombres por cada mujer	2.7 hombres por cada mujer	2.7 hombres por cada mujer
Edad de ingreso	10 a 14 años	14.9%	18.1%	9.1%
	15 a 19 años	41.9%	47.5%	35.8%
	20 a 24 años	17.6%	10.3%	14.8%
	25 a 29 años	8.1%	8.7%	11.8%
	30 a 34 años	5.4%	6.9%	9.5%
	Promedio	21.9 años	20.6 años	25.1 años
Edad de inicio del uso de drogas ilícitas	10 a 14 años	45.9%	49.8%	34.1%
	15 a 19 años	41.2%	39.5%	46.4%
	20 a 24 años	8.1%	4.7%	9.0%
	25 a 29 años	0.7%	2.9%	4.3%
	Promedio	15.9 años	15.5 años	17.1 años
Drogas ilícitas de inicio	1. Cannabis (75.0%)	1. Cannabis (75.9%)	1. Cannabis (66.3%)	
	2. Metanfetaminas (8.8%)	2. Metanfetaminas (8.9%)	2. Metanfetaminas (13.2%)	
	3. Cocaína (6.8%)	3. Inhalables (5.8%)	3. Cocaína (8.7%)	
Drogas de mayor impacto	1. Cannabis (34.5%)	1. Cannabis (40.8%)	1. Metanfetaminas (30.8%)	
	2. Metanfetaminas (27.0%)	2. Metanfetaminas (29.9%)	2. Cannabis (25.3%)	
	3. Tabaco (6.8%)	3. Inhalables (5.8%)	3. Alcohol (12.4%)	
	4. Benzodiacepinas (4.1%)	4. Alcohol (5.6%)	4. Tabaco (5.5%)	
	5. Alcohol (3.4%)	5. Tabaco (3.3%)	5. Cocaína (5.0%)	
	5. Cocaína (3.4%)			
Consumo alguna vez en la vida	1. Cannabis (91.9%)	1. Alcohol (90.2%)	1. Alcohol (81.0%)	
	2. Alcohol (90.5%)	2. Cannabis (87.9%)	2. Cannabis (78.0%)	
	3. Tabaco (84.5%)	3. Tabaco (85.5%)	3. Tabaco (69.9%)	
	4. Metanfetaminas (39.9%)	4. Metanfetaminas (42.9%)	4. Metanfetaminas (45.3%)	
	5. Cocaína (25.7%)	5. Cocaína (21.9%)	5. Cocaína (34.6%)	
Consumo en el último mes	1. Tabaco (46.6%)	1. Tabaco (50.2%)	1. Alcohol (48.0%)	
	2. Alcohol (41.2%)	2. Alcohol (45.3%)	2. Tabaco (46.2%)	
	3. Cannabis (36.5%)	3. Cannabis (39.5%)	3. Cannabis (35.5%)	
	4. Metanfetaminas (20.9%)	4. Metanfetaminas (19.0%)	4. Metanfetaminas (23.6%)	
	5. Benzodiacepinas (4.7%)	5. Inhalables (4.5%)	5. Cocaína (8.4%)	

Nota: Información recuperada de CIJ (2024af).