

Diagnóstico del consumo de sustancias en el estado de Hidalgo

De acuerdo con los últimos datos publicados por el Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones (OMSMA, 2024), obtenidos de personas con consumo de sustancias que solicitan tratamiento en el estado de Hidalgo, se observó que las principales sustancias por las que se demandó atención en 2023 fueron las metanfetaminas, el alcohol, la marihuana y la cocaína. Mientras que las sustancias con las que se inició el consumo fueron alcohol, tabaco y marihuana. Si bien, esta información no puede ser extrapolable a otras poblaciones, sí permite conocer el perfil sociodemográfico y de consumo de sustancias de la población que presenta el problema.

Características sociodemográficas y de consumo de sustancias de personas atendidas en CIJ en el nivel nacional

La información más reciente generada por Centros de Integración Juvenil, a través del Reporte de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas en CIJ (CIJ, 2024ah) muestra que, con relación a la solicitud de atención a nivel nacional en el primer semestre de 2024 por parte de las personas con consumo de drogas ilícitas, CIJ atendió un total de 9 938 solicitudes de atención de primera vez de personas con consumo de sustancias ilícitas.

Con relación con las tendencias del consumo de sustancias muestra que, en relación a las sustancias más consumidas alguna vez en la vida, el consumo de tabaco y alcohol se mantuvo relativamente estable desde 2004 hasta 2020, con tasas de entre el 85% y 90%; posteriormente muestran una disminución, para ubicarse en el primer

semestre de 2024 en 69.9% y 81.0%, respectivamente. La prevalencia del consumo de marihuana alguna vez en la vida, como segunda sustancia más consumida en el primer semestre de 2014 (78.0%), por arriba del tabaco, después de registrar un incremento paulatino entre 2008 y 2015 cuando alcanzó su más alto nivel (87.8%). Por su parte el consumo de metanfetaminas mostró un incremento sostenido entre 2012 y 2021, cuando alcanzaron el índice más alto (50%). En 2024, el consumo de estas sustancias fue referida por el 45.3% de esta población. El consumo de cocaína se ha mantenido relativamente estable entre 2010 y 2024 (entre el 35% y 45%). Por el contrario, se observa una disminución en el consumo alguna vez en la vida de crack, que pasó de 33.6% en 2004 a 10.0% en 2024; y en el consumo de inhalables, que pasó de 33.8% a 12.8% en el mismo periodo.

Con relación a las características sociodemográficas de esta población, predominaron las solicitudes por parte de los hombres (72.6%; mujeres: 27.4%), en una proporción de 2.7 hombres por cada mujer. La edad promedio de ingreso a tratamiento se situó en 25.1 años, donde predominan los rangos de 15 a 19 años (35.8%), de 20 a 24 años (14.8%) y de 25 a 29 años (11.8%) (Tabla 6).

Respecto al patrón de consumo de las sustancias en promedio, la edad de inicio en el consumo de drogas ilícitas se registró a los 17.1 años, el 46.4% refirió haber iniciado el consumo entre los 15 y 19 años. Las principales sustancias ilícitas de inicio reportadas fueron cannabis (66.3%), metanfetaminas (13.2%) y cocaína (clorhidrato, 8.7%). Mientras que, entre las sustancias a cuyo consumo las personas atribuyeron los mayores daños en la salud, en el bienestar personal y familiar o en el desempeño escolar, laboral o social

(droga de mayor impacto) se señalaron: metanfetamina (30.8%), cannabis (25.3%) y alcohol (12.4%). Finalmente, los mayores porcentajes de consumo reportados en el último mes corresponden al alcohol (48.0%), tabaco (46.2%), cannabis (35.5%), metanfetaminas (23.6%) y clorhidrato de cocaína (8.4%) (Tabla 6).

Caracterización de las personas atendidas en el estado de Hidalgo

En el estado de Hidalgo, en el primer semestre de 2024, se obtuvo información sólo del CIJ Pachuca, el cual atendió un total de 127 solicitudes de atención de primera vez de personas con consumo de sustancias ilícitas. Predominaron las solicitudes realizadas por los hombres (70.1% y mujeres: 29.9%), con una razón de 2.3 hombres por cada mujer. Respecto a la edad de ingreso a los servicios de tratamiento de CIJ, la mayor proporción de personas se ubicó en el rango de 15 a 19 años (43.3%), seguido del rango de 20 a 24 años (16.5%) y con proporciones similares los rangos de 10 a 14 años y de 25 a 29 años (18.7%, cada uno); en promedio la solicitud de ingreso se realizó a los 23.7 años.

Respecto al patrón de consumo de las sustancias (Tabla 6), la edad de inicio en el consumo de drogas ilícitas se registró en promedio a los 17.4 años; más del 40 por ciento de estas personas reportaron haber iniciado el consumo entre los 15 y 19 años (45.7%) y 36.2% entre los 10 y 14 años. Las principales sustancias ilícitas de inicio reportadas fueron: cannabis (69.3%), metanfetaminas (15.0%) y cocaína (7.9%). Las sustancias de mayor impacto, por las que se podrían estar solicitando atención fueron: cannabis (18.1%), metanfetaminas (30.7%) y alcohol (20.5%). Los mayores porcentajes de

consumo en el último mes corresponden al alcohol (59.1%), tabaco (55.1%), cannabis (26.8%) y metanfetaminas (26.8%).

Tabla 6

Características y principales drogas consumidas por personas de primer ingreso a tratamiento en el estado de Hidalgo. Enero - junio de 2024

		Hidalgo (CIJ Pachuca) (N=127)	Nacional (N= 9,938)
Sexo	Hombres	70.1%	72.6%
	Mujeres	29.9%	27.4%
	Razón H:M	2.3 hombres por cada mujer	2.7 hombres por cada mujer
Edad de ingreso	10 a 14 años	8.7 %	9.1%
	15 a 19 años	43.3%	35.8%
	20 a 24 años	16.5%	14.8%
	25 a 29 años	8.7%	11.8%
	30 a 34 años	6.3%	9.5%
	Promedio	23.7% años	25.1 años
Edad de inicio del uso de drogas ilícitas	10 a 14 años	36.2 %	34.1%
	15 a 19 años	45.7%	46.4%
	20 a 24 años	7.9%	9.0%
	25 a 29 años	3.9%	4.3%
	Promedio	17.4 % años	17.1 años
Drogas ilícitas de inicio	1. Cannabis (69.3%)	1. Cannabis (66.3%)	
	2. Metanfetaminas (15.0%)	2. Metanfetaminas (13.2%)	
	3. Cocaína (7.9%)	3. Cocaína (8.7%)	
Drogas de mayor impacto	1. Metanfetaminas (30.7%)	1. Metanfetaminas (30.8%)	
	2. Alcohol (20.5%)	2. Cannabis (25.3%)	
	3. Cannabis (18.1%)	3. Alcohol (12.4%)	
	4. Tabaco (12.6%)	4. Tabaco (5.5%)	
	5. Cocaína (3.2%)	5. Cocaína (5.0%)	
Consumo alguna vez en la vida	1. Alcohol (96.9%)	1. Alcohol (81.0%)	
	2. Tabaco (92.9%)	2. Cannabis (78.0%)	
	3. Cannabis (81.9%)	3. Tabaco (69.9%)	
	4. Metanfetaminas (47.2%)	4. Metanfetaminas (45.3%)	
	5. Cocaína (36.2 %)	5. Cocaína (34.6%)	
Consumo en el último mes	1. Alcohol (59.1%)	1. Alcohol (48.0%)	
	2. Tabaco (55.1%)	2. Tabaco (46.2%)	
	3. Cannabis (26.8%)	3. Cannabis (35.5%)	
	3. Metanfetaminas (26.8%)	4. Metanfetaminas (23.6%)	
	4. Cocaína (5.5%)	5. Cocaína (8.4%)	

Nota: Información recuperada de CIJ (2024af).



Tendencias del consumo alguna vez en la vida de sustancias


Con relación a las tendencias del consumo de sustancias alguna vez en la vida de los solicitantes de atención de primera vez de personas con consumo de sustancias ilícitas en el estado de Hidalgo (Figura 2), se observa que de 5 054 personas captadas durante el segundo semestre de 2004 y hasta el primer semestre de 2024, el consumo alguna vez en la vida de tabaco y alcohol se mantuvo por arriba del 90%. El consumo de cannabis ha sido la tercera sustancia de mayor consumo, alcanzando prevalencias por arriba del 90%, en 2024 fue referida por 81.9% de las personas.

Las metanfetaminas registraron un incremento constante desde 2015, registrando su punto más alto en 2023 (59.5%). El consumo de cocaína, después de registrar una disminución entre 2004 (54.2%) y 2009 (25.8%), en 2024 fue referido por 36.2% de las personas. Si bien, en 2004 los inhalables tenían presencia en 41.0% de los casos reportados en el CIJ Pachuca, en 2024 su consumo fue reportado por 3.9% de las personas.

En los 20 años de seguimiento, el consumo de alucinógenos se ha mantenido con prevalencias de alrededor del 20%.

Figura 2

Tendencias del consumo de drogas alguna vez en la vida en consumidores de drogas ilícitas solicitantes de tratamiento en CIJ del estado de Hidalgo (Pachuca). 2do semestre de 2004 - 1er semestre de 2024



Nota: Figura recuperada de CIJ (2024ag).

Zonas de Alto Riesgo de Atención Prioritaria

La identificación de colonias o zonas de alto riesgo para el consumo de drogas y el establecimiento de aquellas zonas de atención prioritaria representan referentes necesarios para la planeación y aplicación estratégica de programas, en el contexto particular del área de influencia de CIJ. Para este efecto, se llevó a cabo una revisión de la clasificación de las colonias que integran la zona de influencia de los CIJ en el estado, en función de factores y condiciones de riesgo (deterioro de condiciones de vida, falta de oportunidades de empleo y de estudio, presencia de núcleos importantes de población

infantil, jóvenes o adultos jóvenes, accesibilidad y oferta de sustancias, indicios de alto consumo), así como identificando aquéllas que presentan necesidades y características propicias para el desarrollo y operación de programas institucionales (accesibilidad, recursos organizados, apoyo interinstitucional, antecedentes de trabajo preventivo y condiciones de seguridad).

La actualización de la lista de zonas de riesgo y de atención prioritaria reportadas en el presente Estudio Básico de Comunidad Objetivo se elaboró a partir de la experiencia y conocimiento del equipo médico técnico.

A partir de esta actualización, en Hidalgo se identificaron 161 colonias de alto riesgo de consumo de sustancias, consideradas de atención prioritaria para la intervención en el periodo 2024-2030. El resultado de esta valoración puede ser consultado en el listado de asentamientos del área de influencia del CIJ Pachuca (Tabla 7.1), CIJ Tula (Tabla 7.2) y CIJ Tulancingo (Tabla 7.3).