

**Tabla 6.3**

*Características y principales drogas consumidas por personas de primer ingreso a tratamiento en CIJ. Enero - junio de 2024*

|                                              |                              | CIJ Puerto Vallarta<br>(N=97) | Jalisco<br>(N= 723)        | Nacional<br>(N= 9,938)     |
|----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Sexo                                         | Hombres                      | 83.5%                         | 75.1%                      | 72.6%                      |
|                                              | Mujeres                      | 16.5%                         | 24.9%                      | 27.4%                      |
|                                              | Razón H:M                    | 5.1 hombres por cada mujer    | 3.0 hombres por cada mujer | 2.7 hombres por cada mujer |
| Edad de ingreso                              | 10 a 14 años                 | 2.1%                          | 5.9 %                      | 9.1%                       |
|                                              | 15 a 19 años                 | 8.2%                          | 22.4%                      | 35.8%                      |
|                                              | 20 a 24 años                 | 17.5%                         | 14.9%                      | 14.8%                      |
|                                              | 25 a 29 años                 | 10.3%                         | 12.9%                      | 11.8%                      |
|                                              | 30 a 34 años                 | 15.5%                         | 13.0%                      | 9.5%                       |
|                                              | Promedio                     | 34.1 años                     | 29.8 años                  | 25.1 años                  |
| Edad de inicio del uso de drogas<br>ilícitas | 10 a 14 años                 | 29.9%                         | 33.6 %                     | 34.1%                      |
|                                              | 15 a 19 años                 | 39.2%                         | 41.9%                      | 46.4%                      |
|                                              | 20 a 24 años                 | 12.4%                         | 11.6%                      | 9.0%                       |
|                                              | 25 a 29 años                 | 7.2%                          | 4.7%                       | 4.3%                       |
|                                              | Promedio                     | 18.1 años                     | 17.4 años                  | 17.1 años                  |
| Drogas ilícitas de inicio                    | 1. Cannabis (69.1%)          | 1. Cannabis (69.3%)           | 1. Cannabis (66.3%)        |                            |
|                                              | 2. Metanfetaminas (14.4%)    | 2. Cocaína (11.8%)            | 2. Metanfetaminas (13.2%)  |                            |
|                                              | 3. Cocaína (12.4%)           | 3. Metanfetaminas (11.3%)     | 3. Cocaína (8.7%)          |                            |
| Drogas de mayor impacto                      | 1. Metanfetaminas (46.4%)    | 1. Metanfetaminas (38.7%)     | 1. Metanfetaminas (30.8%)  |                            |
|                                              | 2. Alcohol (26.8%)           | 2. Cannabis (23.9%)           | 2. Cannabis (25.3%)        |                            |
|                                              | 3. Cannabis (18.6%)          | 3. Alcohol (15.8%)            | 3. Alcohol (12.4%)         |                            |
|                                              | 4. Tabaco (5.2%)             | 4. Tabaco (6.2%)              | 4. Tabaco (5.5%)           |                            |
|                                              | 5. Otros estimulantes (1.0%) | 5. Cocaína (2.4%)             | 5. Cocaína (5.0%)          |                            |
| Consumo alguna vez en la vida                | 1. Alcohol (93.8%)           | 1. Alcohol (89.6%)            | 1. Alcohol (81.0%)         |                            |
|                                              | 2. Cannabis (82.5%)          | 2. Tabaco (82.7%)             | 2. Cannabis (78.0%)        |                            |
|                                              | 3. Tabaco (81.4%)            | 3. Cannabis (82.4%)           | 3. Tabaco (69.9%)          |                            |
|                                              | 4. Metanfetaminas (67.0%)    | 4. Metanfetaminas (53.8%)     | 4. Metanfetaminas (45.3%)  |                            |
|                                              | 5. Cocaína (47.4%)           | 5. Cocaína (41.1 %)           | 5. Cocaína (34.6%)         |                            |
| Consumo en el último mes                     | 1. Tabaco (53.6%)            | 1. Tabaco (60.2%)             | 1. Alcohol (48.0%)         |                            |
|                                              | 2. Alcohol (46.4%)           | 2. Alcohol (51.5%)            | 2. Tabaco (46.2%)          |                            |
|                                              | 3. Cannabis (29.9%)          | 3. Cannabis (36.2%)           | 3. Cannabis (35.5%)        |                            |
|                                              | 4. Metanfetaminas (23.7%)    | 3. Metanfetaminas (27.9%)     | 4. Metanfetaminas (23.6%)  |                            |
|                                              | 5. Cocaína (2.1%)            | 4. Cocaína (6.5%)             | 5. Cocaína (8.4%)          |                            |

*Nota:* Información recuperada de CIJ (2024af).