

**Tabla 6.4**

Características y principales drogas consumidas por personas de primer ingreso a tratamiento en CIJ. Enero - junio de 2024

		CIJ Zamora (N=74 )	Michoacán de Ocampo (N= 229)	Nacional (N= 9,938)
<b>Sexo</b>	Hombres	70.3%	63.3%	72.6%
	Mujeres	29.7%	36.7%	27.4%
	Razón H:M	2.4 hombres por cada mujer	1.7 hombres por cada mujer	2.7 hombres por cada mujer
<b>Edad de ingreso</b>	10 a 14 años	2.7%	1.3%	9.1%
	15 a 19 años	29.7%	25.8%	35.8%
	20 a 24 años	16.2%	18.3%	14.8%
	25 a 29 años	16.2%	14.0%	11.8%
	30 a 34 años	6.8%	9.6%	9.5%
	Promedio	28.8 años	29.4 años	25.1 años
<b>Edad de inicio del uso de drogas ilícitas</b>	10 a 14 años	39.2%	26.6%	34.1%
	15 a 19 años	35.1%	43.2%	46.4%
	20 a 24 años	8.1%	7.4%	9.0%
	25 a 29 años	5.4%	6.1%	4.3%
	Promedio	19.2 años	20.0 años	17.1 años
<b>Drogas ilícitas de inicio</b>	1. Cannabis (68.1%)	1. Cannabis (69.9%)	1. Cannabis (66.3%)	
	2. Benzodiacepinas (10.8%)	2. Metanfetaminas (11.4%)	2. Metanfetaminas (13.2%)	
<b>Drogas de mayor impacto</b>	3. Metanfetaminas (8.1%)	3. Benzodiacepinas (7.9%)	3. Cocaína (8.7%)	
	1. Metanfetaminas (36.5%)	1. Metanfetaminas (31.0%)	1. Metanfetaminas (30.8%)	
	2. Cannabis (23.0%)	2. Cannabis (22.3%)	2. Cannabis (25.3%)	
	3. Alcohol (12.2%)	3. Alcohol (16.6%)	3. Alcohol (12.4%)	
	4. Tabaco (8.1%)	4. Tabaco (7.0%)	4. Tabaco (5.5%)	
	5. Benzodiacepinas (6.8%)	5. Benzodiacepinas (4.4%)	5. Cocaína (5.0%)	
<b>Consumo alguna vez en la vida</b>	1. Alcohol (78.4%)	1. Alcohol (83.0%)	1. Alcohol (81.0%)	
	2. Cannabis (75.7%)	2. Cannabis (79.5%)	2. Cannabis (78.0%)	
	3. Tabaco (71.6%)	3. Tabaco (75.5%)	3. Tabaco (69.9%)	
	4. Metanfetaminas (47.3%)	4. Metanfetaminas (50.2%)	4. Metanfetaminas (45.3%)	
	5. Cocaína (21.6%)	5. Cocaína (24.0%)	5. Cocaína (34.6%)	
<b>Consumo en el último mes</b>	1. Alcohol (59.5%)	1. Alcohol (59.8%)	1. Alcohol (48.0%)	
	1. Tabaco (59.5%)	2. Tabaco (53.3%)	2. Tabaco (46.2%)	
	2. Cannabis (33.8%)	3. Cannabis (33.6%)	3. Cannabis (35.5%)	
	3. Metanfetaminas (28.4%)	4. Metanfetaminas (21.0%)	4. Metanfetaminas (23.6%)	
	4. Benzodiacepinas 9.5%	5. Benzodiacepinas (9.6%)	5. Cocaína (8.4%)	

Nota: Información recuperada de CIJ (2024af).