

**Tabla 6.3**

*Características y principales drogas consumidas por personas de primer ingreso a tratamiento en el nivel nacional y el estado de Quintana Roo.  
Enero - junio de 2024*

|                                           |              | CIJ Chetumal<br>(N= 89)    | Quintana Roo<br>(N= 359)   | Nacional<br>(N= 9,938)     |
|-------------------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Sexo                                      | Hombres      | 71.9%                      | 72.4%                      | 72.6%                      |
|                                           | Mujeres      | 28.1%                      | 27.6%                      | 27.4%                      |
|                                           | Razón H:M    | 2.6 hombres por cada mujer | 2.6 hombres por cada mujer | 2.7 hombres por cada mujer |
| Edad de ingreso                           | 10 a 14 años | 1.1%                       | 5.0%                       | 9.1%                       |
|                                           | 15 a 19 años | 19.1%                      | 32.0%                      | 35.8%                      |
|                                           | 20 a 24 años | 19.1%                      | 15.0%                      | 14.8%                      |
|                                           | 25 a 29 años | 7.9%                       | 11.4%                      | 11.8%                      |
|                                           | 30 a 34 años | 29.2%                      | 15.0%                      | 9.5%                       |
|                                           | Promedio     | 29.2 años                  | 26.5 años                  | 25.1 años                  |
| Edad de inicio del uso de drogas ilícitas | 10 a 14 años | 31.5%                      | 35.1%                      | 34.1%                      |
|                                           | 15 a 19 años | 52.8%                      | 46.2%                      | 46.4%                      |
|                                           | 20 a 24 años | 5.6%                       | 7.2%                       | 9.0%                       |
|                                           | 25 a 29 años | 2.2%                       | 3.1%                       | 4.3%                       |
|                                           | Promedio     | 16.3 años                  | 16.9 años                  | 17.1 años                  |
| Drogas ilícitas de inicio                 |              | 1. Cannabis (71.9%)        | 1. Cannabis (79.4%)        | 1. Cannabis (66.3%)        |
|                                           |              | 2. Cocaína (10.1%)         | 2. Cocaína (9.2%)          | 2. Metanfetaminas (13.2%)  |
|                                           |              | 3. Crack (6.7%)            | 3. Metanfetaminas (3.3%)   | 3. Cocaína (8.7%)          |
| Drogas de mayor impacto                   |              | 1. Cannabis (36.0%)        | 1. Cannabis (27.9%)        | 1. Metanfetaminas (30.8%)  |
|                                           |              | 2. Crack (19.1%)           | 2. Alcohol (15.6%)         | 2. Cannabis (25.3%)        |
|                                           |              | 3. Cocaína (11.2%)         | 3. Metanfetaminas (15.3%)  | 3. Alcohol (12.4%)         |
|                                           |              | 4. Metanfetaminas (11.2%)  | 4. Crack (7.8%)            | 4. Tabaco (5.5%)           |
|                                           |              | 5. Alcohol (6.7%)          | 5. Cocaína (6.1%)          | 5. Cocaína (5.0%)          |
| Consumo alguna vez en la vida             |              | 1. Cannabis (85.4%)        | 1. Cannabis (89.7%)        | 1. Alcohol (81.0%)         |
|                                           |              | 2. Alcohol (57.3%)         | 2. Alcohol (78.3%)         | 2. Cannabis (78.0%)        |
|                                           |              | 3. Tabaco (52.8%)          | 3. Tabaco (62.1%)          | 3. Tabaco (69.9%)          |
|                                           |              | 4. Cocaína (43.8%)         | 4. Cocaína (42.1%)         | 4. Metanfetaminas (45.3%)  |
|                                           |              | 5. Crack (38.2%)           | 5. Metanfetaminas (34.8%)  | 5. Cocaína (34.6%)         |
| Consumo en el último mes                  |              | 1. Tabaco (36.0%)          | 1. Alcohol (44.0%)         | 1. Alcohol (48.0%)         |
|                                           |              | 2. Cannabis (20.2%)        | 2. Cannabis (39.8%)        | 2. Tabaco (46.2%)          |
|                                           |              | 3. Crack (5.6%)            | 3. Tabaco (35.4%)          | 3. Cannabis (35.5%)        |
|                                           |              | 4. Cocaína (3.4%)          | 4. Metanfetaminas (12.0%)  | 4. Metanfetaminas (23.6%)  |
|                                           |              | 5. Metanfetaminas (3.4%)   | 5. Cocaína (8.1%)          | 5. Cocaína (8.4%)          |
|                                           |              | 5. Benzodiacepinas (3.4%)  |                            |                            |

*Nota:* Información recuperada de CIJ (2024af).