

**Tabla 6.3**

*Características y principales drogas consumidas por personas de primer ingreso a tratamiento en el nivel nacional y el estado de Sinaloa.*

*Enero - junio de 2024*

|                                           |                           | CIJ Guamúchil<br>(N= 29)   | Sinaloa<br>(N= 356)        | Nacional<br>(N= 9,938)     |
|-------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Sexo                                      | Hombres                   | 75.9%                      | 73.3%                      | 72.6%                      |
|                                           | Mujeres                   | 24.1%                      | 26.7%                      | 27.4%                      |
|                                           | Razón H:M                 | 3.1 hombres por cada mujer | 2.7 hombres por cada mujer | 2.7 hombres por cada mujer |
| Edad de ingreso                           | 10 a 14 años              | 10.3%                      | 6.5%                       | 9.1%                       |
|                                           | 15 a 19 años              | 17.2%                      | 32.9%                      | 35.8%                      |
|                                           | 20 a 24 años              | 6.9%                       | 14.3%                      | 14.8%                      |
|                                           | 25 a 29 años              | 20.7%                      | 12.4%                      | 11.8%                      |
|                                           | 30 a 34 años              | 13.8%                      | 11.8%                      | 9.5%                       |
|                                           | Promedio                  | 29.9 años                  | 26.9 años                  | 25.1 años                  |
| Edad de inicio del uso de drogas ilícitas | 10 a 14 años              | 20.7%                      | 23.3%                      | 34.1%                      |
|                                           | 15 a 19 años              | 37.9%                      | 50.0%                      | 46.4%                      |
|                                           | 20 a 24 años              | 17.2%                      | 11.5%                      | 9.0%                       |
|                                           | 25 a 29 años              | 20.7%                      | 6.2%                       | 4.3%                       |
|                                           | Promedio                  | 19.9 años                  | 18.3 años                  | 17.1 años                  |
| Drogas ilícitas de inicio                 | 1. Cannabis (58.6%)       | 1. Cannabis (64.6%)        | 1. Cannabis (66.3%)        |                            |
|                                           | 2. Metanfetaminas (24.1%) | 2. Metanfetaminas (17.1%)  | 2. Metanfetaminas (13.2%)  |                            |
|                                           | 3. Cocaína (17.2%)        | 3. Cocaína (14.0%)         | 3. Cocaína (8.7%)          |                            |
| Drogas de mayor impacto                   | 1. Metanfetaminas (55.2%) | 1. Cannabis (36.0%)        | 1. Metanfetaminas (30.8%)  |                            |
|                                           | 2. Cannabis (27.6%)       | 2. Metanfetaminas (35.7%)  | 2. Cannabis (25.3%)        |                            |
|                                           | 3. Alcohol (3.4%)         | 3. Cocaína (6.7%)          | 3. Alcohol (12.4%)         |                            |
|                                           | 4. Tabaco (3.4%)          | 4. Tabaco (6.5%)           | 4. Tabaco (5.5%)           |                            |
|                                           |                           | 5. Alcohol (4.8%)          | 5. Cocaína (5.0%)          |                            |
| Consumo alguna vez en la vida             | 1. Alcohol (72.4%)        | 1. Cannabis (71.6%)        | 1. Alcohol (81.0%)         |                            |
|                                           | 2. Cannabis (69.0%)       | 2. Tabaco (63.5%)          | 2. Cannabis (78.0%)        |                            |
|                                           | 3. Metanfetaminas (65.5%) | 3. Alcohol (61.2%)         | 3. Tabaco (69.9%)          |                            |
|                                           | 4. Tabaco (58.6%)         | 4. Metanfetaminas (44.1%)  | 4. Metanfetaminas (45.3%)  |                            |
|                                           | 5. Cocaína (34.5%)        | 5. Cocaína (27.5%)         | 5. Cocaína (34.6%)         |                            |
| Consumo en el último mes                  | 1. Metanfetaminas (48.3%) | 1. Tabaco (44.1%)          | 1. Alcohol (48.0%)         |                            |
|                                           | 2. Alcohol (41.4%)        | 2. Cannabis (41.0%)        | 2. Tabaco (46.2%)          |                            |
|                                           | 3. Cannabis (37.9%)       | 3. Alcohol (33.7%)         | 3. Cannabis (35.5%)        |                            |
|                                           | 4. Tabaco (34.5%)         | 4. Metanfetaminas (25.6%)  | 4. Metanfetaminas (23.6%)  |                            |
|                                           | 5. Cocaína (6.9%)         | 5. Cocaína (10.1%)         | 5. Cocaína (8.4%)          |                            |

*Nota:* Información recuperada de CIJ (2024af).