

Tabla 6.3

Características y principales drogas consumidas por personas de primer ingreso a tratamiento en el nivel nacional y el estado de Zacatecas.

Enero - junio de 2024

		CIJ Fresnillo (N= 43)	Zacatecas (N= 149)	Nacional (N= 9,938)
Sexo	Hombres	60.5%	69.8%	72.6%
	Mujeres	39.5%	30.2%	27.4%
	Razón H:M	1.5 hombres por cada mujer	2.3 hombres por cada mujer	2.7 hombres por cada mujer
Edad de ingreso	10 a 14 años	11.6%	8.7%	9.1%
	15 a 19 años	32.6%	38.3%	35.8%
	20 a 24 años	25.6%	22.1%	14.8%
	25 a 29 años	7.0%	10.1%	11.8%
	30 a 34 años	7.0%	5.4%	9.5%
	Promedio	24.3 años	23.9 años	25.1 años
Edad de inicio del uso de drogas ilícitas	10 a 14 años	39.5%	38.3%	34.1%
	15 a 19 años	39.5%	43.6%	46.4%
	20 a 24 años	4.7%	5.4%	9.0%
	25 a 29 años	4.7%	4.7%	4.3%
	Promedio	17.2 años	16.7 años	17.1 años
Drogas ilícitas de inicio	1. Cannabis (51.2%)	1. Cannabis (70.5%)	1. Cannabis (66.3%)	
	2. Otra sust. Abuso (25.6%)	2. Cocaína (6.7%)	2. Metanfetaminas (13.2%)	
	3. Cocaína (14.0%)	3. Metanfetaminas (6.0%)	3. Cocaína (8.7%)	
Drogas de mayor impacto	1. Metanfetaminas (27.9%)			
	2. Cannabis (18.6%)	1. Cannabis (30.2%)	1. Metanfetaminas (30.8%)	
	3. Tabaco (9.3%)	2. Metanfetaminas (29.5%)	2. Cannabis (25.3%)	
	4. Cocaína (4.7%)	3. Tabaco (10.7%)	3. Alcohol (12.4%)	
	5. Alcohol (2.3%)	4. Alcohol (6.0%)	4. Tabaco (5.5%)	
	5. Otros estimulantes (2.3%)	5. Cocaína (2.7%)	5. Cocaína (5.0%)	
	5. Benzodiacepinas (2.3%)			
Consumo alguna vez en la vida	5. Otras sust. Abuso (2.3%)			
	1. Alcohol (86.0%)	1. Alcohol (87.2%)	1. Alcohol (81.0%)	
	2. Tabaco (74.4%)	2. Cannabis (83.9%)	2. Cannabis (78.0%)	
	3. Cannabis (69.8%)	3. Tabaco (78.5%)	3. Tabaco (69.9%)	
	4. Otras sust. Abuso (41.9%)	4. Metanfetaminas (41.6%)	4. Metanfetaminas (45.3%)	
Consumo en el último mes	5. Cocaína (32.6%)	5. Cocaína (31.5%)	5. Cocaína (34.6%)	
	1. Alcohol (67.4%)	1. Alcohol (59.1%)	1. Alcohol (48.0%)	
	2. Tabaco (48.8%)	2. Tabaco (51.0%)	2. Tabaco (46.2%)	
	3. Cannabis (46.5%)	3. Cannabis (47.7%)	3. Cannabis (35.5%)	
	4. Metanfetaminas (20.9%)	4. Metanfetaminas (24.2%)	4. Metanfetaminas (23.6%)	
	5. Otras sust. Abuso (16.3%)	5. Cocaína (3.4%)	5. Cocaína (8.4%)	

Nota: Información recuperada de CIJ (2024af).