
**ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL CONSUMO DE
DROGAS EN PACIENTES DE PRIMER INGRESO A
TRATAMIENTO EN CIJ EN EL PRIMER SEMESTRE
DE 2007**

Alma Delia Gutiérrez López
P. Isaías Castillo Franco

Centros de Integración Juvenil
Dirección de Investigación y Enseñanza
Subdirección de Investigación
Depto. de Investigación Clínica y Epidemiológica
México, 2008

Informe de Investigación 08-01

DIRECTORIO

PRESIDENTE DEL PATRONATO NACIONAL

Dr. Jesús Kumate Rodríguez

VICEPRESIDENTE

Lic. Ernesto Enríquez Rubio

VICEPRESIDENTE

Lic. Mario Luis Fuentes Alcalá

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA

Sra. Kena Moreno

DIRECTOR GENERAL

Dr. Víctor Manuel Guisa Cruz

DIRECTORA GENERAL ADJUNTA DE OPERACIÓN Y DE PATRONATOS

Psic. Carmen Fernández Cáceres

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ADMINISTRACIÓN

L.C. Hugo Basurto Ojeda

DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA

Dr. Ricardo Sánchez Huesca

SUBDIRECTOR DE INVESTIGACIÓN

Psic. David Bruno Díaz Negrete

Citación: Gutiérrez López, AD. y Castillo Franco, PI. (2008). **Estudio epidemiológico del consumo de drogas en pacientes de primer ingreso a tratamiento en CIJ en el primer semestre de 2007.** Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación, **Informe de Investigación 08-01**, México.

CONTENIDO

| | |
|--|----|
| INTRODUCCIÓN | 4 |
| MÉTODO | 5 |
| CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS | 8 |
| FACTORES ASOCIADOS A LA DEMANDA DE TRATAMIENTO | 9 |
| CONSUMO DE DROGAS | 10 |
| SÍNTESIS GENERAL | 16 |
| REFERENCIAS | 19 |
| CUADROS | 20 |
| ANEXO | 49 |

RESUMEN

El presente informe se realizó con base en registros clínicos de entrevista inicial de **10,423** usuarios de sustancias psicoactivas que reportaron el consumo de al menos una droga ilícita y que acudieron por primera vez a tratamiento a Centros de Integración Juvenil entre enero y junio de 2007, con objeto de actualizar información sobre el perfil socio-demográfico, factores asociados a la demanda de tratamiento y al patrón de consumo de sustancias psicoactivas, así como de contribuir con elementos útiles para retroalimentar la planeación, diseño y ajuste de los servicios institucionales de prevención y tratamiento del consumo de drogas.

Los datos permitieron observar una mayor proporción de hombres que demandan tratamiento, con una razón de cinco hombres por cada mujer. La edad media de ingreso a tratamiento fue de 25.2 años, mientras que la edad promedio del inicio del consumo de tabaco se situó en 14.7 años, la de alcohol en 15.1 años y la de drogas ilícitas en 17.1 años.

Las drogas de mayor consumo alguna vez en la vida fueron: bebidas alcohólicas (90.2%), tabaco (87.0%), marihuana (70.6%), cocaína en polvo blanco (55.3%), crack (38.6%), solventes o removedores (24.0%), pegamentos (16.7%), metanfetaminas (15.6%), benzodiazepinas (10.4%) y Rohypnol® (9.0%). En cuanto al consumo en el mes previo al ingreso a tratamiento las sustancias más utilizadas fueron: tabaco (68.9%), bebidas alcohólicas (58.7%), marihuana (28.4%), crack (21.4%), cocaína en polvo blanco (17.9%), solventes o removedores (8.4%) y metanfetaminas (7.5%). Las drogas de mayor impacto en el último años fueron: crack (21.2%), alcohol (14.2%), cocaína (13.5%), marihuana (12.3%) y metanfetaminas (9.2%).

En cuanto a los factores asociados a la demanda de tratamiento se observó que los casos acudieron principalmente por iniciativa propia (51.6%) o por condicionamiento o recomendación familiar (37.9%); que buscan atención por el consumo de drogas ilícitas (85.1%), alcohol (37.7%) y/o tabaco (33.5%); que han intentado interrumpir de manera voluntaria y sin apoyo el consumo (32.2%) o que no han tomado ninguna medida contra el problema (24.3%); y que entre los problemas más frecuentemente asociados al consumo se reconocen los de tipo familiar (72.6%) y los de salud (42.2%).

INTRODUCCIÓN

Este informe se desprende de la información obtenida mediante el Sistema Institucional de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas (SIIECD) perteneciente a Centros de Integración Juvenil (CIJ), cuyo objetivo es proporcionar datos actualizados de las características sociodemográficas, de los factores asociados a la demanda de tratamiento y del patrón de consumo de sustancias de la población usuaria de los servicios de tratamiento institucionales, para apoyar el diseño, planeación y ajuste de los programas de prevención y atención curativa-rehabilitatoria institucionales.

El SIIECD es producto de más de veinte años de trabajo, a lo largo de los cuales se ha logrado consolidar el seguimiento sistemático y oportuno de datos que, más allá de su aplicación en la toma de decisiones para el diseño y ajuste de servicios, han contribuido de manera significativa al conocimiento de la forma y tendencias del uso de drogas en nuestro país, al proporcionar referentes sociodemográficos y del patrón de consumo de casos identificados en centros de tratamiento, además de ser una estrategia documental complementaria a los estudios y encuestas poblacionales.

Por otro lado, el sostenido aumento observado en los años recientes en el número de personas que demanda tratamiento en CIJ facilita llevar a cabo el seguimiento semestral de la información, que permite abundar en el

número de observaciones y perfilar con mayor precisión las tendencias y comportamiento del problema.

Por lo que el presente informe integra los resultados de la recopilación sistemática de información de los usuarios de sustancias que solicitaron tratamiento por primera vez a CIJ entre enero y junio de 2007.

MÉTODO

Diseño de estudio: Censo, estudio transversal, descriptivo, *ex post facto*.

Población: 10,423 usuarios de sustancias psicoactivas que reportaron el consumo intencional de al menos una **droga ilegal** que acudieron por primera vez a solicitar tratamiento en CIJ entre enero y junio de 2007, en 87 unidades de atención curativa de CIJ (ver Cuadro 1) y que proporcionaron personalmente la información.¹

Fuente de información: Formato de *Entrevista inicial* (clave 8819-03), aplicado en la primera consulta por parte de los terapeutas responsables del ingreso de pacientes a tratamiento.

Variables de estudio: Las características sociodemográficas estudiadas comprenden: sexo, edad de ingreso a tratamiento, estado civil, escolaridad, ocupación y estrato social. Los factores asociados a la demanda de tratamiento:

¹ No se incluyen casos en los que la información fue proporcionada por la familia del usuario, así como los registros que fueron enviados de manera extemporánea a la Subdirección de Investigación de CIJ.

motivo(s) de consulta, condicionante(s) de la solicitud de tratamiento, antecedente(s) de acciones asumidas frente al uso de sustancias y problema(s) asociado(s) al mismo. Y los indicadores de patrón de consumo: edad de inicio, drogas consumidas en el primer año de consumo, drogas ilícitas consumidas en el primer año de consumo ilegal, tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de sustancias y el ingreso a tratamiento, consumo alguna vez en la vida, en el último año y en el último mes; drogas de preferencia y de mayor impacto en el último año, uso combinado de sustancias, tipo de consumo de drogas ilícitas, episodios de abuso y total de drogas consumidas.²

La información sobre el consumo de drogas se presenta categorizada en once grupos de sustancias: tabaco, alcohol, cannabis, cocaína, inhalables, estimulantes, drogas de diseño, drogas alucinógenas y disociativas, depresores, opiáceos y otras sustancias de abuso.

Considerando la posibilidad de ampliar el seguimiento de sustancias específicas, los once grupos antes mencionados, se desagregan en 43 categorías de sustancias: cigarrillos y otras presentaciones del tabaco; bebidas alcohólicas; marihuana y hachís; cocaína en presentación de polvo blanco, crack y otras presentaciones de cocaína; solventes y removedores, pegamentos, esmaltes y pinturas, gasolinas y combustibles y otros inhalables; anfetamina, derivados anfetamínicos, anorexígenos, metanfetaminas y otros

² Véase Anexo.

estimulantes; éxtasis y otras drogas de diseño; LSD, plantas alucinógenas y derivados, PCP, ketamina y otras drogas alucinógenas y disociativas; benzodiacepinas, Rohypnol®, barbitúricos, sedantes hipnóticos, GHB y otros depresores; opio, morfina, opiáceos de origen natural, heroína blanca, heroína negra y opiáceos sintéticos; sustancias con utilidad médica, nitritos, “drogas inteligentes”, esteroides anabólicos, sustancias no clasificadas y sustancias no especificadas.

Procesamiento de datos. La información fue capturada por personal de la Dirección de Planeación de CIJ, mediante el programa *Control de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas* (CIECD) desarrollado por la Subdirección de Investigación y el Departamento de Sistemas de CIJ. La validación y procesamiento de datos se realizó en el Departamento de Investigación Clínica y Epidemiológica con base en una muestra aleatoria de casos con un nivel de confianza de 95% y un nivel de error del 5%. Para el procesamiento estadístico se utilizó el programa SPSS v. 12. Conviene señalar que los resultados se presentan en porcentajes válidos, excluyendo casos “sin información” y aquéllos que no cumplieron las condiciones de análisis requeridas por cada variable estudiada.

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS³

Persona que proporciona la información. Únicamente acudió el usuario de drogas en 54.9% de los casos y 45.1% lo hizo en compañía de familiares u otras personas.

Sexo. Los hombres representaron al 83.5% de los casos y las mujeres al 16.5%, lo que equivale a una razón de cinco hombres por cada mujer.

Edad de ingreso a tratamiento. La edad promedio se situó en 25.2 años (DE=9.9 años); la mediana en 23 años y la moda en 16 años. Casi la mitad de los casos (46.9%) ingresó entre los 15 y 24 años de edad.

Estado civil. 57.6% señaló que estaba soltero, 19.1% expresó estar casado y 13.1% vivía en unión libre.

Escolaridad. 46.3% cursaba o había cursado algún grado de educación secundaria; 25.0%, al menos algún grado de bachillerato; 16.2%, al menos un año de educación primaria y 7.9%, uno o más años de estudios superiores.

Ocupación. 47.4% desempeñaba alguna actividad laboral, 27.0% estaba desempleado y 17.9% estudiaba.

Estrato social. (Según la percepción de los terapeutas). Destaca que 59.2% de los consumidores corresponden al estrato medio bajo; 26.0%, al estrato bajo y 13.1%, al estrato medio alto.

³ Cfr., Cuadros 1 a 8.

FACTORES ASOCIADOS A LA DEMANDA DE TRATAMIENTO⁴

Motivos de consulta. 40.5% de los casos reportó más de un motivo para acudir a tratamiento (uso de alcohol, tabaco o drogas), mientras que 1.5% de los casos no expresó ninguno. Conviene señalar que 85.1% acudió por consumo de drogas ilícitas; mientras que 37.7%, por el uso de bebidas alcohólicas y 33.5% por el uso de tabaco.

Condicionantes de la solicitud de tratamiento. 16.8% de los casos al solicitar tratamiento expresó dos o más condicionantes, mientras que el 1.3% de los casos no reportó ninguno. Cabe señalar que 51.6% acudió *motu proprio* a tratamiento; 37.9%, por condicionamiento o recomendación familiar; 9.8%, por condicionamiento legal y 7.2%, por condicionamiento o recomendación escolar.

Antecedentes de acciones contra el consumo de sustancias. Antes de acudir a tratamiento en CIJ, 32.2% de los casos expresó que había intentado interrumpir el consumo de drogas de manera voluntaria, pero sin apoyo. 14.3% dijo que previamente había estado internado en algún anexo, mientras que 10.6% había acudido a grupos de autoayuda y 7.4% había hecho algún juramento para evitar el consumo. A diferencia, 24.3% expresó que hasta el momento de la solicitud de tratamiento no había tomado medida alguna en contra del consumo de sustancias; mientras que 12.9% de

⁴ Cfr., Cuadros 9 a 12.

los casos reportó haber intentado al menos dos tipos distintos de acciones para abandonar el consumo de drogas.

Problemas asociados al consumo de sustancias. 72.6% señaló problemas de tipo familiar; 42.2%, de salud; 33.6%, psicológicos; 26.6%, laborales; 24.0%, legales; 20.2%, escolares; 16.3%, de conducta antisocial o delictiva y 13.0%, accidentes o lesiones.

Cabe señalar que 7.4% de los casos no reportó ningún problema asociado al consumo de sustancias, en tanto que 70.0% mencionó dos o más problemas.

CONSUMO DE DROGAS⁵

Edad de inicio del consumo de sustancias. La edad promedio de inicio del consumo de tabaco se situó en 14.7 años (DE=3.7 años), la mediana en 14 y la moda en 15 años; mientras que la edad promedio de inicio del consumo de alcohol se situó en 15.1 años (DE=3.3), la mediana y la moda en 15 años, respectivamente. A diferencia la edad promedio de inicio en el abuso de drogas ilícitas (incluyendo sustancias con utilidad médica utilizadas fuera de prescripción) fue de 17.1 años (DE=5.8), con una mediana y una moda de 16 y 15 años, respectivamente. Cabe señalar que considerando el primer decil como indicador de las edades más tempranas reportadas como edad de inicio, puede apreciarse que el consumo de tabaco aparece más temprano (11 años de

⁵ Cfr., Cuadros 13 a 27.

edad), al que le sigue el consumo de alcohol (12 años) y el de drogas ilícitas (13 años).

Drogas utilizadas en el primer año de consumo. Las principales sustancias utilizadas en este periodo fueron: tabaco en cigarrillos, alcohol y marihuana (61.7%, 50.6% y 19.2%, respectivamente), seguidas por inhalables (solventes y removedores: 7.4%, pegamentos: 4.7%) y cocaína (cocaína en polvo blanco: 5.9% y crack: 2.5).

Considerando únicamente el consumo de drogas ilícitas, las sustancias más reportadas durante el primer año de consumo fueron: marihuana (55.3%); cocaína (cocaína en polvo blanco: 24.3% y crack: 11.1%) e inhalables (solventes/removedores: 15.0% y pegamentos: 9.6%); en menor proporción se reportó el consumo de metanfetaminas (3.9%) y benzodiacepinas (2.8%).

Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de sustancias y el ingreso a tratamiento en CIJ. La media de tiempo transcurrido entre el inicio del uso de sustancias y la solicitud de tratamiento, cuando se trata de tabaco es de 10.7 años, cuando se trata del uso de alcohol es de 10.4 años, y de 8.1 años si únicamente se considera el consumo de drogas ilícitas. Con relación a éstas últimas puede señalarse que la mayor proporción de casos (37.8%) acudió a solicitar tratamiento transcurridos entre uno a cinco años, mientras que 13.3% lo hizo antes de que transcurriera un año. Sin embargo, casi una tercera parte (31.6%) demoró entre seis a quince años para acudir a tratamiento y 17.3% lo hizo

después de quince años de haber iniciado el consumo de dichas sustancias.

Tipo de consumo de drogas ilícitas. 60.5% de los casos fue diagnosticado con consumo funcional; 19.8%, con consumo disfuncional; 8.7%, con consumo social u ocasional; 6.3%, con consumo experimental y 4.7%, en remisión.

Total de drogas consumidas. El promedio de sustancias utilizadas, incluyendo alcohol y tabaco, alguna vez en la vida fue de 4.7 drogas (96.6% reportó el uso de dos o más sustancias); en el último año fue de 3.3 drogas (87.5% consumió dos o más sustancias) y en el último mes fue de 2.3 drogas (70.6% reportó haber utilizado dos o más sustancias).

En cuanto al promedio de sustancias utilizadas, sin incluir alcohol y tabaco, alguna vez en la vida fue de 2.9 drogas (69.5 % reportó el uso de dos o más sustancias); en el último año fue de 1.7 drogas (44.5% consumió dos o más sustancias) y en el último mes fue de una droga (22.9% reportó haber utilizado dos o más sustancias).

Consumo de drogas alguna vez en la vida.⁶ Las proporciones de consumo alguna vez en la vida de los 11 grupos de sustancias fueron: alcohol (90.2%), tabaco (87.0%), cannabis (70.7% [70.6% considerando únicamente

⁶ Dado que la mayoría de los casos refirió haber utilizado dos o más sustancias —tanto en esta categoría como en las de uso en el último año y en el último mes, *infra*— la suma de porcentajes no es igual a 100.

mariguana]), cocaína (68.4%), inhalables (36.9%), depresores (19.1%), estimulantes (20.4%), drogas alucinógenas y disociativas (8.6%), opiáceos (5.2%), drogas de diseño (4.5%) y otras sustancias de abuso (2.8%).

En cuanto al uso de sustancias específicas (contenidas en alguno de los once grupos antes mencionados), destaca el uso cocaína en forma de polvo blanco (55.3%), *crack* (38.6%), solventes y removedores (24.0%), pegamentos (16.7%), metanfetaminas (15.6%), benzodiacepinas (10.4%) y *Rohypnol*[®] (9.0%). En menor proporción se registró el uso de plantas alucinógenas y derivados (5.9%), anfetamina (4.5%), *éxtasis* (4.3%), LSD (3.9%), heroína negra (3.3%), hachís (3.0%) y esmaltes y pinturas (2.9%).

Consumo de drogas en los últimos 12 meses. 97.2% de los casos reportó haber consumido alguna sustancia en el año previo a su ingreso a tratamiento en CIJ.

Las proporciones de consumo de los 11 grupos de sustancias consumidas en este lapso fueron: alcohol (77.9%), tabaco (76.6%), cocaína (51.6%), cannabis (45.2% [45.0% considerando únicamente mariguana]), inhalables (22.2%), estimulantes (14.4%), depresores (9.6%), drogas alucinógenas y disociativas (3.2%), opiáceos (2.7%), drogas de diseño (2.1%) y otras sustancias de abuso (1.7%).

En cuanto al consumo de sustancias específicas contenidas en alguno de los grupos anteriores destaca el uso de cocaína en polvo blanco (33.8%) y *crack* (30.4%), seguidas por solventes y removedores (13.9%), metanfetaminas (11.9%),

pegamentos (8.6%), benzodicepinas (5.6%), *Rohypnol*[®] (3.7%) y, en menores proporciones, anfetamina (2.2%), esmaltes y pinturas (2.0%), heroína negra (2.0%), *éxtasis* (2.0%), plantas alucinógenas y derivados (1.8%) y LSD (1.7%).

Droga de preferencia en los últimos 12 meses.* Entre las sustancias más frecuentemente referidas se encuentran: marihuana (17.1%), alcohol (16.9%), crack (16.5%), tabaco (11.4%), cocaína (10.8%) y metanfetaminas (7.0%). En menor medida se mencionaron: inhalables (4.1%), solventes y removedores (3.6%), cannabis (3.1%), pegamentos (2.2%) y heroína negra (1.5%).

Droga de mayor impacto en los últimos 12 meses.* Entre las sustancias a cuyo consumo los pacientes atribuyen los mayores daños en la salud, en el bienestar personal y familiar o en el desempeño escolar, laboral o social se señalaron: *crack* (21.2%), alcohol (14.2%), cocaína (13.5%), marihuana (12.3%) y metanfetaminas (9.2%). En menor proporción se registró: tabaco (6.8%), inhalables (5.0%), solventes y removedores (4.7%), pegamentos (2.9%), cannabis (2.3%), heroína negra (1.6%) y benzodicepinas (1.2%).

* En las variables “droga de preferencia” y “droga de mayor impacto”, las sustancias se presentan tal como fueron referidas por los usuarios, por lo que el rubro de inhalables puede comprender solventes, removedores, pegamentos, etc., del mismo modo la cocaína puede comprender; cocaína en polvo blanco, crack u otras formas de presentación.

Uso combinado de drogas en los últimos 12 meses.⁷

65.2% de los casos reportó el consumo de dos o más drogas (excluyendo el uso de tabaco) en un mismo día al menos en una ocasión en el transcurso del último año.

Consumo de drogas en los últimos 30 días. 91.1% de los casos reportaron consumo de sustancias en el mes anterior al ingreso a tratamiento.

Las proporciones de consumo de los 11 grupos de sustancias consumidas en este lapso fueron: tabaco (68.9%), alcohol (58.7%), cocaína (35.0%), cannabis (28.5% [28.4% considerando únicamente marihuana]), inhalables (14.1%), estimulantes (8.5%), depresores (4.9%), opiáceos (1.8%), drogas de diseño (0.7%), drogas alucinógenas y disociativas (0.6%) y otras sustancias de abuso (0.9%).

En cuanto al consumo de sustancias específicas de estos grupos destaca el uso de *crack* (21.4%), cocaína en polvo blanco (17.9%), solventes/removedores (8.4%), metanfetaminas (7.5%) y pegamentos (5.0%); en menor proporción se registró el uso de benzodiazepinas (3.2%), heroína negra (1.5%), esmaltes y pinturas (1.4%) y *Rohypnol*[®] (1.2%).

Frecuencia de episodios de abuso en los últimos 30 días.

48.0% de quienes reportaron consumo de tabaco en el último mes aceptó fumar seis o más cigarrillos diariamente. Entre

⁷ No se toman en cuenta 2,407 casos (23.1%) que no cumplieron los criterios de inclusión de esta variable (ver **Anexo**).

quienes consumieron bebidas alcohólicas, una tercera parte (36.6%) reportó consumo abusivo una o dos veces por semana, otra proporción similar (32.0%) abusó del alcohol menos de una vez a la semana. Finalmente, 35.8% de los usuarios de drogas ilícitas reportó consumirlas todos los días. 24.8%, una o dos veces a la semana y 23.0% menos de una vez a la semana (13.5% de los casos no proporcionó información).

SÍNTESIS GENERAL

Dado que el presente informe da cuenta de pacientes que reportaron el uso de al menos una sustancia ilícita alguna vez en la vida, excluyendo a usuarios que sólo reportaron alcohol y/o tabaco, los resultados pueden ser comparables con los obtenidos en estudios anteriores (Gutiérrez López, AD., Castillo Franco, PI. 2007 y Castillo Franco, PI., Gutiérrez López, AD. 2007) y, por tanto, las diferencias que pudieran observarse representan cambios reales.

De esta manera, puede destacarse que:

- Predominó el ingreso a tratamiento de población masculina (5 hombres por cada mujer).
- La mayor proporción de los casos reportó tener entre 15 y 24 años, lo cual señala que entre los asistentes a tratamiento predominan quienes cursan las etapas de la adolescencia y la adultez joven.

- Más de la mitad de los casos acudió por iniciativa propia, y casi dos de cada cinco por condicionamiento o recomendación familiar.
- Nueve de cada diez usuarios acudieron a consulta principalmente por el uso de drogas ilícitas, seguidos por los usuarios de bebidas alcohólicas y por usuarios de tabaco.
- Antes de solicitar tratamiento en CIJ, uno de cada tres casos intentó interrumpir el consumo de sustancias de manera voluntaria aunque sin apoyo; de la misma manera casi uno de cada cuatro no había realizado ninguna acción contra el consumo de drogas.
- Aproximadamente tres de cada cuatro casos refirieron la presencia de problemas familiares asociados al consumo de drogas, dos de cada cinco refirió problemas de salud y uno de cada tres dijo haber experimentado problemas psicológicos.
- El uso de drogas ilícitas suele iniciar, según el primer decil, uno y dos años después del inicio de alcohol y de tabaco, respectivamente.
- El número promedio de sustancias consumidas, incluyendo alcohol y tabaco, fue de: 4.7 sustancias en la medición alguna vez en la vida, 3.3 en el último año y 2.3 en el último mes. Cuando se excluye alcohol y tabaco, las mediciones fueron: 2.9 drogas alguna vez

en la vida, 1.7 drogas en el último año y sólo una droga en el último mes.

- En el último mes siete de cada diez casos consumió dos o más sustancias.
- De los usuarios que manifestaron consumo en el último mes, tres de cada cuatro reportaron abuso de tabaco y casi nueve de cada diez de alcohol; así mismo, más de una tercera parte abusó de drogas ilícitas diariamente.
- El tabaco y el alcohol fueron las drogas más utilizadas en el primer año de consumo, alguna vez en la vida, en el último año y en el último mes, seguidas por el consumo de marihuana, cocaína en polvo blanco, crack, solventes/removedores, pegamentos y metanfetaminas.
- Entre las sustancias de preferencia utilizadas en el último año, se reportaron con mayor frecuencia: marihuana, alcohol, crack, tabaco, cocaína y metanfetaminas. Mientras que las de mayor impacto fueron: crack, alcohol, cocaína, marihuana y metanfetaminas.

REFERENCIAS

Castillo Franco, PI, y Gutiérrez López, AD. (2007). *Consumo de drogas en pacientes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil, Julio-Diciembre 2006*. Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación, **Informe de Investigación 07-07**.

Díaz-Negrete, DB, Sánchez-Huesca, R, y Guisa-Cruz, V (2003). *Registro y estudio de casos en centros de tratamiento especializado*. En: Medina-Mora, ME (coord.). **Metodología para la elaboración de estudios epidemiológicos a nivel nacional y local y estudios para grupos especiales relacionados con las adicciones**. Secretaría de Salud, Consejo Nacional contra las Adicciones, México, pp. 73-77.

Gutiérrez López, AD, Castillo Franco, PI (2007). *Consumo de drogas en pacientes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil. Enero-junio 2007*. Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación, **Informe de Investigación 07-01**.

CUADROS

**CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS USUARIOS DE
DROGAS DE PRIMER INGRESO A TRATAMIENTO EN CIJ
ENTRE ENERO-JUNIO DE 2007**

**Cuadro 1. Distribución de casos de primer ingreso
a tratamiento por unidad de atención**

| Unidad de atención | Total de casos | % |
|---------------------------|-----------------------|----------|
| Álvaro Obregón | 123 | 1.2 |
| Azcapotzalco | 189 | 1.8 |
| Benito Juárez | 124 | 1.2 |
| Coyoacán | 144 | 1.4 |
| Cuajimalpa | 46 | 0.4 |
| Cuauhtémoc Oriente | 133 | 1.3 |
| Cuauhtémoc Poniente | 308 | 3.0 |
| Chalco | 116 | 1.1 |
| Ecatepec | 321 | 3.1 |
| Gustavo A. Madero Norte | 195 | 1.9 |
| Gustavo A. Madero Oriente | 2 | 0.0 |
| Iztapalapa Oriente | 264 | 2.5 |
| Iztapalapa Poniente | 167 | 1.6 |
| Miguel Hidalgo | 111 | 1.1 |
| Naucalpan | 155 | 1.5 |
| Nezahualcóyotl | 251 | 2.4 |
| Tlalpan | 76 | 0.7 |
| Tlalnepantla | 135 | 1.3 |
| Venustiano Carranza | 148 | 1.4 |
| UTCE Zona Norte* | 261 | 2.5 |
| UTR Iztapalapa | 76 | 0.7 |
| <hr/> | | |
| Acapulco | 156 | 1.5 |
| Aguascalientes | 139 | 1.3 |
| Apodaca | 54 | 0.5 |
| Cancún | 164 | 1.6 |
| Celaya | 143 | 1.4 |
| Chihuahua | 234 | 2.2 |
| Chilpancingo | 41 | 0.4 |
| Cd. del Carmen | 44 | 0.4 |

(Continúa)

**Cuadro 1. Distribución de casos de primer ingreso
a tratamiento por unidad de atención**
(Continuación)

| Unidad de atención | Total de casos | % |
|---------------------------|-----------------------|----------|
| Cd. Juárez | 195 | 1.9 |
| Cd. Juárez Zona Norte B | 82 | 0.8 |
| Cd. Victoria | 30 | 0.3 |
| Colima | 135 | 1.3 |
| Cozumel | 56 | 0.5 |
| Cuernavaca | 73 | 0.7 |
| Culiacán | 135 | 1.3 |
| Durango | 124 | 1.2 |
| Durango-Laguna | 94 | 0.9 |
| Fresnillo | 40 | 0.4 |
| Guadalajara Centro | 247 | 2.4 |
| Guadalajara Sur | 82 | 0.8 |
| Guadalupe | 164 | 1.6 |
| Guamúchil | 39 | 0.4 |
| Guasave | 105 | 1.0 |
| Hermosillo | 178 | 1.7 |
| Ixtapa-Zihuatanejo | 45 | 0.4 |
| Laguna-Torreón | 161 | 1.5 |
| La Paz | 51 | 0.5 |
| León | 202 | 1.9 |
| Los Mochis | 65 | 0.6 |
| Manzanillo | 44 | 0.4 |
| Mazatlán | 128 | 1.2 |
| Mérida | 189 | 1.8 |
| Mexicali | 116 | 1.1 |
| Monterrey | 233 | 2.2 |
| Oaxaca | 57 | 0.5 |
| Pachuca | 96 | 0.9 |
| Poza Rica | 52 | 0.5 |
| Puebla | 156 | 1.5 |
| Puerto Vallarta | 110 | 1.1 |
| Querétaro | 144 | 1.4 |
| Salamanca | 89 | 0.9 |
| Saltillo | 131 | 1.3 |

(Continúa)

**Cuadro 1. Distribución de casos de primer ingreso
a tratamiento por unidad de atención
(Continuación)**

| Unidad de atención | Total de casos | % |
|---------------------------|-----------------------|--------------|
| San Luis Potosí | 116 | 1.1 |
| San Nicolás de los Garza | 125 | 1.2 |
| Tampico | 105 | 1.0 |
| Tapachula | 10 | 0.1 |
| Tecomán | 101 | 1.0 |
| Tehuacán | 26 | 0.2 |
| Tepic | 4 | 0.0 |
| Texcoco | 3 | 0.0 |
| Tijuana | 156 | 1.5 |
| Tlaquepaque | 148 | 1.4 |
| Toluca | 161 | 1.5 |
| Tuxtla Gutiérrez | 177 | 1.7 |
| Villahermosa | 40 | 0.4 |
| Xalapa | 119 | 1.1 |
| Zacatecas | 68 | 0.7 |
| Zamora | 87 | 0.8 |
| UTCE Tijuana | 185 | 1.8 |
| UTCE Zapopan | 185 | 1.8 |
| UTR Acapulco Diamante | 42 | 0.4 |
| UTR Culiacán | 52 | 0.5 |
| UTR Noroccidente* | 94 | 0.9 |
| UTR Nuevo León* | 103 | 1.0 |
| UTR Occidente* | 64 | 0.6 |
| UTR Zapotlán el Grande | 84 | 0.8 |
| Total | 10,423 | 100.0 |

* La Unidad de Tratamiento en Consulta Externa (UTCE) Zona Norte se encuentra ubicada en la Delegación Gustavo A. Madero, Distrito Federal; la Unidad de Tratamiento Residencial (UTR) Noroccidente, en el Municipio de Tijuana, Baja California; la UTR Occidente, en el Municipio de Zapopan, Jalisco y la UTR Nuevo León, en la zona conurbada de Monterrey, Nuevo León.

Cuadro 2. Persona que proporciona la información

| | Frec. | % |
|---|---------------|--------------|
| Usuario de drogas | 5,723 | 54.9 |
| Usuario de drogas y familiares u otras personas | 4,700 | 45.1 |
| Total | 10,423 | 100.0 |

Cuadro 3. Sexo

| | Frec. | % | Razón H:M |
|--------------|---------------|--------------|------------------|
| Hombres | 8,699 | 83.5 | 5:1 |
| Mujeres | 1,724 | 16.5 | |
| Total | 10,423 | 100.0 | |

Cuadro 4. Edad de ingreso a tratamiento

| | Frec. | % | % válido |
|------------------------|---------------|--------------|-----------------|
| Hasta 9 años | 1 | 0.0 | 0.0 |
| 10 a 14 años | 918 | 8.8 | 8.9 |
| 15 a 19 años | 2,866 | 27.5 | 27.6 |
| 20 a 24 años | 1,997 | 19.2 | 19.3 |
| 25 a 29 años | 1,580 | 15.2 | 15.2 |
| 30 a 34 años | 1,236 | 11.9 | 11.9 |
| 35 a 39 años | 783 | 7.5 | 7.6 |
| 40 a 44 años | 473 | 4.5 | 4.6 |
| 45 años y más | 513 | 4.9 | 4.9 |
| <i>Sin información</i> | 56 | 0.5 | <i>Se omite</i> |
| Total | 10,423 | 100.0 | 100.0 |

$\mu = 25.2$; $\sigma = 9.9$; Med.=23; Mo.=16; Decil1 =15

Cuadro 5. Estado civil

| | Frec. | % | % válido |
|------------------------|---------------|--------------|-----------------|
| Soltero | 5,775 | 55.4 | 57.6 |
| Casado | 1,918 | 18.4 | 19.1 |
| Unión libre | 1,311 | 12.6 | 13.1 |
| Separado | 811 | 7.8 | 8.1 |
| Divorciado | 180 | 1.7 | 1.8 |
| Viudo | 37 | 0.4 | 0.4 |
| <i>Sin información</i> | 391 | 3.8 | <i>Se omite</i> |
| Total | 10,423 | 100.0 | 100.0 |

Cuadro 6. Escolaridad

| | Frec. | % | % válido |
|---|---------------|--------------|-----------------|
| Ninguna (no sabe leer ni escribir) | 71 | 0.7 | 0.7 |
| Ninguna (sabe leer y escribir) | 40 | 0.4 | 0.4 |
| Primaria incompleta | 627 | 6.0 | 6.1 |
| Primaria completa | 1,045 | 10.0 | 10.1 |
| Secundaria incompleta | 2,486 | 23.9 | 24.1 |
| Secundaria completa | 2,288 | 22.0 | 22.2 |
| Estudios técnicos o comerciales incompletos | 131 | 1.3 | 1.3 |
| Estudios técnicos o comerciales completos | 206 | 2.0 | 2.0 |
| Bachillerato incompleto | 1,781 | 17.1 | 17.3 |
| Bachillerato completo | 799 | 7.7 | 7.7 |
| Estudios superiores incompletos | 501 | 4.8 | 4.9 |
| Estudios superiores completos | 311 | 3.0 | 3.0 |
| Estudios de posgrado incompletos | 6 | 0.1 | 0.1 |
| Estudios de posgrado completos | 21 | 0.2 | 0.2 |
| <i>Sin información</i> | 110 | 1.1 | <i>Se omite</i> |
| Total | 10,423 | 100.0 | 100.0 |

Cuadro 7. Ocupación

| | Frec. | % | % válido |
|------------------------|---------------|--------------|-----------------|
| Desempleado/desocupado | 2,801 | 26.9 | 27.0 |
| Hogar | 414 | 4.0 | 4.0 |
| Estudia | 1,856 | 17.8 | 17.9 |
| Estudia y trabaja | 354 | 3.4 | 3.4 |
| Trabaja | 4,909 | 47.1 | 47.4 |
| Pensionado | 27 | 0.3 | 0.3 |
| Sin información | 62 | 0.6 | Se omite |
| Total | 10,423 | 100.0 | 100.0 |

Cuadro 8. Estrato social

| | Frec. | % | % válido |
|-------------------------------|---------------|--------------|-----------------|
| Alto | 60 | 0.6 | 0.6 |
| Medio alto | 1,266 | 12.1 | 13.1 |
| Medio bajo | 5,740 | 55.1 | 59.2 |
| Bajo | 2,516 | 24.1 | 26.0 |
| Pobreza extrema o marginación | 107 | 1.0 | 1.1 |
| Sin información | 734 | 7.0 | Se omite |
| Total | 10,423 | 100.0 | 100.0 |

**FACTORES ASOCIADOS A LA DEMANDA DE TRATAMIENTO EN
PACIENTES DE PRIMER INGRESO A TRATAMIENTO EN CIJ
ENTRE ENERO-JUNIO DE 2007**

Cuadro 9. Motivos de consulta

| | Frec. | % |
|---|--------------|------------|
| Consumo de drogas ilícitas | 8,871 | 85.1 |
| Consumo de bebidas alcohólicas | 3,926 | 37.7 |
| Consumo de tabaco | 3,494 | 33.5 |
| Otro motivo | 323 | 3.1 |
| <i>Ningún motivo específico reportado</i> | <i>161</i> | <i>1.5</i> |

4,223 usuarios (40.5%) reportaron dos o más motivos de consulta.

Cuadro 10. Condicionantes de la solicitud de tratamiento

| | Frec. | % |
|---|--------------|------------|
| Por propia iniciativa | 5,378 | 51.6 |
| Por condicionamiento o recomendación familiar | 3,947 | 37.9 |
| Por recomendación de pares | 413 | 4.0 |
| Por condicionamiento o recomendación escolar | 750 | 7.2 |
| Por condicionamiento legal | 1,025 | 9.8 |
| Por condicionamiento o recomendación laboral | 223 | 2.1 |
| Por indicación médica | 278 | 2.7 |
| Otros condicionante de solicitud de tratamiento | 188 | 1.8 |
| <i>Ningún condicionante reportado</i> | <i>138</i> | <i>1.3</i> |

1,755 pacientes (16.8%) reportaron dos o más condicionantes de la solicitud de tratamiento.

Cuadro 11. Antecedentes de acciones contra el consumo de sustancias

| | Frec. | % |
|---|--------------|-------------|
| Juramento | 772 | 7.4 |
| Grupo de autoayuda | 1,103 | 10.6 |
| Internamiento en anexo | 1,490 | 14.3 |
| Intervención de emergencia | 134 | 1.3 |
| Programa de mantenimiento | 58 | 0.6 |
| Tratamiento médico no especializado | 129 | 1.2 |
| Tratamiento psiquiátrico o psicoterapéutico ambulatorio | 607 | 5.8 |
| Tratamiento psiquiátrico o psicoterapéutico residencial | 236 | 2.3 |
| Medicina tradicional o alternativa | 119 | 1.1 |
| Intento de interrupción voluntaria del consumo, sin apoyo | 3,357 | 32.2 |
| Otras acciones | 747 | 7.2 |
| <i>Ninguna acción previa reportada</i> | <i>2,536</i> | <i>24.3</i> |

1,338 pacientes (12.9%) reportaron dos o más acciones contra el consumo de sustancias antes de solicitar tratamiento en CIJ.

Cuadro 12. Problemas asociados al consumo de sustancias

| | Frec. | % |
|---|--------------|------------|
| Problemas de salud | 4,397 | 42.2 |
| Accidentes o lesiones | 1,356 | 13.0 |
| Problemas familiares | 7,572 | 72.6 |
| Problemas escolares | 2,108 | 20.2 |
| Problemas laborales | 2,772 | 26.6 |
| Problemas psicológicos | 3,501 | 33.6 |
| Problemas legales | 2,497 | 24.0 |
| Conducta antisocial o delictiva | 1,704 | 16.3 |
| Otros problemas | 327 | 3.1 |
| <i>Ningún problema asociado reportado</i> | <i>772</i> | <i>7.4</i> |

7,290 pacientes (70.0%) reportaron dos o más problemas asociados.

**CARACTERÍSTICAS DEL CONSUMO DE DROGAS EN PACIENTES DE PRIMER INGRESO A TRATAMIENTO
EN CIJ ENTRE ENERO Y JUNIO DE 2007**

Cuadro 13. Edad de inicio del consumo de drogas

| | Consumo de: | | | | | | | | |
|------------------------|--|--------------|-----------------|--|--------------|-----------------|--|--------------|-----------------|
| | Tabaco | | | Alcohol | | | Drogas ilícitas | | |
| | Frec. | % | % válido | Frec. | % | % válido | Frec. | % | % válido |
| Hasta 9 años | 335 | 3.2 | 3.7 | 285 | 2.7 | 3.1 | 153 | 1.5 | 1.5 |
| 10 a 14 años | 4,302 | 41.3 | 48.0 | 3,608 | 34.6 | 39.0 | 3,277 | 31.4 | 31.8 |
| 15 a 19 años | 3,740 | 35.9 | 41.7 | 4,791 | 46.0 | 51.7 | 4,953 | 47.5 | 48.1 |
| 20 a 24 años | 368 | 3.5 | 4.1 | 417 | 4.0 | 4.5 | 1,012 | 9.7 | 9.8 |
| 25 a 29 años | 130 | 1.2 | 1.5 | 113 | 1.1 | 1.2 | 448 | 4.3 | 4.3 |
| 30 a 34 años | 49 | 0.5 | 0.5 | 31 | 0.3 | 0.3 | 205 | 2.0 | 2.0 |
| 35 a 39 años | 26 | 0.2 | 0.3 | 12 | 0.1 | 0.1 | 136 | 1.3 | 1.3 |
| 40 a 44 años | 6 | 0.1 | 0.1 | 2 | 0.0 | 0.0 | 54 | 0.5 | 0.5 |
| 45 años y más | 5 | 0.0 | 0.1 | 3 | 0.0 | 0.0 | 70 | 0.7 | 0.7 |
| <i>No consumió</i> | 1,351 | 13.0 | <i>Se omite</i> | 1,017 | 9.8 | <i>Se omite</i> | --- | --- | --- |
| <i>Sin información</i> | 111 | 1.1 | <i>Se omite</i> | 144 | 1.4 | <i>Se omite</i> | 115 | 1.1 | <i>Se omite</i> |
| Total | 10,423 | 100.0 | 100.0 | 10,423 | 100.0 | 100.0 | 10,423 | 100.0 | 100.0 |
| | μ= 14.7; σ = 3.7; Med.= 14 Mo.=15; Decil ₁ =11 | | | μ= 15.1; σ = 3.3; Med.= 15 Mo.=15; Decil ₁ =12 | | | μ= 17.1; σ = 5.8; Med.= 16 Mo.=15; Decil ₁ =13 | | |

Cuadro 14. Drogas utilizadas durante el primer año de consumo

| | Frec. | % |
|-----------------------------|--------------|----------|
| Tabaco en cigarrillos | 6,436 | 61.7 |
| Otra presentación de tabaco | 12 | 0.1 |
| Alcohol | 5,271 | 50.6 |
| Mariguana | 2,001 | 19.2 |
| Hachís | 22 | 0.2 |
| Cocaína en polvo blanco | 611 | 5.9 |
| Crack | 261 | 2.5 |
| Otros tipos de cocaína | 12 | 0.1 |
| Solventes/removedores | 775 | 7.4 |
| Pegamentos | 489 | 4.7 |
| Esmaltes/pinturas | 87 | 0.8 |
| Gasolinas/combustibles | 20 | 0.2 |
| Otros inhalables | 30 | 0.3 |
| Benzodiacepinas | 87 | 0.8 |
| Rohypnol | 53 | 0.5 |
| Barbitúricos | 4 | 0.0 |
| Sedantes hipnóticos | 16 | 0.2 |
| Otros depresores | 8 | 0.1 |

(Continúa)

Cuadro 14. Drogas utilizadas durante el primer año de consumo
(Continuación)

| | Frec. | % |
|----------------------------------|--------------|----------|
| Anfetamina | 30 | 0.3 |
| Derivados anfetamínicos | 4 | 0.0 |
| Anorexígenos | 2 | 0.0 |
| Metanfetaminas | 113 | 1.1 |
| Otros estimulantes | 6 | 0.1 |
| Éxtasis (MDMA) | 11 | 0.1 |
| Otras drogas de diseño | 2 | 0.0 |
| LSD | 3 | 0.0 |
| Plantas alucinógenas y derivados | 15 | 0.1 |
| PCP | 1 | 0.0 |
| Otros alucinógenos | 1 | 0.0 |
| Opio | 3 | 0.0 |
| Morfina | 1 | 0.0 |
| Heroína blanca | 1 | 0.0 |
| Heroína negra | 12 | 0.1 |
| Opiáceos sintéticos | 2 | 0.0 |
| Sustancias con utilidad médica | 13 | 0.1 |
| Nitritos (<i>poppers</i>) | 1 | 0.0 |
| Esteroides anabólicos | 2 | 0.0 |
| Sustancias no clasificadas | 6 | 0.1 |
| Sustancias no especificadas | 2 | 0.0 |

Cuadro 15. Drogas ilícitas utilizadas durante el primer año de consumo de este tipo de sustancias

| | Frec. | % |
|-------------------------|--------------|----------|
| Mariguana | 5,767 | 55.3 |
| Hachís | 73 | 0.7 |
| Cocaína en polvo blanco | 2,530 | 24.3 |
| Crack | 1,158 | 11.1 |
| Otros tipos de cocaína | 29 | 0.3 |
| Solventes/removedores | 1,562 | 15.0 |
| Pegamentos | 997 | 9.6 |
| Esmaltes/pinturas | 181 | 1.7 |
| Gasolinas/combustibles | 42 | 0.4 |
| Otros inhalables | 77 | 0.7 |
| Benzodicepinas | 289 | 2.8 |
| Rohypnol | 155 | 1.5 |
| Barbitúricos | 14 | 0.1 |
| Sedantes hipnóticos | 53 | 0.5 |
| GHB | 1 | 0.0 |
| Otros depresores | 40 | 0.4 |
| Anfetamina | 123 | 1.2 |
| Derivados anfetamínicos | 9 | 0.1 |
| Anorexígenos | 19 | 0.2 |
| Metanfetaminas | 409 | 3.9 |
| Otros estimulantes | 20 | 0.2 |

(Continúa)

Cuadro 15. Drogas ilícitas utilizadas durante el primer año de consumo de este tipo de sustancias
(Continuación)

| | Frec. | % |
|----------------------------------|--------------|----------|
| Éxtasis (MDMA) | 71 | 0.7 |
| Otras drogas de diseño | 6 | 0.1 |
| LSD | 34 | 0.3 |
| Plantas alucinógenas y derivados | 62 | 0.6 |
| PCP | 4 | 0.0 |
| Ketamina | 2 | 0.0 |
| Otros alucinógenos | 3 | 0.0 |
| Opio | 3 | 0.0 |
| Opiáceos de origen natural | 6 | 0.1 |
| Heroína blanca | 7 | 0.1 |
| Heroína negra | 32 | 0.3 |
| Opiáceos sintéticos | 8 | 0.1 |
| Sustancias con utilidad médica | 55 | 0.5 |
| Nitritos (poppers) | 12 | 0.1 |
| Drogas inteligentes | 1 | 0.0 |
| Esteroides anabólicos | 3 | 0.0 |
| Sustancias no clasificadas | 12 | 0.1 |
| Sustancias no especificadas | 8 | 0.1 |

Cuadro 16. Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de sustancias y el ingreso a tratamiento en CIJ

| | Desde el inicio del uso de tabaco | | | Desde el inicio del uso de alcohol | | | Desde el inicio del uso de drogas ilícitas | | |
|------------------------|--|--------------|-----------------|---|--------------|-----------------|---|--------------|-----------------|
| | Frec. | % | % válido | Frec. | % | % válido | Frec. | % | % válido |
| < de un año | 368 | 3.5 | 4.1 | 470 | 4.5 | 5.1 | 1,361 | 13.1 | 13.3 |
| 1 a 5 años | 3,031 | 29.1 | 34.0 | 3,091 | 29.7 | 33.5 | 3,880 | 37.2 | 37.8 |
| 6 a 10 años | 1,885 | 18.1 | 21.1 | 1,994 | 19.1 | 21.6 | 1,979 | 19.0 | 19.3 |
| 11 a 15 años | 1,366 | 13.1 | 15.3 | 1,364 | 13.1 | 14.8 | 1,262 | 12.1 | 12.3 |
| 16 a 20 años | 923 | 8.9 | 10.4 | 974 | 9.3 | 10.6 | 776 | 7.4 | 7.6 |
| 21 a 25 años | 610 | 5.9 | 6.8 | 579 | 5.6 | 6.3 | 483 | 4.6 | 4.7 |
| 26 o más años | 731 | 7.0 | 8.2 | 744 | 7.1 | 8.1 | 512 | 4.9 | 5.0 |
| <i>No consumió</i> | <i>1,351</i> | <i>13.0</i> | <i>Se omite</i> | <i>1,017</i> | <i>9.8</i> | <i>Se omite</i> | <i>---</i> | <i>---</i> | <i>---</i> |
| <i>Sin información</i> | <i>158</i> | <i>1.5</i> | <i>Se omite</i> | <i>190</i> | <i>1.8</i> | <i>Se omite</i> | <i>170</i> | <i>1.6</i> | <i>Se omite</i> |
| Total | 10,423 | 100.0 | 100.0 | 10,423 | 100.0 | 100.0 | 10,423 | 100.0 | 100.0 |
| | μ= 10.7; σ = 9.3; Med.= 8 Mo.=1; Decil1= un año | | | μ= 10.4; σ = 9.3; Med.=8 Mo.=1; Decil1= un año | | | μ= 8.1; σ = 8.4; Med.= 5 Mo.= < un año; Decil1= < un año | | |

Cuadro 17. Tipo de consumo de drogas ilícitas

| | Frec. | % | % válido |
|------------------------|---------------|--------------|-----------------|
| Experimental | 627 | 6.0 | 6.3 |
| Social u ocasional | 876 | 8.4 | 8.7 |
| Funcional | 6,060 | 58.1 | 60.5 |
| Disfuncional | 1,986 | 19.1 | 19.8 |
| En remisión | 470 | 4.5 | 4.7 |
| <i>Sin información</i> | <i>404</i> | <i>3.9</i> | <i>Se omite</i> |
| Total | 10,423 | 100.0 | 100.0 |

Cuadro 18. Total de drogas consumidas alguna vez en la vida

| | Incluyendo alcohol y tabaco* | | Sin incluir alcohol y tabaco** | |
|------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|
| | Frec. | % | Frec. | % |
| 1 sustancia | 349 | 3.3 | 3,188 | 30.6 |
| 2 sustancias | 725 | 7.0 | 2,387 | 22.9 |
| 3 sustancias | 2,584 | 24.8 | 1,952 | 18.7 |
| 4 sustancias | 2,127 | 20.4 | 1,154 | 11.1 |
| 5 sustancias | 1,842 | 17.7 | 678 | 6.5 |
| 6 sustancias | 1,097 | 10.5 | 436 | 4.2 |
| 7 sustancias | 652 | 6.3 | 240 | 2.3 |
| 8 sustancias | 431 | 4.1 | 173 | 1.7 |
| 9 sustancias | 233 | 2.2 | 81 | 0.8 |
| 10 sustancias | 165 | 1.6 | 56 | 0.5 |
| 11-20 sustancias | 218 | 2.0 | 78 | 0.8 |
| Total | 10,423 | 100.0 | 10,423 | 100.0 |

* $\mu = 4.7$; $\sigma = 2.2$; Med.= 4; Mo.=3; Decil₁=2

** $\mu = 2.9$; $\sigma = 2.0$; Med.= 2; Mo.=1; Decil₁=1

Cuadro 19. Consumo de drogas alguna vez en la vida por sustancia

| | Frec. | % |
|-------------------------|--------------|-------------|
| Tabaco | 9,072 | 87.0 |
| Cigarrillos | 9,071 | 87.0 |
| Otra presentación | 102 | 1.0 |
| Alcohol | 9,406 | 90.2 |
| Cannabis | 7,373 | 70.7 |
| Marihuana | 7,358 | 70.6 |
| Hachís | 313 | 3.0 |
| Cocaína | 7,133 | 68.4 |
| Polvo blanco | 5,761 | 55.3 |
| Crack | 4,024 | 38.6 |
| Otra presentación | 180 | 1.7 |
| Inhalables | 3,851 | 36.9 |
| Solventes / removedores | 2,499 | 24.0 |
| Pegamentos | 1,744 | 16.7 |
| Esmaltes / pinturas | 304 | 2.9 |
| Gasolinas/combustibles | 106 | 1.0 |
| Otros | 186 | 1.8 |
| Depresores | 1,988 | 19.1 |
| Benzodiacepinas | 1,087 | 10.4 |
| Rohypnol® | 938 | 9.0 |
| Barbitúricos | 45 | 0.4 |
| Sedantes hipnóticos | 185 | 1.8 |
| GHB | 7 | 0.1 |
| Otros | 163 | 1.6 |
| Estimulantes | 2,123 | 20.4 |
| Anfetamina | 473 | 4.5 |
| Derivados anfetamínicos | 38 | 0.4 |
| Anorexígenos | 59 | 0.6 |
| Metanfetaminas | 1,626 | 15.6 |
| Otros | 103 | 1.0 |
| Drogas de diseño | 469 | 4.5 |
| Éxtasis (MDMA) | 443 | 4.3 |
| Otras | 42 | 0.4 |

(Continúa)

Cuadro 19. Consumo de drogas alguna vez en la vida por sustancia
(Continuación)

| | Frec. | % |
|---|------------|------------|
| Drogas alucinógenas y disociativas | 900 | 8.6 |
| LSD | 410 | 3.9 |
| Plantas alucinógenas y derivados | 615 | 5.9 |
| PCP | 66 | 0.6 |
| Ketamina | 29 | 0.3 |
| Otras | 55 | 0.5 |
| Opiáceos | 543 | 5.2 |
| Opio | 74 | 0.7 |
| Morfina | 31 | 0.3 |
| Origen natural | 8 | 0.1 |
| Heroína blanca | 100 | 1.0 |
| Heroína negra | 345 | 3.3 |
| Sintéticos | 28 | 0.3 |
| Otras sustancias de abuso | 295 | 2.8 |
| Con utilidad médica | 143 | 1.4 |
| Nitritos (poppers) | 84 | 0.8 |
| “Drogas inteligentes” | 10 | 0.1 |
| Esteroides anabólicos | 9 | 0.1 |
| No clasificadas | 42 | 0.4 |
| No especificadas | 25 | 0.2 |

Cuadro 20. Total de drogas consumidas en el último año

| | Incluyendo alcohol y tabaco* | | Sin incluir alcohol y tabaco** | |
|------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|
| | Frec. | % | Frec. | % |
| 0 sustancias | 296 | 2.8 | 1,328 | 12.7 |
| 1 sustancia | 1,004 | 9.6 | 4,466 | 42.8 |
| 2 sustancias | 1,974 | 18.9 | 2,373 | 22.8 |
| 3 sustancias | 3,249 | 31.2 | 1,215 | 11.7 |
| 4 sustancias | 1,923 | 18.4 | 503 | 4.8 |
| 5 sustancias | 1,039 | 10.0 | 257 | 2.5 |
| 6 sustancias | 436 | 4.2 | 128 | 1.2 |
| 7 sustancias | 237 | 2.3 | 80 | 0.8 |
| 8 sustancias | 123 | 1.2 | 32 | 0.3 |
| 9 sustancias | 71 | 0.7 | 17 | 0.2 |
| 10 sustancias | 32 | 0.3 | 14 | 0.1 |
| 11-16 sustancias | 39 | 0.3 | 10 | 0.1 |
| Total | 10,423 | 100.0 | 10,423 | 100.0 |

* $\mu = 3.3$; $\sigma = 1.8$; Med.= 3; Mo.=3; Decil₁=1

** $\mu = 1.7$; $\sigma = 1.5$; Med.= 1; Mo.=1; Decil₁=0

Cuadro 21. Consumo de drogas en los últimos 12 meses por sustancia

| | Frec. | % |
|-------------------------|--------------|-------------|
| Tabaco | 7,983 | 76.6 |
| Cigarrillos | 7,980 | 76.6 |
| Otra presentación | 23 | 0.2 |
| Alcohol | 8,123 | 77.9 |
| Cannabis | 4,712 | 45.2 |
| Marihuana | 4,695 | 45.0 |
| Hachís | 136 | 1.3 |
| Cocaína | 5,378 | 51.6 |
| Polvo blanco | 3,525 | 33.8 |
| Crack | 3,172 | 30.4 |
| Otra presentación | 99 | 0.9 |
| Inhalables | 2,315 | 22.2 |
| Solventes / removedores | 1,446 | 13.9 |
| Pegamentos | 898 | 8.6 |
| Esmaltes / pinturas | 210 | 2.0 |
| Gasolinas/combustibles | 36 | 0.3 |
| Otros | 96 | 0.9 |
| Depresores | 1,002 | 9.6 |
| Benzodiacepinas | 588 | 5.6 |
| Rohypnol® | 389 | 3.7 |
| Barbitúricos | 23 | 0.2 |
| Sedantes hipnóticos | 98 | 0.9 |
| GHB | 3 | 0.0 |
| Otros | 75 | 0.7 |
| Estimulantes | 1,505 | 14.4 |
| Anfetamina | 234 | 2.2 |
| Derivados anfetamínicos | 19 | 0.2 |
| Anorexígenos | 26 | 0.2 |
| Metanfetaminas | 1,239 | 11.9 |
| Otros | 52 | 0.5 |
| Drogas de diseño | 220 | 2.1 |
| Éxtasis (MDMA) | 206 | 2.0 |
| Otras | 21 | 0.2 |

(Continúa)

**Cuadro 21. Consumo de drogas en los últimos 12 meses por
sustancia**
(Continuación)

| | Frec. | % |
|---|--------------|------------|
| Drogas alucinógenas y disociativas | 333 | 3.2 |
| LSD | 175 | 1.7 |
| Plantas alucinógenas y derivados | 186 | 1.8 |
| PCP | 11 | 0.1 |
| Ketamina | 11 | 0.1 |
| Otras | 17 | 0.2 |
| Opiáceos | 285 | 2.7 |
| Opio | 21 | 0.2 |
| Morfina | 12 | 0.1 |
| Origen natural | 0 | 0.0 |
| Heroína blanca | 33 | 0.3 |
| Heroína negra | 210 | 2.0 |
| Sintéticos | 18 | 0.2 |
| Otras sustancias de abuso | 173 | 1.7 |
| Con utilidad médica | 90 | 0.9 |
| Nitritos (poppers) | 41 | 0.4 |
| “Drogas inteligentes” | 6 | 0.1 |
| Esteroides anabólicos | 4 | 0.0 |
| No clasificadas | 27 | 0.3 |
| No especificadas | 13 | 0.1 |

Cuadro 22. Droga de preferencia en los últimos 12 meses, según menciones

| | Frec. | % | % válido |
|-------------------------|--------------|----------|-----------------|
| Tabaco | 1,138 | 10.9 | 11.4 |
| Tabaco en cigarrillos | 166 | 1.6 | 1.7 |
| Alcohol | 1,683 | 16.1 | 16.9 |
| Cannabis | 308 | 3.0 | 3.1 |
| Mariguana | 1,702 | 16.3 | 17.1 |
| Hachís | 1 | 0.0 | 0.0 |
| Cocaína | 1,079 | 10.4 | 10.8 |
| Cocaína en polvo blanco | 41 | 0.4 | 0.4 |
| Crack | 1,640 | 15.7 | 16.5 |
| Otros tipos de cocaína | 7 | 0.1 | 0.1 |
| Inhalables | 406 | 3.9 | 4.1 |
| Solventes/removedores | 363 | 3.5 | 3.6 |
| Pegamentos | 223 | 2.1 | 2.2 |
| Esmaltes/pinturas | 46 | 0.4 | 0.5 |
| Gasolinas/combustibles | 2 | 0.0 | 0.0 |
| Otros inhalables | 17 | 0.2 | 0.2 |
| Depresores | 5 | 0.0 | 0.1 |
| Benzodiacepinas | 92 | 0.9 | 0.9 |
| Rohypnol | 23 | 0.2 | 0.2 |
| Barbitúricos | 4 | 0.0 | 0.0 |
| Sedantes hipnóticos | 13 | 0.1 | 0.1 |
| Otros depresores | 7 | 0.1 | 0.1 |
| Estimulantes | 1 | 0.0 | 0.0 |
| Anfetamina | 38 | 0.4 | 0.4 |
| Anorexígenos | 4 | 0.0 | 0.0 |
| Metanfetaminas | 698 | 6.7 | 7.0 |
| Otros estimulantes | 11 | 0.1 | 0.1 |
| Éxtasis (MDMA) | 15 | 0.1 | 0.2 |
| Otras drogas de diseño | 2 | 0.0 | 0.0 |

(Continúa)

Cuadro 22. Droga de preferencia en los últimos 12 meses, según menciones
(Continuación)

| | Frec. | % | % válido |
|-------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|
| LSD | 15 | 0.1 | 0.2 |
| Plantas alucinógenas y derivados | 3 | 0.0 | 0.0 |
| Ketamina | 2 | 0.0 | 0.0 |
| Opiáceos | 3 | 0.0 | 0.0 |
| Opio | 2 | 0.0 | 0.0 |
| Morfina | 4 | 0.0 | 0.0 |
| Heroína blanca | 12 | 0.1 | 0.1 |
| Heroína negra | 154 | 1.5 | 1.5 |
| Opiáceos sintéticos | 8 | 0.1 | 0.1 |
| Sustancias con utilidad médica | 13 | 0.1 | 0.1 |
| Nitritos (poppers) | 2 | 0.0 | 0.0 |
| Drogas inteligentes | 1 | 0.0 | 0.0 |
| Esteroides anabólicos | 1 | 0.0 | 0.0 |
| Sustancias no clasificadas | 2 | 0.0 | 0.0 |
| Sustancias no especificadas | 1 | 0.0 | 0.0 |
| <i>No consumió en el último año</i> | 296 | 2.8 | <i>Se omite</i> |
| <i>Sin información</i> | 169 | 1.6 | <i>Se omite</i> |
| Total | 10,423 | 100.0 | 100.0 |

Cuadro 23. Droga de mayor impacto en los últimos 12 meses, según menciones

| | Frec. | % | % válido |
|-------------------------|--------------|----------|-----------------|
| Tabaco | 677 | 6.5 | 6.8 |
| Tabaco en cigarrillos | 95 | 0.9 | 1.0 |
| Alcohol | 1,416 | 13.6 | 14.2 |
| Cannabis | 232 | 2.2 | 2.3 |
| Mariguana | 1,221 | 11.7 | 12.3 |
| Hachís | 2 | 0.0 | 0.0 |
| Cocaína | 1,347 | 12.9 | 13.5 |
| polvo blanco | 31 | 0.3 | 0.3 |
| Crack | 2,111 | 20.3 | 21.2 |
| Otros tipos de cocaína | 15 | 0.1 | 0.2 |
| Inhalables | 498 | 4.8 | 5.0 |
| Solventes/removedores | 472 | 4.5 | 4.7 |
| Pegamentos | 288 | 2.8 | 2.9 |
| Esmaltes/pinturas | 58 | 0.6 | 0.6 |
| Gasolinas/combustibles | 2 | 0.0 | 0.0 |
| Otros inhalables | 22 | 0.2 | 0.2 |
| Depresores | 7 | 0.1 | 0.1 |
| Benzodicepinas | 122 | 1.2 | 1.2 |
| Rohypnol | 30 | 0.3 | 0.3 |
| Barbitúricos | 2 | 0.0 | 0.0 |
| Sedantes hipnóticos | 14 | 0.1 | 0.1 |
| Otros depresores | 6 | 0.1 | 0.1 |
| Estimulantes | 1 | 0.0 | 0.0 |
| Anfetamina | 56 | 0.5 | 0.6 |
| Derivados anfetamínicos | 2 | 0.0 | 0.0 |
| Anorexígenos | 5 | 0.0 | 0.1 |
| Metanfetaminas | 911 | 8.7 | 9.2 |
| Otros estimulantes | 13 | 0.1 | 0.1 |
| Éxtasis (MDMA) | 25 | 0.2 | 0.3 |
| Otras drogas de diseño | 4 | 0.0 | 0.0 |

(Continúa)

Cuadro 23. Droga de mayor impacto en los últimos 12 meses, según menciones
(continuación)

| | Frec. | % | % válido |
|-------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|
| Alucinógenos | 1 | 0.0 | 0.0 |
| LSD | 31 | 0.3 | 0.3 |
| Plantas alucinógenas y derivados | 10 | 0.1 | 0.1 |
| PCP | 2 | 0.0 | 0.0 |
| Ketamina | 2 | 0.0 | 0.0 |
| Otros alucinógenos | 1 | 0.0 | 0.0 |
| Opíáceos | 1 | 0.0 | 0.0 |
| Opio | 1 | 0.0 | 0.0 |
| Morfina | 3 | 0.0 | 0.0 |
| Heroína blanca | 16 | 0.2 | 0.2 |
| Heroína negra | 161 | 1.5 | 1.6 |
| Opíáceos sintéticos | 8 | 0.1 | 0.1 |
| Sustancias con utilidad médica | 17 | 0.2 | 0.2 |
| Nitritos (poppers) | 5 | 0.0 | 0.1 |
| Drogas inteligentes | 1 | 0.0 | 0.0 |
| Esteroides anabólicos | 1 | 0.0 | 0.0 |
| Sustancias no clasificadas | 1 | 0.0 | 0.0 |
| Sustancias no especificadas | 1 | 0.0 | 0.0 |
| <i>No consumió en el último año</i> | 296 | 2.8 | <i>Se omite</i> |
| <i>Sin información</i> | 179 | 1.7 | <i>Se omite</i> |
| Total | 10,423 | 100.0 | 100.0 |

Cuadro 24. Uso combinado de drogas en los últimos 12 meses
(No incluye tabaco)

| | Frec. | % | % válido |
|-------------------|---------------|--------------|-----------------|
| Si combinó drogas | 5,225 | 50.1 | 65.2 |
| No combinó drogas | 2,791 | 26.8 | 34.8 |
| <i>No aplica</i> | 2,407 | 23.1 | <i>Se omite</i> |
| Total | 10,423 | 100.0 | 100.0 |

Cuadro 25. Total de drogas consumidas en el último mes

| | Incluyendo alcohol y tabaco* | | Sin incluir alcohol y tabaco** | |
|------------------|------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|
| | Frec. | % | Frec. | % |
| 0 sustancias | 927 | 8.9 | 3,255 | 31.2 |
| 1 sustancia | 2,129 | 20.4 | 4,778 | 45.8 |
| 2 sustancias | 2,821 | 27.1 | 1,637 | 15.7 |
| 3 sustancias | 2,851 | 27.4 | 531 | 5.1 |
| 4 sustancias | 1,110 | 10.6 | 134 | 1.3 |
| 5 sustancias | 407 | 3.9 | 61 | 0.6 |
| 6 sustancias | 108 | 1.0 | 20 | 0.2 |
| 7 sustancias | 48 | 0.5 | 1 | 0.0 |
| 8 sustancias | 15 | 0.1 | 1 | 0.0 |
| 9 sustancias | 2 | 0.0 | 5 | 0.0 |
| 10-12 sustancias | 5 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Total | 10,423 | 100.0 | 10,423 | 100.0 |

* $\mu = 2.3$; $\sigma = 1.4$; Med.= 2; Mo.=3; Decil₁=1

** $\mu = 1.0$; $\sigma = 1.0$; Med.= 1; Mo.=1; Decil₁=0

Cuadro 26. Consumo de drogas en los últimos 30 días por sustancia

| | Frec. | % |
|--------------------------|--------------|-------------|
| Tabaco | 7,185 | 68.9 |
| Cigarrillos | 7,182 | 68.9 |
| Otra presentación | 10 | 0.1 |
| Alcohol | 6,115 | 58.7 |
| Cannabis | 2,970 | 28.5 |
| Marihuana | 2,962 | 28.4 |
| Hachís | 39 | 0.4 |
| Cocaína | 3,650 | 35.0 |
| Polvo blanco | 1,866 | 17.9 |
| Crack | 2,234 | 21.4 |
| Otra presentación | 57 | 0.5 |
| Inhalables | 1,467 | 14.1 |
| Solventes / removedores | 875 | 8.4 |
| Pegamentos | 520 | 5.0 |
| Esmaltes / pinturas | 145 | 1.4 |
| Gasolinas / combustibles | 19 | 0.2 |
| Otros | 48 | 0.5 |
| Depresores | 509 | 4.9 |
| Benzodiacepinas | 337 | 3.2 |
| Rohypnol® | 124 | 1.2 |
| Barbitúricos | 13 | 0.1 |
| Sedantes hipnóticos | 53 | 0.5 |
| GHB | 0 | 0.0 |
| Otros | 42 | 0.4 |
| Estimulantes | 885 | 8.5 |
| Anfetamina | 95 | 0.9 |
| Derivados anfetamínicos | 5 | 0.0 |
| Anorexígenos | 6 | 0.1 |
| Metanfetaminas | 778 | 7.5 |
| Otros | 24 | 0.2 |
| Drogas de diseño | 69 | 0.7 |
| Éxtasis (MDMA) | 64 | 0.6 |
| Otras | 7 | 0.1 |

(Continúa)

Cuadro 26. Consumo de drogas en los últimos 30 días por sustancia
(Continuación)

| | Frec. | % |
|---|--------------|------------|
| Drogas alucinógenas y disociativas | 58 | 0.6 |
| LSD | 48 | 0.5 |
| Plantas alucinógenas y derivados | 11 | 0.1 |
| PCP | 0 | 0.0 |
| Ketamina | 3 | 0.0 |
| Otras | 0 | 0.0 |
| Opiáceos | 191 | 1.8 |
| Opio | 7 | 0.1 |
| Morfina | 6 | 0.1 |
| Origen natural | 0 | 0.0 |
| Heroína blanca | 13 | 0.1 |
| Heroína negra | 157 | 1.5 |
| Sintéticos | 9 | 0.1 |
| Otras sustancias de abuso | 95 | 0.9 |
| Con utilidad médica | 62 | 0.6 |
| Nitritos (poppers) | 12 | 0.1 |
| “Drogas inteligentes” | 4 | 0.0 |
| Esteroides anabólicos | 0 | 0.0 |
| No clasificadas | 15 | 0.1 |
| No especificadas | 6 | 0.1 |

Cuadro 27. Frecuencia de episodios de abuso del consumo de drogas en los últimos 30 días

| | Tabaco ¹ | | | Alcohol ² | | | Drogas ilícitas ³ | | |
|-------------------------------------|---------------------|--------------|-----------------|----------------------|--------------|-----------------|------------------------------|--------------|-----------------|
| | Frec. | % | % válido | Frec. | % | % válido | Frec. | % | % válido |
| Ni una vez | 1,655 | 15.9 | 23.6 | 783 | 7.5 | 13.2 | --- | --- | --- |
| < de 1 vez a la semana | 700 | 6.7 | 10.0 | 1,903 | 18.3 | 32.0 | 1,323 | 12.7 | 23.0 |
| 1 o 2 veces a la semana | 769 | 7.4 | 11.0 | 2,178 | 20.9 | 36.6 | 1,431 | 13.7 | 24.8 |
| Cada tercer día | 518 | 5.0 | 7.4 | 590 | 5.7 | 9.9 | 945 | 9.1 | 16.4 |
| Diario | 3,363 | 32.3 | 48.0 | 493 | 4.7 | 8.3 | 2,061 | 19.8 | 35.8 |
| <i>No consumió en el último mes</i> | 3,238 | 31.1 | <i>Se omite</i> | 4,308 | 41.3 | <i>Se omite</i> | 3,255 | 31.2 | <i>Se omite</i> |
| <i>Sin información</i> | 180 | 1.7 | <i>Se omite</i> | 168 | 1.6 | <i>Se omite</i> | 1,408 | 13.5 | <i>Se omite</i> |
| Total | 10,423 | 100.0 | 100.0 | 10,423 | 100.0 | 100.0 | 10,423 | 100.0 | 100.0 |

¹ Consumo de seis o más cigarrillos en un solo día.

² Consumo de más de cuatro copas en un día para los hombres y de más de tres copas en un día para las mujeres.

³ Consumo de cualquier dosis.

ANEXO

A continuación se definen algunas de las variables de estudio:

Drogas utilizadas durante el primer año de consumo: Sustancias que el usuario refirió haber utilizado a la misma edad reportada como edad de inicio del consumo. Incluye el uso de tabaco, alcohol, cannabis. etc.

Drogas ilícitas utilizadas durante el primer año de consumo ilícito: Drogas ilegales que el usuario refirió haber utilizado a la misma edad reportada como edad de inicio del consumo de este tipo de sustancias. Excluye el uso de tabaco y alcohol.

Droga de mayor impacto en los últimos 12 meses: Sustancia que el propio usuario de drogas solicitante de tratamiento refiere como la que más problemas le ha ocasionado en los ámbitos de salud, personal, familiar, escolar, laboral o social, en el transcurso del último año.

Droga de preferencia en los últimos 12 meses: Sustancia que el propio usuario solicitante de tratamiento ha elegido o preferido consumir en el transcurso del último año.

Estrato social: Estimación que hace el terapeuta, según su percepción, del estrato al que pertenece el usuario de drogas, considerando aspectos como lugar de residencia, escolaridad, empleo y características manifiestas como higiene y aliño, calidad del vestido, expresión verbal y vocabulario, etc.

Tipo de consumo de drogas ilícitas: Características de consumo de sustancias ilegales según motivo, frecuencia y problemas asociados. No incluye el uso de alcohol y/o tabaco y se clasifica como: experimental, social u ocasional, funcional, disfuncional y en remisión.

Total de drogas consumidas: Número de drogas consumidas (se incluyen las 43 sustancias de seguimiento) en las siguientes categorías: alguna vez en la vida, en el último año y en el último mes.

Uso combinado de drogas en los últimos 12 meses: Consumo de dos o más sustancias (incluyendo alcohol y cualquier droga ilícita o de uso médico, utilizada sin prescripción, pero excluyendo tabaco) en el transcurso de un mismo día, en el año previo a la solicitud de tratamiento en CIJ.