
**CONSUMO DE TABACO Y/O ALCOHOL EN
PACIENTES DE PRIMER INGRESO A TRATAMIENTO
EN CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL,
ENERO-JUNIO, 2008**

Alma Delia Gutiérrez López
P. Isaías Castillo Franco

*Centros de Integración Juvenil
Dirección de Investigación y Enseñanza
Subdirección de Investigación
México, 2009*

Informe de Investigación 09-02c

DIRECTORIO

Dr. Jesús Kumate Rodríguez
PRESIDENTE DEL PATRONATO NACIONAL

Lic. Mario Luis Fuentes Alcalá
VICEPRESIDENTE DEL PATRONATO NACIONAL

Sra. Kena Moreno
FUNDADORA DE CIJ Y PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA

Lic. Carmen Fernández Cáceres
DIRECTORA GENERAL

Dr. Luis Solís Rojas
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO NORMATIVO

L.C. Hugo Basurto Ojeda
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ADMINISTRACIÓN

Dr. Otoniel Cárdenas Elizondo
DIRECTOR DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN

Mtro. Alejandro Sánchez Guerrero
DIRECTOR DE PREVENCIÓN

Dr. Eduardo Salinas Hurtado
DIRECTOR DE DESARROLLO OPERATIVO

Lic. Iván R. Rétiz Márquez
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

Dr. Ricardo Sánchez Huesca
DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA

Mtro. David Bruno Diaz Negrete
SUBDIRECTOR DE INVESTIGACIÓN

Citación: Gutiérrez López, AD. y Castillo Franco, PI. **Consumo de tabaco y/o alcohol en pacientes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil, Enero-junio, 2008.** Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación, **Informe de Investigación 09-02c**, México, 2009.

CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN	4
MÉTODO	5
I. USUARIOS DE TABACO	6
II. USUARIOS DE ALCOHOL	7
III. USUARIOS DE TABACO Y ALCOHOL	9
OBSERVACIONES GENERALES	10
REFERENCIAS	12
CUADROS	14

RESUMEN

Con el fin de ampliar la información sobre el perfil sociodemográfico, los factores asociados a la demanda de tratamiento y el patrón de consumo de los usuarios de los servicios de tratamiento institucionales, este informe presenta la información de **337** usuarios de tabaco, **411** usuarios de alcohol y **1,713** usuarios de ambas sustancias que acudieron por primera vez a tratamiento a Centros de Integración Juvenil entre enero y junio de 2008. Las variables consideradas son sexo, edad de ingreso a tratamiento, estado civil, escolaridad, ocupación, estrato social, condicionantes de la solicitud de tratamiento, antecedentes de acciones asumidas frente al uso de sustancias, problemas asociados al mismo, drogas consumidas en el primer año de consumo, edad de inicio, tiempo transcurrido entre el inicio del consumo y la solicitud de tratamiento, consumo en el último año, consumo en el último mes, droga de preferencia en el último año, droga de mayor impacto en el último año y episodios de abuso en el último mes.

Los datos permiten observar diferencias entre los tres grupos señalados, entre las más destacadas se encuentran: en el grupo de fumadores predominan las mujeres; los casados; los que, en promedio, acuden a mayor edad; presentan más problemas de salud asociados al consumo y la mayor frecuencia (diaria) de episodios de abuso del mismo. En tanto que, en el grupo de consumidores de alcohol sobresalen los solteros; los que presentan más problemas familiares asociados al consumo; los que presentan menos acciones contra el consumo y los que, en promedio, acuden a solicitar tratamiento a menor edad. Finalmente, el grupo de usuarios de tabaco y alcohol es el más grande (siete de cada diez consumidores de estas sustancias reportó policonsumo); es el que presenta mayor porcentaje de casos con estudios de bachillerato y superiores; inician el consumo, principalmente, con tabaco y se mantienen con éste durante más de un año; registran más frecuentemente episodios de abuso de tabaco que de alcohol y reconocen tanto problemas familiares como de salud asociados al consumo de estas sustancias.

INTRODUCCIÓN

Desde hace más de dos décadas Centros de Integración Juvenil A.C. ha realizado el seguimiento epidemiológico del consumo de drogas de pacientes que acuden por primera vez a solicitar los servicios institucionales de tratamiento. No obstante, a fin de contar con una mayor precisión, a partir de 2005 se dejó de incluir en los reportes correspondientes a los usuarios exclusivos de tabaco y/o alcohol —grupo que en los últimos años ha crecido considerablemente dada la diversificación de los programas de tratamiento de CIJ, hasta alcanzar en el último año cerca de un 20% de la población atendida—. Esta medida se tomó a partir de que al considerar a este grupo sin distinguirlo de los usuarios de drogas ilícitas se producía un efecto de confusión derivado del distinto perfil sociodemográfico y, por supuesto, del consumo característico del mismo.

Así, desde el 2006 se lleva a cabo, por separado, la recuperación de información correspondiente a usuarios de tabaco y/o alcohol solicitantes de atención terapéutica entre enero y diciembre de cada año (4,5), pero con el mismo propósito de otros informes del Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas (1,6); a saber, proporcionar datos actualizados de la población que demanda tratamiento en CIJ, para apoyar el diseño,

planeación y ajuste de los programas institucionales de prevención y atención curativa-rehabilitatoria.¹

MÉTODO

Diseño de estudio: Censo, transversal, descriptivo.

Población: 2,461 usuarios exclusivos de tabaco y/o alcohol que acudieron por primera vez a solicitar tratamiento entre enero y junio de 2008, en 92 unidades de atención de CIJ (ver Cuadro 1) y que proporcionaron personalmente la información.²

Fuente de información: Formato de *Entrevista inicial* (clave 8819-03), aplicado por los terapeutas en la primera consulta.

Variables de estudio: sexo, edad de ingreso a tratamiento, estado civil, escolaridad, ocupación, estrato social, condicionante(s) de la solicitud de tratamiento, antecedente(s) de acciones asumidas frente al uso de sustancias, problema(s) asociado(s) al mismo, drogas consumidas en el primer año de consumo, edad de inicio, tiempo transcurrido entre el inicio del consumo y la solicitud de tratamiento, consumo en el último año, consumo en el último mes, droga de preferencia en el último año, droga de

¹ Al igual que los reportes correspondientes a usuarios de drogas ilícitas, a partir de éste informe el seguimiento de esta información se llevará a cabo con una periodicidad semestral.

² No se incluyen casos donde la información es proporcionada por la familia del usuario. Así como los registros que fueron enviados de manera extemporánea a la Subdirección de Investigación de CIJ.

mayor impacto en el último año y episodios de abuso en el último mes.

Análisis: Se realizaron análisis de frecuencia y medidas de tendencia central para tres grupos *mutuamente excluyentes*: I.- usuarios de tabaco (n=337 casos), II.- usuarios de alcohol (n=411 casos) y III.-usuarios de tabaco y alcohol (n=1,713 casos).

Los resultados se presentan en porcentajes válidos que excluyen casos “sin información” y aquellos que no cumplen las condiciones requeridas para el análisis.

I. USUARIOS DE TABACO

En 84.0% de los casos que reportaron sólo ser fumadores, el propio usuario acudió a solicitar tratamiento, sin asistir acompañado de otras personas. Las mujeres representaron el 61.4% de los casos, lo que equivale a una razón de 0.6 hombres por cada mujer. La edad promedio de ingreso a tratamiento se situó en 42.3 años (DE=15.5), pese a que 49.4% contaba con 45 años o más. 41.4% expresó estar casado; 30.7% cursaba o había cursado algún grado de educación secundaria y 18.8%, al menos algún grado de bachillerato. 43.2% desempeñaba alguna actividad laboral y 28.8% se dedicaba a tareas del hogar. Según la percepción de los terapeutas 54.2% provenía de un estrato medio bajo y 27.6% de un estrato medio alto.

Por otro lado, 93.5% acudió solicitando atención para tratar su consumo de tabaco; 76.0% lo hizo *motu proprio*. 40.9%

expresó que antes de acudir a CIJ había intentado interrumpir el consumo de tabaco de manera voluntaria, pero sin apoyo, mientras que 38.0% afirmó que, hasta el momento de la solicitud de tratamiento, no había intentado tomar alguna medida en contra del consumo de tabaco. Asimismo, 85.5% reportaron problemas asociados al consumo de tabaco, entre los que destacan los de salud (59.6%) y los familiares (31.2%).

La edad promedio de inicio del consumo se situó en 18.2 años (DE=7.9), por lo que el tiempo transcurrido entre el inicio y el ingreso a tratamiento fue de 24.2 años (DE=14.3), si bien la mayor proporción de casos (52.1%) acudió a solicitar tratamiento transcurridos más de 25 años. Destaca que el uso de tabaco se redujo en el último año a 94.1% y en el último mes a 89.3%. Finalmente, 80.2% aceptó haber abusado —al fumar seis o más cigarrillos— diariamente durante el último mes.

II. USUARIOS DE ALCOHOL

De los 411 usuarios exclusivos de alcohol que acudieron por primera vez a solicitar tratamiento en el primer semestre de 2008, sólo 49.1% acudió personalmente y sin compañía; 56.4% fueron hombres, lo que equivale a una razón de 1.3 hombres por cada mujer. La edad promedio de ingreso a tratamiento fue de 25.2 años (DE=13.3.), aunque 52.4% contaba con menos de 20 años. 63.2% expresó estar soltero. 49.6% cursaba o había cursado algún grado de educación secundaria y 21.1% al menos algún grado de bachillerato. Un

42.7% estudiaba mientras que 31.1% desempeñaba alguna actividad laboral. Según juicio de los terapeutas, 56.2% y 28.5% pertenecían a los estratos sociales medio bajo y bajo, respectivamente.

Como era de esperar, 87.8% acudió solicitando atención para el consumo de alcohol; 41.1% lo hizo *motu proprio* y 35.8% por condicionamiento o recomendación familiar. 60.8% afirmó que no había tomado ninguna medida contra el consumo de alcohol, en tanto que 12.2% expresó que había intentado interrumpirlo sin apoyo alguno. Por otro lado, 85.6% de los casos reportó problemas asociados al uso de alcohol, principalmente de tipo familiar (62.8%), escolar (27.0%) y psicológicos (24.8%).

La edad promedio de inicio del consumo de alcohol fue de 16.2 años (DE=4.9), por lo que el tiempo transcurrido entre el inicio y el ingreso a tratamiento fue de 8.9 años (DE=11.2); no obstante, 66.4% de los casos acudió a tratamiento transcurridos 10 años o menos. El uso de alcohol en el último año fue referido por 92.0% de los casos y en el último mes por 69.1%. De quienes reportaron consumo de alcohol en el último mes, 30.6% aceptó haber abusado del mismo menos de una vez a la semana y 28.0% una o dos veces a la semana.³

³ El abuso de alcohol se define en el caso de los hombres como el consumo de más de cuatro copas en una ocasión y para las mujeres de más de tres copas.

III. USUARIOS DE TABACO Y ALCOHOL

Dentro de la población estudiada de usuarios de drogas lícitas, los usuarios de tabaco y alcohol representan el grupo predominante (1,713 casos). En 66.1% de los casos acudió únicamente el propio consumidor; 60.4% fueron hombres (con una razón de 1.5 hombres por cada mujer) y la edad promedio se ubicó en 32.3 años (DE=16.0). 47.7% era soltero y 31.4%, casado. 35.6% cursaba o había cursado algún grado de educación secundaria y 25.4% al menos algún grado de bachillerato; finalmente, 44.6% desempeñaba alguna actividad laboral y 24.3% estudiaba. De acuerdo con la evaluación de los terapeutas, 58.1% provenían del estrato medio bajo y 21.5% del estrato medio alto.

Por otra parte, 66.6% acudió a solicitar tratamiento por el uso de tabaco y 58.5% por el consumo de alcohol (54.9% lo hizo *motu proprio*). 45.1% afirmó que hasta el momento de llegar a CIJ no había tomado alguna medida contra el consumo de tabaco o alcohol, aunque 30.4% expresó que había intentado interrumpirlo de manera voluntaria y sin apoyo. Cabe señalar que nueve de cada diez casos reportaron problemas asociados al consumo, entre los que sobresalen los familiares (57.3%) y de salud (42.3%).

La edad promedio de inicio del uso de tabaco se situó en los 16.2 años (DE=5.1), en tanto que la de alcohol se ubicó 17.0 años (DE=5.3). Durante el primer año del consumo, 40.9% reportó únicamente uso de tabaco, 25.9% el de alcohol y 33.2% el consumo de ambas sustancias.

Del 96.2% de los casos que refirió haber utilizado alguna de estas sustancias durante el último año, 78.6% consumió tabaco y alcohol, 12.0% únicamente tabaco y 9.4% sólo alcohol. Además, en el mismo periodo, el tabaco presentó el mayor porcentaje tanto como sustancia de preferencia (56.3%) como de mayor impacto (50.3%).

Asimismo, 87.8% de los casos reportó consumo en el último mes, de los cuales 55.7% siguió consumiendo tabaco y alcohol, 29.4% únicamente tabaco y 14.9% sólo alcohol. De aquéllos que reportaron el uso de tabaco en este periodo, 60.5% aceptó fumar seis o más cigarrillos diariamente; mientras que 34.5% de quienes consumieron alcohol admitió haber abusado del mismo en menos de una ocasión a la semana y 31.3% de una a dos veces a la semana.

OBSERVACIONES GENERALES

Los datos permiten advertir claras diferencias entre los usuarios de tabaco, alcohol y tabaco y alcohol. Teniendo así que:

- Entre los usuarios de tabaco predominan las mujeres, mientras que en los otros grupos predominan los hombres.
- Los usuarios de alcohol acuden a solicitar tratamiento a menor edad que los usuarios de tabaco. Asimismo, los solteros predominan entre los usuarios de alcohol, en tanto que los casados entre los usuarios de tabaco.

- Los usuarios de tabaco y/o alcohol presenta los mayores porcentajes en los niveles de escolaridad de bachillerato y de estudios superiores.
- Si bien, entre los usuarios de tabaco predominan los casos que se dedican a trabajar, también sobresalen las amas de casa; en tanto que los estudiantes sobresalen entre los usuarios de alcohol.
- Los mayores porcentajes de casos que acuden a solicitar tratamiento por iniciativa propia y sin la compañía de algún familiar o amigo se ubican en el grupo de usuarios de tabaco; en tanto que, el mayor porcentaje de los que acuden a solicitar tratamiento por algún tipo de condicionamiento se ubica en el grupo de alcohol.
- Entre los usuarios de tabaco predominan los casos que han tenido intentos de interrupción voluntaria del consumo, sin apoyo; mientras que en los otros dos grupos predominan los casos que no han realizado ninguna acción previa contra el uso de sustancias.
- Los usuarios de tabaco presentan más problemas de salud, mientras que los usuarios de alcohol los de tabaco y alcohol presentan principalmente problemas familiares.
- En general, los usuarios de tabaco y/o alcohol presentan más características similares a los usuarios de tabaco que a los usuarios de alcohol, debido a que en este grupo, el tabaco es la droga de mayor consumo y de la que se abusa más.

REFERENCIAS

1. Castillo Franco, Pl., Gutiérrez López, AD. (2008). *Estudio epidemiológico del consumo de drogas en pacientes de primer ingreso a tratamiento en CIJ en el segundo semestre de 2007*. Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación, **Informe de Investigación 08-07**, México.
2. Castillo Franco, I., Gutiérrez López, A. Diaz Negrete, B., Sánchez Huesca, R., Guisa Cruz, VM. (2002). "Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas (SIECD) Centros de Integración Juvenil" en: **Observatorio mexicano en tabaco, alcohol y otras drogas 2002**. Secretaría de Salud, Consejo Nacional contra las Adicciones, México, pp. 63-81.
3. Diaz Negrete, D., Sánchez Huesca, R., Guisa Cruz, V. (2003). "Registro y estudio de casos en centros de tratamiento especializado" en: **Metodología para la elaboración de estudios epidemiológicos a nivel nacional y local y estudios para grupos especiales relacionados con las adicciones**. Secretaría de Salud, Consejo Nacional contra las Adicciones, México, pp. 73-77.
4. Gutiérrez López, AD. y Castillo Franco, Pl. *Características sociodemográficas y de consumo en usuarios de tabaco y alcohol de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil en 2006*. Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de

Investigación, **Informe de Investigación 07-13**, México, 2007.

5. Gutiérrez López, AD. y Castillo Franco, PI. (2008). *Estudio epidemiológico del consumo de alcohol y tabaco en pacientes solicitantes de tratamiento en CIJ en 2007*. Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación, **Informe de Investigación 08-12**, México.
6. Gutiérrez López, AD. y Castillo Franco, PI. (2008). *Estudio epidemiológico del consumo de drogas en pacientes de primer ingreso a tratamiento en CIJ en el primer semestre de 2007*. Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación, **Informe de Investigación 08-01**, México.

CUADROS

**Cuadro 1. Distribución de casos de primer ingreso
a tratamiento por unidad de atención, 2007**

Unidad de atención	Total de casos	Tabaco	Alcohol	Tabaco y alcohol
Álvaro Obregón Norte	26	19.2	26.9	53.8
Álvaro Obregón Oriente	5	0.0	0.0	100.0
Azcapotzalco	92	17.4	9.8	72.8
Benito Juárez	65	7.7	7.7	84.6
Coyoacán	31	3.2	3.2	93.5
Cuajimalpa	16	12.5	12.5	75.0
Cuauhtémoc Oriente	43	7.0	16.3	76.7
Cuauhtémoc Poniente	46	17.4	34.8	47.8
Chalco	24	4.2	33.3	62.5
Ecatepec	25	8.0	12.0	80.0
Gustavo A. Madero Aragón	67	26.9	19.4	53.7
Gustavo A. Madero Norte	35	22.9	14.3	62.9
Gustavo A. Madero Oriente	4	25.0	0.0	75.0
Iztapalapa Oriente	32	18.8	3.1	78.1
Iztapalapa Poniente	36	5.6	25.0	69.4
Miguel Hidalgo	66	24.2	4.5	71.2
Naucalpan	34	2.9	5.9	91.2
Nezahualcóyotl	71	22.5	25.4	52.1
Tlalpan	46	13.0	10.9	76.1
Tlalnepantla	26	11.5	15.4	73.1
Venustiano Carranza	70	5.7	31.4	62.9
UI Iztapalapa	8	12.5	12.5	75.0
Acapulco	17	5.9	11.8	82.4
Aguascalientes	25	20.0	16.0	64.0
Apodaca	3	0.0	0.0	100.0
Cancún	7	0.0	0.0	100.0
Cd. del Carmen	25	8.0	8.0	84.0
Cd. Juárez Clínica	11	0.0	36.4	63.6
Cd. Juárez Norte	20	5.0	20.0	75.0
Cd. Victoria	12	0.0	8.3	91.7
Celaya	32	9.4	6.3	84.4
Chihuahua	64	29.7	23.4	46.9
Chilpancingo	12	0.0	0.0	100.0
Colima	47	6.4	19.1	74.5
Cozumel	24	0.0	25.0	75.0
Cuernavaca	29	13.8	17.2	69.0
Culiacán	25	12.0	40.0	48.0

(Continúa)

**Cuadro 1. Distribución de casos de primer ingreso
a tratamiento por unidad de atención, 2007**
(Continuación)

Unidad de atención	Total de casos	Tabaco	Alcohol	Tabaco y alcohol
Durango	11	0.0	0.0	100.0
Fresnillo Pinacoteca	9	22.2	11.1	66.7
Guadalajara	28	21.4	7.1	71.4
Guadalajara Sur	14	14.3	0.0	85.7
Guadalupe	12	16.7	16.7	66.7
Guamúchil	6	16.7	16.7	66.7
Guasave	18	11.1	33.3	55.6
Hermosillo	34	5.9	11.8	82.4
Ixtapa Zihuatanejo	5	0.0	20.0	80.0
La Paz	19	5.3	21.1	73.7
La Piedad	1	0.0	0.0	100.0
Laguna Durango	15	0.0	13.3	86.7
León	25	4.0	8.0	88.0
Los Cabos	7	0.0	28.6	71.4
Los Mochis	25	12.0	8.0	80.0
Manzanillo	16	6.3	37.5	56.3
Mazatlán	39	5.1	20.5	74.4
Mérida	36	25.0	33.3	41.7
Mexicali	39	15.4	25.6	59.0
Monterrey	14	21.4	14.3	64.3
Morelia	3	33.3	66.7	0.0
Nogales	8	12.5	25.0	62.5
Oaxaca	28	0.0	17.9	82.1
Pachuca	30	0.0	6.7	93.3
Poza Rica	39	12.8	2.6	84.6
Puebla	83	31.3	24.1	44.6
Puerto Vallarta	16	6.3	12.5	81.3
Querétaro	24	0.0	16.7	83.3
Salamanca	23	0.0	0.0	100.0
Saltillo	53	17.0	13.2	69.8
San Luis Potosí	62	17.7	1.6	80.6
San Nicolás de los Garza	8	25.0	12.5	62.5
Tampico	52	26.9	0.0	73.1
Tapachula	3	0.0	33.3	66.7
Tecomán	23	0.0	43.5	56.5

(Continúa)

**Cuadro 1. Distribución de casos de primer ingreso
a tratamiento por unidad de atención, 2007**
(Continuación)

Unidad de atención	Total de casos	Tabaco	Alcohol	Tabaco y alcohol
Tehuacán	13	0.0	15.4	84.6
Texcoco	8	50.0	0.0	50.0
Tijuana Guaycura	14	7.1	14.3	78.6
Tijuana Soler	3	0.0	0.0	100.0
Tlaquepaque	45	24.4	22.2	53.3
Toluca	49	4.1	4.1	91.8
Torreón	53	7.5	26.4	66.0
Tuxtla Gutiérrez	20	5.0	20.0	75.0
Villahermosa	62	12.9	22.6	64.5
Xalapa	34	5.9	41.2	52.9
Zacatecas	17	11.8	17.6	70.6
Zamora	40	20.0	20.0	60.0
Zapopan Norte	32	43.8	12.5	43.8
UI Culiacán	1	0.0	100.0	0.0
UI Jerez	9	0.0	11.1	88.9
UI Monterrey	2	0.0	0.0	100.0
UI Punta Diamante	1	100.0	0.0	0.0
UI Tijuana	1	0.0	0.0	100.0
UI Zapopan	5	0.0	40.0	60.0
UI Zapotlán el Grande	3	0.0	0.0	100.0
Nacional	2,461	13.7	16.7	69.6

Nota: UI = Unidad de Internamiento.

Cuadro 2. Características sociodemográficas de los usuarios de tabaco y/o alcohol que solicitan tratamiento a Centros de Integración Juvenil. Enero-Junio de 2008

	Tabaco (N=337)			Alcohol (N=411)			Tabaco y alcohol (N=1,713)		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Persona que proporciona la información									
Usuario	283	84.0	84.0	202	49.1	49.1	1,133	66.1	66.1
Usuario y otra(s) persona(s)	54	16.0	16.0	209	50.9	50.9	580	33.9	33.9
Sexo									
Hombre	130	38.6	38.6	232	56.4	56.4	1,035	60.4	60.4
Mujer	207	61.4	61.4	179	43.6	43.6	678	39.6	39.6
Razón Hombre : Mujer		0.6:1			1.3:1			1.5:1	
Edad de ingreso a tratamiento									
Hasta 9 años	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	2	0.1	0.1
10 A 14 años	25	7.4	7.5	98	23.8	24.0	191	11.2	11.2
15 A 19 años	18	5.3	5.4	116	28.2	28.4	389	22.7	22.8
20 A 24 años	6	1.8	1.8	27	6.6	6.6	136	7.9	8.0
25 A 29 años	20	5.9	6.0	33	8.0	8.1	117	6.8	6.9
30 A 34 años	23	6.8	6.9	37	9.0	9.0	140	8.2	8.2
35 A 39 años	37	11.0	11.1	27	6.6	6.6	149	8.7	8.7
40 A 44 años	39	11.6	11.7	26	6.3	6.4	133	7.8	7.8
45 años o más	164	48.7	49.4	45	10.9	11.0	451	26.3	26.4
<i>Sin información</i>	5	1.5	<i>Se omite</i>	2	0.5	<i>Se omite</i>	5	0.3	<i>Se omite</i>
Promedio		42.3			25.2			32.3	

Cuadro 2. Características sociodemográficas de los usuarios de tabaco y/o alcohol que solicitan tratamiento a Centros de Integración Juvenil. Enero-Junio de 2008

	Tabaco (N=337)			Alcohol (N=411)			Tabaco y alcohol (N=1,713)		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Estado civil									
Soltero(a)	96	28.5	29.4	244	59.4	63.2	788	46.0	47.7
Casado(a)	135	40.1	41.4	77	18.7	19.9	519	30.3	31.4
En unión libre	23	6.8	7.1	23	5.6	6.0	137	8.0	8.3
Separado(a)	34	10.1	10.4	30	7.3	7.8	114	6.7	6.9
Divorciado(a)	15	4.5	4.6	9	2.2	2.3	55	3.2	3.3
Viudo(a)	23	6.8	7.1	3	0.7	0.8	39	2.3	2.4
<i>Sin información</i>	11	3.3	<i>Se omite</i>	25	6.1	<i>Se omite</i>	61	3.6	<i>Se omite</i>
Escolaridad									
Ninguna (no sabe leer ni escribir)	1	0.3	0.3	2	0.5	0.5	8	0.5	0.5
Ninguna (sabe leer y escribir)	2	0.6	0.6	1	0.2	0.2	13	0.8	0.8
Primaria	51	15.1	15.2	49	11.9	12.2	225	13.1	13.3
Secundaria	103	30.6	30.7	200	48.7	49.6	602	35.1	35.6
Estudios técnicos o comerciales	56	16.6	16.7	22	5.4	5.5	102	6.0	6.0
Bachillerato o bachillerato técnico	63	18.7	18.8	85	20.7	21.1	429	25.0	25.4
Estudios superiores	52	15.4	15.5	42	10.2	10.4	291	17.0	17.2
Estudios de postgrado	8	2.4	2.4	2	0.5	0.5	22	1.3	1.3
<i>Sin información</i>	1	0.3	<i>Se omite</i>	8	1.9	<i>Se omite</i>	21	1.2	<i>Se omite</i>

Cuadro 2. Características sociodemográficas de los usuarios de tabaco y/o alcohol que solicitan tratamiento a Centros de Integración Juvenil. Enero-Junio de 2008

	Tabaco (N=337)			Alcohol (N=411)			Tabaco y alcohol (N=1,713)		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Ocupación									
Desempleado/desocupado	29	8.6	8.7	51	12.4	12.6	203	11.9	11.9
Hogar	96	28.5	28.8	31	7.5	7.7	171	10.0	10.0
Estudia	31	9.2	9.3	173	42.1	42.7	414	24.2	24.3
Estudia y trabaja	13	3.9	3.9	22	5.4	5.4	71	4.1	4.2
Trabaja	144	42.7	43.2	126	30.7	31.1	760	44.4	44.6
Pensionado	20	5.9	6.0	2	0.5	0.5	86	5.0	5.0
Sin información	4	1.2	<i>Se omite</i>	6	1.5	<i>Se omite</i>	8	0.5	<i>Se omite</i>
Estrato social									
Alto	9	2.7	3.0	1	0.2	0.3	24	1.4	1.5
Medio alto	83	24.6	27.6	53	12.9	13.7	345	20.1	21.5
Medio bajo	163	48.4	54.2	217	52.8	56.2	931	54.3	58.1
Bajo	44	13.1	14.6	110	26.8	28.5	288	16.8	18.0
Pobreza extrema o marginación	2	0.6	0.7	5	1.2	1.3	14	0.8	0.9
Sin información	36	10.7	<i>Se omite</i>	25	6.1	<i>Se omite</i>	111	6.5	<i>Se omite</i>

Cuadro 3. Factores asociados a la demanda de tratamiento de los usuarios de tabaco y/o alcohol que solicitan tratamiento a Centros de Integración Juvenil. Enero-Junio de 2008

	Tabaco (N=337)			Alcohol (N=411)			Tabaco y alcohol (N=1,713)		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Condicionantes de la solicitud de tratamiento									
Por propia iniciativa	256	76.0	76.0	147	35.8	35.8	941	54.9	54.9
Por condicionamiento o recomendación familiar	43	12.8	12.8	169	41.1	41.1	515	30.1	30.1
Por recomendación de pares	1	0.3	0.3	6	1.5	1.5	55	3.2	3.2
Por condicionamiento o recomendación escolar	23	6.8	6.8	91	22.1	22.1	196	11.4	11.4
Por condicionamiento legal	6	1.8	1.8	15	3.6	3.6	62	3.6	3.6
Por condicionamiento o recomendación laboral	3	0.9	0.9	6	1.5	1.5	22	1.3	1.3
Por indicación médica	28	8.3	8.3	6	1.5	1.5	105	6.1	6.1
Otros condicionante de solicitud de tratamiento	5	1.5	1.5	7	1.7	1.7	30	1.8	1.8
Ningún condicionante reportado	7	2.1	2.1	5	1.2	1.2	29	1.7	1.7
Antecedentes de acciones contra el consumo de sustancias									
Juramento	7	2.1	2.1	20	4.9	4.9	71	4.1	4.1
Grupo de autoayuda	7	2.1	2.1	22	5.4	5.4	102	6.0	6.0
Internamiento en anexo	2	0.6	0.6	21	5.1	5.1	42	2.5	2.5
Intervención de emergencia	2	0.6	0.6	0	0.0	0.0	6	0.4	0.4
Programa de mantenimiento	4	1.2	1.2	0	0.0	0.0	7	0.4	0.4
Tratamiento médico no especializado	4	1.2	1.2	0	0.0	0.0	27	1.6	1.6

Cuadro 3. Factores asociados a la demanda de tratamiento de los usuarios de tabaco y/o alcohol que solicitan tratamiento a Centros de Integración Juvenil. Enero-Junio de 2008

	Tabaco (N=337)			Alcohol (N=411)			Tabaco y alcohol (N=1,713)		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Antecedentes de acciones contra el consumo de sustancias									
Tratamiento psiquiátrico o psicoterapéutico ambulatorio	11	3.3	3.3	16	3.9	3.9	43	2.5	2.5
Tratamiento psiquiátrico o psicoterapéutico residencial	2	0.6	0.6	5	1.2	1.2	11	0.6	0.6
Medicina tradicional o alternativa	5	1.5	1.5	2	0.5	0.5	23	1.3	1.3
Intento de interrupción voluntaria del consumo, sin apoyo	138	40.9	40.9	50	12.2	12.2	520	30.4	30.4
Otras acciones	45	13.4	13.4	44	10.7	10.7	200	11.7	11.7
Ninguna acción previa reportada	128	38.0	38.0	250	60.8	60.8	772	45.1	45.1
Problemas asociados al consumo									
Problemas de salud	201	59.6	59.6	79	19.2	19.2	724	42.3	42.3
Accidentes o lesiones	2	0.6	0.6	29	7.1	7.1	126	7.4	7.4
Problemas familiares	105	31.2	31.2	258	62.8	62.8	981	57.3	57.3
Problemas escolares	28	8.3	8.3	111	27.0	27.0	304	17.7	17.7
Problemas laborales	9	2.7	2.7	49	11.9	11.9	188	11.0	11.0
Problemas psicológicos	67	19.9	19.9	102	24.8	24.8	458	26.7	26.7
Problemas legales	3	0.9	0.9	29	7.1	7.1	118	6.9	6.9
Conducta antisocial o delictiva	5	1.5	1.5	7	1.7	1.7	71	4.1	4.1
Otros problemas	12	3.6	3.6	12	2.9	2.9	84	4.9	4.9
Ningún problema asociado reportado	49	14.5	14.5	59	14.4	14.4	162	9.5	9.5

Cuadro 4. Patrón de consumo de los usuarios de tabaco y/o alcohol que solicitan tratamiento a Centros de Integración Juvenil. Enero-Junio de 2008

	Tabaco (N=337)			Alcohol (N=411)			Tabaco y alcohol (N=1,713)		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Drogas consumidas en el primer año de consumo									
Tabaco	337	100.0	100.0	---	---	---	700	40.9	40.9
Alcohol	---	---	---	411	100.0	100.0	444	25.9	25.9
Tabaco y alcohol	---	---	---	---	---	---	569	33.2	33.2
Edad de inicio del consumo									
Hasta 9 años	6	1.8	1.8	13	3.2	3.2	72	4.2	4.2
10 A 14 años	102	30.3	30.4	141	34.3	34.5	703	41.0	41.1
15 A 19 años	144	42.7	42.9	187	45.5	45.7	775	45.2	45.3
20 A 24 años	39	11.6	11.6	45	10.9	11.0	112	6.5	6.5
25 A 29 años	17	5.0	5.1	13	3.2	3.2	30	1.8	1.8
30 A 34 años	8	2.4	2.4	5	1.2	1.2	10	0.6	0.6
35 A 39 años	7	2.1	2.1	2	0.5	0.5	4	0.2	0.2
40 A 44 años	5	1.5	1.5	2	0.5	0.5	3	0.2	0.2
45 años y más	8	2.4	2.4	1	0.2	0.2	2	0.1	0.1
<i>Sin información</i>	1	0.3	<i>Se omite</i>	2	0.5	<i>Se omite</i>	2	0.1	<i>Se omite</i>
Promedio		18.2			16.2			15.2	

Cuadro 4. Patrón de consumo de los usuarios de tabaco y/o alcohol que solicitan tratamiento a Centros de Integración Juvenil. Enero-Junio de 2008

	Tabaco (N=337)			Alcohol (N=411)			Tabaco y alcohol (N=1,713)		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Edad de inicio en el consumo de tabaco									
Hasta 9 años	6	1.8	1.8	---	---	---	44	2.6	2.6
10 A 14 años	102	30.3	30.4	---	---	---	618	36.1	36.3
15 A 19 años	143	42.4	42.6	---	---	---	784	45.8	46.0
20 A 24 años	40	11.9	11.9	---	---	---	156	9.1	9.2
25 A 29 años	18	5.3	5.4	---	---	---	47	2.7	2.8
30 A 34 años	8	2.4	2.4	---	---	---	30	1.8	1.8
35 A 39 años	7	2.1	2.1	---	---	---	13	0.8	0.8
40 A 44 años	5	1.5	1.5	---	---	---	6	0.4	0.4
45 años y más	7	2.1	2.1	---	---	---	6	0.4	0.4
<i>Sin información</i>	1	0.3	<i>Se omite</i>	---	---	---	9	0.5	<i>Se omite</i>
Promedio		18.2			---			16.2	
Edad de inicio en el consumo de alcohol									
Hasta 9 años	---	---	---	13	3.2	3.2	42	2.5	2.5
10 A 14 años	---	---	---	141	34.3	34.5	515	30.1	30.2
15 A 19 años	---	---	---	187	45.5	45.7	814	47.5	47.7
20 A 24 años	---	---	---	45	10.9	11.0	186	10.9	10.9
25 A 29 años	---	---	---	13	3.2	3.2	84	4.9	4.9
30 A 34 años	---	---	---	5	1.2	1.2	37	2.2	2.2
35 A 39 años	---	---	---	2	0.5	0.5	13	0.8	0.8
40 A 44 años	---	---	---	2	0.5	0.5	8	0.5	0.5
45 años y más	---	---	---	1	0.2	0.2	6	0.4	0.4
<i>Sin información</i>	---	---	---	2	0.5	<i>Se omite</i>	8	0.5	<i>Se omite</i>
Promedio		---			16.2			16.8	

Cuadro 4. Patrón de consumo de los usuarios de tabaco y/o alcohol que solicitan tratamiento a Centros de Integración Juvenil. Enero-Junio de 2008

	Tabaco (N=337)			Alcohol (N=411)			Tabaco y alcohol (N=1,713)		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo y la solicitud de tratamiento									
Menos de 1 año	27	8.0	8.1	107	26.0	26.3	78	4.6	4.6
1 a 5 años	25	7.4	7.5	129	31.4	31.7	525	30.6	30.8
6 a 10 años	13	3.9	3.9	34	8.3	8.4	157	9.2	9.2
11 a 15 años	27	8.0	8.1	32	7.8	7.9	138	8.1	8.1
16 a 20 años	33	9.8	9.9	33	8.0	8.1	151	8.8	8.9
21 a 25 años	34	10.1	10.2	25	6.1	6.1	138	8.1	8.1
26 años o más años	173	51.3	52.1	47	11.4	11.5	519	30.3	30.4
<i>Sin información</i>	5	1.5	<i>Se omite</i>	4	1.0	<i>Se omite</i>	7	0.4	<i>Se omite</i>
Promedio		24.2			8.9			17.0	
Consumo en el último año									
Tabaco	317	94.1	100.0	---	---	---	197	11.5	12.0
Alcohol	---	---	---	378	92.0	100.0	155	9.0	9.4
Tabaco y alcohol	---	---	---	---	---	---	1,296	75.7	78.6
<i>Sin consumo en el periodo</i>	20	5.9	<i>Se omite</i>	33	8.0	<i>Se omite</i>	65	3.8	<i>Se omite</i>

Cuadro 4. Patrón de consumo de los usuarios de tabaco y/o alcohol que solicitan tratamiento a Centros de Integración Juvenil. Enero-Junio de 2008

	Tabaco (N=337)			Alcohol (N=411)			Tabaco y alcohol (N=1,713)		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Droga de preferencia en el último año									
Tabaco	277	82.2	88.8	---	---	---	812	47.4	50.7
Cigarrillos	35	10.4	11.2	---	---	---	89	5.2	5.6
Alcohol	---	---	---	342	83.2	100.0	701	40.9	43.8
<i>Sin consumo en el último año</i>	20	5.9	<i>Se omite</i>	33	8.0	<i>Se omite</i>	65	3.8	<i>Se omite</i>
<i>Ninguna/sin información</i>	5	1.5	<i>Se omite</i>	36	8.8	<i>Se omite</i>	46	2.7	<i>Se omite</i>
Droga de mayor impacto en el último año									
Tabaco	274	81.3	88.6	---	---	---	717	41.9	45.3
Cigarrillos	35	10.4	11.3	---	---	---	80	4.7	5.0
Alcohol	---	---	---	344	83.7	100.0	788	46.0	49.7
<i>Sin consumo en el último año</i>	20	5.9	<i>Se omite</i>	33	8.0	<i>Se omite</i>	65	3.8	<i>Se omite</i>
<i>Ninguna/sin información</i>	8	2.4	<i>Se omite</i>	34	8.3	<i>Se omite</i>	63	3.7	<i>Se omite</i>
Consumo en el último mes									
Tabaco	301	89.3	100.0	---	---	---	442	25.8	29.4
Alcohol	---	---	---	284	69.1	100.0	224	13.1	14.9
Tabaco y alcohol	---	---	---	---	---	---	838	48.9	55.7
<i>Sin consumo en el periodo</i>	36	10.7	<i>Se omite</i>	127	30.9	<i>Se omite</i>	209	12.2	<i>Se omite</i>

Cuadro 4. Patrón de consumo de los usuarios de tabaco y/o alcohol que solicitan tratamiento a Centros de Integración Juvenil. Enero-Junio de 2008

	Tabaco (N=337)			Alcohol (N=411)			Tabaco y alcohol (N=1,713)		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Frecuencia de episodios de abuso del consumo de tabaco en los últimos 30 días									
Ni una vez	29	8.6	9.9	---	---	---	281	16.4	22.4
< de 1 vez a la semana	13	3.9	4.4	---	---	---	120	7.0	9.5
1 o 2 veces a la semana	11	3.3	3.8	---	---	---	115	6.7	9.1
Cada tercer día	5	1.5	1.7	---	---	---	60	3.5	4.8
Diario	235	69.7	80.2	---	---	---	681	39.8	54.2
<i>No consumió tabaco en el último mes</i>	36	10.7	<i>Se omite</i>	---	---	---	433	25.3	<i>Se omite</i>
<i>Sin información</i>	8	2.4	<i>Se omite</i>	---	---	---	23	1.3	<i>Se omite</i>
Frecuencia de episodios de abuso del consumo de alcohol en los últimos 30 días									
Ni una vez	---	---	---	50	12.2	18.5	214	12.5	20.7
< de 1 vez a la semana	---	---	---	83	20.2	30.6	364	21.2	35.3
1 o 2 veces a la semana	---	---	---	76	18.5	28.0	274	16.0	26.6
Cada tercer día	---	---	---	23	5.6	8.5	81	4.7	7.8
Diario	---	---	---	39	9.5	14.4	99	5.8	9.6
<i>No consumió alcohol en el último mes</i>	---	---	---	127	30.9	<i>Se omite</i>	651	38.0	<i>Se omite</i>
<i>Sin información</i>	---	---	---	13	3.2	<i>Se omite</i>	30	1.8	<i>Se omite</i>