
**CONSUMO DE TABACO Y/O ALCOHOL EN
PACIENTES DE PRIMER INGRESO A TRATAMIENTO
EN CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL,
ENERO - JUNIO, 2009**

Alma Delia Gutiérrez López
P. Isaías Castillo Franco

*Centros de Integración Juvenil
Dirección de Investigación y Enseñanza
Subdirección de Investigación
México, 2010*

Informe de Investigación 10-01d

DIRECTORIO

PRESIDENTE DEL PATRONATO NACIONAL

Dr. Jesús Kumate Rodríguez

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA

Sra. Kena Moreno

DIRECTORA GENERAL

Lic. Carmen Fernández Cáceres

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ADMINISTRACIÓN

L. C. Hugo Basurto Ojeda

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE OPERACIÓN Y PATRONATOS

Dr. José Ángel Prado García

DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA

Dr. Ricardo Sánchez Huesca

SUBDIRECTOR DE INVESTIGACIÓN

Mtro. David Bruno Díaz Negrete

Citación: Gutiérrez López, AD. y Castillo Franco, PI. (2010). **Consumo de tabaco y/o alcohol en pacientes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil, Enero - Junio, 2009.** Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación, **Informe de Investigación 10-01d**, México.

CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN	4
MÉTODO	5
I. USUARIOS DE TABACO	6
II. USUARIOS DE ALCOHOL	7
III. USUARIOS DE TABACO Y ALCOHOL	9
OBSERVACIONES GENERALES	10
REFERENCIAS	12
CUADROS	14

RESUMEN

Con el fin de ampliar la información sobre el perfil sociodemográfico, los factores asociados a la demanda de tratamiento y el patrón de consumo de los usuarios de los servicios de tratamiento institucionales, este informe presenta la información de **328** usuarios de tabaco, **560** usuarios de alcohol y **1,677** usuarios de ambas sustancias que acudieron por primera vez a tratamiento a Centros de Integración Juvenil entre enero y junio de 2009. Las variables consideradas son sexo, edad de ingreso a tratamiento, estado civil, escolaridad, ocupación, estrato social, condicionantes de la solicitud de tratamiento, antecedentes de acciones asumidas frente al uso de sustancias, problemas asociados al mismo, drogas consumidas en el primer año de consumo, edad de inicio, tiempo transcurrido entre el inicio del consumo y la solicitud de tratamiento, consumo en el último año, consumo en los últimos 30 días, droga de preferencia en el último año, droga de mayor impacto en el último año y episodios de abuso en los últimos 30 días.

Los datos permiten observar diferencias entre los tres grupos señalados, entre las más destacadas se encuentran: en el grupo de fumadores predominan las mujeres; los casados; los que, en promedio, acuden a mayor edad; este grupo es el que presenta mayor porcentaje de casos con estudios superiores, presentan más problemas de salud asociados al consumo y la mayor frecuencia (diaria) de episodios de abuso del mismo. En tanto que, en el grupo de consumidores de alcohol sobresalen los solteros; los que presentan más problemas escolares asociados al consumo; los que presentan menos acciones contra el consumo y los que, en promedio, acuden a solicitar tratamiento a menor edad. Finalmente, el grupo de usuarios de tabaco y alcohol es el más grande (casi dos de cada tres consumidores de estas sustancias reportó el consumo de las dos sustancias); es el que presenta mayor porcentaje de casos con estudios de bachillerato; inician el consumo, principalmente, con tabaco y se mantienen con éste durante más de un año; si bien, abusan más del alcohol, registran más frecuentemente episodios de abuso de tabaco y reconocen como principal problema asociado al consumo de estas sustancias los de tipo familiar seguidos de los problemas de salud.

INTRODUCCIÓN

Desde hace más de dos décadas Centros de Integración Juvenil A.C. ha realizado el seguimiento epidemiológico del consumo de drogas de pacientes que acuden por primera vez a solicitar los servicios institucionales de tratamiento. No obstante, a fin de contar con una mayor precisión, a partir de 2005 se dejó de incluir en los reportes correspondientes a los usuarios exclusivos de tabaco y/o alcohol —grupo que en los últimos años ha crecido considerablemente dada la diversificación de los programas de tratamiento de CIJ, hasta alcanzar en el segundo semestre de 2008 cerca de un 20% de la población atendida (1,5)—. Esta medida se tomó a partir de que al considerar a este grupo sin distinguirlo de los usuarios de drogas ilícitas se producía un efecto de confusión derivado del distinto perfil sociodemográfico y, por supuesto, del consumo característico del mismo.

Así, en el año 2006 y en el 2007 se llevó a cabo, por separado, la recuperación de información correspondiente a usuarios de tabaco y/o alcohol solicitantes de atención terapéutica entre enero y diciembre (2,3) y a partir del 2008 el seguimiento de estos usuarios se realiza con cortes semestrales (4,5). Hay que señalar que estos estudios tienen el mismo propósito de otros informes del Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas (1,5); a saber, proporcionar datos actualizados de la población que demanda tratamiento en CIJ, para apoyar el diseño,

planeación y ajuste de los programas institucionales de prevención y atención curativa-rehabilitatoria.

MÉTODO

Diseño de estudio: Censo, transversal, descriptivo.

Población: 2,565 usuarios exclusivos de tabaco y/o alcohol que acudieron por primera vez a solicitar tratamiento entre enero y junio de 2009, en 89 unidades de atención de CIJ (ver Cuadro 1) y que proporcionaron personalmente la información.¹

Fuente de información: Formato de *Entrevista inicial* (clave 8819-03), aplicado por los terapeutas en la primera consulta.

Variables de estudio: sexo, edad de ingreso a tratamiento, estado civil, escolaridad, ocupación, estrato social, condicionante(s) de la solicitud de tratamiento, antecedente(s) de acciones asumidas frente al uso de sustancias, problema(s) asociado(s) al mismo, drogas consumidas en el primer año de consumo, edad de inicio, tiempo transcurrido entre el inicio del consumo y la solicitud de tratamiento, consumo en el último año, consumo en los últimos 30 días, droga de preferencia en el último año, droga de mayor impacto en el último año y episodios de abuso en los últimos 30 días.

¹ No se incluyen casos donde la información es proporcionada por la familia del usuario. Así como los registros que fueron enviados de manera extemporánea a la Subdirección de Investigación de CIJ.

Análisis: Se realizaron análisis de frecuencia y medidas de tendencia central para tres grupos *mutuamente excluyentes*: I.- usuarios de tabaco (n=328 casos), II.- usuarios de alcohol (n=560 casos) y III.-usuarios de tabaco y alcohol (n=1,677 casos).

Los resultados se presentan en porcentajes válidos que excluyen casos “sin información” y aquellos que no cumplen las condiciones requeridas para el análisis.

I. USUARIOS DE TABACO

En 84.5% de los casos que reportaron sólo ser fumadores, el propio usuario acudió a solicitar tratamiento, sin asistir acompañado de otras personas. Las mujeres representaron el 60.4% de los casos, lo que equivale a una razón de 0.7 hombres por cada mujer. La edad promedio de ingreso a tratamiento se situó en 38.8 años (desviación estándar=17.4 años), pese a que 43.8% contaba con 45 años o más. 35.3% expresó estar casado; 32.9% cursaba o había cursado algún grado de educación secundaria y 18.5%, al menos algún grado de estudios superiores. 36.7% desempeñaba alguna actividad laboral y 28.1% se dedicaba a tareas del hogar. Según la percepción de los terapeutas 58.1% provenía de un estrato medio bajo y 23.3% de un estrato medio alto.

Por otro lado, 94.2% acudió solicitando atención para tratar su consumo de tabaco; 68.6% lo hizo *motu proprio*. 29.9% expresó que antes de acudir a CIJ había intentado interrumpir el consumo de tabaco de manera voluntaria, pero sin apoyo, mientras que 47.3% afirmó que, hasta el momento

de la solicitud de tratamiento, no había intentado tomar alguna medida en contra del consumo de tabaco. Asimismo, 85.7% reportaron problemas asociados al consumo de tabaco, entre los que destacan los de salud (57.3%) y los familiares (31.4%).

La edad promedio de inicio del consumo se situó en 17.1 años (desviación estándar=7.0 años), por lo que el tiempo transcurrido entre el inicio y el ingreso a tratamiento fue de 21.5 años (desviación estándar=16.1 años), si bien la mayor proporción de casos (44.4%) acudió a solicitar tratamiento transcurridos más de 25 años. Destaca que el uso de tabaco se redujo en el último año a 95.1% y en los últimos 30 días a 89.6%. Finalmente, 71.8% aceptó haber abusado —al fumar seis o más cigarrillos— diariamente durante el último mes.

II. USUARIOS DE ALCOHOL

De los 560 usuarios exclusivos de alcohol que acudieron por primera vez a solicitar tratamiento en el primer semestre de 2009, 53.2% acudió personalmente y sin compañía; 63.4% fueron hombres, lo que equivale a una razón de 1.7 hombres por cada mujer. La edad promedio de ingreso a tratamiento fue de 24.7 años (desviación estándar=13.2 años), aunque 53.5% contaba con menos de 20 años. 65.1% expresó estar soltero. 49.0% cursaba o había cursado algún grado de educación secundaria y 23.1% al menos algún grado de bachillerato. Mientras que 33.9% desempeñaba alguna actividad laboral, 44.8% estudiaba. Según juicio de los

terapeutas, 62.5% y 20.9% pertenecían a los estratos sociales medio bajo y bajo, respectivamente.

Como era de esperar, 84.6% acudió solicitando atención para el consumo de alcohol; 36.3% lo hizo por condicionamiento o recomendación familiar y 34.1% *motu proprio*. 59.8% afirmó que no había tomado ninguna medida contra el consumo de alcohol, en tanto que 11.4% expresó que había intentado interrumpirlo sin apoyo alguno. Por otro lado, 83.0% de los casos reportó problemas asociados al uso de alcohol, principalmente de tipo familiar (57.0%), escolar (28.4%) y psicológicos (25.2%).

La edad promedio de inicio del consumo de alcohol fue de 16.2 años (desviación estándar=5.6 años), por lo que el tiempo transcurrido entre el inicio y el ingreso a tratamiento fue de 8.5 años (desviación estándar=10.9 años); no obstante, 58.4% de los casos acudió a tratamiento transcurridos 5 años o menos. El uso de alcohol en el último año fue referido por 89.8% de los casos y en los últimos 30 días por 64.5%. De quienes reportaron consumo de alcohol en los últimos 30 días, 29.3% aceptó haber abusado del mismo menos de una vez a la semana y 26.7% una o dos veces a la semana.²

² El abuso de alcohol se define en el caso de los hombres como el consumo de más de cuatro copas en una ocasión y para las mujeres de más de tres copas.

III. USUARIOS DE TABACO Y ALCOHOL

Dentro de la población estudiada de usuarios de drogas lícitas, los usuarios de tabaco y alcohol representan el grupo predominante (1,677 casos). En 63.0% de los casos acudió únicamente el propio consumidor; 59.7% fueron hombres (con una razón de 1.5 hombres por cada mujer) y la edad promedio se ubicó en 30.1 años (desviación estándar=15.8 años). 53.3% era soltero y 25.2%, casado. 38.5% cursaba o había cursado algún grado de educación secundaria y 25.5% al menos algún grado de bachillerato; finalmente, 39.9% desempeñaba alguna actividad laboral y 28.8% estudiaba. De acuerdo con la evaluación de los terapeutas, 62.4% provenían del estrato medio bajo, 19.8% del estrato bajo y 16.2% del estrato medio alto.

Por otra parte, 64.0% acudió a solicitar tratamiento por el uso de tabaco y 65.3% por el consumo de alcohol (51.3% lo hizo *motu proprio*). 43.9% afirmó que hasta el momento de llegar a CIJ no había tomado alguna medida contra el consumo de tabaco o alcohol, aunque 24.6% expresó que había intentado interrumpirlo de manera voluntaria y sin apoyo. Cabe señalar que nueve de cada diez casos reportaron problemas asociados al consumo, entre los que sobresalen los familiares (61.7%) y de salud (37.0%).

La edad promedio de inicio del uso de tabaco se situó en los 15.9 años (desviación estándar=4.9 años), en tanto que la de alcohol se ubicó 16.2 años (desviación estándar=5.1 años). Durante el primer año del consumo, 34.4% reportó

únicamente uso de tabaco, 28.5% el de alcohol y 37.1% el consumo de ambas sustancias.

96.1% de los casos que refirió haber utilizado alguna de estas sustancias durante el último año; 75.4% consumió tabaco y alcohol, 11.8% sólo alcohol y 8.8% únicamente tabaco. Además, en el mismo periodo, las bebidas alcohólicas presentaron el mayor porcentaje tanto como sustancias de preferencia (52.5%) como de mayor impacto (60.8%).

Asimismo, 85.0% de los casos reportó consumo en los últimos 30 días; es decir, 49.1% siguió consumiendo tabaco y alcohol, 21.6% únicamente tabaco y 14.3% sólo alcohol. De aquéllos que reportaron el uso de tabaco en este periodo, 49.2% aceptó fumar seis o más cigarrillos diariamente; mientras que 31.9% de quienes consumieron alcohol admitió haber abusado del mismo en menos de una ocasión a la semana y 31.0% de una a dos veces a la semana.

OBSERVACIONES GENERALES

Los datos permiten advertir claras diferencias entre los usuarios de tabaco, alcohol y tabaco y alcohol. Teniendo así que:

- El grupo más grande es el conformado por los usuarios de tabaco y alcohol, dos de cada tres usuarios de estas sustancias.

- Entre los usuarios de tabaco predominan las mujeres, mientras que en los otros grupos predominan los hombres.
- Los usuarios de alcohol acuden a solicitar tratamiento a menor edad que los de tabaco y los usuarios de alcohol y tabaco. Asimismo, los solteros predominan entre los usuarios de alcohol, en tanto que los casados entre los usuarios de tabaco.
- En los tres grupos predominan los usuarios con escolaridad a nivel de secundaria; sin embargo, los usuarios de tabaco y alcohol presenta el mayor porcentaje en el nivel de bachillerato, en tanto los usuarios de tabaco en el de estudios superiores.
- Si bien, entre los usuarios de tabaco predominan los casos que se dedican a trabajar, también sobresalen las amas de casa; en tanto que entre los usuarios de alcohol sobresalen los estudiantes.
- Los mayores porcentajes de casos que acuden a solicitar tratamiento por iniciativa propia y sin la compañía de algún familiar o amigo se ubican en el grupo de usuarios de tabaco; en tanto que, el mayor porcentaje de los que acuden a solicitar tratamiento por algún tipo de condicionamiento se ubica en el grupo de alcohol.
- Entre los usuarios de tabaco y los usuarios de tabaco y alcohol los casos que han tenido intentos de interrupción voluntaria del consumo, sin apoyo son similares; mientras

que en los de alcohol es mayor el porcentaje de casos que no han realizado ninguna acción previa contra el uso de sustancias.

- Los usuarios de tabaco presentan más problemas de salud, mientras que los usuarios de alcohol y los de tabaco y alcohol presentan principalmente problemas familiares.
- Los usuarios de tabaco y alcohol inician el consumo de sustancias a menor edad que los otros dos grupos.
- El grupo de usuarios de tabaco es el que ha dejado pasar más tiempo antes de solicitar tratamiento a CIJ, mientras que el grupo de usuarios de alcohol es el que acudió a solicitar atención en menos tiempo.
- En general, los usuarios de tabaco y alcohol presentan menos episodios de abuso en el consumo de tabaco que los usuarios de tabaco y más episodios de abuso de alcohol que los usuarios de alcohol.

REFERENCIAS

1. Castillo Franco, Pl. y Gutiérrez López, AD. (2009). **Consumo de drogas en pacientes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil. Julio-Diciembre, 2008.** Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación, **Informe de Investigación 09-09**, México

2. Gutiérrez López, AD. y Castillo Franco, PI. **Características sociodemográficas y de consumo en usuarios de tabaco y alcohol de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil en 2006.** Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación, **Informe de Investigación 07-13**, México, 2007.
3. Gutiérrez López, AD. y Castillo Franco, PI. (2009). **Estudio epidemiológico del consumo de alcohol y tabaco en pacientes solicitantes de tratamiento en CIJ en 2007.** Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación, **Informe de Investigación 08-12**, México.
4. Gutiérrez López, AD. y Castillo Franco, PI. (2009). **Consumo de tabaco y/o alcohol en pacientes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil, enero-junio, 2008.** Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación, **Informe de Investigación 09-02c**, México.
5. Gutiérrez López, AD. y Castillo Franco, PI. (2009). **Consumo de tabaco y/o alcohol en pacientes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil, julio-diciembre, 2008.** Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación, **Informe de Investigación 09-09c**, México.

CUADROS

**Cuadro 1. Distribución de casos de primer ingreso
a tratamiento por unidad de atención, Enero – Junio de 2009**

Unidad de atención	Total de casos	Tabaco	Alcohol	Tabaco y alcohol
Álvaro Obregón Norte	27	18.5	22.2	59.3
Azcapotzalco	73	28.8	11.0	60.3
Benito Juárez	76	3.9	7.9	88.2
Coyoacán	22	9.1	9.1	81.8
Cuajimalpa	14	0.0	14.3	85.7
Cuauhtémoc Oriente	38	2.6	39.5	57.9
Cuauhtémoc Poniente	48	20.8	33.3	45.8
Chalco	13	7.7	7.7	84.6
Ecatepec	20	10.0	10.0	80.0
Gustavo A. Madero Aragón	49	8.2	49.0	42.9
Gustavo A. Madero Norte	22	18.2	9.1	72.7
Iztapalapa Oriente	40	15.0	7.5	77.5
Iztapalapa Poniente	40	32.5	30.0	37.5
Miguel Hidalgo	26	19.2	11.5	69.2
Naucalpan	39	5.1	7.7	87.2
Nezahualcóyotl	87	40.2	18.4	41.4
Tlalpan	44	15.9	11.4	72.7
Tlalnepantla	28	0.0	25.0	75.0
Venustiano Carranza	65	12.3	29.2	58.5
UH Iztapalapa	2	0.0	0.0	100.0
<hr/>				
Acapulco	17	11.8	47.1	41.2
Aguascalientes	38	10.5	47.4	42.1
Apodaca	7	14.3	42.9	42.9
Cancún	27	7.4	7.4	85.2
Ciudad del Carmen	70	2.9	28.6	68.6
Ciudad Juárez Norte	23	26.1	8.7	65.2
Ciudad Victoria	30	3.3	36.7	60.0
Celaya	44	2.3	20.5	77.3
Chihuahua	86	33.7	12.8	53.5
Chilpancingo	29	0.0	17.2	82.8
Colima	79	6.3	27.8	65.8
Cozumel	25	4.0	40.0	56.0
Cuernavaca	26	0.0	15.4	84.6
Culiacán	35	25.7	28.6	45.7
Durango	35	5.7	28.6	65.7
Fresnillo Pinacoteca	7	0.0	0.0	100.0

(Continúa)

**Cuadro 1. Distribución de casos de primer ingreso
a tratamiento por unidad de atención, Enero – Junio de 2009**
(Continuación)

Unidad de atención	Total de casos	Tabaco	Alcohol	Tabaco y alcohol
Guadalajara Centro	28	10.7	17.9	71.4
Guadalajara Sur	19	15.8	26.3	57.9
Guadalupe	12	8.3	25.0	66.7
Guamúchil	16	0.0	43.8	56.3
Guasave	63	3.2	50.8	46.0
Hermosillo	43	7.0	11.6	81.4
Ixtapa Zihuatanejo	12	0.0	33.3	66.7
La Paz	17	11.8	5.9	82.4
Laguna Coahuila	40	0.0	37.5	62.5
Laguna Durango	23	4.3	8.7	87.0
León	32	25.0	12.5	62.5
Los Cabos	49	14.3	8.2	77.6
Los Mochis	29	13.8	3.4	82.8
Manzanillo	14	0.0	50.0	50.0
Mazatlán	29	20.7	20.7	58.6
Mérida	31	9.7	48.4	41.9
Mexicali	24	8.3	20.8	70.8
Monterrey	17	11.8	5.9	82.4
Morelia	10	20.0	10.0	70.0
Nogales	2	0.0	50.0	50.0
Oaxaca	23	0.0	30.4	69.6
Pachuca	38	2.6	26.3	71.1
Poza Rica	30	6.7	3.3	90.0
Puebla	45	22.2	17.8	60.0
Puerto Vallarta	19	26.3	21.1	52.6
Querétaro	19	0.0	0.0	100.0
Salamanca	20	0.0	5.0	95.0
Saltillo	37	13.5	13.5	73.0
San Luis Potosí	32	6.3	21.9	71.9
San Nicolás de los Garza	6	33.3	0.0	66.7
Tampico	31	32.3	6.5	61.3
Tapachula	4	25.0	25.0	50.0
Tecomán	25	0.0	44.0	56.0
Tehuacán	19	5.3	21.1	73.7

(Continúa)

**Cuadro 1. Distribución de casos de primer ingreso
a tratamiento por unidad de atención, Enero – Junio de 2009**
(Continuación)

Unidad de atención	Total de casos	Tabaco	Alcohol	Tabaco y alcohol
Tijuana Guaycura	10	0.0	0.0	100.0
Tijuana Soler	7	0.0	0.0	100.0
Tlaquepaque	53	24.5	20.8	54.7
Toluca	53	9.4	17.0	73.6
Tuxtla Gutiérrez	39	10.3	17.9	71.8
Villahermosa	31	3.2	22.6	74.2
Xalapa	38	13.2	42.1	44.7
Zacatecas	24	12.5	16.7	70.8
Zamora	25	16.0	20.0	64.0
Zapopan Norte	34	32.4	11.8	55.9
UH Culiacán	2	0.0	100.0	0.0
UH Ecatepec	1	0.0	100.0	0.0
UH Jerez	12	0.0	33.3	66.7
UH Monterrey	3	0.0	33.3	66.7
UH Punta Diamante	1	0.0	100.0	0.0
UH Tijuana	3	0.0	33.3	66.7
UH Zapopan	8	0.0	37.5	62.5
UH Zapotlán el Grande	4	0.0	50.0	50.0
UTPPCH Cd. Juárez	8	0.0	0.0	100.0
Nacional	2,565	12.8	21.8	65.4

UH = Unidad de Hospitalización.

UTPPCH = Unidad de Tratamiento a Personas con Problemas del Consumo de Heroína respectivamente.

Cuadro 2. Características sociodemográficas de los usuarios de tabaco y/o alcohol que solicitan tratamiento a Centros de Integración Juvenil. Enero – Junio de 2009

	Tabaco (N=328)			Alcohol (N=560)			Tabaco y alcohol (N=1,677)		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Persona que proporciona la información									
Usuario	277	84.5	84.5	298	53.2	53.2	1,056	63.0	63.0
Usuario y otra(s) persona(s)	51	15.5	15.5	262	46.8	16.8	621	37.0	37.0
Sexo									
Hombre	130	39.6	39.6	355	63.4	63.4	1,002	59.7	59.7
Mujer	198	60.4	60.4	205	36.6	36.6	675	40.3	40.3
Razón Hombre : Mujer		0.7:1			1.7:1			1.5:1	
Edad de ingreso a tratamiento									
Hasta 9 años	1	0.3	0.3	0	0.0	0.0	1	0.1	0.1
10 A 14 años	40	12.2	12.6	156	27.9	28.1	245	14.6	14.8
15 A 19 años	22	6.7	6.9	141	25.2	25.4	405	24.2	24.5
20 A 24 años	22	6.7	6.9	42	7.5	7.6	150	8.9	9.1
25 A 29 años	22	6.7	6.9	42	7.5	7.6	123	7.3	7.4
30 A 34 años	20	6.1	6.3	38	6.8	6.8	119	7.1	7.2
35 A 39 años	20	6.1	6.3	37	6.6	6.7	138	8.2	8.3
40 A 44 años	31	9.5	9.8	41	7.3	7.4	107	6.4	6.5
45 años o más	139	42.4	43.8	58	10.4	10.5	365	21.8	22.1
<i>Sin información</i>	11	3.4	<i>Se omite</i>	5	0.9	<i>Se omite</i>	24	1.4	<i>Se omite</i>
Promedio		38.8 años			24.7 años			30.1 años	

Cuadro 2. Características sociodemográficas de los usuarios de tabaco y/o alcohol que solicitan tratamiento a Centros de Integración Juvenil. Enero - Junio de 2009

	Tabaco (N=328)			Alcohol (N=560)			Tabaco y alcohol (N=1,677)		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Estado civil									
Soltero(a)	112	34.1	35.0	351	62.7	65.1	868	51.8	53.3
Casado(a)	113	34.5	35.3	110	19.6	20.4	411	24.5	25.2
En unión libre	33	10.1	10.3	38	6.8	7.1	139	8.3	8.5
Separado(a)	25	7.6	7.8	25	4.5	4.6	109	6.5	6.7
Divorciado(a)	19	5.8	5.9	11	2.0	2.0	59	3.5	3.6
Viudo(a)	18	5.5	5.6	4	0.7	0.7	43	2.6	2.6
<i>Sin información</i>	8	2.4	<i>Se omite</i>	21	3.8	<i>Se omite</i>	48	2.9	<i>Se omite</i>
Escolaridad									
Ninguna (no sabe leer ni escribir)	4	1.2	1.2	3	0.5	0.5	15	0.9	0.9
Ninguna (sabe leer y escribir)	2	0.6	0.6	6	1.1	1.1	13	0.8	0.8
Primaria	61	18.6	18.8	62	11.1	11.3	220	13.1	13.2
Secundaria	107	32.6	32.9	269	48.0	49.0	641	38.2	38.5
Estudios técnicos o comerciales	25	7.6	7.7	16	2.9	2.9	100	6.0	6.0
Bachillerato o bachillerato técnico	60	18.3	18.5	127	22.7	23.1	424	25.3	25.5
Estudios superiores	60	18.3	18.5	64	11.4	11.7	242	14.4	14.5
Estudios de postgrado	6	1.8	1.8	2	0.4	0.4	11	0.7	0.7
<i>Sin información</i>	3	0.9	<i>Se omite</i>	11	2.0	<i>Se omite</i>	11	0.7	<i>Se omite</i>

Cuadro 2. Características sociodemográficas de los usuarios de tabaco y/o alcohol que solicitan tratamiento a Centros de Integración Juvenil. Enero - Junio de 2009

	Tabaco (N=328)			Alcohol (N=560)			Tabaco y alcohol (N=1,677)		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Ocupación									
Desempleado/desocupado	24	7.3	7.3	78	13.9	14.1	234	14.0	14.0
Hogar	92	28.0	28.1	25	4.5	4.5	171	10.2	10.3
Estudia	66	20.1	20.2	248	44.3	44.8	480	28.6	28.8
Estudia y trabaja	11	3.4	3.4	15	2.7	2.7	71	4.2	4.3
Trabaja	120	36.6	36.7	185	33.0	33.4	666	39.7	39.9
Pensionado	14	4.3	4.3	3	0.5	0.5	46	2.7	2.8
Sin información	1	0.3	<i>Se omite</i>	6	1.1	<i>Se omite</i>	9	0.5	<i>Se omite</i>
Estrato social									
Alto	4	1.2	1.3	6	1.1	1.1	17	1.0	1.1
Medio alto	70	21.3	23.3	71	12.7	13.4	258	15.4	16.2
Medio bajo	175	53.4	58.1	331	59.1	62.5	993	59.2	62.4
Bajo	50	15.2	16.6	111	19.8	20.9	316	18.8	19.8
Pobreza extrema o marginación	2	0.6	0.7	11	2.0	2.1	8	0.5	0.5
Sin información	27	8.2	<i>Se omite</i>	30	5.4	<i>Se omite</i>	85	5.1	<i>Se omite</i>

Cuadro 3. Factores asociados a la demanda de tratamiento de los usuarios de tabaco y/o alcohol que solicitan tratamiento a Centros de Integración Juvenil. Enero - Junio de 2009

	Tabaco (N=328)			Alcohol (N=560)			Tabaco y alcohol (N=1,677)		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Condicionantes de la solicitud de tratamiento									
Por propia iniciativa	225	68.6	68.6	191	34.1	34.1	861	51.3	51.3
Por condicionamiento o recomendación familiar	48	14.6	14.6	203	36.3	36.3	526	31.4	31.4
Por recomendación de pares	6	1.8	1.8	9	1.6	1.6	35	2.1	2.1
Por condicionamiento o recomendación escolar	32	9.8	9.8	144	25.7	25.7	260	15.5	15.5
Por condicionamiento legal	3	0.9	0.9	27	4.8	4.8	64	3.8	3.8
Por condicionamiento o recomendación laboral	3	0.9	0.9	10	1.8	1.8	25	1.5	1.5
Por indicación médica	30	9.1	9.1	11	2.0	2.0	55	3.3	3.3
Otros condicionante de solicitud de tratamiento	3	0.9	0.9	10	1.8	1.8	32	1.9	1.9
Ningún condicionante reportado	0	5	1.5	1.5	14	2.5	2.5	25	1.5
Antecedentes de acciones contra el consumo de sustancias									
Juramento	6	1.8	1.8	15	2.7	2.7	76	4.5	4.5
Grupo de autoayuda	1	0.3	0.3	38	6.8	6.8	109	6.5	6.5
Internamiento en anexo	4	1.2	1.2	22	3.9	3.9	74	4.4	4.4
Intervención de emergencia	0	0.0	0.0	5	0.9	0.9	5	0.3	0.3
Programa de mantenimiento	1	0.3	0.3	1	0.2	0.2	3	0.2	0.2
Tratamiento médico no especializado	0	0.0	0.0	5	0.9	0.9	12	0.7	0.7

Cuadro 3. Factores asociados a la demanda de tratamiento de los usuarios de tabaco y/o alcohol que solicitan tratamiento a Centros de Integración Juvenil. Enero - Junio de 2009

	Tabaco (N=328)			Alcohol (N=560)			Tabaco y alcohol (N=1,677)		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Antecedentes de acciones contra el consumo de sustancias									
Tratamiento psiquiátrico o psicoterapéutico ambulatorio	7	2.1	2.1	21	3.8	3.8	64	3.8	3.8
Tratamiento psiquiátrico o psicoterapéutico residencial	1	0.3	0.3	0	0.0	0.0	15	0.9	0.9
Medicina tradicional o alternativa	7	2.1	2.1	4	0.7	0.7	14	0.8	0.8
Intento de interrupción voluntaria del consumo, sin apoyo	98	29.9	29.9	64	11.4	11.4	413	24.6	24.6
Otras acciones	54	16.5	16.5	78	13.9	13.9	282	16.8	16.8
Ninguna acción previa reportada	155	47.3	47.3	335	59.8	59.8	736	43.9	43.9
Problemas asociados al consumo									
Problemas de salud	188	57.3	57.3	121	21.6	21.6	621	37.0	37.0
Accidentes o lesiones	4	1.2	1.2	34	6.1	6.1	176	10.5	10.5
Problemas familiares	103	31.4	31.4	319	57.0	57.0	1,034	61.7	61.7
Problemas escolares	33	10.1	10.1	159	28.4	28.4	362	21.6	21.6
Problemas laborales	11	3.4	3.4	74	13.2	13.2	207	12.3	12.3
Problemas psicológicos	74	22.6	22.6	141	25.2	25.2	458	27.3	27.3
Problemas legales	2	0.6	0.6	34	6.1	6.1	137	8.2	8.2
Conducta antisocial o delictiva	5	1.5	1.5	30	5.4	5.4	101	6.0	6.0
Otros problemas	13	4.0	4.0	14	2.5	2.5	63	3.8	3.8
Ningún problema asociado reportado	47	14.3	14.3	95	17.0	17.0	166	9.9	9.9

Cuadro 4. Patrón de consumo de los usuarios de tabaco y/o alcohol que solicitan tratamiento a Centros de Integración Juvenil. Enero - Junio de 2009

	Tabaco (N=328)			Alcohol (N=560)			Tabaco y alcohol (N=1,677)		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Drogas consumidas en el primer año de consumo									
Tabaco	328	100.0	100.0	---	---	---	577	34.4	34.4
Alcohol	---	---	---	560	100.0	100.0	478	28.5	28.5
Tabaco y alcohol	---	---	---	---	---	---	622	37.1	37.1
Edad de inicio del consumo									
Hasta 9 años	11	3.4	3.4	15	2.7	2.7	84	5.0	5.0
10 A 14 años	119	36.3	36.5	227	40.5	40.9	731	43.6	43.7
15 A 19 años	123	37.5	37.7	217	38.8	39.1	729	43.5	43.6
20 A 24 años	35	10.7	10.7	48	8.6	8.6	88	5.2	5.3
25 A 29 años	19	5.8	5.8	28	5.0	5.0	25	1.5	1.5
30 A 34 años	10	3.0	3.1	10	1.8	1.8	7	0.4	0.4
35 A 39 años	1	0.3	0.3	4	0.7	0.7	6	0.4	0.4
40 A 44 años	3	0.9	0.9	4	0.7	0.7	1	0.1	0.1
45 años y más	5	1.5	1.5	2	0.4	0.4	2	0.1	0.1
<i>Sin información</i>	2	0.6	<i>Se omite</i>	5	0.9	<i>Se omite</i>	4	0.2	<i>Se omite</i>
Promedio		17.1 años			16.2 años			14.9 años	

Cuadro 4. Patrón de consumo de los usuarios de tabaco y/o alcohol que solicitan tratamiento a Centros de Integración Juvenil. Enero - Junio de 2009

	Tabaco (N=328)			Alcohol (N=560)			Tabaco y alcohol (N=1,677)		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Edad de inicio en el consumo de tabaco									
Hasta 9 años	11	3.4	3.4	---	---	---	41	2.4	2.5
10 A 14 años	119	36.3	36.5	---	---	---	645	38.5	38.7
15 A 19 años	123	37.5	37.7	---	---	---	770	45.9	46.2
20 A 24 años	35	10.7	10.7	---	---	---	126	7.5	7.6
25 A 29 años	19	5.8	5.8	---	---	---	42	2.5	2.5
30 A 34 años	10	3.0	3.1	---	---	---	18	1.1	1.1
35 A 39 años	1	0.3	0.3	---	---	---	12	0.7	0.7
40 A 44 años	3	0.9	0.9	---	---	---	8	0.5	0.5
45 años y más	5	1.5	1.5	---	---	---	5	0.3	0.3
<i>Sin información</i>	2	0.6	<i>Se omite</i>	---	---	---	10	0.6	<i>Se omite</i>
Promedio		17.1 años			---			15.9 años	
Edad de inicio en el consumo de alcohol									
Hasta 9 años	---	---	---	15	2.7	2.7	61	3.6	3.7
10 A 14 años	---	---	---	227	40.5	40.9	553	33.0	33.2
15 A 19 años	---	---	---	217	38.8	39.1	799	47.6	47.9
20 A 24 años	---	---	---	48	8.6	8.6	155	9.2	9.3
25 A 29 años	---	---	---	28	5.0	5.0	52	3.1	3.1
30 A 34 años	---	---	---	10	1.8	1.8	24	1.4	1.4
35 A 39 años	---	---	---	4	0.7	0.7	8	0.5	0.5
40 A 44 años	---	---	---	4	0.7	0.7	9	0.5	0.5
45 años y más	---	---	---	2	0.4	0.4	6	0.4	0.4
<i>Sin información</i>	---	---	---	5	0.9	<i>Se omite</i>	10	0.6	<i>Se omite</i>
Promedio		---			16.2 años			16.2 años	

Cuadro 4. Patrón de consumo de los usuarios de tabaco y/o alcohol que solicitan tratamiento a Centros de Integración Juvenil. Enero - Junio de 2009

	Tabaco (N=328)			Alcohol (N=560)			Tabaco y alcohol (N=1,677)		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo y la solicitud de tratamiento									
Menos de 1 año	33	10.1	10.5	129	23.0	23.5	100	6.0	6.1
1 a 5 años	43	13.1	13.7	192	34.3	34.9	559	33.3	33.9
6 a 10 años	28	8.5	8.9	59	10.5	10.7	184	11.0	11.2
11 a 15 años	29	8.8	9.2	41	7.3	7.5	126	7.5	7.6
16 a 20 años	18	5.5	5.7	46	8.2	8.4	138	8.2	8.4
21 a 25 años	24	7.3	7.6	33	5.9	6.0	119	7.1	7.2
26 años o más años	140	42.7	44.4	50	8.9	9.1	423	25.2	25.7
<i>Sin información</i>	13	4.0	<i>Se omite</i>	10	1.8	<i>Se omite</i>	28	1.7	<i>Se omite</i>
Promedio		21.5 años			8.5 años			15.3 años	
Consumo en el último año									
Tabaco	312	95.1	95.1	---	---	---	147	8.8	8.8
Alcohol	---	---	---	503	89.8	89.8	198	11.8	11.8
Tabaco y alcohol	---	---	---	---	---	---	1,264	75.4	75.4
<i>Sin consumo en el periodo</i>	16	4.9	4.9	57	10.2	10.2	68	4.1	4.1

Cuadro 4. Patrón de consumo de los usuarios de tabaco y/o alcohol que solicitan tratamiento a Centros de Integración Juvenil. Enero - Junio de 2009

	Tabaco (N=328)			Alcohol (N=560)			Tabaco y alcohol (N=1,677)		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Droga de preferencia en el último año									
Tabaco	200	61.0	77.2	---	---	---	465	27.7	35.2
Cigarrillos	59	18.0	22.8	---	---	---	163	9.7	12.3
Alcohol	---	---	---	381	68.0	100.0	693	41.3	52.5
<i>Sin consumo en el último año</i>	16	4.9	<i>Se omite</i>	57	10.2	<i>Se omite</i>	68	4.1	<i>Se omite</i>
<i>Ninguna/sin información</i>	53	16.2	<i>Se omite</i>	122	21.8	<i>Se omite</i>	288	17.2	<i>Se omite</i>
Droga de mayor impacto en el último año									
Tabaco	199	60.7	75.7	---	---	---	378	22.5	28.5
Cigarrillos	64	19.5	24.3	---	---	---	141	8.4	10.6
Alcohol	---	---	---	373	66.6	100.0	806	48.1	60.8
<i>Sin consumo en el último año</i>	16	4.9	<i>Se omite</i>	57	10.2	<i>Se omite</i>	68	4.1	<i>Se omite</i>
<i>Ninguna/sin información</i>	49	14.9	<i>Se omite</i>	130	23.2	<i>Se omite</i>	284	16.9	<i>Se omite</i>
Consumo en los últimos 30 días									
Tabaco	294	89.6	89.6	---	---	---	363	21.6	21.6
Alcohol	---	---	---	361	64.5	64.5	239	14.3	14.3
Tabaco y alcohol	---	---	---	---	---	---	824	49.1	49.1
<i>Sin consumo en el periodo</i>	34	10.4	10.4	199	35.5	35.5	251	15.0	15.0

Cuadro 4. Patrón de consumo de los usuarios de tabaco y/o alcohol que solicitan tratamiento a Centros de Integración Juvenil. Enero - Junio de 2009

	Tabaco (N=328)			Alcohol (N=560)			Tabaco y alcohol (N=1,677)		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Frecuencia de episodios de abuso del consumo de tabaco en los últimos 30 días									
Ni una vez	44	13.4	15.1	---	---	---	301	17.9	25.9
< de 1 vez a la semana	22	6.7	7.6	---	---	---	117	7.0	10.1
1 o 2 veces a la semana	9	2.7	3.1	---	---	---	116	6.9	10.0
Cada tercer día	7	2.1	2.4	---	---	---	56	3.3	4.8
Diario	209	63.7	71.8	---	---	---	571	34.0	49.2
<i>No consumió tabaco en los últimos 30 días</i>	34	10.4	<i>Se omite</i>	---	---	---	490	29.2	<i>Se omite</i>
<i>Sin información</i>	3	0.9	<i>Se omite</i>	---	---	---	26	1.6	<i>Se omite</i>
Frecuencia de episodios de abuso del consumo de alcohol en los últimos 30 días									
Ni una vez	---	---	---	77	13.8	22.1	197	11.7	19.1
< de 1 vez a la semana	---	---	---	102	18.2	29.3	329	19.6	31.9
1 o 2 veces a la semana	---	---	---	93	16.6	26.7	320	19.1	31.0
Cada tercer día	---	---	---	22	3.9	6.3	93	5.5	9.0
Diario	---	---	---	54	9.6	15.5	92	5.5	8.9
<i>No consumió alcohol en los últimos 30 días</i>	---	---	---	199	35.5	<i>Se omite</i>	614	36.6	<i>Se omite</i>
<i>Sin información</i>	---	---	---	13	2.3	<i>Se omite</i>	32	1.9	<i>Se omite</i>