
**CONSUMO DE DROGAS EN PACIENTES DE PRIMER INGRESO A
TRATAMIENTO EN CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL.
JULIO - DICIEMBRE, 2010**

DATOS A NIVEL NACIONAL Y POR SEXO

Alma Delia Gutiérrez López

Centros de Integración Juvenil
Dirección de Investigación y Enseñanza
Subdirección de Investigación
Depto. de Investigación Clínica y Epidemiológica
México, 2011

Informe de Investigación 11-07a

DIRECTORIO

PRESIDENTE DEL PATRONATO NACIONAL

Dr. Jesús Kumate Rodríguez

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA

Sra. Kena Moreno

DIRECTORA GENERAL

Lic. Carmen Fernández Cáceres

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ADMINISTRACIÓN

Lic. Felipe de Jesús Armenta Gómez

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE OPERACIÓN Y PATRONATOS

Dr. José Ángel Prado García

DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA

Dr. Ricardo Sánchez Huesca

SUBDIRECTOR DE INVESTIGACIÓN

Mtro. David Bruno Díaz Negrete

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	4
MÉTODO.....	4
CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS.....	6
FACTORES ASOCIADOS A LA DEMANDA DE TRATAMIENTO.....	8
CONSUMO DE DROGAS.....	10
CUADROS.....	19
GLOSARIO	44

RESUMEN

El presente informe se realizó con base en registros clínicos de la entrevista inicial de 11,671 usuarios de sustancias psicoactivas que reportaron el consumo de al menos una droga ilícita y que acudieron por primera vez a tratamiento a Centros de Integración Juvenil entre Julio y Diciembre de 2010. Con este estudio se busca actualizar información sobre el perfil sociodemográfico de los usuarios, los factores asociados a la demanda de tratamiento y el patrón de consumo de sustancias psicoactivas, así como contribuir con elementos útiles para retroalimentar la planeación, diseño y ajuste de los servicios institucionales de prevención y tratamiento del consumo de drogas.

Los datos permitieron observar una mayor proporción de hombres que demandan tratamiento, con una razón de 4.4 hombres por cada mujer. La edad media de ingreso a tratamiento fue de 23.8 años. En promedio, los hombres ingresan a tratamiento a una edad mayor que las mujeres (24.4 años hombres; 21.3 años mujeres). La edad promedio del inicio del consumo de tabaco se situó en general en los 14.5 años, la de alcohol en 14.7 años y la de drogas ilícitas en 16.5 años. En promedio, tanto los hombres como las mujeres inician el consumo de estas drogas a la misma edad (tabaco: hombres 14.5 años y mujeres 14.6 años; alcohol: hombres 14.8 años, mujeres 14.6 años; drogas ilícitas: hombres 16.4 años, mujeres 16.8 años).

Las drogas de mayor consumo alguna vez en la vida fueron: alcohol (88.4%), tabaco (83.8%), marihuana (75.0%), cocaína en polvo blanco (39.6%), solventes y removedores (31.8%), crack (24.8%), pegamentos (11.2%), metanfetaminas (11.1%) y benzodiazepinas (10.6%). En cuanto al consumo en el mes previo al ingreso a tratamiento las sustancias más utilizadas fueron: tabaco (64.2%), alcohol (56.4%), marihuana (38.9%), solventes o removedores (15.4%), crack (9.5%) y cocaína en polvo blanco (9.4%). Las drogas de mayor impacto en el último año fueron: marihuana (27.6%), alcohol (17.1%), solventes y removedores (12.8%), crack (9.8%) y cocaína (6.0%).

En cuanto a los factores asociados a la demanda de tratamiento se observó que los usuarios de drogas acudieron principalmente por iniciativa propia (41.8%) o por condicionamiento o recomendación familiar (36.1%); que buscan atención por el consumo de drogas ilícitas (84.3%), alcohol (42.1%) y/o tabaco (37.0%); que no han tomado ninguna medida contra el problema (33.5%) o que han intentado interrumpir de manera voluntaria y sin apoyo el consumo (25.9%); y que entre los problemas más frecuentemente asociados al consumo se reconocen los de tipo familiar (75.6%), los de salud (39.6%) y los psicológicos (36.6%).

Cabe destacar que se observan diferencias entre los hombres y mujeres atendidos en Centros de Integración Juvenil, en cuanto a sus características sociodemográficas, los factores asociados a la demanda de tratamiento y su patrón de consumo.

INTRODUCCIÓN

El presente informe se elabora a partir de la información obtenida mediante el Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas (SIECD) de Centros de Integración Juvenil (CIJ), cuyo objetivo es proporcionar datos actualizados de las características sociodemográficas, de los factores asociados a la demanda de tratamiento y del patrón de consumo de sustancias de la población usuaria de los servicios de tratamiento institucionales, para apoyar el diseño, planeación y ajuste de los programas institucionales de prevención y atención curativa-rehabilitatoria.

El SIECD es producto de más de veinte años de trabajo, a lo largo de los cuales se ha logrado consolidar el seguimiento sistemático y oportuno de datos que, más allá de su aplicación en la toma de decisiones para el diseño y ajuste de servicios, ha contribuido de manera significativa al conocimiento de la forma y tendencias del uso de drogas en nuestro país, al proporcionar referentes identificados en centros de tratamiento, además de ser una estrategia documental complementaria a los estudios y encuestas poblacionales.

MÉTODO

Diseño de estudio: Censo, estudio transversal, descriptivo, *ex post facto*.

Población: 11,671 usuarios de sustancias psicoactivas que reportaron el consumo intencional de al menos una droga ilegal, que acudieron por primera vez a solicitar tratamiento en CIJ entre Julio y Diciembre de 2010 en alguna de las unidades de atención curativa de CIJ (ver Cuadro 1) y que proporcionaron personalmente la información.¹

Fuente de información: Entrevista Inicial (en alguno de los dos formatos utilizados durante el periodo que comprende el estudio y que forman parte del expediente clínico), aplicada en la primera consulta por parte de los terapeutas responsables del ingreso de pacientes a tratamiento.

Variables de estudio: Las características sociodemográficas estudiadas comprenden: persona que proporciona la información, sexo, edad de ingreso a tratamiento, estado civil, escolaridad, ocupación y estrato social. Las variables de los factores asociados a la demanda de tratamiento: motivo(s) de consulta, condicionante(s) de la solicitud de

¹ No se incluyen casos en los que la información fue proporcionada por familiares del usuario, así como los registros que fueron enviados de manera extemporánea a la Subdirección de Investigación de CIJ.

tratamiento, antecedente(s) de acciones asumidas frente al uso de sustancias y problema(s) asociado(s) al mismo. Y las variables de patrón de consumo: edad de inicio, drogas consumidas en el primer año de consumo, drogas ilícitas consumidas en el primer año de consumo ilegal, tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de sustancias y el ingreso a tratamiento, consumo alguna vez en la vida, en el último año y en los últimos 30 días; drogas de preferencia y de mayor impacto en el último año, uso combinado de sustancias, tipo de consumo de drogas ilícitas, episodios de abuso y total de drogas consumidas.

La información sobre el consumo de drogas se presenta categorizada en diez grupos de sustancias: tabaco, alcohol, cannabis, cocaína, inhalables, depresores, estimulantes, drogas alucinógenas y disociativas, opiáceos y otras sustancias de abuso.

Sin embargo, también se desagregan los diez grupos antes mencionados en 26 categorías de sustancias: tabaco; alcohol; marihuana y hachís; cocaína en presentación de polvo blanco, crack y otras presentaciones de cocaína; solventes y removedores, pegamentos, esmaltes y pinturas y otros inhalables; benzodiacepinas, *Rohypno*[®] y otros depresores; anfetaminas, metanfetaminas (*crystal*, *ICE*, etc.), MDMA (éxtasis) y metanfetaminas alucinógenas y otros estimulantes; LSD, plantas alucinógenas y derivados y otras drogas alucinógenas y disociativas; heroína, opiáceos sintéticos, y opio y opioides; sustancias con utilidad médica y otras sustancias de abuso.

Procesamiento de datos. La información obtenida a través de los formatos de Entrevista Inicial fue capturada por personal de la Dirección de Planeación de CIJ, mediante el programa *Control de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas* (CIECD) desarrollado por la Subdirección de Investigación y el Departamento de Sistemas de CIJ para cada uno de los formatos utilizados. La validación y procesamiento de datos se realizó en el Departamento de Investigación Clínica y Epidemiológica con base en una muestra aleatoria de casos correspondientes al periodo de estudio, con un nivel de confianza de 95% y de error de 5%. La información obtenida a través del expediente clínico electrónico fue capturada por los terapeutas responsables de realizar la entrevista inicial. Para el procesamiento estadístico se utilizó el programa SPSS v. 15.

Los resultados se presentan tanto en forma general como desglosados por sexo y en porcentajes válidos, excluyendo casos “sin información” así como a aquellos que no cumplieron con las condiciones requeridas para el análisis en cada variable de estudio.

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS²

Sexo. Los hombres representaron al 81.6% de los casos y las mujeres al 18.4%, lo que corresponde a una razón de 4.4 hombres por cada mujer.

Persona que proporciona la información. 50.1% de los casos acudió sólo (51.3% de los hombres y 45.0% de las mujeres), mientras que 49.9% lo hizo en compañía de familiares u otras personas (48.7% de los hombres y 54.6% de las mujeres).

Edad de ingreso a tratamiento. La edad promedio se situó en 23.8 años ($\sigma=10.4$ años); la mediana en 20 años y la moda en 16 años. La mitad de los casos (50.4%) ingresó entre los 15 y 24 años de edad.


Figura 1. Edad de ingreso según sexo

	Años	Años
Promedio	24.4	21.3
Desviación estándar	10.4	10.3
Mediana	21	17
Moda	16	14

Los hombres ingresan a tratamiento a mayor edad


Estado civil. 68.6% dijo ser soltero, 11.8% casado y 10.9% vivir en unión libre.

Figura 2. Estado civil según sexo




² Cfr., Cuadros 1 a 8.

Escolaridad. 45.1% cursaba o había cursado algún grado de educación secundaria; 31.2%, al menos algún grado de bachillerato; 12.1%, al menos un año de educación primaria y 7.9%, uno o más años de estudios superiores.



Las mujeres cuentan con mayor escolaridad que los hombres


Ocupación. 36.5% desempeñaba alguna actividad laboral, 31.3% estudiaba y 24.7% estaba desempleado.



Mientras que un mayor porcentaje de mujeres se dedica a estudiar o a las labores del hogar; una mayor proporción de hombres trabaja o no cuenta con ocupación alguna

Estrato social. Según la percepción de los terapeutas, 60.9% de los pacientes corresponden al estrato medio bajo; 25.9%, al estrato bajo y 11.4%, al estrato medio alto.


Figura 5. Estrato social según sexo



FACTORES ASOCIADOS A LA DEMANDA DE TRATAMIENTO³

Motivos de consulta. 43.0% de los casos reportó más de un motivo para acudir a tratamiento (uso de alcohol, tabaco o drogas), mientras que 2.2% de los casos no expresó ninguno. Conviene señalar que 84.3% acudió por consumo de drogas ilícitas; mientras que 42.1%, por el uso de bebidas alcohólicas y 37.0% por el uso de tabaco.

Figura 6. Motivos de consulta según sexo




Un menor porcentaje de mujeres acude por el consumo de drogas ilegales y de bebidas alcohólicas en comparación con los hombres

³ Cfr., Cuadros 9 a 12.


Condicionantes de la solicitud de tratamiento. 16.0% de los casos expresó dos o más condicionantes de su solicitud de tratamiento. 41.8% acudió *motu proprio*; 36.1%, por condicionamiento o recomendación familiar; 14.9%, por condicionamiento o recomendación escolar y 13.9%, por condicionamiento legal.

Figura 7. Condicionantes de la solicitud de tratamiento según sexo



Antecedentes de acciones contra el consumo de sustancias. 25.9% de los casos expresó que antes de acudir a CIJ, había intentado interrumpir el consumo de drogas de manera voluntaria pero sin apoyo. 14.5% señaló que previamente había estado internado en algún anexo, mientras que 9.9% había acudido a grupos de autoayuda, 9.3% a tratamiento psiquiátrico o psicoterapéutico y 9.1% había realizado juramentos. A diferencia, 33.5% expresó que hasta el momento de la solicitud de tratamiento no había tomado medida alguna en contra del consumo de sustancias; mientras que 15.0% de los casos reportó haber intentado al menos dos tipos distintos de acciones para abandonar el consumo de drogas.


Figura 8. Antecedentes de acciones contra el consumo de sustancias según sexo



Las mujeres adoptan menos medidas o acciones contra el consumo de sustancias que los hombres

Problemas asociados al consumo de sustancias. 75.6% señaló problemas de tipo familiar; 39.6%, de salud; 36.6%, psicológicos; 33.0%, escolares; 28.2%, legales; 23.9%, laborales; 18.7%, de conducta antisocial o delictiva y 15.1%, accidentes o lesiones. Cabe señalar que 74.7% de los casos mencionó dos o más problemas problema asociado al consumo de sustancias, en tanto que 4.3% no reportó ninguno.

Figura 9. Problemas asociados al consumo de sustancias según sexo





Las mujeres refieren más problemas de tipo escolar y psicológicos que los hombres; mientras que éstos presentan más problemas de tipo legal o laboral

CONSUMO DE DROGAS⁴

Edad de inicio del consumo de sustancias. La edad promedio de inicio del consumo de tabaco se situó en 14.5 años ($\sigma=3.5$ años), la mediana en 14 años y la moda en 15 años; mientras que la edad promedio de inicio del consumo de alcohol se situó en 14.7 años ($\sigma=3.1$ años), la mediana y la moda en 15 años, respectivamente. A diferencia la edad promedio de inicio en el abuso de drogas ilícitas (incluyendo sustancias con utilidad médica utilizadas fuera de prescripción) fue de 16.5 años ($\sigma=5.3$ años), con mediana de 15 años y moda de 14 años. Cabe señalar que considerando el primer decil como indicador de las edades más tempranas reportadas como edad de inicio, puede apreciarse que el consumo de tabaco aparece un año antes (11 años) que el consumo de alcohol y drogas ilícitas (12 años).

⁴ Cfr., Cuadros 13 a 34.

Figura 10. Edad de inicio del consumo de sustancias según sexo


	 Años			 Años			Hombres y mujeres inician el consumo de sustancias casi a la misma edad
	Tabaco	Alcohol	Drogas ilícitas	Tabaco	Alcohol	Drogas ilícitas	
Promedio	14.5	14.8	16.4	14.6	14.6	16.8	
Desviación estándar	3.4	3.0	4.9	3.7	3.7	6.6	
Mediana	14	15	15	14	14	15	
Moda	15	15	15	13	13	14	

Drogas utilizadas en el primer año de consumo. Las sustancias principalmente utilizadas en este periodo fueron tabaco (52.9%) y alcohol (51.1%), seguidas por marihuana (21.5%), inhalables (solventes y removedores: 9.9%, y pegamentos: 2.7%) y cocaína (cocaína en polvo blanco: 4.0% y crack: 2.0%).


Considerando únicamente el consumo de drogas ilícitas, las sustancias más reportadas durante el primer año de consumo ilícito fueron: marihuana (57.0%); inhalables (solventes/removedores: 19.5%, pegamentos: 5.4% y esmaltes y pinturas: 2.7%) y cocaína (cocaína en polvo blanco: 14.4% y crack: 5.9%); en menor proporción se reportó el consumo de depresores (principalmente benzodiacepinas: 2.5%) y metanfetaminas (2.2%).

Figura 11. Principales drogas de inicio del consumo según sexo

Uso de tabaco y alcohol como drogas de inicio





Principales drogas ilícitas consumidas durante el primer año de uso de este tipo de sustancias



Los hombres inician con mayor frecuencia el consumo de drogas ilegales con cannabis y cocaína, mientras que las mujeres lo hacen con cannabis e inhalables


Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de sustancias y el ingreso a tratamiento en CIJ. La media de tiempo transcurrido entre el inicio del uso de sustancias y la solicitud de tratamiento, cuando se trata de tabaco es de 9.6 años ($\sigma=9.9$ años), cuando se trata del uso de alcohol es de 9.5 años ($\sigma=9.6$ años) y de 7.4 años ($\sigma=8.8$ años) para el consumo de drogas ilícitas. Cabe señalar que más del 40% de los usuarios de tabaco, alcohol y drogas ilícitas dejó pasar entre uno y cinco años antes de acudir a solicitar tratamiento.

Figura 12. Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de sustancias y el ingreso a tratamiento en CIJ según sexo

Los hombres dejaron pasar más tiempo que las mujeres para solicitar tratamiento	 Años			 Años		
	Tabaco	Alcohol	Drogas ilícitas	Tabaco	Alcohol	Drogas ilícitas
	Promedio	10.0	9.5	8.0	7.4	7.1
Desviación estándar	9.9	9.6	9.0	9.2	8.8	6.9
Mediana	6	7	4	3	3	2
Moda	1	1	< 1	1	1	< 1

Tipo de consumo de drogas ilícitas. 52.8% de los casos fue diagnosticado con consumo funcional; 18.8%, con consumo disfuncional; 12.8%, con consumo social u ocasional; 11.0%, con consumo experimental y 4.7%, en remisión.

Figura 13. Tipo de consumo de drogas ilícitas según sexo




Las mujeres presentan patrones de consumo menos graves que los hombres

Total de drogas consumidas. El promedio de sustancias utilizadas alguna vez en la vida, incluyendo alcohol y tabaco, fue de 4.3 drogas (95.0% reportó el uso de dos o más sustancias); en el último año fue de 3.2 drogas (86.0% consumió dos o más sustancias)

y en los últimos 30 días fue de 2.2 drogas (66.5% reportó haber utilizado dos o más sustancias).

El promedio de sustancias utilizadas alguna vez en la vida sin incluir alcohol y tabaco, fue de 2.5 drogas (61.3 % reportó el uso de dos o más sustancias); en el último año fue de 1.7 drogas (40.7% consumió dos o más sustancias) y en los últimos 30 días fue de una droga (20.2% reportó haber utilizado dos o más sustancias).

Figura 14. Total de drogas consumidas según sexo



Las mujeres consumen menos drogas que los hombres


Consumo de drogas alguna vez en la vida.⁵ Las proporciones de consumo alguna vez en la vida de los diez grupos de sustancias fueron: alcohol, 88.4%; tabaco, 83.8%; cannabis, 75.2% (75.0% considerando únicamente marihuana); inhalables, 43.8%; cocaína, 48.7%; estimulantes, 19.3%; depresores, 14.9%; drogas alucinógenas y disociativas, 9.9%; opiáceos, 5.2% y otras sustancias de abuso, 2.9%.

En cuanto al uso de sustancias específicas (contenidas en alguno de los diez grupos antes mencionados) destaca el uso cocaína en forma de polvo blanco (39.6%), solventes y removedores (31.8%), crack (24.8%), pegamentos (11.2%), metanfetaminas (11.1%) y benzodiazepinas (10.6%). En menor proporción se registró el uso de éxtasis y metanfetaminas alucinógenas (6.2%), LSD (6.1%), plantas alucinógenas y derivados

⁵ Dado que la mayoría de los casos refirió haber utilizado dos o más sustancias —tanto en esta categoría como en las de uso en el último año y en los últimos 30 días, *infra*— la suma de porcentajes no es igual a 100.

(5.7%), esmaltes y pinturas (4.6%), heroína (4.4%), *Rohypnol*® (3.7%) y anfetamina (3.4%).

Figura 15. Consumo de drogas alguna vez en la vida según sexo




Las drogas más utilizadas alguna vez en la vida por hombres y mujeres fueron alcohol, tabaco, cannabis e inhalables; las mujeres reportan mayor consumo de inhalables y benzodiacepinas que los hombres

Consumo de drogas en los últimos 12 meses. 97.7% de los casos reportó haber consumido alguna sustancia en el año previo a su ingreso a tratamiento en CIJ.

Las proporciones de consumo de los diez grupos de sustancias consumidas en este lapso fueron: alcohol, 77.6%; tabaco, 74.4%; cannabis, 57.2% (57.0% considerando únicamente marihuana); inhalables, 32.1%; cocaína, 31.5%; estimulantes, 12.2%; depresores, 9.1%; drogas alucinógenas y disociativas, 4.8%; opiáceos, 3.4% y otras sustancias de abuso, 1.7%.

En cuanto al consumo de sustancias específicas contenidas en alguno de los grupos anteriores destaca el uso de solventes y removedores (23.5%), cocaína en polvo blanco (21.8%) y crack (16.4%), seguidas por metanfetaminas (7.2%), benzodiacepinas (6.9%), pegamentos (6.8%), éxtasis y metanfetaminas alucinógenas (3.6%), esmaltes y pinturas (3.4%), LSD (3.3%) y heroína (3.0%).


Figura 16. Consumo de drogas en los últimos 12 meses según sexo



Las drogas más consumidas en el último año por hombres y mujeres fueron alcohol, tabaco, cannabis e inhalables; las mujeres reportan mayor consumo de inhalables y benzodicepinas que los hombres

Droga de preferencia en los últimos 12 meses. Entre las sustancias más frecuentemente referidas se encuentran: mariguana (31.6%), alcohol (19.5%) y tabaco (14.4%). En menor medida se mencionaron: solventes y removedores (9.8%), crack (7.3%), cocaína (4.3%), metanfetaminas (2.8%), pegamentos (2.4%) y heroína (2.2%).

Figura 17. Droga de preferencia en los últimos 12 meses según sexo




Durante el último año los hombres prefirieron principalmente la cannabis; las mujeres, los inhalables

Droga de mayor impacto en los últimos 12 meses. Entre las sustancias a cuyo consumo los pacientes atribuyen los mayores daños en la salud, en el bienestar personal y familiar o en el desempeño escolar, laboral o social se señalaron: mariguana


(27.6%), alcohol (17.1%) y solventes y removedores (12.8%). En menor proporción se registró: crack (9.8%), tabaco (8.3%), cocaína (6.0%), metanfetaminas (4.2%) y pegamentos (3.0%).

Figura 18. Droga de mayor impacto en los últimos 12 meses según sexo



Uso combinado de drogas en los últimos 12 meses.⁶ 56.9% de los casos reportó el consumo de dos o más drogas (excluyendo el uso de tabaco) en un mismo día al menos en una ocasión en el transcurso del último año.

Figura 19. Uso combinado de droga en los últimos 12 meses según sexo



Consumo de drogas en los últimos 30 días. 90.6% de los casos reportaron consumo de sustancias en el mes anterior al ingreso a tratamiento.


Las proporciones de consumo de los diez grupos de sustancias consumidas en este lapso fueron: tabaco, 64.2%; alcohol, 56.4%; cannabis, 39.1% (38.9% considerando únicamente marihuana); inhalables, 21.2%; cocaína, 16.9%; estimulantes, 5.7%;

⁶ No se toman en cuenta 3,216 casos (27.4%) que no cumplieron los criterios de inclusión de esta variable; 26.6% de los hombres y 30.5% de las mujeres. (ver anexo).

depresores, 5.0%; opiáceos, 2.6%; drogas alucinógenas y disociativas, 1.3% y otras sustancias de abuso, 0.8%.

En cuanto al consumo de sustancias específicas de estos grupos destaca el uso de solventes/removedores (15.4%), crack (9.5%) y cocaína en polvo blanco (9.4%); en menor proporción se registró el uso de pegamentos (4.0%), benzodiacepinas (3.9%), metanfetaminas (3.6%), heroína (2.3%) y esmaltes y pinturas (2.2%).


Figura 20. Consumo de drogas en los últimos 30 días según sexo



La droga ilícita más utilizada por los hombres en los 30 días previos a la solicitud de tratamiento fue la cannabis; mientras que entre las mujeres fueron los inhalables

Frecuencia de episodios de abuso en los últimos 30 días. 42.1% de quienes reportaron consumo de tabaco en los últimos 30 días aceptó fumar seis o más cigarrillos diariamente. Así mismo, entre quienes consumieron alcohol, una tercera parte (33.9%) reportó consumo abusivo una o dos veces por semana, otra tercera parte (33.4%) abusó del alcohol menos de una vez a la semana. Finalmente, 37.0% de los usuarios de drogas ilícitas durante el último mes reportó consumirlas todos los días, 27.5% menos de una vez a la semana y 22.0% una a dos veces a la semana.

Figura 21. Frecuencia de episodios de abuso en los últimos 30 días según sexo



Los hombres registran con mayor frecuencia episodios de abuso que las mujeres

CUADROS

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS USUARIOS DE DROGAS DE PRIMER INGRESO A TRATAMIENTO EN CIJ EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2010

Cuadro 1. Distribución de casos de primer ingreso a tratamiento por unidad de atención

Unidad de atención	Total de casos	%
Álvaro Obregón Norte	162	1.4
Álvaro Obregón Oriente	61	0.5
Azcapotzalco	278	2.4
Benito Juárez	156	1.3
Coyoacán	197	1.7
Cuajimalpa	85	0.7
Cuauhtémoc Oriente	154	1.3
Cuauhtémoc Poniente	229	2.0
Chalco	198	1.7
Ecatepec	247	2.1
Gustavo A. Madero Aragón	349	3.0
Gustavo A. Madero Norte	197	1.7
Gustavo A. Madero Oriente	56	0.5
Iztapalapa Oriente	603	5.2
Iztapalapa Poniente	202	1.7
Miguel Hidalgo	180	1.5
Naucalpan	195	1.7
Nezahualcóyotl	246	2.1
Tlalnepantla	152	1.3
Tlalpan	191	1.6
Venustiano Carranza	205	1.8
Xochimilco	79	0.7
UH Ecatepec	63	0.5
UH Iztapalapa	102	0.9
Unidad Móvil de tabaco I (PEMEX)	5	0.0
Acapulco	115	1.0
Aguascalientes	105	0.9
Apodaca	34	0.3
Cancún	115	1.0
Cd. del Carmen	46	0.4
Cd. Juárez Norte	124	1.1
Cd. Victoria	28	0.2
Celaya	158	1.4
Chihuahua	189	1.6
Chilpancingo	52	0.4

(Continúa)

Cuadro 1. Distribución de casos de primer ingreso a tratamiento por unidad de atención
(Continuación)

Unidad de atención	Total de casos	%
Colima	155	1.3
Cozumel	95	0.8
Cuernavaca	60	0.5
Culiacán	104	0.9
Culiacán Oriente	7	0.1
Durango	140	1.2
Escuinapa	43	0.4
Fresnillo Pinacoteca	25	0.2
Guadalajara	209	1.8
Guadalajara Sur	86	0.7
Guadalupe	124	1.1
Guamúchil	46	0.4
Guasave	84	0.7
Hermosillo	183	1.6
Ixtapa Zihuatanejo	22	0.2
La Paz	74	0.6
La Piedad	16	0.1
Laguna Coahuila	149	1.3
Laguna Durango	78	0.7
León	214	1.8
Los Cabos	42	0.4
Los Mochis	56	0.5
Manzanillo	51	0.4
Mazatlán	97	0.8
Mérida	95	0.8
Mexicali	167	1.4
Monterrey	100	0.9
Morelia	59	0.5
Nogales	58	0.5
Oaxaca	64	0.5
Pachuca	109	0.9
Playa del Carmen	26	0.2
Poza Rica	26	0.2
Puebla	140	1.2
Puerto Vallarta	76	0.7

(Continúa)

Cuadro 1. Distribución de casos de primer ingreso a tratamiento por unidad de atención
(Continuación)

Unidad de atención	Total de casos	%
Querétaro	144	1.2
Salamanca	98	0.8
Saltillo	167	1.4
San Luis Potosí	120	1.0
San Nicolás de los Garza	107	0.9
Tampico	72	0.6
Tapachula	21	0.2
Tecomán	75	0.6
Tehuacán	28	0.2
Tepic	55	0.5
Texcoco	179	1.5
Tijuana Guaycura	168	1.4
Tijuana Soler	149	1.3
Tlaquepaque	156	1.3
Toluca	226	1.9
Tuxtla Gutiérrez	108	0.9
Villahermosa	56	0.5
Xalapa	75	0.6
Zacatecas	62	0.5
Zamora	74	0.6
Zapopan Kena Moreno	16	0.1
Zapopan Norte	191	1.6
UH Ciudad Juárez (UMAA)	13	0.1
UH Culiacán	46	0.4
UH Ixbalanqué	18	0.2
UH Jerez	106	0.9
UH Monterrey	94	0.8
UH Punta Diamante	86	0.7
UH Tijuana	72	0.6
UH Zapopan	97	0.8
UH Zapotlán el Grande	24	0.2
UTPPCH Cd. Juárez	130	1.1
Total	11,671	100.0

UH=Unidad de Hospitalización

UTPPCH=Unidad de Tratamiento a Personas con Problemas de Consumo de Heroína

UMAA=Unidad Médica de Atención a las Adicciones

Cuadro 2. Sexo

	Frec.	%	Razón H:M
Hombres	9,528	81.6	4.4 : 1
Mujeres	2,143	18.4	
Total	11,671	100.0	

Cuadro 3. Persona que proporciona la información

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Usuario de drogas	5,849	50.1	4,885	51.3	964	45.0
Usuario de drogas y familiares u otras personas	5,822	49.9	4,643	48.7	1,179	55.0
Total	11,671	100.0	9,528	100.0	2,143	100.0

Cuadro 4. Edad de ingreso a tratamiento

	General*			Hombres**			Mujeres***		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Hasta 9 años	3	0.0	0.0	3	0.0	0.0	0	0.0	0.0
10 a 14 años	1,550	13.3	13.4	1,041	10.9	11.0	509	23.8	23.9
15 a 19 años	4,042	34.6	34.8	3,221	33.8	34.0	821	38.3	38.5
20 a 24 años	1,813	15.5	15.6	1,532	16.1	16.2	281	13.1	13.2
25 a 29 años	1,279	11.0	11.0	1,123	11.8	11.9	156	7.3	7.3
30 a 34 años	989	8.5	8.5	869	9.1	9.2	120	5.6	5.6
35 a 39 años	788	6.8	6.8	709	7.4	7.5	79	3.7	3.7
40 a 44 años	506	4.3	4.4	452	4.7	4.8	54	2.5	2.5
45 años y más	639	5.5	5.5	526	5.5	5.6	113	5.3	5.3
<i>Sin información</i>	62	0.5	<i>Se omite</i>	52	0.5	<i>Se omite</i>	10	0.5	<i>Se omite</i>
Total	11,671	100.0	100.0	9,528	100.0	100.0	2,143	100.0	100.0

* $\mu=23.8$; $\sigma=10.4$; Med.=20; Mo.=16; Decil1 =14** $\mu=24.4$; $\sigma=10.4$; Med.=21; Mo.=16; Decil1 =14*** $\mu=21.3$; $\sigma=10.3$; Med.=17; Mo.=14; Decil1 =13

Cuadro 5. Estado civil

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Soltero	7,717	66.1	68.6	6,184	64.9	67.1	1,533	71.5	75.1
Casado	1,333	11.4	11.8	1,210	12.7	13.1	123	5.7	6.0
Unión libre	1,227	10.5	10.9	1,026	10.8	11.1	201	9.4	9.8
Separado	759	6.5	6.7	633	6.6	6.9	126	5.9	6.2
Divorciado	179	1.5	1.6	144	1.5	1.6	35	1.6	1.7
Viudo	38	0.3	0.3	15	0.2	0.2	23	1.1	1.1
<i>Sin información</i>	418	3.6	<i>Se omite</i>	316	3.3	<i>Se omite</i>	102	4.8	<i>Se omite</i>
Total	11,671	100.0	100.0	9,528	100.0	100.0	2,143	100.0	100.0

Cuadro 6. Escolaridad

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Ninguna (no sabe leer ni escribir)	30	0.3	0.3	23	0.2	0.2	7	0.3	0.3
Ninguna (sabe leer y escribir)	37	0.3	0.3	32	0.3	0.3	5	0.2	0.2
Primaria incompleta	443	3.8	3.9	381	4.0	4.1	62	2.9	2.9
Primaria completa	939	8.0	8.2	802	8.4	8.6	137	6.4	6.5
Secundaria incompleta	2,733	23.4	23.8	2,106	22.1	22.5	627	29.3	29.8
Secundaria completa	2,441	20.9	21.3	2,065	21.7	22.0	376	17.5	17.9
Estudios técnicos o comerciales incompletos	162	1.4	1.4	124	1.3	1.3	38	1.8	1.8
Estudios técnicos o comerciales completos	174	1.5	1.5	122	1.3	1.3	52	2.4	2.5
Bachillerato incompleto	2,468	21.1	21.5	2,045	21.5	21.8	423	19.7	20.1
Bachillerato completo	1,112	9.5	9.7	925	9.7	9.9	187	8.7	8.9
Estudios superiores incompletos	547	4.7	4.8	434	4.6	4.6	113	5.3	5.4
Estudios superiores completos	360	3.1	3.1	290	3.0	3.1	70	3.3	3.3
Estudios de posgrado incompletos	11	0.1	0.1	6	0.1	0.1	5	0.2	0.2
Estudios de posgrado completos	24	0.2	0.2	21	0.2	0.2	3	0.1	0.1
<i>Sin información</i>	190	1.6	<i>Se omite</i>	152	1.6	<i>Se omite</i>	38	1.8	<i>Se omite</i>
Total	11,671	100.0	100.0	9,528	100.0	100.0	2,143	100.0	100.0

Cuadro 7. Ocupación

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Desempleado/desocupado	2,859	24.5	24.7	2,444	25.7	25.9	415	19.4	19.5
Hogar	341	2.9	3.0	63	0.7	0.7	278	13.0	13.1
Estudia	3,618	31.0	31.3	2,625	27.6	27.8	993	46.3	46.7
Estudia y trabaja	489	4.2	4.2	428	4.5	4.5	61	2.8	2.9
Trabaja	4,211	36.1	36.5	3,836	40.3	40.7	375	17.5	17.6
Pensionado	34	0.3	0.3	31	0.3	0.3	3	0.1	0.1
Sin información	119	1.0	<i>Se omite</i>	101	1.1	<i>Se omite</i>	18	0.8	<i>Se omite</i>
Total	11,671	100.0	100.0	9,528	100.0	100.0	2,143	100.0	100.0

Cuadro 8. Estrato social

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Alto	79	0.7	0.7	60	0.6	0.7	19	0.9	0.9
Medio alto	1,270	10.9	11.4	1,014	10.6	11.1	256	11.9	12.5
Medio bajo	6,800	58.3	60.9	5,540	58.1	60.7	1,260	58.8	61.6
Bajo	2,893	24.8	25.9	2,406	25.3	26.4	487	22.7	23.8
Pobreza extrema o marginación	128	1.1	1.1	103	1.1	1.1	25	1.2	1.2
Sin información	501	4.3	<i>Se omite</i>	405	4.3	<i>Se omite</i>	96	4.5	<i>Se omite</i>
Total	11,671	100.0	100.0	9,528	100.0	100.0	2,143	100.0	100.0

FACTORES ASOCIADOS A LA DEMANDA DE TRATAMIENTO EN PACIENTES DE PRIMER INGRESO A TRATAMIENTO EN CIJ EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2010

Cuadro 9. Motivos de consulta

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Consumo de drogas ilícitas	9,844	84.3	8,085	84.9	1,759	82.1
Consumo de bebidas alcohólicas	4,908	42.1	4,050	42.5	858	40.0
Consumo de tabaco	4,321	37.0	3,485	36.6	836	39.0
Otro motivo	164	1.4	126	1.3	38	1.8
<i>Ningún motivo específico reportado</i>	<i>252</i>	<i>2.2</i>	<i>199</i>	<i>2.1</i>	<i>53</i>	<i>2.5</i>
<i>Usuarios que reportaron dos o más motivos de consulta</i>	<i>5,015</i>	<i>43.0</i>	<i>4,123</i>	<i>43.3</i>	<i>892</i>	<i>41.6</i>

Cuadro 10. Condicionantes de la solicitud de tratamiento

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Por propia iniciativa	4,882	41.8	3,997	42.0	885	41.3
Por condicionamiento o recomendación familiar	4,219	36.1	3,416	35.9	803	37.5
Por recomendación de pares	241	2.1	189	2.0	52	2.4
Por condicionamiento o recomendación escolar	1,741	14.9	1,286	13.5	455	21.2
Por condicionamiento legal	1,618	13.9	1,471	15.4	147	6.9
Por condicionamiento o recomendación laboral	274	2.3	260	2.7	14	0.7
Por indicación médica	414	3.5	320	3.4	94	4.4
Otros condicionante de solicitud de tratamiento	151	1.3	120	1.3	31	1.4
<i>Ningún condicionante reportado</i>	<i>167</i>	<i>1.4</i>	<i>128</i>	<i>1.3</i>	<i>39</i>	<i>1.8</i>
<i>Pacientes que reportaron dos o más condicionantes de la solicitud de tratamiento</i>	<i>1,862</i>	<i>16.0</i>	<i>1,521</i>	<i>16.0</i>	<i>341</i>	<i>15.9</i>

Cuadro 11. Antecedentes de acciones contra el consumo de sustancias

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Juramento	1,060	9.1	939	9.9	121	5.6
Grupo de autoayuda	1,151	9.9	1,020	10.7	131	6.1
Internamiento en anexo	1,688	14.5	1,509	15.8	179	8.4
Intervención de emergencia	126	1.1	108	1.1	18	0.8
Programa de mantenimiento	87	0.7	78	0.8	9	0.4
Tratamiento médico no especializado	108	0.9	88	0.9	20	0.9
Tratamiento psiquiátrico o psicoterapéutico ambulatorio	797	6.8	665	7.0	132	6.2
Tratamiento psiquiátrico o psicoterapéutico residencial	345	3.0	280	2.9	65	3.0
Medicina tradicional o alternativa	79	0.7	71	0.7	8	0.4
Intento de interrupción voluntaria del consumo, sin apoyo	3,025	25.9	2,527	26.5	498	23.2
Otras acciones	1,698	14.5	1,329	13.9	369	17.2
<i>Ninguna acción previa reportada</i>	<i>3,907</i>	<i>33.5</i>	<i>3,046</i>	<i>32.0</i>	<i>861</i>	<i>40.2</i>
<i>Pacientes que reportaron dos o más acciones contra el consumo de sustancias antes de solicitar tratamiento en CIJ</i>	<i>1,749</i>	<i>15.0</i>	<i>1,537</i>	<i>16.1</i>	<i>212</i>	<i>9.9</i>

Cuadro 12. Problemas asociados al consumo de sustancias

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Problemas de salud	4,616	39.6	3,760	39.5	856	39.9
Accidentes o lesiones	1,766	15.1	1,538	16.1	228	10.6
Problemas familiares	8,828	75.6	7,174	75.3	1,654	77.2
Problemas escolares	3,853	33.0	2,967	31.1	886	41.3
Problemas laborales	2,785	23.9	2,536	26.6	249	11.6
Problemas psicológicos	4,271	36.6	3,391	35.6	880	41.1
Problemas legales	3,292	28.2	3,003	31.5	289	13.5
Conducta antisocial o delictiva	2,186	18.7	1,921	20.2	265	12.4
Otros problemas	453	3.9	370	3.9	83	3.9
<i>Ningún problema asociado reportado</i>	<i>497</i>	<i>4.3</i>	<i>394</i>	<i>4.1</i>	<i>103</i>	<i>4.8</i>
<i>Pacientes que reportaron dos o más problemas asociados</i>	<i>8,714</i>	<i>74.7</i>	<i>7,173</i>	<i>75.3</i>	<i>1,541</i>	<i>71.9</i>

CARACTERÍSTICAS DEL CONSUMO DE DROGAS EN PACIENTES DE PRIMER INGRESO A TRATAMIENTO EN CIJ EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2010

Cuadro 13. Edad de inicio del consumo de Tabaco

	General*			Hombres**			Mujeres***		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Hasta 9 años	377	3.2	3.9	327	3.4	4.1	50	2.3	2.9
10 a 14 años	4,929	42.2	50.6	3,988	41.9	49.7	941	43.9	55.2
15 a 19 años	3,879	33.2	39.8	3,278	34.4	40.8	601	28.0	35.2
20 a 24 años	363	3.1	3.7	291	3.1	3.6	72	3.4	4.2
25 a 29 años	115	1.0	1.2	92	1.0	1.1	23	1.1	1.3
30 a 34 años	45	0.4	0.5	34	0.4	0.4	11	0.5	0.6
35 a 39 años	14	0.1	0.1	11	0.1	0.1	3	0.1	0.2
40 a 44 años	8	0.1	0.1	6	0.1	0.1	2	0.1	0.1
45 años y más	6	0.1	0.1	4	0.0	0.0	2	0.1	0.1
No consumió	1,895	16.2	Se omite	1,465	15.4	Se omite	430	20.1	Se omite
Sin información	40	0.3	Se omite	32	0.3	Se omite	8	0.4	Se omite
Total	11,671	100.0	100.0	9,528	100.0	100.0	2,143	100.0	100.0

* $\mu= 14.5$; $\sigma = 3.5$; Med.=14; Mo.=15; Decil1 =11

** $\mu= 14.5$; $\sigma = 3.4$; Med.=14; Mo.=15; Decil1 =11

*** $\mu= 14.6$; $\sigma = 3.7$; Med.=14; Mo.=13; Decil1 =11

Cuadro 14. Edad de inicio del consumo de Alcohol.

	General*			Hombres**			Mujeres***		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Hasta 9 años	315	2.7	3.1	254	2.7	3.0	61	2.8	3.4
10 a 14 años	4,729	40.5	46.0	3,760	39.5	44.5	969	45.2	53.4
15 a 19 años	4,707	40.3	45.8	4,034	42.3	47.7	673	31.4	37.1
20 a 24 años	387	3.3	3.8	310	3.3	3.7	77	3.6	4.2
25 a 29 años	94	0.8	0.9	72	0.8	0.9	22	1.0	1.2
30 a 34 años	27	0.2	0.3	19	0.2	0.2	8	0.4	0.4
35 a 39 años	5	0.0	0.0	3	0.0	0.0	2	0.1	0.1
40 a 44 años	6	0.1	0.1	4	0.0	0.0	2	0.1	0.1
45 años y más	3	0.0	0.0	1	0.0	0.0	2	0.1	0.1
No consumió	1,349	11.6	Se omite	1,030	10.8	Se omite	319	14.9	Se omite
Sin información	49	0.4	Se omite	41	0.4	Se omite	8	0.4	Se omite
Total	11,671	100.0	100.0	9,528	100.0	100.0	2,143	100.0	100.0

* $\mu= 14.7$; $\sigma = 3.1$; Med.=15; Mo.=15; Decil1 =12

** $\mu= 14.8$; $\sigma = 3.0$; Med.=15; Mo.=15; Decil1 =12

*** $\mu= 14.6$; $\sigma = 3.7$; Med.=14; Mo.=13; Decil1 =12

Cuadro 15. Edad de inicio del consumo de Drogas ilícitas.

	General*			Hombres**			Mujeres***		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Hasta 9 años	138	1.2	1.2	127	1.3	1.3	11	0.5	0.5
10 a 14 años	4,334	37.1	37.3	3,377	35.4	35.5	957	44.7	44.9
15 a 19 años	5,435	46.6	46.7	4,616	48.4	48.6	819	38.2	38.5
20 a 24 años	921	7.9	7.9	759	8.0	8.0	162	7.6	7.6
25 a 29 años	398	3.4	3.4	331	3.5	3.5	67	3.1	3.1
30 a 34 años	203	1.7	1.7	157	1.6	1.7	46	2.1	2.2
35 a 39 años	94	0.8	0.8	73	0.8	0.8	21	1.0	1.0
40 a 44 años	58	0.5	0.5	40	0.4	0.4	18	0.8	0.8
45 años y más	52	0.4	0.4	23	0.2	0.2	29	1.4	1.4
<i>Sin información</i>	38	0.3	<i>Se omite</i>	25	0.3	<i>Se omite</i>	13	0.6	<i>Se omite</i>
Total	11,671	100.0	100.0	9,528	100.0	100.0	2,143	100.0	100.0

* $\mu = 16.5$; $\sigma = 5.3$; Med.=15; Mo.=15; Decil1 =12

** $\mu = 16.4$; $\sigma = 4.9$; Med.=15; Mo.=15; Decil1 =12

*** $\mu = 16.8$; $\sigma = 6.6$; Med.=15; Mo.=14; Decil1 =12

Cuadro 16. Drogas utilizadas durante el primer año de consumo

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Tabaco	6,178	52.9	5,141	54.0	1,037	48.4
Alcohol	5,969	51.1	4,801	50.4	1,168	54.5
Cannabis	2,514	21.5	2,186	22.9	328	15.3
Mariguana	2,506	21.5	2,179	22.9	327	15.3
Hachís	27	0.2	24	0.3	3	0.1
Cocaína	602	5.2	502	5.3	100	4.7
Polvo blanco	462	4.0	379	4.0	83	3.9
Crack	230	2.0	197	2.1	33	1.5
Otra presentación	3	0.0	2	0.0	1	0.0
Inhalables	1,597	13.7	1,183	12.4	414	19.3
Solventes o removedores	1,155	9.9	846	8.9	309	14.4
Pegamentos	312	2.7	244	2.6	68	3.2
Esmaltes o pinturas	162	1.4	118	1.2	44	2.1
Otros	67	0.6	53	0.6	14	0.7
Depresores	197	1.7	124	1.3	73	3.4
Benzodiacepinas	136	1.2	76	0.8	60	2.8
Rohypnol®	33	0.3	27	0.3	6	0.3
Otros	34	0.3	25	0.3	9	0.4
Estimulantes	173	1.5	134	1.4	39	1.8
Anfetamina	51	0.4	42	0.4	9	0.4
Metanfetaminas	80	0.7	65	0.7	15	0.7
Éxtasis (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas	37	0.3	22	0.2	15	0.7
Otros	14	0.1	12	0.1	2	0.1
Drogas alucinógenas y disociativas	45	0.4	34	0.4	11	0.5
LSD	23	0.2	17	0.2	6	0.3
Plantas alucinógenas y derivados	21	0.2	16	0.2	5	0.2
Otras	2	0.0	2	0.0		
Opiáceos	27	0.2	24	0.3	3	0.1
Heroína	19	0.2	18	0.2	1	0.0
Opiáceos Sintéticos	3	0.0	1	0.0	2	0.1
Opio y otros opiáceos	5	0.0	5	0.1		
Otras sustancias de abuso	29	0.2	12	0.1	17	0.8
Con utilidad médica	19	0.2	6	0.1	13	0.6
Otras	12	0.1	7	0.1	5	0.2
Sin Información*	945	8.1	785	8.2	160	7.5

* Pertencen a los formatos de entrevista inicial del expediente clínico electrónico.

Cuadro 17. Drogas ilícitas utilizadas durante el primer año de consumo de este tipo de sustancias

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Cannabis	6,652	57.0	5,675	59.6	977	45.6
Mariguana	6,631	56.8	5,657	59.4	974	45.5
Hachís	71	0.6	64	0.7	7	0.3
Cocaína	2,172	18.6	1,811	19.0	361	16.8
Polvo blanco	1,678	14.4	1,382	14.5	296	13.8
Crack	689	5.9	584	6.1	105	4.9
Otra presentación	7	0.1	4	0.0	3	0.1
Inhalables	3,115	26.7	2,330	24.5	785	36.6
Solventes o removedores	2,271	19.5	1,703	17.9	568	26.5
Pegamentos	626	5.4	489	5.1	137	6.4
Esmaltes o pinturas	314	2.7	227	2.4	87	4.1
Otros	140	1.2	105	1.1	35	1.6
Depresores	393	3.4	247	2.6	146	6.8
Benzodiazepinas	286	2.5	170	1.8	116	5.4
Rohypnol®	73	0.6	62	0.7	11	0.5
Otros	56	0.5	32	0.3	24	1.1
Estimulantes	571	4.9	431	4.5	140	6.5
Anfetamina	155	1.3	130	1.4	25	1.2
Metanfetaminas	260	2.2	195	2.0	65	3.0
Éxtasis (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas	128	1.1	82	0.9	46	2.1
Otros	52	0.4	43	0.5	9	0.4
Drogas alucinógenas y disociativas	149	1.3	120	1.3	29	1.4
LSD	80	0.7	65	0.7	15	0.7
Plantas alucinógenas y derivados	70	0.6	56	0.6	14	0.7
Otras	8	0.1	6	0.1	2	0.1
Opiáceos	55	0.5	44	0.5	11	0.5
Heroína	38	0.3	30	0.3	8	0.4
Opiáceos Sintéticos	10	0.1	8	0.1	2	0.1
Opio y otros opiáceos	7	0.1	6	0.1	1	0.0
Otras sustancias de abuso	82	0.7	42	0.4	40	1.9
Con utilidad médica	48	0.4	21	0.2	27	1.3
Otras	35	0.3	21	0.2	14	0.7
Sin Información*	947	8.1	784	8.2	163	7.6

* Pertencen a los formatos de entrevista inicial del expediente clínico electrónico.

Cuadro 18. Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de Tabaco y el ingreso a tratamiento en CIJ

	General*			Hombres**			Mujeres***		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
< de un año	664	5.7	6.9	468	4.9	5.9	196	9.1	11.6
1 a 5 años	4,040	34.6	41.7	3,194	33.5	40.0	846	39.5	49.9
6 a 10 años	1,623	13.9	16.8	1,367	14.3	17.1	256	11.9	15.1
11 a 15 años	1,121	9.6	11.6	980	10.3	12.3	141	6.6	8.3
16 a 20 años	837	7.2	8.6	756	7.9	9.5	81	3.8	4.8
21 a 25 años	558	4.8	5.8	510	5.4	6.4	48	2.2	2.8
26 o más años	843	7.2	8.7	715	7.5	8.9	128	6.0	7.5
No consumió	1,895	16.2	Se omite	1,465	15.4	Se omite	430	20.1	Se omite
Sin información	90	0.8	Se omite	73	0.8	Se omite	17	0.8	Se omite
Total	11,671	100.0	100.0	9,528	100.0	100.0	2,143	100.0	100.0

* $\mu=9.6$; $\sigma=9.9$; Med.=6; Mo.=1; Decil1 =1

** $\mu=10.0$; $\sigma=9.9$; Med.=6; Mo.=1; Decil1 =1

*** $\mu=7.4$; $\sigma=9.2$; Med.=3; Mo.=1; Decil1 = < un año

Cuadro 19. Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de Alcohol y el ingreso a tratamiento en CIJ

	General*			Hombres**			Mujeres***		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
< de un año	667	5.7	6.5	483	5.1	5.7	184	8.6	10.2
1 a 5 años	4,263	36.5	41.7	3,316	34.8	39.4	947	44.2	52.3
6 a 10 años	1,744	14.9	17.1	1,472	15.4	17.5	272	12.7	15.0
11 a 15 años	1,178	10.1	11.5	1,023	10.7	12.2	155	7.2	8.6
16 a 20 años	921	7.9	9.0	837	8.8	9.9	84	3.9	4.6
21 a 25 años	611	5.2	6.0	553	5.8	6.6	58	2.7	3.2
26 o más años	839	7.2	8.2	730	7.7	8.7	109	5.1	6.0
No consumió	1,349	11.6	Se omite	1,030	10.8	Se omite	319	14.9	Se omite
Sin información	99	0.8	Se omite	84	0.9	Se omite	15	0.7	Se omite
Total	11,671	100.0	100.0	9,528	100.0	100.0	2,143	100.0	100.0

* $\mu=9.5$; $\sigma=9.6$; Med.=5; Mo.=1; Decil1 =1

** $\mu=10.1$; $\sigma=9.7$; Med.=7; Mo.=1; Decil1 =1

*** $\mu=7.1$; $\sigma=8.8$; Med.=3; Mo.=1; Decil1 = < un año

Cuadro 20. Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de Drogas ilícitas y el ingreso a tratamiento en CIJ

	General*			Hombres**			Mujeres***		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
< de un año	1,989	17.0	17.2	1,386	14.5	14.7	603	28.1	28.5
1 a 5 años	4,794	41.1	41.4	3,807	40.0	40.3	987	46.1	46.6
6 a 10 años	1,726	14.8	14.9	1,489	15.6	15.8	237	11.1	11.2
11 a 15 años	1,183	10.1	10.2	1,054	11.1	11.2	129	6.0	6.1
16 a 20 años	743	6.4	6.4	679	7.1	7.2	64	3.0	3.0
21 a 25 años	511	4.4	4.4	465	4.9	4.9	46	2.1	2.2
26 o más años	622	5.3	5.4	569	6.0	6.0	53	2.5	2.5
<i>Sin información</i>	103	0.9	<i>Se omite</i>	79	0.8	<i>Se omite</i>	24	1.1	<i>Se omite</i>
Total	11,671	100.0	100.0	9,528	100.0	100.0	2,143	100.0	100.0

* $\mu= 7.4$; $\sigma = 8.8$; Med.=4; Mo.= < un año ; Decil1 =< un año
 ** $\mu= 8.0$; $\sigma = 9.0$; Med.=4; Mo.= < un año ; Decil1 =< un año
 *** $\mu= 4.5$; $\sigma = 6.9$; Med.=2; Mo.= < un año ; Decil1 =< un año

Cuadro 21. Tipo de consumo de drogas ilícitas

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Experimental	1,230	10.5	11.0	841	8.8	9.2	389	18.2	19.2
Social u ocasional	1,436	12.3	12.8	1,065	11.2	11.6	371	17.3	18.3
Funcional	5,909	50.6	52.8	4,997	52.4	54.5	912	42.6	44.9
Disfuncional	2,101	18.0	18.8	1,810	19.0	19.7	291	13.6	14.3
En remisión	524	4.5	4.7	458	4.8	5.0	66	3.1	3.3
<i>Sin información</i>	471	4.0	<i>Se omite</i>	357	3.7	<i>Se omite</i>	114	5.3	<i>Se omite</i>
Total	11,671	100.0	100.0	9,528	100.0	100.0	2,143	100.0	100.0

**Cuadro 22. Total de drogas consumidas alguna vez en la vida.
(Incluye el consumo de tabaco o alcohol)**

	General*		Hombres**		Mujeres***	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
1 sustancia	580	5.0	418	4.4	162	7.6
2 sustancias	1,107	9.5	842	8.8	265	12.4
3 sustancias	3,320	28.4	2,603	27.3	717	33.5
4 sustancias	2,473	21.2	2,056	21.6	417	19.5
5 sustancias	1,652	14.2	1,403	14.7	249	11.6
6 sustancias	1,030	8.8	888	9.3	142	6.6
7 sustancias	640	5.5	551	5.8	89	4.2
8 sustancias	385	3.3	342	3.6	43	2.0
9 sustancias	214	1.8	189	2.0	25	1.2
10 sustancias	133	1.1	113	1.2	20	0.9
11 -18 sustancias	137	1.2	123	1.3	14	0.5
Total	11,671	100.0	9,528	100.0	2,143	100.0

* $\mu = 4.3$; $\sigma = 2.1$; Med.=4; Mo.=3; Decil1 =2

** $\mu = 4.3$; $\sigma = 2.1$; Med.=4; Mo.=3; Decil1 =2

*** $\mu = 3.8$; $\sigma = 1.9$; Med.=3; Mo.=3; Decil1 =2

**Cuadro 23. Total de drogas ilícitas consumidas alguna vez en la vida
(No incluye el consumo de tabaco o alcohol)**

	General*		Hombres**		Mujeres***	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
1 sustancia	4,512	38.7	3,456	36.3	1,056	49.3
2 sustancias	2,729	23.4	2,267	23.8	462	21.6
3 sustancias	1,764	15.1	1,489	15.6	275	12.8
4 sustancias	1,101	9.4	946	9.9	155	7.2
5 sustancias	665	5.7	574	6.0	91	4.2
6 sustancias	401	3.4	359	3.8	42	2.0
7 sustancias	223	1.9	196	2.1	27	1.3
8 sustancias	134	1.1	115	1.2	19	0.9
9 sustancias	57	0.5	49	0.5	8	0.4
10 sustancias	46	0.4	41	0.4	5	0.2
11-16 sustancias	39	0.3	36	0.4	3	0.1
Total	11,671	100.0	9,528	100.0	2,143	100.0

* $\mu = 2.5$; $\sigma = 1.9$; Med.=2; Mo.=1; Decil1 =1

** $\mu = 2.6$; $\sigma = 1.9$; Med.=2; Mo.=1; Decil1 =1

*** $\mu = 2.2$; $\sigma = 1.6$; Med.=2; Mo.=1; Decil1 =1

Cuadro 24. Consumo de drogas alguna vez en la vida por sustancia

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Tabaco	9,776	83.8	8,063	84.6	1,713	79.9
Alcohol	10,321	88.4	8,498	89.2	1,823	85.1
Cannabis	8,782	75.2	7,496	78.7	1,286	60.0
Mariguana	8,750	75.0	7,468	78.4	1,282	59.8
Hachís	280	2.4	246	2.6	34	1.6
Cocaína	5,689	48.7	4,932	51.8	757	35.3
Polvo blanco	4,623	39.6	3,982	41.8	641	29.9
Crack	2,893	24.8	2,583	27.1	310	14.5
Otra presentación	76	0.7	64	0.7	12	0.6
Inhalables	5,115	43.8	4,085	42.9	1,030	48.1
Solventes o removedores	3,711	31.8	2,977	31.2	734	34.3
Pegamentos	1,303	11.2	1,096	11.5	207	9.7
Esmaltes o pinturas	538	4.6	413	4.3	125	5.8
Otros	324	2.8	254	2.7	70	3.3
Depresores	1,739	14.9	1,404	14.7	335	15.6
Benzodiacepinas	1,236	10.6	971	10.2	265	12.4
<i>Rohypnol</i> [®]	437	3.7	401	4.2	36	1.7
Otros	263	2.3	208	2.2	55	2.6
Estimulantes	2,256	19.3	1,831	19.2	425	19.8
Anfetamina	395	3.4	321	3.4	74	3.5
Metanfetaminas	1,296	11.1	1,072	11.3	224	10.5
Éxtasis (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas	718	6.2	548	5.8	170	7.9
Otros	151	1.3	133	1.4	18	0.8
Drogas alucinógenas y disociativas	1,159	9.9	983	10.3	176	8.2
LSD	707	6.1	594	6.2	113	5.3
Plantas alucinógenas y derivados	667	5.7	583	6.1	84	3.9
Otras	112	1.0	100	1.0	12	0.6
Opiáceos	603	5.2	536	5.6	67	3.1
Heroína	514	4.4	460	4.8	54	2.5
Opiáceos Sintéticos	49	0.4	45	0.5	4	0.2
Opio y otros opiáceos	83	0.7	72	0.8	11	0.5
Otras sustancias de abuso	335	2.9	241	2.5	94	4.4
Con utilidad médica	151	1.3	100	1.0	51	2.4
Otras	193	1.7	147	1.5	46	2.1

**Cuadro 25. Total de drogas consumidas en el último año
(Incluye el consumo de tabaco o alcohol)**

	General*		Hombres**		Mujeres***	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Ninguna	268	2.3	208	2.2	60	2.8
1 sustancia	1,364	11.7	1,057	11.1	307	14.3
2 sustancias	2,432	20.8	1,953	20.5	479	22.4
3 sustancias	3,571	30.6	2,924	30.7	647	30.2
4 sustancias	2,026	17.4	1,702	17.9	324	15.1
5 sustancias	974	8.3	811	8.5	163	7.6
6 sustancias	488	4.2	411	4.3	77	3.6
7 sustancias	283	2.4	241	2.5	42	2.0
8 sustancias	142	1.2	123	1.3	19	0.9
9 sustancias	53	0.5	41	0.4	12	0.6
10 sustancias	45	0.4	35	0.4	10	0.5
11-14 sustancias	25	0.2	22	0.2	3	0.1
Total	11,671	100.0	9,528	100.0	2,143	100.0

* $\mu= 3.2$; $\sigma = 1.7$; Med.=3; Mo.=3; Decil1 =1

** $\mu= 3.2$; $\sigma = 1.7$; Med.=3; Mo.=3; Decil1 =1

*** $\mu= 3.0$; $\sigma = 1.7$; Med.=3; Mo.=3; Decil1 =1

**Cuadro 26. Total de drogas ilícitas consumidas en el último año
(No incluye el consumo de tabaco o alcohol)**

	General*		Hombres**		Mujeres***	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Ninguna	1,527	13.1	1,235	13.0	292	13.6
1 sustancia	5,392	46.2	4,303	45.2	1,089	50.8
2 sustancias	2,474	21.2	2,081	21.8	393	18.3
3 sustancias	1,143	9.8	954	10.0	189	8.8
4 sustancias	554	4.7	463	4.9	91	4.2
5 sustancias	287	2.5	246	2.6	41	1.9
6 sustancias	162	1.4	140	1.5	22	1.0
7 sustancias	58	0.5	45	0.5	13	0.6
8 sustancias	45	0.4	38	0.4	7	0.3
9 sustancias	17	0.1	14	0.1	3	0.1
10 sustancias	9	0.1	6	0.1	3	0.1
11-12 sustancias	3	0.0	3	0.0	0	0.0
Total	11,671	100.0	9,528	100.0	2,143	100.0

* $\mu= 1.7$; $\sigma = 1.4$; Med.=1; Mo.=1; Decil1 =ninguna

** $\mu= 1.7$; $\sigma = 1.4$; Med.=1; Mo.=1; Decil1 =ninguna

*** $\mu= 1.6$; $\sigma = 1.4$; Med.=1; Mo.=1; Decil1 =ninguna

Cuadro 27. Consumo de drogas en los últimos 12 meses por sustancia

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Tabaco	8,679	74.4	7,153	75.1	1,526	71.2
Alcohol	9,061	77.6	7,466	78.4	1,595	74.4
Cannabis	6,677	57.2	5,694	59.8	983	45.9
Mariguana	6,656	57.0	5,675	59.6	981	45.8
Hachís	159	1.4	138	1.4	21	1.0
Cocaína	3,682	31.5	3,190	33.5	492	23.0
Polvo blanco	2,550	21.8	2,175	22.8	375	17.5
Crack	1,912	16.4	1,706	17.9	206	9.6
Otra presentación	40	0.3	33	0.3	7	0.3
Inhalables	3,748	32.1	2,882	30.2	866	40.4
Solventes o removedores	2,742	23.5	2,120	22.3	622	29.0
Pegamentos	790	6.8	637	6.7	153	7.1
Esmaltes o pinturas	398	3.4	291	3.1	107	5.0
Otros	208	1.8	159	1.7	49	2.3
Depresores	1,065	9.1	811	8.5	254	11.9
Benzodiacepinas	802	6.9	599	6.3	203	9.5
Rohypnol®	176	1.5	156	1.6	20	0.9
Otros	170	1.5	127	1.3	43	2.0
Estimulantes	1,423	12.2	1,130	11.9	293	13.7
Anfetamina	212	1.8	170	1.8	42	2.0
Metanfetaminas	841	7.2	684	7.2	157	7.3
Éxtasis (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas	422	3.6	308	3.2	114	5.3
Otros	67	0.6	58	0.6	9	0.4
Drogas alucinógenas y disociativas	566	4.8	461	4.8	105	4.9
LSD	381	3.3	309	3.2	72	3.4
Plantas alucinógenas y derivados	244	2.1	202	2.1	42	2.0
Otras	40	0.3	34	0.4	6	0.3
Opiáceos	400	3.4	351	3.7	49	2.3
Heroína	353	3.0	312	3.3	41	1.9
Opiáceos Sintéticos	31	0.3	28	0.3	3	0.1
Opio y Otros opiáceos	32	0.3	26	0.3	6	0.3
Otras sustancias de abuso	202	1.7	136	1.4	66	3.1
Con utilidad médica	99	0.8	61	0.6	38	1.8
Otras	110	0.9	80	0.8	30	1.4

Cuadro 28. Droga de preferencia en los últimos 12 meses, según menciones*

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Tabaco	1,341	11.5	14.4	1,047	11.0	13.7	294	13.7	17.9
Alcohol	1,814	15.5	19.5	1,489	15.6	19.4	325	15.2	19.8
Cannabis	2,939	25.2	31.6	2,641	27.7	34.5	298	13.9	18.2
Marihuana	2,938	25.2	31.6	2,641	27.7	34.5	297	13.9	18.1
Hachís	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1	0.0	0.1
Cocaína	1,074	9.2	11.6	929	9.7	12.1	145	6.8	8.8
Polvo blanco	397	3.4	4.3	326	3.4	4.3	71	3.3	4.3
Crack	675	5.8	7.3	601	6.3	7.8	74	3.5	4.5
Otra presentación	2	0.0	0.0	2	0.0	0.0	0	0.0	0.0
Inhalables	1,365	11.7	14.6	972	10.3	12.6	393	18.3	23.9
Solventes o removedores	909	7.8	9.8	654	6.9	8.5	255	11.9	15.5
Pegamentos	225	1.9	2.4	160	1.7	2.1	65	3.0	4.0
Esmaltes o pinturas	107	0.9	1.1	72	0.8	0.9	35	1.6	2.1
Otros	124	1.1	1.3	86	0.9	1.1	38	1.8	2.3
Depresores	140	1.2	1.5	82	0.9	1.0	58	2.7	3.5
Benzodiacepinas	109	0.9	1.2	62	0.7	0.8	47	2.2	2.9
Rohypnol®	13	0.1	0.1	9	0.1	0.1	4	0.2	0.2
Otros	18	0.2	0.2	11	0.1	0.1	7	0.3	0.4
Estimulantes	344	2.9	3.7	263	2.8	3.4	81	3.7	5.0
Anfetamina	33	0.3	0.4	30	0.3	0.4	3	0.1	0.2
Metanfetaminas	259	2.2	2.8	197	2.1	2.6	62	2.9	3.8
Éxtasis (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas	39	0.3	0.4	26	0.3	0.3	13	0.6	0.8
Otros	13	0.1	0.1	10	0.1	0.1	3	0.1	0.2
Drogas alucinógenas y disociativas	42	0.4	0.5	28	0.3	0.4	14	0.7	0.8
LSD	34	0.3	0.4	22	0.2	0.3	12	0.6	0.7
Plantas alucinógenas y derivados	8	0.1	0.1	6	0.1	0.1	2	0.1	0.1
Otras	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
Opiáceos	230	2.0	2.5	203	2.2	2.6	27	1.2	1.7
Heroína	203	1.7	2.2	180	1.9	2.3	23	1.1	1.4
Opiáceos Sintéticos	20	0.2	0.2	17	0.2	0.2	3	0.1	0.2
Opio y Otros opiáceos	7	0.1	0.1	6	0.1	0.1	1	0.0	0.1
Otras sustancias de abuso	17	0.1	0.2	8	0.1	0.1	9	0.4	0.6
Con utilidad médica	14	0.1	0.2	6	0.1	0.1	8	0.4	0.5
Otras	3	0.0	0.0	2	0.0	0.0	1	0.0	0.1
<i>No aplica</i>	268	2.3	<i>Se omite</i>	208	2.2	<i>Se omite</i>	60	2.8	<i>Se omite</i>
<i>Sin Información*</i>	2,097	18.0	<i>Se omite</i>	1,658	17.4	<i>Se omite</i>	439	20.5	<i>Se omite</i>
Total	11,671	100.0	100.0	9,528	100.0	100.0	2,143	100.0	100.0

* 1,943 casos pertenecen a los formatos de entrevista inicial que no registran esta variable (1,549 formatos de los hombres y 394 de las mujeres).

Cuadro 29. Droga de mayor impacto en los últimos 12 meses, según menciones*

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Tabaco	764	6.5	8.3	591	6.2	7.8	173	8.1	10.6
Alcohol	1,582	13.6	17.1	1,304	13.7	17.1	278	13.0	17.0
Cannabis	2,561	21.9	27.6	2,268	23.8	29.7	293	13.7	17.9
Marihuana	2,558	21.9	27.6	2,265	23.8	29.7	293	13.7	17.9
Hachís	3	0.0	0.0	3	0.0	0.0	0	0.0	0.0
Cocaína	1,464	12.6	15.8	1,279	13.4	16.7	185	8.6	11.3
Polvo blanco	555	4.8	6.0	467	4.9	6.1	88	4.1	5.4
Crack	907	7.8	9.8	810	8.5	10.6	97	4.5	5.9
Otra presentación	2	0.0	0.0	2	0.0	0.0	0	0.0	0.0
Inhalables	1,803	15.4	19.4	1,336	14.1	17.6	467	21.8	28.6
Solventes o removedores	1,184	10.1	12.8	893	9.4	11.7	291	13.6	17.8
Pegamentos	282	2.4	3.0	211	2.2	2.8	71	3.3	4.3
Esmaltes o pinturas	167	1.4	1.8	112	1.2	1.5	55	2.6	3.4
Otros	170	1.5	1.8	120	1.3	1.6	50	2.3	3.1
Depresores	201	1.7	2.2	119	1.2	1.6	82	3.8	5.1
Benzodiacepinas	154	1.3	1.7	89	0.9	1.2	65	3.0	4.0
Rohypnol®	24	0.2	0.3	18	0.2	0.2	6	0.3	0.4
Otros	23	0.2	0.2	12	0.1	0.2	11	0.5	0.7
Estimulantes	527	4.4	5.8	425	4.5	5.6	102	4.8	6.2
Anfetamina	62	0.5	0.7	54	0.6	0.7	8	0.4	0.5
Metanfetaminas	386	3.3	4.2	312	3.3	4.1	74	3.5	4.5
Éxtasis (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas	63	0.5	0.7	46	0.5	0.6	17	0.8	1.0
Otros	16	0.1	0.2	13	0.1	0.2	3	0.1	0.2
Drogas alucinógenas y disociativas	77	0.7	0.8	59	0.6	0.7	18	0.8	1.1
LSD	55	0.5	0.6	40	0.4	0.5	15	0.7	0.9
Plantas alucinógenas y derivados	19	0.2	0.2	16	0.2	0.2	3	0.1	0.2
Otras	3	0.0	0.0	3	0.0	0.0	0	0.0	0.0
Opiáceos	253	2.2	2.7	222	2.3	2.9	31	1.4	1.9
Heroína	222	1.9	2.4	195	2.0	2.6	27	1.3	1.6
Opiáceos Sintéticos	22	0.2	0.2	19	0.2	0.2	3	0.1	0.2
Opio y Otros opiáceos	9	0.1	0.1	8	0.1	0.1	1	0.0	0.1
Otras sustancias de abuso	21	0.2	0.3	11	0.2	0.2	10	0.4	0.6
Con utilidad médica	15	0.1	0.2	6	0.1	0.1	9	0.4	0.5
Otras	6	0.1	0.1	5	0.1	0.1	1	0.0	0.1
<i>No aplica</i>	268	2.3	<i>Se omite</i>	208	2.2	<i>Se omite</i>	60	2.8	<i>Se omite</i>
<i>Sin Información</i>	2,150	18.4	<i>Se omite</i>	1,706	17.9	<i>Se omite</i>	444	20.7	<i>Se omite</i>
Total	11,671	100.0	100.0	9,528	100.0	100.0	2,143	100.0	100.0

* 1,980 casos pertenecen a los formatos de entrevista inicial que no registran esta variable (1,578 formatos de los hombres y 402 de las mujeres).

**Cuadro 30. Uso combinado de drogas en los últimos 12 meses
(No incluye tabaco)**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Si combinó drogas	4,911	42.1	56.9	4,158	43.6	58.3	753	35.1	50.1
No combinó drogas	3,726	31.9	43.1	2,977	31.2	41.7	749	35.0	49.9
<i>No aplica</i>	<i>3,034</i>	<i>26.0</i>	<i>Se omite</i>	<i>2,393</i>	<i>25.1</i>	<i>Se omite</i>	<i>641</i>	<i>29.9</i>	<i>Se omite</i>
Total	11,671	100.0	100.0	9,528	100.0	100.0	2,143	100.0	100.0

**Cuadro 31. Total de drogas consumidas en los últimos 30 días
(Incluye el consumo de tabaco o alcohol)**

	General*		Hombres**		Mujeres***	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Ninguna	1,097	9.4	857	9.0	240	11.2
1 sustancia	2,816	24.1	2,208	23.2	608	28.4
2 sustancias	3,312	28.4	2,713	28.5	599	28.0
3 sustancias	2,780	23.8	2,349	24.7	431	20.1
4 sustancias	1,087	9.3	920	9.7	167	7.8
5 sustancias	363	3.1	308	3.2	55	2.6
6 sustancias	130	1.1	105	1.1	25	1.2
7 sustancias	52	0.4	40	0.4	12	0.6
8 sustancias	24	0.2	21	0.2	3	0.1
9 sustancias	6	0.1	4	0.0	2	0.1
10 sustancias	4	0.0	3	0.0	1	0.0
Total	11,671	100.0	9,528	100.0	2,143	100.0

* $\mu=2.2$; $\sigma=1.4$; Med.=2; Mo.=2; Decil1 =1

** $\mu=2.2$; $\sigma=1.4$; Med.=2; Mo.=2; Decil1 =1

*** $\mu=2.0$; $\sigma=1.4$; Med.=2; Mo.=1; Decil1 =ninguna

**Cuadro 32. Total de drogas ilícitas consumidas en los últimos 30 días
(No incluye el consumo de tabaco o alcohol)**

	General*		Hombres**		Mujeres***	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Ninguna	3,893	33.4	3,131	32.9	762	35.6
1 sustancia	5,418	46.4	4,405	46.2	1,013	47.3
2 sustancias	1,623	13.9	1,388	14.6	235	11.0
3 sustancias	467	4.0	387	4.1	80	3.7
4 sustancias	171	1.5	139	1.5	32	1.5
5 sustancias	60	0.5	46	0.5	14	0.7
6 sustancias	28	0.2	25	0.3	3	0.1
7 sustancias	6	0.1	4	0.0	2	0.1
8 sustancias	5	0.0	3	0.0	2	0.1
Total	11,671	100.0	9,528	100.0	2,143	100.0

* $\mu = 1.0$; $\sigma = 1.0$; Med.=1; Mo.=1; Decil1 =ninguna

** $\mu = 1.0$; $\sigma = 1.0$; Med.=1; Mo.=1; Decil1 =ninguna

*** $\mu = 0.9$; $\sigma = 1.0$; Med.=1; Mo.=1; Decil1 =ninguna

Cuadro 33. Consumo de drogas en los últimos 30 días por sustancia

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Tabaco	7,493	64.2	6,213	65.2	1,280	59.7
Alcohol	6,581	56.4	5,502	57.7	1,079	50.3
Cannabis	4,559	39.1	3,971	41.7	588	27.4
Mariguana	4,538	38.9	3,953	41.5	585	27.3
Hachís	68	0.6	56	0.6	12	0.6
Cocaína	1,975	16.9	1,727	18.1	248	11.6
Polvo blanco	1,095	9.4	930	9.8	165	7.7
Crack	1,110	9.5	998	10.5	112	5.2
Otra presentación	15	0.1	12	0.1	3	0.1
Inhalables	2,480	21.2	1,866	19.6	614	28.7
Solventes o removedores	1,799	15.4	1,355	14.2	444	20.7
Pegamentos	467	4.0	367	3.9	100	4.7
Esmaltes o pinturas	253	2.2	181	1.9	72	3.4
Otros	96	0.8	73	0.8	23	1.1
Depresores	584	5.0	411	4.3	173	8.1
Benzodiazepinas	459	3.9	320	3.4	139	6.5
Rohypnol®	68	0.6	56	0.6	12	0.6
Otros	85	0.7	58	0.6	27	1.3
Estimulantes	663	5.7	501	5.3	162	7.6
Anfetamina	84	0.7	60	0.6	24	1.1
Metanfetaminas	424	3.6	334	3.5	90	4.2
Éxtasis (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas	150	1.3	99	1.0	51	2.4
Otros	33	0.3	28	0.3	5	0.2
Drogas alucinógenas y disociativas	151	1.3	116	1.2	35	1.6
LSD	99	0.8	76	0.8	23	1.1
Plantas alucinógenas y derivados	48	0.4	38	0.4	10	0.5
Otras	12	0.1	10	0.1	2	0.1
Opiáceos	300	2.6	266	2.8	34	1.6
Heroína	270	2.3	241	2.5	29	1.4
Opiáceos Sintéticos	24	0.2	22	0.2	2	0.1
Opio y Otros opiáceos	11	0.1	8	0.1	3	0.1
Otras sustancias de abuso	89	0.8	54	0.6	35	1.6
Con utilidad médica	51	0.4	30	0.3	21	1.0
Otras	40	0.3	25	0.3	15	0.7

Cuadro 34. Frecuencia de episodios de abuso del consumo de Tabaco¹ en los últimos 30 días

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Ni una vez	2,196	18.8	29.9	1,793	18.8	29.5	403	18.8	32.1
< de 1 vez a la semana	767	6.6	10.5	614	6.4	10.1	153	7.1	12.2
1 o 2 veces a la semana	808	6.9	11.0	670	7.0	11.0	138	6.4	11.0
Cada tercer día	478	4.1	6.5	402	4.2	6.6	76	3.5	6.1
Diario	3,088	26.5	42.1	2,604	27.3	42.8	484	22.6	38.6
<i>No consumió en los últimos 30 días</i>	4,178	35.8	<i>Se omite</i>	3,315	34.8	<i>Se omite</i>	863	40.3	<i>Se omite</i>
<i>Sin información</i>	156	1.3	<i>Se omite</i>	130	1.4	<i>Se omite</i>	26	1.2	<i>Se omite</i>
Total	11,671	100.0	100.0	9,528	100.0	100.0	2,143	100.0	100.0

¹ Consumo de seis o más cigarrillos en un solo día.

Cuadro 35. Frecuencia de episodios de abuso del consumo de Alcohol¹ en los últimos 30 días

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Ni una vez	1,040	8.9	16.2	814	8.5	15.2	226	10.5	21.4
< de 1 vez a la semana	2,149	18.4	33.4	1,770	18.6	32.9	379	17.7	35.9
1 o 2 veces a la semana	2,178	18.7	33.9	1,882	19.8	35.0	296	13.8	28.1
Cada tercer día	559	4.8	8.7	464	4.9	8.6	95	4.4	9.0
Diario	501	4.3	7.8	442	4.6	8.2	59	2.8	5.6
<i>No consumió en los últimos 30 días</i>	5,090	43.6	<i>Se omite</i>	4,026	42.3	<i>Se omite</i>	1,064	49.7	<i>Se omite</i>
<i>Sin información</i>	154	1.3	<i>Se omite</i>	130	1.4	<i>Se omite</i>	24	1.1	<i>Se omite</i>
Total	11,671	100.0	100.0	9,528	100.0	100.0	2,143	100.0	100.0

¹ Consumo de más de cuatro copas en un día para los hombres y de más de tres copas en un día para las mujeres.

Cuadro 36. Frecuencia de episodios de abuso del consumo de drogas ilícitas¹ en los últimos 30 días

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
< de 1 vez a la semana	1,704	14.6	27.5	1,307	13.7	25.4	397	18.5	37.6
1 o 2 veces a la semana	1,364	11.7	22.0	1,140	12.0	22.1	224	10.5	21.2
Cada tercer día	840	7.2	13.5	705	7.4	13.7	135	6.3	12.8
Diario	2,298	19.7	37.0	1,999	21.0	38.8	299	14.0	28.3
<i>No consumió en los últimos 30 días</i>	3,893	33.4	<i>Se omite</i>	3,131	32.9	<i>Se omite</i>	762	35.6	<i>Se omite</i>
<i>Sin información</i>	1,572	13.5	<i>Se omite</i>	1,246	13.1	<i>Se omite</i>	326	15.2	<i>Se omite</i>
Total	11,671	100.0	100.0	9,528	100.0	100.0	2,143	100.0	100.0

¹ Consumo de cualquier dosis.

GLOSARIO

A continuación se definen algunas de las variables de estudio:

Drogas utilizadas durante el primer año de consumo: Sustancias que el usuario refirió haber utilizado a la misma edad reportada como edad de inicio del consumo. Incluye el uso de tabaco, alcohol, cannabis. etc.

Drogas ilícitas utilizadas durante el primer año de consumo ilícito: Drogas ilegales que el usuario refirió haber utilizado a la misma edad reportada como edad de inicio del consumo de este tipo de sustancias. Excluye el uso de tabaco y alcohol.

Droga de mayor impacto en los últimos 12 meses: Sustancia que el propio usuario de drogas solicitante de tratamiento refiere como la que más problemas le ha ocasionado en los ámbitos de salud, personal, familiar, escolar, laboral o social, en el transcurso del último año.

Droga de preferencia en los últimos 12 meses: Sustancia que el propio usuario solicitante de tratamiento ha elegido o preferido consumir en el transcurso del último año.

Estrato social: Estimación que hace el terapeuta, según su percepción, del estrato al que pertenece el usuario de drogas, considerando aspectos como lugar de residencia, escolaridad, empleo y características manifiestas como higiene y aliño, calidad del vestido, expresión verbal y vocabulario, etc.

Tipo de consumo de drogas ilícitas: Características de consumo de sustancias ilegales según motivo, frecuencia y problemas asociados. No incluye el uso de alcohol y/o tabaco y se clasifica como: experimental, social u ocasional, funcional, disfuncional y en remisión.

Total de drogas consumidas: Número de drogas consumidas (se incluyen las 26 sustancias de seguimiento) en las siguientes categorías: alguna vez en la vida, en el último año y en los últimos 30 días.

Uso combinado de drogas en los últimos 12 meses: Consumo de dos o más sustancias (incluyendo alcohol y cualquier droga ilícita o de uso médico, utilizada sin prescripción, pero excluyendo tabaco) en el transcurso de un mismo día, en el año previo a la solicitud de tratamiento en CIJ.