

---

**CONSUMO DE DROGAS EN PACIENTES DE PRIMER INGRESO A  
TRATAMIENTO A CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL  
JULIO - DICIEMBRE, 2011**

---

Valeriano Raúl García Aurrecoechea

Centros de Integración Juvenil  
Dirección de Investigación y Enseñanza  
Subdirección de Investigación  
Depto. de Investigación Clínica y Epidemiológica  
México, 2012

---

**Informe de Investigación 12-08a**

## **DIRECTORIO**

### **PRESIDENTE HONORARIO VITALICIO DEL PATRONATO NACIONAL**

Dr. Jesús Kumate Rodríguez

### **PRESIDENTE DEL PATRONATO NACIONAL**

Dr. Roberto Tapia Conyer

### **PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA**

Sra. Kena Moreno

### **DIRECTORA GENERAL**

Lic. Carmen Fernández Cáceres

### **DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE NORMATIVIDAD**

Dr. José Ángel Prado García

### **DIRECTORA GENERAL ADJUNTA DE OPERACIÓN Y PATRONATOS**

Mtra. Ana Villasuso Escartín

### **DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA**

Dr. Ricardo Sánchez Huesca

### **SUBDIRECTOR DE INVESTIGACIÓN**

Mtro. David Bruno Díaz Negrete

### **JEFA DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA Y EPIDEMIOLÓGICA**

Dra. Solveig E. Rodríguez Kuri

Se agradece el apoyo de Fabiola Jiménez Lechuga en la revisión de este informe.

## CONTENIDO

ANTECEDENTES.....	5
MÉTODO.....	7
CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS.....	9
FACTORES ASOCIADOS A LA DEMANDA DE TRATAMIENTO.....	14
CONSUMO DE DROGAS.....	18
REFERENCIAS.....	28
CUADROS.....	33
GLOSARIO.....	57

## ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro 1. Pacientes de primer ingreso a tratamiento por unidad de atención (CIJ)	34
Cuadro 2. Sexo	37
Cuadro 3. Persona que proporciona la información	37
Cuadro 4. Edad de ingreso a tratamiento	37
Cuadro 5. Estado civil	38
Cuadro 6. Escolaridad	38
Cuadro 7. Ocupación	39
Cuadro 8. Estrato social	39
Cuadro 9. Motivos de consulta	40
Cuadro 10. Condicionantes de la solicitud de tratamiento	40
Cuadro 11. Antecedentes de acciones contra el consumo de sustancias	41
Cuadro 12. Problemas asociados al consumo de sustancias	41
Cuadro 13. Edad de inicio del consumo de Tabaco	42
Cuadro 14. Edad de inicio del consumo de Alcohol	42
Cuadro 15. Edad de inicio del consumo de Drogas ilícitas	43
Cuadro 16. Drogas ilícitas de inicio	44
Cuadro 17. Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de Tabaco y el ingreso a tratamiento a CIJ	45
Cuadro 18. Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de Alcohol y el ingreso a tratamiento a CIJ	45
Cuadro 19. Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de Drogas ilícitas y el ingreso a tratamiento a CIJ	46
Cuadro 20. Tipo de consumo de drogas ilícitas	46
Cuadro 21. Total de drogas consumidas alguna vez en la vida (incluye alcohol o tabaco)	47
Cuadro 22. Total de drogas ilícitas consumidas alguna vez en la vida (no incluye ni alcohol ni tabaco)	47
Cuadro 23. Consumo de drogas alguna vez en la vida por sustancia	48
Cuadro 24. Total de drogas consumidas en el último año (incluye alcohol o tabaco)	49
Cuadro 25. Total de drogas ilícitas consumidas en el último año (no incluye ni alcohol ni tabaco)	49
Cuadro 26. Consumo de drogas en los últimos 12 meses por sustancia	50
Cuadro 27. Droga de preferencia en los últimos 12 meses, según menciones	51
Cuadro 28. Droga de mayor impacto en los últimos 12 meses, según menciones	52
Cuadro 29. Uso combinado de drogas en los últimos 12 meses (no incluye tabaco)	53
Cuadro 30. Total de drogas consumidas en los últimos 30 días (incluye alcohol o tabaco)	53
Cuadro 31. Total de drogas ilícitas consumidas en los últimos 30 días (no incluye alcohol ni tabaco)	54
Cuadro 32. Consumo de drogas en los últimos 30 días por sustancia	55
Cuadro 33. Frecuencia de episodios de abuso del consumo de Tabaco en los últimos 30 días	56
Cuadro 34. Frecuencia de episodios de abuso del consumo de Alcohol en los últimos 30 días	56
Cuadro 35. Frecuencia de episodios de abuso del consumo de drogas ilícitas en los últimos 30 días	56

## RESUMEN

El informe se realizó con base en 11,958 registros clínicos de entrevista inicial de personas usuarias de sustancias psicoactivas que reportaron consumo de al menos una droga ilícita y que acudieron por primera vez a consulta a Centros de Integración Juvenil entre julio y diciembre de 2011. Los propósitos del estudio son a) actualizar la información del perfil sociodemográfico de pacientes, de los factores asociados a la demanda de tratamiento y del patrón de consumo de sustancias; b) contribuir a retroalimentar sistemas nacionales de información del consumo de drogas en nuestro país; c) aportar bases para fundamentar estudios que involucren a pacientes o consumidores(as) de drogas en México y sus regiones; y d) sobre todo contribuir al desarrollo, diseño y ajuste de los servicios institucionales de prevención y tratamiento del consumo de drogas.

Los datos permiten ver que el uso de drogas ilícitas es aún un trastorno que afecta en mayor proporción a la población masculina que solicita tratamiento, en una proporción de 4.6 hombres por cada mujer. La edad media de ingreso a tratamiento fue de 23.3 años, En promedio, los hombres ingresan a tratamiento a una edad mayor que las mujeres (23.7 años hombres y 21.4 años mujeres). La edad promedio del inicio del consumo de tabaco se situó en general en los 14.5 años, la de alcohol en 14.6 años y la de drogas ilícitas en 16.3 años. En promedio, tanto los hombres como las mujeres inician el consumo de estas drogas a la misma edad.

Las drogas de mayor consumo alguna vez en la vida fueron alcohol (89.4%), tabaco (85.6%), *cannabis* (78.5%), inhalables (43.1%), cocaína/*crack* (46.1%), depresores (15%), drogas alucinógenas y disociativas (10%) y opiáceos (4.1%). En cuanto al consumo en el mes previo al ingreso a tratamiento, las sustancias más utilizadas fueron tabaco (64.9%), alcohol (58%), *cannabis* (42.1%), inhalables (20.1%) y cocaína/*crack* (15.9%). Las sustancias de mayor impacto fueron marihuana (32.1%), alcohol (16.1%), solventes y removedores (14.5%), *crack* (8.2%), tabaco (8.2%) y cocaína en polvo (5.2%).

En cuanto a los factores asociados a la demanda de tratamiento se observó que los usuarios de drogas acudieron principalmente por condicionamiento o recomendación familiar (43.1%) o por iniciativa propia (40.6%); que buscan atención por el consumo de drogas ilícitas (84.1%), por alcohol (45.4%) y por tabaco (38.7%); que no han tomado ninguna medida contra el problema (24.6%) o que han intentado interrumpir de manera voluntaria y sin apoyo el consumo (30.3%); y que entre los problemas más frecuentemente asociados al consumo se reconocen los de tipo familiar (80.2%), los de salud (43.7%), los psicológicos (39.9%) y los escolares (33.9%).

Cabe destacar que se observan diferencias entre los hombres y mujeres atendidos en cuanto a sus características sociodemográficas, los factores asociados a la demanda de tratamiento y su patrón de consumo.

## ANTECEDENTES

Centros de Integración Juvenil ha reportado información de los pacientes atendidos y su consumo de drogas desde 1976<sup>1</sup> y en 1983 inicia la aplicación de una cédula homogénea a los pacientes de nuevo ingreso<sup>2</sup>, aunque no es sino a partir de 1990 que lleva a cabo el reporte estadístico de datos en forma sistemática y se consolida como *Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas (SIECD)*<sup>3</sup>, con lo cual a lo largo de los años ha podido realizar el seguimiento oportuno de un conjunto de variables que, además de haber contribuido en la toma de decisiones del diseño y ajuste de servicios institucionales, también ha aportado conocimiento de la forma y tendencias del uso de drogas en nuestro país, proporcionando a los Sistemas Epidemiológicos de las Adicciones, tanto a nivel Nacional como Regional, tal es el caso del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA)<sup>4</sup> de la Secretaría de Salud, y desde 1993, ha proporcionado información al Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas (SRID), perteneciente al Instituto Nacional de Psiquiatría "*Ramón de la Fuente*" (INP)<sup>5</sup>, así como al Observatorio Epidemiológico en Drogas de la Secretaría de Salud<sup>6</sup>. En este sentido, es pertinente resaltar que en los primeros años del milenio, se colaboró en un proyecto multinacional en conjunto con otras instituciones, tales como la Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC), el Instituto Nacional de Psiquiatría "*Ramón de la Fuente Muñiz*", el SISVEA de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI) de la Procuraduría General de la República, en colaboración también con representantes de instituciones de otros países americanos, entre los que se encontraron Barbados, Chile, Costa Rica y Uruguay, coordinados por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas CICAD (2004), con lo cual se elaboró un informe que sistematizó la información aportada por la institución<sup>7</sup>.

El SIECD también ha ofrecido información para el desarrollo de diferentes estudios epidemiológicos especializados, con temas que van desde el perfil de usuarios de drogas y su trayectoria de consumo<sup>8</sup>, el consumo de drogas en las mujeres<sup>9</sup>, en la población infantil<sup>10</sup> ó de acuerdo con las etapas de la vida<sup>11</sup>, hasta llegar a los estudios de tendencias, que en su momento monitorearon la epidemia -a nivel nacional- del consumo de cocaína y la emergencia regional del abuso de metanfetaminas en la década de los 90<sup>12</sup>, así como la posterior epidemia del nocivo consumo del *crack*, la cual se logró estabilizar hasta la primera década del Siglo XXI<sup>13,14</sup>. Toda esta información ha facilitado el enfrentamiento oportuno de las problemáticas generadas

por el creciente consumo de estimulantes y simultáneamente ha impulsado el desarrollo de estudios sobre las características particulares de los consumidores de estos alcaloides<sup>15,16,17,18</sup>, entre los cuales se logró identificar en particular la presencia de la violencia, tanto en los antecedentes familiares, en su situación actual de vida, como ejerciéndola principalmente en forma delincuencial, aunque también en forma de violencia relacional como respuesta adaptativa a su medio<sup>19,20</sup>.

Asimismo, el análisis de la información reportada dio pie al desarrollo de estudios epidemiológicos particulares, enfocados en profundizar en las características del consumo de drogas legales de pacientes atendidos, por lo que en 2003 se identificó la necesidad de valorar más a fondo el patrón de consumo de alcohol<sup>21</sup>, lo que en forma oportuna precedió a la incorporación del programa de tratamiento cognitivo conductual para bebedores problema<sup>22</sup>, diseñado originalmente por la UNAM, así como la apertura institucional al tratamiento de usuarios de ésta y otras drogas lícitas aun sin consumo de drogas ilegales, por lo que a partir de 2006, el SIECD se avocó a reportar por separado las características de este tipo de consumidores(as)<sup>23</sup>, con lo cual recientemente se ha logrado identificar una emergencia epidemiológica del consumo de alcohol entre las pacientes atendidas con relación a los años anteriores<sup>24</sup>, emergencia que también ha sido reportada por la Encuesta Nacional de Adicciones (ENA), sobre todo para el caso de las mujeres jóvenes<sup>34</sup> y ha dado pie a CIJ para profundizar en esta problemática<sup>25</sup>.

Por otra parte, con el apoyo de algunos de estos estudios ha sido posible la validación y el desarrollo de escalas de riesgo y protección del consumo de drogas en la población atendida, tanto para los y las adolescentes<sup>26</sup> como para adultos jóvenes<sup>27,28</sup>. Además, se ha logrado el desarrollo de modelos estadísticos que articulan de manera compleja conjuntos de variables con el fin de explicar la conducta adictiva y sus trastornos asociados en la población adolescente<sup>29,30,31</sup> y en la de adultos jóvenes<sup>32,33</sup>.

Adicionalmente, es importante destacar que la información reportada por el SIECD durante el lapso de más de dos décadas ha sido consistente con la de las Encuestas Nacionales de Adicciones (ENA) de este periodo, ya sea en el nivel nacional o en el regional<sup>34</sup> y también que ha sido referente para el desarrollo de metodologías de investigación en variados estudios clínicos, psicosociales y evaluativos de la Institución, como es el caso de diversos *Estudios de la Comunidad Objetivo* (EBCO)<sup>35</sup> realizados por los CIJ a lo largo y ancho del país.

El presente informe se elaboró con base en la información obtenida por el SIECD de Centros de Integración Juvenil (CIJ) y tiene el objetivo de proporcionar datos

actualizados sobre las características sociodemográficas, factores asociados a la demanda de tratamiento y del patrón de consumo de drogas de la población usuaria de los servicios de tratamiento institucionales, con el propósito adicional de apoyar el diseño, planeación y ajuste de los programas institucionales de prevención, tratamiento y rehabilitación, además de contribuir con información a los sistemas de información en drogas de los Gobiernos y de aportar elementos para la elaboración de investigaciones en el campo de las adicciones.

## MÉTODO

**Diseño de estudio:** Censo, estudio transversal, descriptivo.

**Población:** 11,958 pacientes procedentes de 106 unidades de CIJ que acudieron por primera vez a consulta entre julio y diciembre de 2011, proporcionaron personalmente la información, reportaron el consumo voluntario de sustancias psicoactivas y tuvieron respuesta a las variables sexo y persona que proporciona la información (cuadro 1. Anexo).

**Fuente de información:** formatos de Entrevista Inicial (en alguno de los dos diferentes ejemplares utilizados durante el periodo que comprende el estudio y que forman parte del expediente clínico), aplicados en la primera consulta por parte del personal médico-técnico responsable del ingreso de pacientes a tratamiento, la gran mayoría (10,577 casos) fueron captados por medio de la entrevista inicial electrónica, sumadas a otro tanto que se transcribió en los CIJ a cédulas impresas y se mandó a capturar en forma externa (1,350 cédulas) y un adicional de 31 formatos impresos que se capturaron en forma interna por el Área de Investigación.

**Variables de estudio:** Las características sociodemográficas estudiadas comprenden: asistentes a la entrevista, sexo, edad de ingreso a tratamiento, estado civil, escolaridad, ocupación y estrato social; las variables de los factores asociados a la demanda de tratamiento: motivo(s) de consulta, condicionante(s) de la solicitud de tratamiento, antecedente(s) de acciones tomadas frente al uso de sustancias y problema(s) asociado(s) al mismo; y las variables de patrón de consumo: edad de inicio, tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de sustancias y el ingreso a tratamiento, consumo alguna vez en la vida, en el último año y en los últimos 30 días; drogas de preferencia y de mayor impacto en el último año, uso combinado de sustancias, tipo de consumo de drogas ilícitas, episodios de abuso y total de drogas consumidas.

La información sobre el consumo de drogas se presenta categorizada en diez grupos de sustancias: tabaco, alcohol, cannabis, cocaína, inhalables, depresores, estimulantes, drogas alucinógenas y disociativas, opiáceos y otras sustancias de abuso.

Asimismo, también se desagregan los diez grupos antes mencionados en 26 categorías de sustancias: tabaco; alcohol; *Cannabis*: marihuana y hachís; Cocaína: cocaína en polvo blanco, *crack* y otras presentaciones de cocaína; Inhalables: solventes y removedores, pegamentos, esmaltes y pinturas y otros inhalables; Depresores: benzodiazepinas, *Rohypnol* y otros depresores; Estimulantes: anfetaminas, metanfetaminas (*crystal, ICE, etc.*), MDMA (éxtasis) y metanfetaminas alucinógenas y otros estimulantes; Drogas alucinógenas y disociativas: ácido lisérgico (LSD), plantas alucinógenas y derivados y otras; Opiáceos: heroína, opiáceos sintéticos, y opio y otros opioides; Otras sustancias de abuso: sustancias con utilidad médica y otras.

**Procesamiento de datos.** La información obtenida a través del expediente clínico electrónico fue capturada por los y las terapeutas responsables de realizar la entrevista inicial, mientras que la información recabada a través del formato físico de Entrevista Inicial fue capturada por profesionales externos y en menor medida por personal de servicio social de la Institución mediante el programa *Control de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas* (CIECD). Para el procesamiento estadístico se utilizó el programa SPSS v.15.

Los resultados se presentan tanto en forma general como desglosada por sexo y en porcentajes válidos, excluyendo casos “*sin información*”, así como aquellos que no cumplieron con las condiciones requeridas para el análisis en cada variable de estudio.

## CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS<sup>a</sup>

**Sexo.** La población se conformó por cerca de diez mil hombres (9,828) y más de dos mil mujeres (2,130) lo que en porcentajes representa a un ochenta por ciento de hombres (82.2%) y veinte por ciento de mujeres (17.8%), dando una proporción aproximada de cinco hombres (4.6) por cada mujer.

**Persona que proporciona la información.** Casi la mitad de las ocasiones (46.7%) los y las pacientes acudieron solas (47.3% de los hombres y 43.8% de las mujeres), mientras que en la otra mitad (53.3%) lo hicieron en compañía de familiares u otras personas (52.7% de los hombres y 56.2% de las mujeres).

**Edad de ingreso a tratamiento.** Se observa un rango de edad de 7 a 68 años, con un promedio de 23 años ( $\mu= 23.3$ ), correspondiente a la de una persona adulta-joven, se podría decir *en la flor de la juventud*, deseablemente todavía en las etapas finales de su periodo educativo universitario, tal vez formando una familia y en los albores de su ingreso a la vida económicamente activa, sin embargo se observan diferencias estadísticamente significativas en los promedios de edad de ingreso por sexo, lo cual de inicio marca una diferencia de género importante al ser una variable de las llamadas *duras*, dada su consistencia, dado que es de las pocas variables en psicología que cuentan con una escala de razón que incluye a un cero absoluto, de manera que con su crecimiento afecta significativamente el sentido de de otras variables, como puede ser el nivel educativo y el estado civil, entre otras (histograma 1).


La desviación estándar es de diez años ( $\sigma=10.2$ ), lo cual implica que más del ochenta por ciento (84.7%) de las personas atendidas (9,988) se ubique entre los 13 y los 34 años de edad; la mediana de la población fue de 19 años, lo que conduce a precisar que sólo el 40% de los casos fueron menores de edad, sobre todo púberes y adolescentes entre 12 y 17 años (4,728 pacientes), mientras la mayoría fueron adultos (60%), sobre todo 4,444 adultos jóvenes menores de 30 años (37.1%), con un grupo importante de 1,648 treintañeros(as) (13.7%) y otro de 1,096 adultos maduros entre 40 y 59 años (8.8%); y se destaca también que la moda se ubica en 17 años (1,126 personas atendidas) aunque en empate estadístico con los 16 años (1,124 personas), conformando entre ambas edades casi el veinte por ciento de la población (19.1%), (histograma 1).

---

<sup>a</sup> Cfr., Cuadros 1 a 8.

Se destaca que en promedio las consumidoras de drogas solicitan tratamiento a menor edad (21.3 años) mientras que los usuarios lo hacen posteriormente (23.8 años) (figura 1).


**Histograma 1. Frecuencia de edades de ingreso**



En el cuadro 4 (anexo) se puede identificar como el intervalo de 15 a 19 años de edad cubre, si no toda, gran parte de las y los pacientes atendidos (39.1%), lo que en términos de frecuencias representa a casi cinco mil adolescentes y post-adolescentes (4,671).

Asimismo, llama la atención que entre los sexos se presenta una diferencia particular en las medianas de edad de ingreso, puesto que para la mujer, ésta se presenta aún en la adolescencia, mientras que para los hombres se ubica en los inicios de la etapa adulta de la vida (figura 1). Se destaca que aunque la moda de edad de ingreso de la mujer es a los 15 años, los 14 y 16 años presentan también altas frecuencias y suman entre las tres edades más del 30% de la población femenina atendida.

**Figura 1. Edad de ingreso según sexo**




**Las mujeres ingresan a tratamiento a menor edad**

	<b>Años</b>	<b>Años</b>
<b>Media</b>	23.7	21.2
<b>Desviación estándar</b>	10.2	9.7
<b>Mediana</b>	20	17
<b>Moda</b>	17	15


**Estado civil.** La mayor parte de la población refirió ser soltera (70%), mientras que un 22% indicó que vivía en unión libre o que estaba casada, con ligeras diferencias entre los sexos.

**Figura 2. Estado civil según sexo**


**Un mayor porcentaje de hombres cuenta con una relación de pareja**



**Escolaridad.** 44.3% cursaba o había cursado algún grado de educación secundaria, 32.5% al menos algún grado de bachillerato, 11.7% al menos un año de educación primaria y 8% uno o más años de estudios superiores.




**Ocupación.** 35.9% desempeñaba alguna actividad laboral, 30.7% estudiaba y 24.6% se encontraba desempleado.



**Mientras que un mayor porcentaje de mujeres se dedicaba a estudiar o a las labores del hogar; una mayor proporción de hombres trabajaba o no contaba con ocupación alguna**

**Estrato social.** Según la percepción de los terapeutas 58.7% de los pacientes correspondieron al estrato medio bajo, 29.5%, al estrato bajo y 10%, al estrato medio alto.


Según la percepción de los terapeutas tanto hombres como mujeres presentan condiciones sociales similares



## FACTORES ASOCIADOS A LA DEMANDA DE TRATAMIENTO<sup>b</sup>

**Motivos de consulta.** 46.7% de las personas atendidas reportó más de un motivo para acudir a tratamiento (uso de alcohol, tabaco o drogas), mientras que 2% no expresó ninguno. Conviene señalar que 84.1% acudió por consumo de drogas ilícitas, 45.4% por uso de bebidas alcohólicas y 38.7% por uso de tabaco.

Figura 6. Motivos de consulta según sexo




Un porcentaje un poco menor de mujeres demanda tratamiento por consumo de drogas ilegales, aunque es similar por bebidas alcohólicas y tabaco en comparación con los hombres

<sup>b</sup> Cfr., Cuadros 9 a 12.


**Condicionantes de la solicitud de tratamiento.** 19.7% de los casos expresó dos o más condicionantes de su solicitud de tratamiento, 43.1% acudió por condicionamiento o recomendación familiar, 40.6% por *motu proprio*, 13.7% por condicionamiento o recomendación escolar y 11.8% por condicionamiento legal.

**Figura 7. Condicionantes de la solicitud de tratamiento según sexo**



**Antecedentes de acciones contra el consumo de sustancias.** 30.3% de los y las pacientes expresó que antes de acudir a CIJ había intentado interrumpir el consumo de manera voluntaria pero sin apoyo, 25.5% lo había hecho por medio de juramento, 14.7% señaló que previamente había estado internado en algún anexo, mientras que 9.2% había acudido a grupos de autoayuda, 4.9% acudió a algún tipo de tratamiento psiquiátrico o psicoterapéutico y 24.6% reportó haber intentado al menos dos tipos distintos de acciones para abandonar el consumo de estupefacientes. A diferencia, 24.6% expresó que hasta el momento de la solicitud de tratamiento no había tomado ninguna medida en contra del consumo de drogas.


**Figura 8. Antecedentes de acciones contra el consumo de sustancias según sexo**



**Las pacientes adoptan menos medidas o acciones contra el consumo de sustancias que los pacientes antes de solicitar tratamiento a CIJ**

**Problemas asociados al consumo de sustancias.** La mayor parte (80.2%) señaló problemas de tipo familiar, 43.7% de salud, 39.9% psicológicos, 33.9% escolares, 25.8% legales, 23.3% laborales, 18.9% de conducta antisocial o delictiva y 14.4% accidentes o lesiones. Cabe señalar que 78% de las personas atendidas mencionaron dos o más problemas asociados al consumo de sustancias, en tanto que 2.9% no reportó ninguno.

**Figura 9. Problemas asociados al consumo de sustancias según sexo**



Las mujeres presentan en mayor proporción problemas psicológicos y escolares, mientras que los hombres de tipo legal, laboral y de conducta antisocial

## CONSUMO DE DROGAS<sup>c</sup>

**Edad de inicio del consumo de sustancias.** La edad promedio de inicio del consumo de tabaco se situó en 14.5 años ( $\sigma=3$  años), la mediana en 14 y la moda en 15, mientras que la edad promedio de inicio del consumo de alcohol se ubicó en 14.6 años ( $\sigma=3$  años) y tanto la mediana como la moda se situaron en los 15 años. A diferencia la edad promedio de inicio en el abuso de drogas ilícitas (incluyendo sustancias con utilidad médica utilizadas fuera de prescripción) fue de 16.3 años ( $\sigma=5.2$  años), con mediana y moda de 15 años. Por otra parte, al considerar el primer decil como indicador de las edades de inicio más tempranas, se observa que el consumo de tabaco y alcohol aparece a los 11 años mientras que el de drogas ilícitas lo hace un año después.


**Figura 10. Edad de inicio del consumo de sustancias según sexo**

	 Años			 Años			Tanto Hombres como mujeres inician el consumo de sustancias a edades similares
	Tabaco	Alcohol	Drogas ilícitas	Tabaco	Alcohol	Drogas ilícitas	
<b>Promedio</b>	14.4	14.6	16.3	14.5	14.4	16.6	
<b>Desviación estándar</b>	3.3	2.9	5	3.9	3.5	6.1	
<b>Mediana</b>	14	15	15	14	14	15	
<b>Moda</b>	15	15	15	13	15	14	

<sup>c</sup> Cfr., Cuadros 13 a 34.

**Drogas ilícitas de inicio.** Las sustancias de inicio más reportadas fueron en primer lugar la *cannabis* (63.1%), sobre todo en forma de marihuana y sólo 0.1% de hachís; en segundo lugar los inhalables (19.4%), la mayor parte en forma de solventes y removedores (14.5%); en tercer puesto se ubica la cocaína (11.8%), tanto en forma de polvo blanco (8.5%) o como piedras de *crack* (3.3%); en cuarto lugar aparecen los estimulantes (2.7%), entre los cuales se destacan las anfetaminas y las metanfetaminas, ambas con 1%, pero con diferencias al interior de los sexos, pues resulta mayor la proporción de las primeras entre los hombres y de las segundas entre las mujeres; en quinto lugar se ubican los depresores con utilidad médica (2.3%); y en sexto puesto los opiáceos (0.6%), sobre todo en el caso de la heroína, la cual como droga de inicio, alcanza en general un medio por ciento en la población atendida.

**Figura 11. Principales drogas ilícitas de inicio según sexo**



**Es mayor la proporción de hombres que inician el consumo de drogas con *cannabis* y *crack*, mientras que entre las mujeres es mayor con inhalables, depresores y metanfetaminas**

## Lapso transcurrido entre el inicio del consumo de sustancias y el ingreso a tratamiento en CIJ.

En general crecieron las medias promedio de tiempo del inicio de consumo y la solicitud de tratamiento, la de tabaco a 9.1 años ( $\sigma=9.8$  años), la de alcohol a 9 ( $\sigma=9.2$  años) y la de drogas ilícitas a 7 ( $\sigma=8.7$  años), también cabe señalar que el 50% de los usuarios de alcohol y tabaco dejó pasar entre uno y cinco años antes de acudir a solicitar tratamiento, mientras que para el caso de las drogas ilícitas fue entre uno y tres años.


**Figura 12. Lapso transcurrido entre el inicio del consumo de sustancias y el ingreso a tratamiento en CIJ según sexo**




	Años			Años		
	Tabaco	Alcohol	Drogas ilícitas	Tabaco	Alcohol	Drogas ilícitas
<b>Promedio</b>	9.5	9.5	7.5	7.1	6.9	4.7
<b>Desviación estándar</b>	9.9	9.7	8.9	8.9	8.4	7.2
<b>Mediana</b>	6	6	4	4	3	2
<b>Moda</b>	1	1	1	1	1	< 1 año

**Las mujeres solicitan tratamiento en forma más oportuna**

**Tipo de consumo de drogas ilícitas.** 54.1% de los y las solicitantes de tratamiento fue diagnosticado con consumo funcional, 19.9% con consumo disfuncional, 13.6% con consumo social u ocasional, 8.5% con consumo experimental y 3.9% en remisión.




**Las mujeres presentan patrones de consumo menos graves que los hombres**

**Total de drogas consumidas.** El promedio de sustancias utilizadas alguna vez en la vida, incluyendo alcohol o tabaco, fue de 4.3 drogas (95.4% reportó el uso de dos o más sustancias); en el último año fue de 3.2 drogas (86.6% consumió dos o más sustancias); y en los últimos 30 días fue de 2.2 drogas (68.3% reportó haber utilizado dos o más sustancias).

El promedio de sustancias utilizadas alguna vez en la vida, sin incluir alcohol y tabaco, fue de 2.5 drogas (61.5 % reportó el uso de dos o más sustancias); en el último año fue de 1.7 drogas (41.2% consumió dos o más sustancias); y en los últimos 30 días fue de una droga (20.6% reportó haber utilizado dos o más sustancias).


**Figura 14. Total de drogas consumidas según sexo**



**Las mujeres consumen menos drogas que los hombres**

**Consumo de drogas alguna vez en la vida.**<sup>d</sup> Las proporciones de consumo alguna vez en la vida de los diez grupos de sustancias fueron: alcohol (89.4%), tabaco (85.6%); *cannabis* (78.5%), inhalables (43.1%), cocaína (46.1%), estimulantes (19%), depresores (15%), drogas alucinógenas y disociativas (10%), opiáceos (4.1%) y otras sustancias de abuso (2.5%).

En cuanto al uso de sustancias específicas (contenidas en alguno de los diez grupos antes mencionados) sobresalen marihuana (78.4%), hachís (4.2%); cocaína en polvo blanco (37.4%) y *crack* (24.8%); solventes y removedores (32.7%), pegamentos (10.13%), esmaltes y pinturas (5%); metanfetaminas (11.5%), éxtasis (6.1%) y anfetamina (3.3%); benzodiacepinas (13.3%) y *Rohypnol* (2.1%); LSD (6.4%) y plantas alucinógenas y derivados (5.6%); heroína (3.5%), opiáceos sintéticos (0.5%) y opio (también con 0.5%).




**Las drogas más utilizadas alguna vez en la vida por hombres y mujeres fueron alcohol, tabaco, cannabis e inhalables; las mujeres reportan mayor consumo de inhalables y benzodiacepinas que los hombres**

<sup>d</sup> Dado que la mayoría de los casos refirió haber utilizado dos o más sustancias —tanto en esta categoría como en las de uso en el último año y en los últimos 30 días, *infra*— la suma de porcentajes no es igual a 100.

**Consumo de drogas en los últimos 12 meses.** 94.2% de las personas reportaron haber consumido alguna sustancia en el año previo a su ingreso a tratamiento en CIJ. Las proporciones de consumo de los diez grupos de sustancias utilizadas en este lapso fueron: alcohol (79.1%), tabaco (74.4%), *cannabis* (60.8%), inhalables (31.3%), cocaína (30%), estimulantes (12.5%), depresores (9.9%), drogas alucinógenas y disociativas (5.5%); opiáceos (2.7%) y otras sustancias de abuso (1.6%).

En cuanto al consumo de sustancias específicas contenidas en alguno de los grupos anteriores destacan: marihuana (60.7%) y hachis (2.7%); solventes y removedores (23.6%), pegamentos (6.2%) y esmaltes y pinturas (3.6%); cocaína en polvo blanco (20.6%) y *crack* (16.2%); metanfetaminas (7.6%), éxtasis (3.6%) y anfetamina (1.9%); benzodiacepinas (8.4%) y *Rohypnol* (0.7%); LSD (3.7%) y plantas alucinógenas y derivados (2.4%); y heroína (2.3%).


**Figura 16. Consumo de drogas en los últimos 12 meses según sexo**



**Las drogas más consumidas en el último año por hombres y mujeres fueron alcohol, tabaco, cannabis e inhalables; las mujeres reportan mayor consumo de inhalables y benzodiacepinas que los hombres**

**Droga de preferencia en los últimos 12 meses.** Entre las sustancias más frecuentemente referidas se encontraron: marihuana (35.9%), alcohol (18.5%) y tabaco (13.2%). En menores proporciones aparecieron: solventes y removedores (10.8%), *crack* (6.5%), cocaína en polvo (3.7%), heroína (1.9%) y pegamentos (1.7%).

**Figura 17. Droga de preferencia en los últimos 12 meses según sexo**




**Durante el último año los hombres prefirieron consumir en mayor medida *cannabis* y las mujeres inhalables**

**Droga de mayor impacto en los últimos 12 meses.** Entre las sustancias a cuyo consumo los pacientes atribuyen los mayores daños en la salud, en el bienestar personal y familiar o en el desempeño escolar, laboral o social se señalaron: marihuana (32.1%), alcohol (16.1%), solventes y removedores (14.5%), *crack* (8.6%), tabaco (8.2%), cocaína en polvo (5.2%), *Rohypnol* (4.1%), pegamentos (2.6%) y heroína (2%).


**Figura 18. Droga de mayor impacto en los últimos 12 meses según sexo**

**La *cannabis* es la droga que los hombres reportan como la sustancia que les ha causado mayores problemas, mientras que en las mujeres fueron los inhalables**



**Uso combinado de drogas en los últimos 12 meses.**<sup>e</sup> Al menos en una ocasión en el transcurso del último año y excluyendo al tabaco, poco más de la mitad de la población (53.1%) reportó el consumo en un mismo día de dos o más sustancias.

**Figura 19. Uso combinado de droga en los últimos 12 meses según sexo**




**Consumo de drogas en los últimos 30 días.** Incluyendo al alcohol y al tabaco, 89.9% de los casos reportaron consumo de sustancias en el mes anterior al ingreso a tratamiento.

Las proporciones de consumo de los diez grupos de sustancias utilizadas en este lapso fueron: tabaco (64.9%), alcohol (58%), *cannabis* (42.1%), inhalables (20.1)%, cocaína (15.9%), estimulantes (5.8%), depresores (4.5%), opiáceos (2%), drogas alucinógenas y disociativas (1.4%) y otras sustancias de abuso (0.6%).

En cuanto al consumo de sustancias específicas destaca el de marihuana con 42%, mientras que el de hachís es sólo 0.1%; solventes/removedores (15.4%), pegamentos (3.4%) y esmaltes y pinturas (1.9%); el *crack* (9%) supera a la cocaína en polvo (8.6%); benzodiazepinas (4.2%) y el *Rohypnol* baja a 0.2%; metanfetaminas (4%), éxtasis (1.1%) y anfetamina (0.8%); LSD (1%), plantas alucinógenas y derivados (0.5%); heroína (1.8%) y opiáceos sintéticos (0.2%).

<sup>e</sup> No se toman en cuenta 3,135 casos (25.3%) que no cumplieron los criterios de inclusión de esta variable; 24.6% de los hombres y 28.5% de las mujeres. (ver anexo).


**Figura 20. Consumo de drogas en los últimos 30 días según sexo**



**La droga ilícita más utilizada por los hombres en los 30 días previos a la solicitud de tratamiento fue la cannabis; mientras que entre las mujeres fueron los inhalables**

**Frecuencia de episodios de abuso en los últimos 30 días.** 40.1% de quienes reportaron consumo de tabaco en los últimos 30 días aceptó fumar seis o más cigarrillos diariamente. Así mismo, entre quienes consumieron alcohol, una tercera parte (33.2%) reportó consumo abusivo menos de una vez a la semana, otra tercera parte (36.2%) abusó del alcohol una o dos veces a la semana. Finalmente, 38.7% de los usuarios de drogas ilícitas durante el último mes reportó consumirlas todos los días, 23.3% menos de una vez a la semana y 22.2% una a dos veces a la semana.

**Figura 21. Frecuencia de episodios de abuso en los últimos 30 días según sexo**



Las proporciones de abuso de alcohol y tabaco tienden a ser similares entre los sexos, mientras que en el caso de las drogas ilícitas los hombres reportan episodios de abuso con mayor frecuencia que las mujeres

## Referencias

1. Sánchez-Huesca, R. y López Granados, L. (1985). **Características demográficas y patrones de inicio en el consumo de drogas en asistentes a los Centros Locales; recuperación de los archivos de siete años (1976-1982)**. México: Centros de Integración Juvenil, A.C. (reporte interno).
2. Clarac Rengade, P. y Wagner Echeagaray, F. (1987). Análisis de algunas variables en una muestra de pacientes farmacodependientes (1986). En F. Wagner Echeagaray y R. Ortiz Mondragón (Comp.) (1990). **Estudios acerca de la farmacodependencia en México realizados por Paule Clarac**. México: Centros de Integración Juvenil, A. C. (pp. 111-126).
3. Garcia Aurrecoechea, R., Diaz Negrete, B., Balanzario, M. C., Gutierrez-López, A. Castillo-Franco, I. (1999). Características sociodemográficas y de consumo de drogas en pacientes atendidos entre 1990 y 1997. México: Centros de Integración Juvenil, A.C., Dirección de Promoción Institucional. **Informe de investigación 98-12**.
4. Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA), **Informe 2009** (2010). México: Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, Dirección de Epidemiología, Dirección de Investigación Operativa Epidemiológica.  
[http://www.dgepi.salud.gob.mx/2010/PDFS/SISVEA/informes\\_sisvea\\_2009.pdf](http://www.dgepi.salud.gob.mx/2010/PDFS/SISVEA/informes_sisvea_2009.pdf)
5. Ortiz A, Martínez R., Meza D. Grupo Interinstitucional para el desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. **Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana** No. 50, Junio de 2011. México: Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.  
[http://www.inprf.gob.mx/opencms/export/sites/INPRFM/psicosociales/archivos/srid/rep\\_50\\_pdf.pdf](http://www.inprf.gob.mx/opencms/export/sites/INPRFM/psicosociales/archivos/srid/rep_50_pdf.pdf)
6. Diaz, D. B., Balanzario, M. C., Castillo, I., Gutierrez, A. y Garcia, R. (2001). Uso de drogas entre pacientes de primer ingreso en Centros de Integración Juvenil. En Secretaría de Salud. **Observatorio Epidemiológico en drogas. El fenómeno de las adicciones en México 2001**. México: Secretaría de Salud (pp. 66-71) (ISBN: 970-721-008-7). [http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/publicaciones/obs2001\\_cap4.pdf](http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/publicaciones/obs2001_cap4.pdf)
7. Díaz Negrete, D. B., García Aurrecoechea, V. R. y Sánchez-Huesca, R. (2009). **Costo del tratamiento del consumo de drogas en Centros de Integración Juvenil en el lapso 1998-2003**. En CD: B. D. Díaz Negrete, J. Arellanez, M. C. Balanzario y R.

Sánchez Huesca, *Once años de estudios del consumo de drogas en México, Investigaciones realizadas en Centros de Integración Juvenil entre 1997 y 2007*. México: Centros de Integración Juvenil (ISBN: 968-5411-5).

8. García-Aurrecochea, R., Díaz-Negrete, B., Balanzario, M. C., Castillo-Franco, I. (1998). ***Perfil y trayectoria del consumo de drogas en pacientes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil en 1996***. En CD: B. D. Díaz Negrete, J. Arellanez, M. C. Balanzario y R. Sánchez Huesca, *Once años de estudios del consumo de drogas en México, Investigaciones realizadas en Centros de Integración Juvenil entre 1997 y 2007*. México: Centros de Integración Juvenil (ISBN: 968-5411-5).

9. Castillo Franco, P. I., Gutiérrez López, A. D. (2008). Consumo de drogas en mujeres asistentes a centros de tratamiento especializado en la Ciudad de México. ***Salud Mental 31 (5)***, 351-359. <http://scielo.unam.mx/pdf/sm/v31n5/v31n5a3.pdf>

10. Gracia Gutiérrez de Velasco, S. E. y Balanzario Lorenzana, M. C. (2003). El consumo de drogas en menores de 12 años en Centros de Integración Juvenil en el año 2002. México: Centros de Integración Juvenil, A.C., Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación. ***Informe de Investigación 03-17***.

11. García Aurrecochea, R., Castillo Franco, P. I. y Guerrero Huesca, J. A. (2003). El consumo de drogas en pacientes atendidos en Centros de Integración Juvenil según la etapa de vida correspondiente al ingreso a tratamiento. México: Centros de Integración Juvenil, A.C., Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación. ***Informe de Investigación 03-13***.

12. García Aurrecochea, R., Díaz Negrete, B., Balanzario, M. C. (2001). Tendencias del consumo de drogas en pacientes de primer ingreso a tratamiento en CIJ entre 1990 y 1999. México: Centros de Integración Juvenil, A.C., Dirección de Promoción Institucional. ***Informe de investigación 2000-06***.

13. Gutiérrez López, AD. (2012). Tendencias del consumo de drogas alguna vez en la vida en Centros de Integración Juvenil. Segundo semestre de 2004 - Primer semestre de 2011 (Nivel Nacional y Entidades Federativas). México: Centros de Integración Juvenil, A.C., Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación. ***Informe de Investigación 12-02e***. <http://www.cij.gob.mx/Especialistas/pdf/12-02e.pdf>

14. Gutiérrez López, A. D. (2012). Droga de mayor impacto reportada por usuarios de drogas ilícitas en el año previo a la solicitud de tratamiento en Centros de Integración

Juvenil. Segundo semestre de 2004 - Primer semestre de 2011 (Nivel Nacional y Entidades Federativa). México: Centros de Integración Juvenil, A.C., Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación. **Informe de Investigación 12-02g**. <http://www.cij.gob.mx/Especialistas/pdf/12-02g.pdf>

15. García Aurrecochea, V. R., Mejía Cobarrubias, T., Díaz Negrete, D. B., Balanzario Lorenzana, M. C. (1999). Estudio clínico y epidemiológico del consumo de metanfetaminas entre pacientes de primer ingreso a tratamiento en la Unidad de Tratamiento y Consulta Externa de Tijuana. México: Centros de Integración Juvenil, A.C., Dirección de Planeación, Subdirección de Investigación, **Informe de investigación 99-03**. <http://www.cij.gob.mx/especialistas/detalle.asp?id=26>

16. Jiménez Silvestre K., García Aurrecochea, V. R. y González Sánchez, J. D. (2005). Patrón de Consumo de Cocaína y Crack en pacientes que ingresan a Tratamiento. México: Centros de Integración Juvenil, A.C., Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación. **Informe de investigación 05-07**.

17. Jiménez-Silvestre, K. y Castillo-Vite N.L. Factores de reincidencia en usuarios de cocaína, crack y metanfetaminas en fase de recuperación. México: Centros de Integración Juvenil, A.C., Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación. **Informe de Investigación 04-14**.

18. Jiménez Silvestre, K. y Castillo Franco, P. I. (2011). A través del cristal. La experiencia del consumo de metanfetaminas en Tijuana. **Región y sociedad [online] 23, 50**, 153-183. ISSN 1870-3925. <http://www.scielo.org.mx/pdf/regsoc/v23n50/v23n50a7.pdf>

19. Jiménez-Silvestre K, García-Aurrecochea R y Balanzario MC. Consumo de estimulantes y su relación con la violencia. México: Centros de Integración Juvenil, A.C., Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación. **Informe de investigación 06-13**, México, 2006. <http://www.cij.gob.mx/especialistas/detalle.asp?id=99>

20. García-Aurrecochea, R., Díaz-Guerrero, R., Reyes-Lagunes, I., Medina-Mora, M. E., Andrade-Palos, P. y Reidl, L. (2006). Indicadores psicosociales de motivación del consumo de marihuana y/o cocaína. **Adicciones 18 (4)**, 387-398 (ISSN: 0214-4840). <http://www.adicciones.es/files/387-398%20Garcia.pdf>

21. García Aurrecochea, R., Guerrero Huesca, A. y Castillo Franco, I. (2009). **Tamizaje y prevalencia del abuso de alcohol en pacientes atendidos en Centros de Integración Juvenil**. En CD: B. D. Diaz Negrete, J. Arellanez, M. C. Balanzario y R. Sánchez Huesca, Once años de estudios del consumo de drogas en México,

Investigaciones realizadas en Centros de Integración Juvenil entre 1997 y 2007. México: Centros de Integración Juvenil (ISBN: 968-5411-5).

22. González Sánchez, J. D., Contreras Sofía I., García Aurrecochea V. R. y Córdova Alcaráz, A. J. (2004). Características sociodemográficas y diagnósticas de los usuarios atendidos a través del Modelo de Detección Temprana e Intervención Breve para Bebedores Problema en CIJ. México: Centros de Integración Juvenil, A.C., Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación. **Informe de Investigación 04-13**.

23. Gutiérrez López, A. D. y Castillo Franco, P. I. (2007). Características sociodemográficas y de consumo en usuarios de tabaco y alcohol de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil en 2006. México: Centros de Integración Juvenil, A.C., Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación. **Informe de Investigación 07-13**. <http://www.cij.gob.mx/Especialistas/pdf/07-13.pdf>

24. Velázquez Altamirano, M., Gutiérrez López, AD y Nute Méndez, LD. (2012). Consumo de tabaco y alcohol en pacientes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil. Enero - Junio 2011. México: Centros de Integración Juvenil, A.C., Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación. **Informe de Investigación 12-02d**. <http://www.cij.gob.mx/Especialistas/pdf/12-02d.pdf>

25. K. Moreno (Coord.) (2010). **Los jóvenes y el alcohol en México. Un problema emergente en mujeres**. México: Centros de Integración Juvenil, A.C.

26. Díaz-Negrete, B., González-Sánchez, J. D. y García-Aurrecochea, R. (2006). Adaptación del Drug Use Screening Inventory para su aplicación con adolescentes mexicanos. **Adicciones, 18 (2)**, 197-210 (ISSN: 0214-4840).

<http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=17851497>

27. García-Aurrecochea, R., Fukushima-Taniguchi, E. A., Gracia-Gutiérrez de Velasco, Jiménez-Silvestre, K. y Cielo Meléndez, D. B. (2009). Evaluación formativa de un programa de tratamiento del uso de estimulantes teóricamente sustentado. Segunda fase: Prueba de instrumentos. En CD: B. D. Díaz Negrete, J. Arellanez, M. C. Balanzario y R. Sánchez Huesca, **Once años de estudios del consumo de drogas en México, Investigaciones realizadas en Centros de Integración Juvenil entre 1997 y 2007**. México: Centros de Integración Juvenil (ISBN: 968-5411-5).

28. García-Aurrecochea, R., Rodríguez-Kuri, S. E., Córdova-Alcaráz, A. (2009). **Validación de escalas de riesgo y protección de trastornos del afecto y consumo**

**de drogas.** En CD: B. D. Diaz Negrete, J. Arellanez, M. C. Balanzario y R. Sánchez Huesca, *Once años de estudios del consumo de drogas en México, Investigaciones realizadas en Centros de Integración Juvenil entre 1997 y 2007.* México: Centros de Integración Juvenil (ISBN: 968-5411-5).

29. González Sánchez, J.D., García Aurrecoechea, V.R., y Córdova Alcaráz, A. (2004). Uso de sustancias entre adolescentes y su asociación con síntomas de depresión y percepción de sus relaciones familiares. México: Centros de Integración Juvenil, A.C., Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación. **Informe de Investigación 04-03.** <http://www.cij.gob.mx/especialistas/pdf/04-03.pdf>

30. Diaz-Negrete, D. B. y García-Aurrecoechea, R. (2008). Factores psicosociales de riesgo de consumo de drogas ilícitas en una muestra de estudiantes mexicanos de educación media. **Revista Panamericana de Salud Pública 24 (4)**, 223-232 (ISSN: 1020-4989). <http://www.scielosp.org/pdf/rpsp/v24n4/v24n4a01.pdf>

31. Córdova Alcaráz, A. J. y García Aurrecoechea, V. R. (2011). Efecto de los trastornos del afecto y la relación con sus padres en la severidad y el consumo de alcohol y drogas en adolescentes. **Revista de Psicología de la Universidad de Antioquía, 3 (2)**, 7-23.

<http://aprendeonline.udea.edu.co/revistas/index.php/psicologia/article/viewFile/11364/10386>

32. García-Aurrecoechea, R., Rodríguez-Kuri, S. E. y Córdova, A. (2008). Factores motivacionales protectores de la depresión y el consumo de drogas. **Salud Mental 31 (6)**, 453-459 (ISSN: 0185-3325). <http://www.medigraphic.com/pdfs/salmen/sam-2008/sam086e.pdf>

33. García-Aurrecoechea, R., Rodríguez-Kuri, S. E., Córdova, A. (2011). **Depresión y consumo de drogas.** México: Ed. Trillas (ISBN: 978-607-17-0707-9).

34. **Encuesta Nacional de Adicciones 2008.** (ENA 2008). México: Consejo Nacional contra las Adicciones (CONADIC), Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz (INPRFM), Fundación Gonzalo Río Arronte. [http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/ena08/ENA08\\_NACIONAL.pdf](http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/ena08/ENA08_NACIONAL.pdf)

35. CD: **EBCO 2007-2008. Estudio Básico de Comunidad Objetivo Vol. 1 y 2.** México: Centros de Integración Juvenil, A.C., Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación.

---

## **CUADROS**

---

**CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS USUARIOS DE DROGAS DE PRIMER INGRESO A TRATAMIENTO A CIJ EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2011**

**Cuadro 1. Pacientes por Unidad de atención (CIJ)**

CIJ	General		Hombres		Mujeres		Razón H:M
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	
Álvaro Obregón Norte	237	2	195	2	42	2	4.6:1
Azcapotzalco	217	1.8	182	1.9	35	1.6	5.2:1
Benito Juárez	139	1.2	106	1.1	33	1.5	3.2:1
Coyoacán	157	1.3	140	1.4	17	0.8	8.2:1
Cuauhtémoc Oriente	174	1.5	134	1.4	40	1.9	3.4:1
Cuauhtémoc Poniente	161	1.3	121	1.2	40	1.9	3:1
Chalco	224	1.9	184	1.9	40	1.9	4.6:1
Ecatepec	257	2.1	218	2.2	39	1.8	5.6:1
Gustavo A. Madero Norte	249	2.1	210	2.1	39	1.8	5.4:1
Gustavo A. Madero Ote.	12	0.1	7	0.1	5	0.2	1.4:1
Iztapalapa Poniente	209	1.7	160	1.6	49	2.3	3.3:1
Iztapalapa Oriente	555	4.6	474	4.8	81	3.8	5.9:1
Miguel Hidalgo	163	1.4	130	1.3	33	1.5	3.9:1
Naucalpan	236	2	197	2	39	1.8	5.1:1
Nezahualcóyotl	301	2.5	241	2.5	60	2.8	4:1
Tlalpan	201	1.7	171	1.7	30	1.4	5.7:1
Tlalnepantla	211	1.8	179	1.8	32	1.5	5.6:1
Venustiano Carranza	165	1.4	141	1.4	24	1.1	5.9:1
Acapulco	120	1	79	0.8	41	1.9	1.9:1
Aguascalientes	136	1.1	109	1.1	27	1.3	4:1
Cancún	183	1.5	151	1.5	32	1.5	4.7:1
Celaya	169	1.4	134	1.4	35	1.6	3.8:1
Chihuahua	179	1.5	144	1.5	35	1.6	4.1:1
UTPPCH Cd. Juárez	139	1.2	106	1.1	33	1.5	3.2:1
Colima	124	1	106	1.1	18	0.8	5.9:1
Cuernavaca	91	0.8	76	0.8	15	0.7	5.1:1
Culiacán	124	1	119	1.2	5	0.2	23.8:1
Durango	115	1	84	0.9	31	1.5	2.7:1
Guadalajara	219	1.8	181	1.8	38	1.8	4.8:1
Guadalupe	81	0.7	70	0.7	11	0.5	6.4:1
Hermosillo	159	1.3	124	1.3	35	1.6	3.5:1
Xalapa	81	0.7	59	0.6	22	1	2.7:1
La Paz	105	0.9	84	0.9	21	1	4:1
León	212	1.8	171	1.7	41	1.9	4.2:1
Mazatlán	94	0.8	72	0.7	22	1	3.3:1

*(Continúa)*

**Cuadro 1. Pacientes de primer ingreso a tratamiento por Unidad de atención (CIJ)**  
(Continuación)

CIJ	General		Hombres		Mujeres		Razón H:M
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	
Mérida	114	1	92	0.9	22	1	4.2:1
Mexicali	157	1.3	140	1.4	17	0.8	8.2:1
Monterrey	106	0.9	87	0.9	19	0.9	4.6:1
Pachuca	140	1.2	114	1.2	26	1.2	4.4:1
Poza Rica	54	0.5	42	0.4	12	0.6	3.5:1
Puebla	195	1.6	173	1.8	22	1	7.9:1
Puerto Vallarta	110	0.9	91	0.9	19	0.9	4.8:1
Querétaro	247	2.1	208	2.1	39	1.8	5.3:1
Saltillo	113	0.9	92	0.9	21	1	4.4:1
San Luis Potosí	119	1.0	97	1	22	1	4.4:1
Tampico	75	0.6	63	0.6	12	0.6	5.3:1
Tijuana Guaycura	160	1.3	118	1.2	42	2	2.8:1
Tlaquepaque	181	1.5	151	1.5	30	1.4	5:1
Toluca	264	2.2	221	2.2	43	2	5.1:1
Laguna Coahuila	9	0.1	6	0.1	3	0.1	2:1
Tuxtla Gutiérrez	151	1.3	140	1.4	11	0.5	12.7:1
Zapopan Norte	203	1.7	168	1.7	35	1.6	4.8:1
Zacatecas	76	0.6	64	0.7	12	0.6	5.3:1
Salamanca	93	0.8	72	0.7	21	1	3.4:1
Los Mochis	49	0.4	44	0.4	5	0.2	8.8:1
Guasave	94	0.8	85	0.9	9	0.4	9.4:1
Guamúchil	26	0.2	21	0.2	5	0.2	4.2:1
Zamora	65	0.5	58	0.6	7	0.3	8.3:1
Gustavo A. Mad. Aragón	270	2.3	238	2.4	32	1.5	7.4:1
Guadalajara Sur	98	0.8	76	0.8	22	1	3.5:1
UH Zapopan	68	0.6	55	0.6	13	0.6	4.2:1
UH Monterrey	36	0.3	28	0.3	8	0.4	3.5:1
Tehuacán	66	0.6	58	0.6	8	0.4	7.3:1
UH Tijuana	51	0.4	44	0.4	7	0.3	6.3:1
Tepic	48	0.4	44	0.4	4	0.2	11:1
Apodaca	12	0.1	11	0.1	1	0	11:1
Cuajimalpa	106	0.9	79	0.8	27	1.3	2.9:1
Cd. Victoria	32	0.3	24	0.2	8	0.4	3:1
Tecomán	38	0.3	32	0.3	6	0.3	5.3:1
Manzanillo	72	0.6	52	0.5	20	0.9	2.6:1
Cozumel	66	0.6	48	0.5	18	0.8	2.7:1
Oaxaca	92	0.8	75	0.8	17	0.8	4.4:1

*(Continúa)*

**Cuadro 1. Pacientes de primer ingreso a tratamiento por Unidad de atención (CIJ)**  
(Continuación)

CIJ	General		Hombres		Mujeres		Razón H:M
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	
San Nicolás de los Garza	62	0.5	54	0.5	8	0.4	6.8:1
Tijuana Soler	150	1.3	123	1.3	27	1.3	4.6:1
Cd. del Carmen	45	0.4	37	0.4	8	0.4	4.6:1
Villahermosa	40	0.3	35	0.4	5	0.2	7:1
UH Punta Diamante	65	0.5	56	0.6	9	0.4	6.2:1
Los Cabos	21	0.2	20	0.2	1	0	20:1
UH Culiacán	30	0.3	30	0.3	0	0	--
Ixtapa Zihuatanejo	29	0.2	26	0.3	3	0.1	8.7:1
UH Zapotlán el Grande	43	0.4	43	0.4	0	0	--
Laguna Durango	116	1.0	86	0.9	30	1.4	2.9:1
Texcoco	129	1.1	106	1.1	23	1.1	4.6:1
Cd. Juárez Norte	117	1.0	93	0.9	24	1.1	3.9:1
Chilpancingo	38	0.3	27	0.3	11	0.5	2.5:1
Tapachula	25	0.2	23	0.2	2	0.1	11.5:1
UH Ixbalanqué	8	0.1	8	0.1	0	0	--
Chetumal	57	0.5	51	0.5	6	0.3	8.5:1
Playa del Carmen	43	0.4	33	0.3	10	0.5	3.3:1
Fresnillo Pinacoteca	45	0.4	37	0.4	8	0.4	4.6:1
UH Iztapalapa	75	0.6	62	0.6	13	0.6	4.8:1
Nogales	56	0.5	41	0.4	15	0.7	2.7:1
Álvaro Obregón Oriente	87	0.7	71	0.7	16	0.8	4.4:1
UH Jerez	69	0.6	58	0.6	11	0.5	5.3:1
Morelia	77	0.6	66	0.7	11	0.5	6:1
La Piedad	14	0.1	13	0.1	1	0	13:1
UH Ecatepec	58	0.5	50	0.5	8	0.4	6.3:1
Unidad Móvil I	2	0.0	0	0	2	0.1	0:1
Xochimilco	71	0.6	59	0.6	12	0.6	4.9:1
Escuinapa	110	0.9	79	0.8	31	1.5	2.5:1
Zapopan Kena Moreno	4	0.0	4	0	0	0	--
UH Cd. Juárez (UMAA)	11	0.1	11	0.1	0	0	--
Torreón Oriente	117	1.0	91	0.9	26	1.2	3.5:1
Magdalena Contreras	52	0.4	37	0.4	15	0.7	2.5:1
Tlalpan Viaducto	2	0.0	2	0	0	0	--
UH Naucalpan	35	0.3	26	0.3	9	0.4	2.9:1
<b>Total</b>	<b>11,995</b>	<b>100</b>	<b>9828</b>	<b>100</b>	<b>2130</b>	<b>100</b>	<b>4.6:1</b>

UH=Unidad de Hospitalización

UTPPCH=Unidad de Tratamiento a Personas con Problemas de Consumo de Heroína

UMAA=Unidad Médica de Atención a las Adicciones

**Cuadro 2. Sexo**

	Frec.	%	Razón H:M
Hombres	9828	82.2	4.6 : 1
Mujeres	2130	17.8	
<b>Total</b>	<b>11958</b>	<b>100</b>	

**Cuadro 3. Persona que proporciona la información**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Usuario de drogas	5579	46.7	4647	47.3	932	43.8
Usuario de drogas y familiares u otras personas	6379	53.3	5181	52.7	1198	56.2
<b>Total</b>	<b>11958</b>	<b>100</b>	<b>9828</b>	<b>100</b>	<b>2130</b>	<b>100</b>

**Cuadro 4. Edad de ingreso a tratamiento**

	General*			Hombres**			Mujeres***		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Hasta 9 años	3	0	0	3	0	0	0	0	0
10 a 14 años	1445	12.1	12.1	995	10.1	10.1	450	21.1	10.1
15 a 19 años	4671	39.1	39.1	3795	38.6	38.7	876	41.1	38.7
20 a 24 años	1864	15.6	15.6	1575	16	16.1	289	13.6	16.1
25 a 29 años	1214	10.2	10.2	1054	10.7	10.7	160	7.5	10.7
30 a 34 años	942	7.9	7.9	821	8.4	8.4	121	5.7	8.4
35 a 39 años	706	5.9	5.9	629	6.4	6.4	77	3.6	6.4
40 a 44 años	467	3.9	3.9	413	4.2	4.2	54	2.5	4.2
45 años y más	629	5.3	5.3	528	5.4	5.4	101	4.7	5.4
<i>Sin información</i>	17	0.1	<i>Se omite</i>	15	0.2	<i>Se omite</i>	2	0.1	<i>Se omite</i>
<b>Total</b>	<b>11958</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>9828</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>2130</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

\*  $\mu = 23.3$   $\sigma = 10.2$ ; Med.= 19; Mo.= 17; Decil1 = 14

\*\*  $\mu = 23.8$ ;  $\sigma = 10.2$ ; Med.= 20; Mo.= 17; Decil1 = 14

\*\*\*  $\mu = 21.3$ ;  $\sigma = 9.8$ ; Med.= 17; Mo.= 15; Decil1 = 14

**Cuadro 5. Estado civil**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Soltero	7966	66.6	70	6503	66.2	69.4	1463	68.7	69.4
Casado	1188	9.9	10.4	1063	10.8	11.3	125	5.9	11.3
Unión libre	1267	10.6	11.1	1052	10.7	11.2	215	10.1	11.2
Separado	759	6.3	6.7	602	6.1	6.4	157	7.4	6.4
Divorciado	171	1.4	1.5	136	1.4	1.5	35	1.6	1.5
Viudo	37	0.3	0.3	20	0.2	0.2	17	0.8	0.2
<i>Sin información</i>	570	4.8	<i>Se omite</i>	452	4.6	<i>Se omite</i>	118	5.5	<i>Se omite</i>
<b>Total</b>	<b>11958</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>9828</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>2130</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Cuadro 6. Escolaridad**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Ninguna (no sabe leer ni escribir)	61	0.5	0.5	51	0.5	0.5	10	0.5	0.5
Ninguna (sabe leer y escribir)	47	0.4	0.4	41	0.4	0.4	6	0.3	0.4
Primaria incompleta	498	4.2	4.2	426	4.3	4.4	72	3.4	4.4
Primaria completa	897	7.5	7.5	771	7.8	7.9	126	5.9	7.9
Secundaria incompleta	2802	23.4	23.6	2193	22.3	22.4	609	28.6	22.4
Secundaria completa	2457	20.5	20.7	2086	21.2	21.3	371	17.4	21.3
Estudios técnicos o comerciales incompletos	142	1.2	1.2	115	1.2	1.2	27	1.3	1.2
Estudios técnicos o comerciales completos	149	1.2	1.3	102	1	1	47	2.2	1
Bachillerato incompleto	2907	24.3	24.4	2400	24.4	24.5	507	23.8	24.5
Bachillerato completo	964	8.1	8.1	807	8.2	8.3	157	7.4	8.3
Estudios superiores incompletos	651	5.4	5.5	533	5.4	5.4	118	5.5	5.4
Estudios superiores completos	293	2.5	2.5	231	2.4	2.4	62	2.9	2.4
Estudios de posgrado incompletos	11	0.1	0.1	9	0.1	0.1	2	0.1	0.1
Estudios de posgrado completos	18	0.2	0.2	15	0.2	0.2	3	0.1	0.2
<i>Sin información</i>	61	0.5	<i>Se omite</i>	48	0.5	<i>Se omite</i>	13	0.6	<i>Se omite</i>
<b>Total</b>	<b>11958</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>9828</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>2130</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Cuadro 7. Ocupación**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Estudiante	3644	30.5	30.7	2771	28.2	28.4	873	41	41.3
Estudia y trabaja	556	4.6	4.7	466	4.7	4.8	90	4.2	4.3
Trabaja	4270	35.7	35.9	3880	39.5	39.7	390	18.3	18.4
Desempleado(a)	2929	24.5	24.6	2514	25.6	25.7	415	19.5	19.6
Tareas del hogar	443	3.7	3.7	105	1.1	1.1	338	15.9	16.0
Pensionado	42	0.4	0.4	33	0.3	0.3	9	0.4	0.4
Sin información	74	0.6	<i>Se omite</i>	59	0.6	<i>Se omite</i>	15	0.7	<i>Se omite</i>
<b>Total</b>	<b>11958</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>9828</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>2130</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Cuadro 8. Estrato social**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Alto	95	0.8	0.8	76	0.8	0.8	19	0.9	0.9
Medio alto	1149	9.6	10	933	9.5	9.9	216	10.1	10.6
Medio bajo	6721	56.2	58.7	5556	56.5	59	1165	54.7	57.3
Bajo	3381	28.3	29.5	2765	28.1	29.4	616	28.9	30.3
Pobreza extrema o marginación	101	0.8	0.9	85	0.9	0.9	16	0.8	0.8
Sin información	511	4.3	<i>Se omite</i>	413	4.2	<i>Se omite</i>	98	4.6	<i>Se omite</i>
<b>Total</b>	<b>11958</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>9828</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>2130</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**FACTORES ASOCIADOS A LA DEMANDA DE TRATAMIENTO EN PACIENTES DE PRIMER INGRESO A TRATAMIENTO EN CIJ EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2011**

**Cuadro 9. Motivos de consulta**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Consumo de drogas ilícitas	10054	84.1	8351	85	1703	80
Consumo de bebidas alcohólicas	5424	45.4	4434	45.1	990	46.5
Consumo de tabaco	4632	38.7	3787	38.5	845	39.7
Otro motivo	426	3.6	328	3.3	98	4.6
<i>Ningún motivo específico reportado</i>	240	2	194	2	46	2.2
<i>Usuarios que reportaron dos o más motivos de consulta</i>	5581	46.7	4595	46.8	986	46.3

**Cuadro 10. Condicionantes de la solicitud de tratamiento**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Por propia iniciativa	4851	40.6	3948	40.2	903	42.4
Por condicionamiento o recomendación familiar	5151	43.1	4193	42.7	958	45
Por recomendación de pares	214	1.8	170	1.7	44	2.1
Por condicionamiento o recomendación escolar	1633	13.7	1266	12.9	367	17.2
Por condicionamiento legal	1409	11.8	1263	12.9	146	6.9
Por condicionamiento o recomendación laboral	297	2.5	282	2.9	15	0.7
Por indicación médica	518	4.3	423	4.3	95	4.5
Otros condicionante de solicitud de tratamiento	272	2.3	218	2.2	54	2.5
<i>Ningún condicionante reportado</i>	166	1.4	132	1.3	34	1.6
<i>Pacientes que reportaron dos o más condicionantes de la solicitud de tratamiento</i>	2354	19.7	1904	19.4	450	21.1

**Cuadro 11. Antecedentes de acciones contra el consumo de sustancias**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Juramento	3070	25.7	2537	25.8	533	25
Grupo de autoayuda	1100	9.2	961	9.8	139	6.5
Internamiento en anexo	1758	14.7	1537	15.6	221	10.4
Intervención de emergencia	97	0.8	85	0.9	12	0.6
Programa de mantenimiento	73	0.6	59	0.6	14	0.7
Tratamiento médico no especializado	109	0.9	80	0.8	29	1.4
Tratamiento psiquiátrico o psicoterapéutico ambulatorio	586	4.9	473	4.8	113	5.3
Tratamiento psiquiátrico o psicoterapéutico residencial	305	2.6	248	2.5	57	2.7
Medicina tradicional o alternativa	52	0.4	44	0.4	8	0.4
Intento de interrupción voluntaria del consumo, sin apoyo	3619	30.3	3027	30.8	592	27.8
Otras acciones	2557	21.4	2069	21.1	488	22.9
<i>Ninguna acción previa reportada</i>	2941	24.6	2326	23.7	615	28.9
<i>Pacientes que reportaron dos o más acciones contra el consumo de sustancias antes de solicitar tratamiento en CIJ</i>	3561	29.8	2952	30	609	28.6

**Cuadro 12. Problemas asociados al consumo de sustancias**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Problemas de salud	5221	43.7	4251	43.3	970	45.5
Accidentes o lesiones	1721	14.4	1456	14.8	265	12.4
Problemas familiares	9589	80.2	7814	79.5	1775	83.3
Problemas escolares	4054	33.9	3208	32.6	846	39.7
Problemas laborales	2789	23.3	2526	25.7	263	12.3
Problemas psicológicos	4769	39.9	3796	38.6	973	45.7
Problemas legales	3091	25.8	2757	28.1	334	15.7
Conducta antisocial o delictiva	2265	18.9	1961	20	304	14.3
Otros problemas	478	4	404	4.1	74	3.5
<i>Ningún problema asociado reportado</i>	344	2.9	285	2.9	59	2.8
<i>Pacientes que reportaron dos o más problemas asociados</i>	9330	78	7646	77.8	1684	79.1

**CARACTERÍSTICAS DEL CONSUMO DE DROGAS EN PACIENTES DE PRIMER INGRESO A  
TRATAMIENTO EN CIJ EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2011**

**Cuadro 13. Edad de inicio del consumo de Tabaco**

	General*			Hombres**			Mujeres***		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Hasta 9 años	409	3.4	4	353	3.6	4.2	56	2.6	3.2
10 a 14 años	5192	43.4	50.9	4218	42.9	50	974	45.7	55.2
15 a 19 años	4096	34.3	40.1	3459	35.2	41	637	29.9	36.1
20 a 24 años	357	3	3.5	299	3	3.5	58	2.7	3.3
25 a 29 años	85	0.7	0.8	64	0.7	0.8	21	1	1.2
30 a 34 años	37	0.3	0.4	31	0.3	0.4	6	0.3	0.3
35 a 39 años	16	0.1	0.2	9	0.1	0.1	7	0.3	0.4
40 a 44 años	7	0.1	0.1	4	0	0	3	0.1	0.2
45 años y más	8	0.1	0.1	4	0	0	4	0.2	0.2
<i>No consumió</i>	1722	14.4	<i>Se omite</i>	1364	13.9	<i>Se omite</i>	358	16.8	<i>Se omite</i>
<i>Sin información</i>	29	0.2	<i>Se omite</i>	23	0.2	<i>Se omite</i>	6	0.3	<i>Se omite</i>
<b>Total</b>	<b>11958</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>9828</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>2130</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

\*  $\mu=14.5$ ;  $\sigma=3$ ; Med.= 14; Mo.= 15; Decil1 = 11

\*\*  $\mu=14.4$ ;  $\sigma=3.3$ ; Med.= 14; Mo.= 15; Decil1 = 11

\*\*\*  $\mu=14.5$ ;  $\sigma=3.9$ ; Med.= 14; Mo.= 13; Decil1 = 11

**Cuadro 14. Edad de inicio del consumo de Alcohol.**

	General*			Hombres**			Mujeres***		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Hasta 9 años	362	3	3.4	305	3.1	3.5	57	2.7	3
10 a 14 años	4906	41	46.1	3903	39.7	44.5	1003	47.1	53.5
15 a 19 años	4918	41.1	46.2	4197	42.7	47.9	721	33.8	38.4
20 a 24 años	368	3.1	3.5	307	3.1	3.5	61	2.9	3.3
25 a 29 años	61	0.5	0.6	39	0.4	0.4	22	1	1.2
30 a 34 años	18	0.2	0.2	10	0.1	0.1	8	0.4	0.4
35 a 39 años	9	0.1	0.1	7	0.1	0.1	2	0.1	0.1
40 a 44 años	1	0	0	1	0	0	0	0	0
45 años y más	3	0	0	1	0	0	2	0.1	0.1
<i>No consumió</i>	1271	10.6	<i>Se omite</i>	1025	10.4	<i>Se omite</i>	246	11.5	<i>Se omite</i>
<i>Sin información</i>	41	0.3	<i>Se omite</i>	33	0.3	<i>Se omite</i>	8	0.4	<i>Se omite</i>
<b>Total</b>	<b>11958</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>9828</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>2130</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

\*  $\mu=14.6$ ;  $\sigma=3$ ; Med.= 15; Mo.= 15; Decil1 = 12

\*\*  $\mu=14.6$ ;  $\sigma=2.9$ ; Med.= 15; Mo.= 15; Decil1 = 12

\*\*\*  $\mu=14.4$ ;  $\sigma=3.5$ ; Med.= 14; Mo.= 15; Decil1 = 11

**Cuadro 15. Edad de inicio del consumo de Drogas ilícitas.**

	General*			Hombres**			Mujeres***		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Hasta 9 años	183	1.5	1.5	161	1.6	1.6	22	1	1
10 a 14 años	4380	36.6	36.8	3476	35.4	35.5	904	42.4	42.7
15 a 19 años	5724	47.9	48.1	4855	49.4	49.6	869	40.8	41
20 a 24 años	855	7.2	7.2	701	7.1	7.2	154	7.2	7.3
25 a 29 años	364	3	3.1	294	3	3	70	3.3	3.3
30 a 34 años	192	1.6	1.6	147	1.5	1.5	45	2.1	2.1
35 a 39 años	96	0.8	0.8	71	0.7	0.7	25	1.2	1.2
40 a 44 años	52	0.4	0.4	39	0.4	0.4	13	0.6	0.6
45 años y más	62	0.5	0.5	45	0.5	0.5	17	0.8	0.8
<i>Sin información</i>	50	0.4	<i>Se omite</i>	39	0.4	<i>Se omite</i>	11	0.5	<i>Se omite</i>
<b>Total</b>	<b>11958</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>9828</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>2130</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

\*  $\mu = 16.3$ ;  $\sigma = 5.2$ ; Med.= 15; Mo.= 15; Decil1 = 12

\*\*  $\mu = 16.3$ ;  $\sigma = 5$ ; Med.= 15; Mo.= 15; Decil1 = 12

\*\*\*  $\mu = 16.6$ ;  $\sigma = 6.1$ ; Med.= 15; Mo.= 14; Decil1 = 12

**Cuadro 16. Drogas ilícitas de inicio**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
<b>Cannabis</b>	7550	63.1	6429	65.4	1121	52.6
Mariguana	7534	63	6416	65.3	1118	52.5
Hachís	16	0.1	13	0.1	3	0.1
<b>Cocaína</b>	1415	11.8	1190	12.1	225	10.6
Polvo blanco	1015	8.5	835	8.5	180	8.5
Crack	392	3.3	349	3.6	43	2
Otra presentación	8	0.1	6	0.1	2	0.1
<b>Inhalables</b>	2319	19.4	1759	17.9	560	26.3
Solventes o removedores	1736	14.5	1302	13.2	434	20.4
Pegamentos	316	2.6	258	2.6	58	2.7
Esmaltes o pinturas	195	1.6	143	1.5	52	2.4
Otros	72	0.6	56	0.6	16	0.8
<b>Depresores</b>	284	2.3	212	2.2	72	3.4
Benzodiazepinas	121	1	104	1.1	17	0.8
Rohypnol®	124	1	81	0.8	43	2
Otros	39	0.3	27	0.3	12	0.6
<b>Estimulantes</b>	317	2.7	243	2.5	74	3.5
Anfetamina	121	1.0	104	1.1	17	0.8
Metanfetaminas	124	1.0	81	0.8	43	2.0
Éxtasis (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas	39	0.3	27	0.3	12	0.6
Otros	33	0.3	31	0.3	2	0.1
<b>Drogas alucinógenas y disociativas</b>	28	0.2	19		9	0.4
LSD	13	0.1	12	0.1	1	0.0
Plantas alucinógenas y derivados	12	0.1	6	0.1	6	0.3
Otras	3	0.0	1	0.0	2	0.1
<b>Opiáceos</b>	66	0.6	54	0.5	12	0.6
Heroína	58	0.5	48	0.5	10	0.5
Opiáceos Sintéticos	6	0.1	6	0.1	0	0
Opio y otros opiáceos	2	0.0	9	0.1	2	0.1
<b>Otras sustancias de abuso</b>	63	0.5	39	0.4	24	1.1
Con utilidad médica	16	0.1	0	0	7	0.3
Otras	47	0.4	30	0.3	17	0.8

**Cuadro 17. Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de Tabaco y el ingreso a tratamiento en CIJ**

	General*			Hombres**			Mujeres***		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
< de un año	646	5.4	6.3	459	4.7	5.4	187	8.8	10.6
1 a 5 años	4623	38.7	45.4	3699	37.6	43.9	924	43.4	52.3
6 a 10 años	1711	14.3	16.8	1469	14.9	17.4	242	11.4	13.7
11 a 15 años	1064	8.9	10.4	907	9.2	10.8	157	7.4	8.9
16 a 20 años	796	6.7	7.8	706	7.2	8.4	90	4.2	5.1
21 a 25 años	511	4.3	5	461	4.7	5.5	50	2.3	2.8
26 o más años	843	7	8.3	727	7.4	8.6	116	5.4	6.6
No consumió	1722	14.4	Se omite	1364	13.9	Se omite	358	16.8	Se omite
Sin información	42	0.4	Se omite	36	0.4	Se omite	6	0.3	Se omite
<b>Total</b>	<b>11958</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>9828</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>2130</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

\*  $\mu=9.1$ ;  $\sigma=9.8$ ; Med.= 5; Mo.= 1; Decil1 = 1

\*\*  $\mu=9.5$ ;  $\sigma=9.9$ ; Med.= 6; Mo.= 1; Decil1 = 1

\*\*\*  $\mu=7.2$ ;  $\sigma=8.9$ ; Med.= 4; Mo.= 1; Decil1 = < un año

**Cuadro 18. Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de Alcohol y el ingreso a tratamiento en CIJ**

	General*			Hombres**			Mujeres***		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
< de un año	659	5.5	6.2	486	4.9	5.6	173	8.1	9.2
1 a 5 años	4829	40.4	45.4	3802	38.7	43.4	1027	48.2	54.8
6 a 10 años	1774	14.8	16.7	1521	15.5	17.4	253	11.9	13.5
11 a 15 años	1125	9.4	10.6	967	9.8	11	158	7.4	8.4
16 a 20 años	818	6.8	7.7	714	7.3	8.2	104	4.9	5.5
21 a 25 años	586	4.9	5.5	523	5.3	6	63	3	3.4
26 o más años	840	7	7.9	743	7.6	8.5	97	4.6	5.2
Sin información	1327	11.1	Se omite	1072	10.9	Se omite	255	12	Se omite
<b>Total</b>	<b>11958</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>9828</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>2130</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

\*  $\mu=9$ ;  $\sigma=9.2$ ; Med.= 5; Mo.= 1; Decil1 = 1

\*\*  $\mu=9$ ;  $\sigma=9.7$ ; Med.= 6; Mo.= 1; Decil1 = 1

\*\*\*  $\mu=6.9$ ;  $\sigma=8.4$ ; Med.= 3; Mo.= 1; Decil1 = < un año

**Cuadro 19. Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de Drogas ilícitas y el ingreso a tratamiento en CIJ**

	General*			Hombres**			Mujeres***		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
< de un año	1892	15.8	15.9	1369	13.9	14	523	24.6	24.7
1 a 5 años	5458	45.6	45.9	4389	44.7	44.9	1069	50.2	50.5
6 a 10 años	1653	13.8	13.9	1437	14.6	14.7	216	10.1	10.2
11 a 15 años	1072	9	9	944	9.6	9.7	128	6	6
16 a 20 años	723	6	6.1	650	6.6	6.7	73	3.4	3.4
21 a 25 años	452	3.8	3.8	415	4.2	4.2	37	1.7	1.7
26 o más años	639	5.3	5.4	569	5.8	5.8	70	3.3	3.3
<i>Sin información</i>	69	0.6	<i>Se omite</i>	55	0.6	<i>Se omite</i>	14	0.7	<i>Se omite</i>
<b>Total</b>	<b>11958</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>9828</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>2130</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

\*  $\mu = 7$ ;  $\sigma = 8.7$ ; Med.= 3; Mo.= 1; Decil1 = < un año

\*\*  $\mu = 7.5$ ;  $\sigma = 8.9$ ; Med.= 4; Mo.= 1; Decil1 = < un año

\*\*\*  $\mu = 4.7$ ;  $\sigma = 7.2$ ; Med.= 2; Mo.= < un año ; Decil1 = < un año

**Cuadro 20. Tipo de consumo de drogas ilícitas**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Experimental	971	8.1	8.5	692	7	7.4	279	13.1	13.7
Social u ocasional	1546	12.9	13.6	1195	12.2	12.8	351	16.5	17.3
Funcional	6170	51.6	54.1	5191	52.8	55.4	979	46	48.2
Disfuncional	2265	18.9	19.9	1924	19.6	20.5	341	16	16.8
En remisión	448	3.7	3.9	368	3.7	3.9	80	3.8	3.9
<i>Sin información</i>	558	4.7	<i>Se omite</i>	458	4.7	<i>Se omite</i>	100	4.7	<i>Se omite</i>
<b>Total</b>	<b>11958</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>9828</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>2130</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Cuadro 21. Total de drogas consumidas alguna vez en la vida.  
(Incluye alcohol o tabaco)**

	General*		Hombres**		Mujeres***	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
1 sustancia	552	4.6	441	4.5	111	5.2
2 sustancias	1016	8.5	788	8	228	10.7
3 sustancias	3497	29.2	2802	28.5	695	32.6
4 sustancias	2548	21.3	2094	21.3	454	21.3
5 sustancias	1688	14.1	1417	14.4	271	12.7
6 sustancias	1137	9.5	964	9.8	173	8.1
7 sustancias	655	5.5	561	5.7	94	4.4
8 sustancias	358	3	309	3.1	49	2.3
9 sustancias	222	1.9	200	2	22	1
10 sustancias	120	1	104	1.1	16	0.8
11 -21 sustancias	165	1.3	148	1.5	17	0.8
<b>Total</b>	<b>11958</b>	<b>100</b>	<b>9828</b>	<b>100</b>	<b>2130</b>	<b>100</b>

\*  $\mu= 4.3$ ;  $\sigma = 2.1$ ; Med.= 4; Mo.= 3; Decil1 = 2

\*\*  $\mu= 4.4$ ;  $\sigma = 2.1$ ; Med.= 4; Mo.= 3; Decil1 = 2

\*\*\*  $\mu= 3.9$ ;  $\sigma = 1.9$ ; Med.= 3; Mo.= 3; Decil1 = 2

**Cuadro 22. Total de drogas ilícitas consumidas alguna vez en la vida  
(No incluye ni alcohol ni tabaco)**

	General*		Hombres**		Mujeres***	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
1 sustancia	4599	38.5	3656	37.2	943	44.3
2 sustancias	2811	23.5	2299	23.4	512	24
3 sustancias	1805	15.1	1520	15.5	285	13.4
4 sustancias	1157	9.7	970	9.9	187	8.8
5 sustancias	694	5.8	599	6.1	95	4.5
6 sustancias	372	3.1	321	3.3	51	2.4
7 sustancias	228	1.9	204	2.1	24	1.1
8 sustancias	123	1	107	1.1	16	0.8
9 sustancias	79	0.7	69	0.7	10	0.5
10 sustancias	39	0.3	36	0.4	3	0.1
11-19 sustancias	51	0.4	47	0.4	4	0.2
<b>Total</b>	<b>11958</b>	<b>100</b>	<b>9828</b>	<b>100</b>	<b>2130</b>	<b>100</b>

\*  $\mu= 2.5$ ;  $\sigma = 1.9$ ; Med.=2; Mo.= 1; Decil1 = 1

\*\*  $\mu= 2.6$ ;  $\sigma = 1.9$ ; Med.=2; Mo.= 1; Decil1 = 1

\*\*\*  $\mu= 2.2$ ;  $\sigma = 1.7$ ; Med.=2; Mo.= 1; Decil1 = 1

**Cuadro 23. Consumo de drogas alguna vez en la vida por sustancia**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
<b>Tabaco</b>	10236	85.6	8464	86.1	1772	83.2
<b>Alcohol</b>	10687	89.4	8803	89.6	1884	88.5
<b>Cannabis</b>	9390	78.5	7955	80.9	1435	67.4
Mariguana	9378	78.4	7944	80.8	1434	67.3
Hachís	503	4.2	440	4.5	63	3
<b>Cocaína</b>	5513	46.1	4736	48.2	777	36.5
Polvo blanco	4473	37.4	3803	38.7	670	31.5
Crack	2967	24.8	2633	26.8	334	15.7
Otra presentación	71	0.6	63	0.6	8	0.4
<b>Inhalables</b>	5154	43.1	4205	42.8	949	44.6
Solventes o removedores	3905	32.7	3179	32.3	726	34.1
Pegamentos	1203	10.1	1030	10.5	173	8.1
Esmaltes o pinturas	596	5	474	4.8	122	5.7
Otros	329	2.8	275	2.8	54	2.5
<b>Depresores</b>	1792	15	1439	14.6	353	16.6
Benzodiacepinas	1587	13.3	1265	12.9	322	15.1
Rohypnol	256	2.1	238	2.4	18	0.8
Otros	69	0.6	48	0.5	21	1
<b>Estimulantes</b>	2271	19	1826	18.6	445	20.9
Anfetamina	391	3.3	311	3.2	80	3.8
Metanfetaminas	1378	11.5	1144	11.6	234	11
Éxtasis (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas	727	6.1	556	5.7	171	8
Otros	94	0.8	81	0.8	13	0.6
<b>Drogas alucinógenas y disociativas</b>	1198	10	1027	10.4	171	8
LSD	765	6.4	644	6.6	121	5.7
Plantas alucinógenas y derivados	670	5.6	589	6	81	3.8
Otras	71	0.6	61	0.6	10	0.5
<b>Opiáceos</b>	487	4.1	415	4.2	72	3.4
Heroína	413	3.5	353	3.6	60	2.8
Opiáceos sintéticos	54	0.5	52	0.5	2	0.1
Opio y otros opiáceos	71	0.6	57	0.6	14	0.7
<b>Otras sustancias de abuso</b>	303	2.5	219	2.2	84	3.9
Con utilidad médica	90	0.8	62	0.6	28	1.3
Otras	215	1.8	159	1.6	56	2.6

**Cuadro 24. Total de drogas consumidas en el último año  
(Incluye alcohol o tabaco)**

	General*		Hombres**		Mujeres***	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Ninguna	358	3	301	3.1	57	2.7
1 sustancia	1247	10.4	1013	10.3	234	11
2 sustancias	2478	20.7	1997	20.3	481	22.6
3 sustancias	3642	30.5	3017	30.7	625	29.3
4 sustancias	2031	17	1688	17.2	343	16.1
5 sustancias	1050	8.8	860	8.8	190	8.9
6 sustancias	570	4.8	464	4.7	106	5
7 sustancias	288	2.4	238	2.4	50	2.3
8 sustancias	140	1.2	118	1.2	22	1
9 sustancias	84	0.7	73	0.7	11	0.5
10 sustancias	40	0.3	35	0.4	5	0.2
11-15 sustancias	30	0.2	24	0.1	6	0.2
<b>Total</b>	<b>11958</b>	<b>100</b>	<b>9828</b>	<b>100</b>	<b>2130</b>	<b>100</b>

\*  $\mu= 3.2$ ;  $\sigma = 1.8$ ; Med.= 3; Mo.= 3; Decil1 = 1

\*\*  $\mu= 3.2$ ;  $\sigma = 1.8$ ; Med.= 3; Mo.= 3; Decil1 = 1

\*\*\*  $\mu= 3.1$ ;  $\sigma = 1.7$ ; Med.= 3; Mo.= 3; Decil1 = 1

**Cuadro 25. Total de drogas ilícitas consumidas en el último año  
(No incluye ni alcohol ni tabaco)**

	General*		Hombres**		Mujeres***	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Ninguna	1584	13.2	1265	12.9	319	15
1 sustancia	5448	45.6	4486	45.6	962	45.2
2 sustancias	2505	20.9	2077	21.1	428	20.1
3 sustancias	1163	9.7	970	9.9	193	9.1
4 sustancias	625	5.2	495	5	130	6.1
5 sustancias	316	2.6	263	2.7	53	2.5
6 sustancias	154	1.3	136	1.4	18	0.8
7 sustancias	89	0.7	74	0.8	15	0.7
8 sustancias	41	0.3	35	0.4	6	0.3
9 sustancias	21	0.2	17	0.2	4	0.2
10 sustancias	4	0	3	0	1	0
11-13 sustancias	8	0	7	0	1	0
<b>Total</b>	<b>11958</b>	<b>100</b>	<b>9828</b>	<b>100</b>	<b>2130</b>	<b>100</b>

\*  $\mu= 1.7$ ;  $\sigma = 1.5$ ; Med.= 1; Mo.= 1; Decil1 = ninguna

\*\*  $\mu= 1.7$ ;  $\sigma = 1.5$ ; Med.= 1; Mo.= 1; Decil1 = ninguna

\*\*\*  $\mu= 1.6$ ;  $\sigma = 1.4$ ; Med.= 1; Mo.= 1; Decil1 = ninguna

**Cuadro 26. Consumo de drogas en los últimos 12 meses por sustancia**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
<b>Tabaco</b>	8891	74.4	7317	74.5	1574	73.9
<b>Alcohol</b>	9455	79.1	7756	78.9	1699	79.8
<b>Cannabis</b>	7267	60.8	6195	63	1072	50.3
Mariguana	7256	60.7	6185	62.9	1071	50.3
Hachís	320	2.7	276	2.8	44	2.1
<b>Cocaína</b>	3587	30	3055	31.1	532	25
Polvo blanco	2459	20.6	2037	20.7	422	19.8
Crack	1937	16.2	1710	17.4	227	10.7
Otra presentación	31	0.3	29	0.3	2	0.1
<b>Inhalables</b>	3744	31.3	2956	30.1	788	37
Solventes o removedores	2826	23.6	2220	22.6	606	28.5
Pegamentos	736	6.2	611	6.2	125	5.9
Esmaltes o pinturas	416	3.5	316	3.2	100	4.7
Otros	187	1.6	146	1.5	41	1.9
<b>Depresores</b>	1101	9.2	841	8.6	260	12.2
Benzodiacepinas	1005	8.4	765	7.8	240	11.3
<i>Rohypnol</i>	81	0.7	73	0.7	8	0.4
Otros	45	0.4	30	0.3	15	0.7
<b>Estimulantes</b>	1498	12.5	1173	11.9	325	15.3
Anfetamina	233	1.9	178	1.8	55	2.6
Metanfetaminas	912	7.6	733	7.5	179	8.4
Éxtasis (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas	433	3.6	317	3.2	116	5.4
Otros	61	0.5	52	0.5	9	0.4
<b>Drogas alucinógenas y disociativas</b>	653	5.5	543	5.5	110	5.2
LSD	445	3.7	364	3.7	81	3.8
Plantas alucinógenas y derivados	290	2.4	245	2.5	45	2.1
Otras	24	0.2	21	0.2	3	0.1
<b>Opiáceos</b>	317	2.7	262	2.7	55	2.6
Heroína	279	2.3	232	2.4	47	2.2
Opiáceos Sintéticos	33	0.3	31	0.3	2	0.1
Opio y Otros opiáceos	26	0.2	18	0.2	8	0.4
<b>Otras sustancias de abuso</b>	190	1.6	134	1.4	56	2.6
Con utilidad médica	54	0.5	36	0.4	18	0.8
Otras	136	1.1	98	1	38	1.8

**Cuadro 27. Droga de preferencia en los últimos 12 meses**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Tabaco	1490	12.5	13.2	1166	11.9	12.6	324	15.2	16.1
Alcohol	2082	17.4	18.5	1644	16.7	17.8	438	20.6	21.8
Mariguana	4045	33.8	35.9	3617	36.8	39.1	428	20.1	21.3
Hachís	32	0.3	0.3	27	0.3	0.3	5	0.2	0.2
Cocaína en polvo blanco	421	3.5	3.7	350	3.6	3.8	71	3.3	3.5
<i>Crack</i>	735	6.1	6.5	660	6.7	7.1	75	3.5	3.7
Cocaína en otra presentación	5	0.0	0.0	5	0.1	0.1			
Solventes o removedores	1214	10.2	10.8	873	8.9	9.4	341	16.0	17.0
Pegamentos	196	1.6	1.7	151	1.5	1.6	45	2.1	2.2
Esmaltes o pinturas	122	1.0	1.1	83	0.8	0.9	39	1.8	1.9
Otros inhalables	42	0.4	0.4	28	0.3	0.3	14	0.7	0.7
Anfetaminas	64	0.5	0.6	56	0.6	0.6	8	0.4	0.4
Metanfetaminas	312	2.6	2.8	226	2.3	2.4	86	4.0	4.3
Éxtasis (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas	38	0.3	0.3	20	0.2	0.2	18	0.8	0.9
Otros estimulantes	13	0.1	0.1	12	0.1	0.1	1	0.0	0.0
LSD	42	0.4	0.4	29	0.3	0.3	13	0.6	0.6
Plantas alucinógenas y derivados	4	0.0	0.0	3	0.0	0.0	1	0.0	0.0
Otras sustancias alucinógenas o disociativas	4	0.0	0.0	2	0.0	0.0	2	0.1	0.1
Benzodiacepinas	102	0.9	0.9	56	0.6	0.6	46	2.2	2.3
<i>Rohypnol</i>	11	0.1	0.1	9	0.1	0.1	2	0.1	0.1
Otros depresores	14	0.1	0.1	6	0.1	0.1	8	0.4	0.4
Heroína	211	1.8	1.9	177	1.8	1.9	34	1.6	1.7
Opiáceos Sintéticos	13	0.1	0.1	13	0.1	0.1			
Opio y Otros opiáceos	10	0.1	0.1	8	0.1	0.1	2	0.1	0.1
Con utilidad médica	5	0.0	0.0	2	0.0	0.0	3	0.1	0.1
Otras	33	0.3	0.3	27	0.3	0.3	6	0.3	0.3
<i>No aplica</i>	358	3.0	<i>Se omite</i>	301	3.1	<i>Se omite</i>	57	2.7	<i>Se omite</i>
<i>Sin Información</i>	340	2.8	<i>Se omite</i>	277	2.8	<i>Se omite</i>	63	3.0	<i>Se omite</i>
<b>Total</b>	<b>11958</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>9828</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>2130</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Cuadro 28. Droga de mayor impacto en los últimos 12 meses**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Tabaco	917	7.7	8.2	717	7.3	7.8	200	9.4	10.0
Alcohol	1807	15.1	16.1	1423	14.5	15.4	384	18.0	19.2
Mariguana	3602	30.1	32.1	3199	32.5	34.6	403	18.9	20.2
Hachís	38	0.3	0.3	28	0.3	0.3	10	0.5	0.5
Cocaína en polvo blanco	579	4.8	5.2	478	4.9	5.2	101	4.7	5.1
<i>Crack</i>	968	8.1	8.6	887	9.0	9.6	81	3.8	4.1
Cocaína en otra presentación	8	0.1	0.1	6	0.1	0.1	2	0.1	0.1
Solventes o removedores	1626	13.6	14.5	1214	12.4	13.1	412	19.3	20.6
Pegamentos	287	2.4	2.6	222	2.3	2.4	65	3.1	3.3
Esmaltes o pinturas	164	1.4	1.5	119	1.2	1.3	45	2.1	2.3
Otros inhalables	55	0.5	0.5	42	0.4	0.5	13	0.6	0.7
Anfetaminas	89	0.7	0.8	77	0.8	0.8	12	0.6	0.6
Metanfetaminas	456	3.8	4.1	355	3.6	3.8	101	4.7	5.1
Éxtasis (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas	59	0.5	0.5	39	0.4	0.4	20	0.9	1.0
Otros estimulantes	22	0.2	0.2	19	0.2	0.2	3	0.1	0.2
LSD	42	0.4	0.4	30	0.3	0.3	12	0.6	0.6
Plantas alucinógenas y derivados	16	0.1	0.1	13	0.1	0.1	3	0.1	0.2
Otras sustancias alucinógenas o disociativas	5	0.0	0.0	2	0.0	0.0	3	0.1	0.2
Benzodiacepinas	181	1.5	1.6	111	1.1	1.2	70	3.3	3.5
<i>Rohypnol</i>	11	0.1	0.1	8	0.1	0.1	3	0.1	0.2
Otros depresores	16	0.1	0.1	8	0.1	0.1	8	0.4	0.4
Heroína	222	1.9	2.0	187	1.9	2.0	35	1.6	1.8
Opiáceos Sintéticos	12	0.1	0.1	12	0.1	0.1			
Opio y Otros opiáceos	12	0.1	0.1	9	0.1	0.1	3	0.1	0.2
Con utilidad médica	7	0.1	0.1	4	0.0	0.0	3	0.1	0.2
Otras	32	0.3	0.3	27	0.3	0.3	5	0.2	0.3
<i>No aplica</i>	358	3.0	<i>Se omite</i>	301	3.1	<i>Se omite</i>	57	2.7	<i>Se omite</i>
<i>Sin Información</i>	367	3.1	<i>Se omite</i>	291	3.0	<i>Se omite</i>	76	3.6	<i>Se omite</i>
<b>Total</b>	<b>11958</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>9828</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>2130</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Cuadro 29. Uso combinado de drogas en los últimos 12 meses  
(No incluye tabaco)**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Si combinó drogas	4752	39.7	53.1	3999	40.7	54.1	753	35.4	48.2
No combinó drogas	4199	35.1	46.9	3389	34.5	45.9	810	38.0	51.8
<i>No aplica</i>	<i>3007</i>	<i>25.1</i>	<i>Se omite</i>	<i>2440</i>	<i>24.8</i>	<i>Se omite</i>	<i>567</i>	<i>26.6</i>	<i>Se omite</i>
<b>Total</b>	<b>11958</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>9828</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>2130</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Cuadro 30. Total de drogas consumidas en los últimos 30 días  
(Incluye alcohol o tabaco)**

	General*		Hombres**		Mujeres***	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Ninguna	1204	10.1	961	9.8	243	11.4
1 sustancia	2584	21.6	2057	20.9	527	24.7
2 sustancias	3491	29.2	2879	29.3	612	28.7
3 sustancias	2946	24.6	2496	25.4	450	21.1
4 sustancias	1111	9.3	917	9.3	194	9.1
5 sustancias	405	3.4	349	3.6	56	2.6
6 sustancias	145	1.2	113	1.1	32	1.5
7 sustancias	42	0.4	31	0.3	11	0.5
8 sustancias	17	0.1	14	0.1	3	0.1
9 sustancias	7	0.1	5	0.1	2	0.1
10 sustancias	3	0	3	0	0	0
11-12 sustancias	3	0	3	0	0	0
<b>Total</b>	<b>11958</b>	<b>100</b>	<b>9828</b>	<b>100</b>	<b>2130</b>	<b>100</b>

\*  $\mu = 2.2$ ;  $\sigma = 1.4$ ; Med.= 2; Mo.= 2; Decil1 = ninguna

\*\*  $\mu = 2.2$ ;  $\sigma = 1.4$ ; Med.= 2; Mo.= 2; Decil1 = 1

\*\*\*  $\mu = 2.1$ ;  $\sigma = 1.4$ ; Med.=2; Mo.= 2; Decil1 = ninguna

**Cuadro 31. Total de drogas ilícitas consumidas en los últimos 30 días  
(No incluye alcohol ni tabaco)**

	General*		Hombres**		Mujeres***	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Ninguna	4009	33.5	3208	32.6	801	37.6
1 sustancia	5484	45.9	4569	46.5	915	43
2 sustancias	1689	14.1	1407	14.3	282	13.2
3 sustancias	508	4.2	432	4.4	76	3.6
4 sustancias	182	1.5	147	1.5	35	1.6
5 sustancias	52	0.4	36	0.4	16	0.8
6 sustancias	20	0.2	17	0.2	3	0.1
7 sustancias	8	0.1	6	0.1	2	0.1
8 sustancias	3	0	3	0	0	0
9 sustancias	1	0	1	0	0	0
11 sustancias	2	0	2	0	0	0
<b>Total</b>	<b>11958</b>	<b>100</b>	<b>9828</b>	<b>100</b>	<b>2130</b>	<b>100</b>

\*  $\mu= 1$ ;  $\sigma = 1$ ; Med.= 1; Mo.= 1; Decil1 = ninguna

\*\*  $\mu= 1$ ;  $\sigma = 1$ ; Med.= 1; Mo.= 1; Decil1 = ninguna

\*\*\*  $\mu= 0.9$ ;  $\sigma = 1$ ; Med.= 1; Mo.= 1; Decil1 = ninguna

**Cuadro 32. Consumo de drogas en los últimos 30 días por sustancia**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
<b>Tabaco</b>	7765	64.9	6445	65.6	1320	62
<b>Alcohol</b>	6933	58	5744	58.4	1189	55.8
<b>Cannabis</b>	5032	42.1	4355	44.3	677	31.8
Mariguana	5021	42	4345	44.2	676	31.7
Hachís	122	0.1	100	0.1	22	0.1
<b>Cocaína</b>	1896	15.9	1651	16.8	245	11.5
Polvo blanco	1034	8.6	872	8.9	162	7.6
Crack	1077	9	967	9.8	110	5.2
Otra presentación	11	0.1	11	0.1		
<b>Inhalables</b>	2409	20.1	1882	19.1	527	24.7
Solventes o removedores	1842	15.4	1420	14.4	422	19.8
Pegamentos	410	3.4	347	3.5	63	3
Esmaltes o pinturas	226	1.9	169	1.7	57	2.7
Otros	72	0.6	59	0.6	13	0.6
<b>Depresores</b>	544	4.5	388	3.9	156	7.3
Benzodiacepinas	501	4.2	360	3.7	141	6.6
Rohypnol®	28	0.2	24	0.2	4	0.2
Otros	29	0.2	16	0.2	13	0.6
<b>Estimulantes</b>	693	5.8	532	5.4	161	7.6
Anfetamina	90	0.8	65	0.7	25	1.2
Metanfetaminas	482	4	381	3.9	101	4.7
Éxtasis (MDMA) y Metanfetaminas Alucinógenas	130	1.1	87	0.9	43	2
Otros	26	0.2	24	0.2	2	0.1
<b>Drogas alucinógenas y disociativas</b>	168	1.4	136	1.4	32	1.5
LSD	114	1	91	0.9	23	1.1
Plantas alucinógenas y derivados	61	0.5	50	0.5	11	0.5
Otras	8	0.1	7	0.1	1	0
<b>Opiáceos</b>	241	2	202	2.1	39	1.8
Heroína	213	1.8	180	1.8	33	1.5
Opiáceos Sintéticos	20	0.2	18	0.2	2	0.1
Opio y Otros opiáceos	12	0.1	6	0.1	6	0.3
<b>Otras sustancias de abuso</b>	76	0.6	47	0.5	29	1.4
Con utilidad médica	24	0.2	12	0.1	12	0.6
Otras	52	0.4	35	0.4	17	0.8

**Cuadro 33. Frecuencia de episodios de abuso del consumo de Tabaco<sup>1</sup> en los últimos 30 días**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Ni una vez	2319	19.4	30.5	1949	19.8	30.8	370	17.4	28.8
< de 1 vez a la semana	829	6.9	10.9	683	6.9	10.8	146	6.9	11.4
1 o 2 veces a la semana	877	7.3	11.5	721	7.3	11.4	156	7.3	12.1
Cada tercer día	536	4.5	7	458	4.7	7.2	78	3.7	6.1
Diario	3051	25.5	40.1	2516	25.6	39.8	535	25.1	41.6
<i>No consumió en los últimos 30 días</i>	4193	35.1	<i>Se omite</i>	3383	34.4	<i>Se omite</i>	810	38	<i>Se omite</i>
<i>Sin información</i>	153	1.3	<i>Se omite</i>	118	1.2	<i>Se omite</i>	35	1.6	<i>Se omite</i>
<b>Total</b>	<b>11958</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>9828</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>2130</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

<sup>1</sup> Consumo de seis o más cigarros en un solo día.

**Cuadro 34. Frecuencia de episodios de abuso del consumo de Alcohol<sup>1</sup> en los últimos 30 días**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Ni una vez	1055	8.8	15.6	866	8.8	15.5	189	8.9	16.4
< de 1 vez a la semana	2247	18.8	33.2	1843	18.8	32.9	404	19	35
1 o 2 veces a la semana	2448	20.5	36.2	2048	20.8	36.5	400	18.8	34.7
Cada tercer día	542	4.5	8	444	4.5	7.9	98	4.6	8.5
Diario	467	3.9	6.9	404	4.1	7.2	63	3	5.5
<i>No consumió en los últimos 30 días</i>	5025	42	<i>Se omite</i>	4084	41.6	<i>Se omite</i>	941	44.2	<i>Se omite</i>
<i>Sin información</i>	174	1.5	<i>Se omite</i>	139	1.4	<i>Se omite</i>	35	1.6	<i>Se omite</i>
<b>Total</b>	<b>11958</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>9828</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>2130</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

<sup>1</sup> Consumo de más de cuatro copas en un día para los hombres y de más de tres copas en un día para las mujeres.

**Cuadro 35. Frecuencia de episodios de abuso del consumo de drogas ilícitas<sup>1</sup> en los últimos 30 días**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
< de 1 vez a la semana	1545	12.9	23.3	1195	12.2	21.6	350	16.4	31.8
1 o 2 veces a la semana	1473	12.3	22.2	1228	12.5	22.2	245	11.5	22.3
Cada tercer día	1040	8.7	15.7	887	9	16.1	153	7.2	13.9
Diario	2566	21.5	38.7	2215	22.5	40.1	351	16.5	31.9
<i>No consumió en los últimos 30 días</i>	4009	33.5	<i>Se omite</i>	3208	32.6	<i>Se omite</i>	801	37.6	<i>Se omite</i>
<i>Sin información</i>	1325	11.1	<i>Se omite</i>	1095	11.1	<i>Se omite</i>	230	10.8	<i>Se omite</i>
<b>Total</b>	<b>11958</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>9828</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>2130</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

<sup>1</sup> Consumo de cualquier dosis.

## GLOSARIO

A continuación se definen algunas de las variables de estudio:

**Drogas ilícitas de inicio:** Drogas ilegales que el usuario refirió haber utilizado a la misma edad reportada como edad de inicio del consumo de este tipo de sustancias. Excluye el uso de tabaco y alcohol.

**Droga de mayor impacto en los últimos 12 meses:** Sustancia que el propio usuario de drogas solicitante de tratamiento refiere como la que más problemas le ha ocasionado en los ámbitos de salud, personal, familiar, escolar, laboral o social, en el transcurso del último año.

**Droga de preferencia en los últimos 12 meses:** Sustancia que el propio usuario solicitante de tratamiento ha elegido o preferido consumir en el transcurso del último año.

**Estrato social:** Estimación que hace el terapeuta, según su percepción, del estrato al que pertenece el usuario de drogas, considerando aspectos como lugar de residencia, escolaridad, empleo y características manifiestas como higiene y aliño, calidad del vestido, expresión verbal y vocabulario, etc.

**Tipo de consumo de drogas ilícitas:** Características de consumo de sustancias ilegales según motivo, frecuencia y problemas asociados. No incluye el uso de alcohol y/o tabaco y se clasifica como: experimental, social u ocasional, funcional, disfuncional y en remisión.

**Total de drogas consumidas:** Número de drogas consumidas (se incluyen las 26 sustancias de seguimiento) en las siguientes categorías: alguna vez en la vida, en el último año y en los últimos 30 días.

**Uso combinado de drogas en los últimos 12 meses:** Consumo de dos o más sustancias (incluyendo alcohol y cualquier droga ilícita o de uso médico, utilizada sin prescripción, pero excluyendo tabaco) en el transcurso de un mismo día, en el año previo a la solicitud de tratamiento en CIJ.