

2014

# CONSUMO DE DROGAS EN PACIENTES DE PRIMER INGRESO A TRATAMIENTO A CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL JULIO - DICIEMBRE, 2013


Marina Velázquez Altamirano  
Alma Delia Gutiérrez López

Centros de Integración Juvenil  
Dirección de Investigación y Enseñanza  
Subdirección de Investigación  
Depto. de Investigación Clínica y Epidemiológica

**SIECD**  
SIECD

Sistema de Información  
Epidemiológica  
del Consumo de Drogas

Informe de Investigación 14-03a



## **DIRECTORIO**

---

**PRESIDENTE HONORARIO VITALICIO DEL PATRONATO NACIONAL**

Dr. Jesús Kumate Rodríguez

**PRESIDENTE DEL PATRONATO NACIONAL**

Dr. Roberto Tapia Conyer

**PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA**

Sra. Kena Moreno

**DIRECTORA GENERAL**

Lic. Carmen Fernández Cáceres

**DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE OPERACIÓN Y PATRONATOS**

Dr. José Ángel Prado García

**DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE NORMATIVIDAD**

Dr. Ricardo Sánchez Huesca

**DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA**

Dr. Jaime Arturo Quintanilla Bendek

**SUBDIRECTOR DE INVESTIGACIÓN**

Mtro. David Bruno Díaz Negrete

**JEFA DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA Y EPIDEMIOLÓGICA**

Dra. Solveig Eréndira Rodríguez Kuri

<b>CONTENIDO</b>	<b>PÁG.</b>
ANTECEDENTES	5
MÉTODO	6
CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS	8
FACTORES ASOCIADOS A LA DEMANDA DE TRATAMIENTO	11
CONSUMO DE DROGAS	14
REFERENCIAS	24
CUADROS	27
GLOSARIO	51

## ÍNDICE DE CUADROS

PÁG.

Cuadro 1	Pacientes de primer ingreso a tratamiento por unidad de atención (CIJ)	28
Cuadro 2	Sexo	31
Cuadro 3	Persona que proporciona la información	31
Cuadro 4	Edad de ingreso a tratamiento	31
Cuadro 5	Estado civil	32
Cuadro 6	Escolaridad	32
Cuadro 7	Ocupación	33
Cuadro 8	Estrato social	33
Cuadro 9	Motivos de consulta	34
Cuadro 10	Condicionantes de la solicitud de tratamiento	34
Cuadro 11	Antecedentes de acciones contra el consumo de sustancias	35
Cuadro 12	Problemas asociados al consumo de sustancias	35
Cuadro 13	Edad de inicio del consumo de Tabaco	36
Cuadro 14	Edad de inicio del consumo de Alcohol	36
Cuadro 15	Edad de inicio del consumo de Drogas ilícitas	37
Cuadro 16	Drogas ilícitas de inicio	38
Cuadro 17	Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de Tabaco y el ingreso a tratamiento a CIJ	39
Cuadro 18	Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de Alcohol y el ingreso a tratamiento a CIJ	39
Cuadro 19	Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de Drogas ilícitas y el ingreso a tratamiento a CIJ	40
Cuadro 20	Tipo de consumo de drogas ilícitas	40
Cuadro 21	Total de drogas consumidas alguna vez en la vida (incluye alcohol o tabaco)	41
Cuadro 22	Total de drogas ilícitas consumidas alguna vez en la vida (no incluye ni alcohol ni tabaco)	41
Cuadro 23	Consumo de drogas alguna vez en la vida por sustancia	42
Cuadro 24	Total de drogas consumidas en el último año (incluye alcohol o tabaco)	43
Cuadro 25	Total de drogas ilícitas consumidas en el último año (no incluye ni alcohol ni tabaco)	43
Cuadro 26	Consumo de drogas en los últimos 12 meses por sustancia	44
Cuadro 27	Droga de preferencia en los últimos 12 meses, según menciones	45
Cuadro 28	Droga de mayor impacto en los últimos 12 meses, según menciones	46
Cuadro 29	Uso combinado de drogas en los últimos 12 meses (no incluye tabaco)	47
Cuadro 30	Total de drogas consumidas en los últimos 30 días (incluye alcohol o tabaco)	47
Cuadro 31	Total de drogas ilícitas consumidas en los últimos 30 días (no incluye ni alcohol ni tabaco)	48
Cuadro 32	Consumo de drogas en los últimos 30 días por sustancia	49
Cuadro 33	Frecuencia de episodios de abuso del consumo de Tabaco en los últimos 30 días	50
Cuadro 34	Frecuencia de episodios de abuso del consumo de Alcohol en los últimos 30 días	50
Cuadro 35	Frecuencia de episodios de abuso del consumo de drogas ilícitas en los últimos 30 días	50

## RESUMEN

El informe se realizó con base en 11,692 registros clínicos de la entrevista inicial de usuarios de sustancias psicoactivas que reportaron consumo de al menos una droga ilícita y que acudieron por primera vez a consulta a Centros de Integración Juvenil entre julio y diciembre de 2013. Los objetivos del estudio son a) actualizar la información del perfil sociodemográfico de los pacientes, de los factores asociados a la demanda de tratamiento y del patrón de consumo de sustancias; b) contribuir a retroalimentar sistemas nacionales de información del consumo de drogas; c) generar información que oriente el desarrollo de estudios con pacientes o consumidores(as) de drogas en México; y d) contribuir al desarrollo, diseño y ajuste de los servicios institucionales de prevención y tratamiento del consumo de drogas.

Los datos que se presentan en este informe permiten ver que el uso de drogas ilícitas sigue siendo un trastorno que afecta en mayor proporción a la población masculina que solicita tratamiento, en una proporción de 4.6 hombres por cada mujer. La edad media de ingreso a tratamiento fue de 22.6 años. En promedio, los hombres ingresaron a tratamiento a mayor edad que las mujeres (22.9 y 21.4 años respectivamente). La edad promedio del inicio del consumo de tabaco se situó en los 14.3 años, la de alcohol en 14.4 años y la de drogas ilícitas en 16.1 años. Tanto hombres como mujeres iniciaron el consumo de estas sustancias alrededor de las edades mencionadas, lo muestra que la edad de inicio ya no presenta diferencias relevantes por sexo.

Las drogas de mayor consumo alguna vez en la vida fueron alcohol (87.1%), tabaco (84.2%), cannabis (85.4%), cocaína/*crack* (40.9%), inhalables (33.4%), estimulantes (21.7%, principalmente metanfetaminas: 15.4% y *éxtasis*: 6.5%), depresores (14.6%), drogas alucinógenas y disociativas (10.5%) y opiáceos (3.5%). En cuanto al consumo en el mes previo al ingreso a tratamiento, las sustancias más utilizadas fueron tabaco (62.0%), alcohol (54.1%), cannabis (49.6%), inhalables (13.4%) y cocaína/*crack* (13.1%). Las sustancias de mayor impacto fueron marihuana (43.2%), alcohol (14.5%), solventes y removedores (8.0%), tabaco (7.6%), metanfetaminas (7.2%), *crack* (5.7%), y cocaína en polvo (4.0%).

En cuanto a los factores asociados a la demanda de tratamiento se observó que los usuarios de drogas acudieron principalmente por condicionamiento o recomendación de la familia (45.3%) o por iniciativa propia (38.6%); que solicitaron atención debido a su consumo de drogas ilícitas (87.6%), de alcohol (41.2%) y de tabaco (37.4%); que previo al tratamiento algunos de ellos (31.0%) intentaron interrumpir de manera voluntaria y sin apoyo el consumo y otros (26.5%) no habían tomado ninguna medida contra el problema; y que entre los problemas más frecuentemente asociados al consumo se reconocieron los de tipo familiar (77.1%), los de salud (40.0%), los psicológicos (37.2%) y los escolares (36.4%).

## ANTECEDENTES

Centros de Integración Juvenil ha reportado información epidemiológica del consumo de drogas de las personas que acuden a tratamiento desde 1976<sup>1</sup>. En 1983, se inicia la aplicación de una cédula homogénea a los pacientes de nuevo ingreso<sup>2</sup>, aunque no es sino a partir de 1990 que la recolección de datos se realiza en forma sistemática<sup>3</sup> con la creación del *Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas* (SIECD), el cual se ha ido consolidando a través de los años, y ha permitido realizar el seguimiento oportuno de un conjunto de variables que, además de contribuir en la toma de decisiones del diseño y ajuste de servicios institucionales, también aporta conocimiento de la forma y tendencias del uso de drogas en nuestro país, asimismo, ofrece información a los Sistemas Epidemiológicos de las Adicciones existentes en el país, tal es el caso del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA)<sup>4</sup> de la Secretaría de Salud, y al Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas (SRID), perteneciente al Instituto Nacional de Psiquiatría “*Ramón de la Fuente*” (INP)<sup>5</sup>, así como al Observatorio Epidemiológico en Drogas de la Secretaría Salud<sup>6</sup>.

El SIECD, también ha apoyado en el desarrollo de diferentes estudios epidemiológicos especializados, con temas que van desde el perfil de usuarios de drogas y su trayectoria de consumo<sup>7</sup>, el consumo de drogas en las mujeres<sup>8</sup>, en la población infantil<sup>9</sup> o de acuerdo con las etapas de la vida<sup>10</sup>, hasta llegar a los estudios de tendencias<sup>11,12,13,14</sup>. Toda esta información ha facilitado el enfrentamiento oportuno de las problemáticas generadas por el creciente consumo de estimulantes y simultáneamente ha impulsado el desarrollo de estudios sobre las características particulares de los consumidores de estos alcaloides<sup>15,16</sup>.

Por otro lado, la información reportada ha dado pie al desarrollo de estudios epidemiológicos particulares enfocados en profundizar en las características del consumo de drogas legales de pacientes atendidos. Así, desde el año 2006, el SIECD genera un informe por separado de las características de los pacientes consumidores de tabaco y alcohol<sup>17</sup>, con lo cual se ha logrado identificar una emergencia epidemiológica del consumo de alcohol entre las pacientes atendidas con relación a los años anteriores<sup>18</sup>; suceso que también ha sido reportado por la Encuesta Nacional de Adicciones (ENA), sobre todo para el caso de las mujeres jóvenes<sup>19</sup> y ha dado pie a CIJ para profundizar en esta problemática<sup>20</sup>.

Adicionalmente, es importante destacar que la información generada por el SIECD durante el lapso de más de dos décadas ha sido consistente con la de las Encuestas Nacionales de Adicciones (ENA) de este periodo, ya sea en el nivel nacional o en el regional<sup>19</sup> y también ha sido referente para el desarrollo de metodologías de investigación en variados estudios clínicos, psicosociales y evaluativos de la Institución, como es el caso de diversos *Estudios de la Comunidad Objetivo* (EBCO)<sup>21</sup> realizados por los CIJ a lo largo y ancho del país.

El presente informe se elaboró con base en la información obtenida por el SIECD de Centros de Integración Juvenil (CIJ) durante el segundo semestre de 2013 y tiene el objetivo de proporcionar datos actualizados sobre las características sociodemográficas, factores asociados a la demanda de tratamiento y del patrón de consumo de drogas de la población usuaria de los servicios de tratamiento institucionales, con el propósito adicional de apoyar el diseño, planeación y ajuste de los programas institucionales de prevención, tratamiento y rehabilitación, además de contribuir con información a los sistemas de información en drogas de los Gobiernos y de aportar elementos para la elaboración de investigaciones en el campo de las adicciones.

## MÉTODO

**Diseño de estudio:** Censo, estudio transversal, descriptivo.

**Población:** 11,692 usuarios de drogas ilícitas procedentes de 105 unidades de CIJ que acudieron por primera vez a consulta entre julio y diciembre de 2013 y que proporcionaron personalmente la información (cuadro 1. Anexo).

**Fuente de información:** Formato de Entrevista Inicial, aplicado en la primera consulta por parte del personal médico-técnico responsable del ingreso de pacientes a tratamiento, que forma parte del expediente clínico en cualquiera de sus dos versiones: formato electrónico (base de datos recuperada el día 19 de Febrero del 2014, con 11,396 registros capturados por los y las terapeutas responsables de realizar la entrevista inicial); o formato impreso (296 registros capturados por personal del departamento de Investigación Clínica y Epidemiológica mediante el programa *Control de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas* desarrollado por CIJ).

**Variables de estudio:** Las características sociodemográficas estudiadas comprenden: persona que proporciona la información, sexo, edad de ingreso a tratamiento, estado civil, escolaridad, ocupación y estrato social; las variables de los factores asociados a la demanda de tratamiento: motivo(s) de consulta, condicionante(s) de la solicitud de

tratamiento, antecedente(s) de acciones tomadas frente al uso de sustancias y problema(s) asociado(s) al mismo; y las variables de patrón de consumo: edad de inicio, tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de sustancias y el ingreso a tratamiento, consumo alguna vez en la vida, en el último año y en los últimos 30 días; drogas de preferencia y de mayor impacto en el último año, uso combinado de sustancias, tipo de consumo de drogas ilícitas, episodios de abuso y total de drogas consumidas.

La información sobre el consumo de drogas se presenta categorizada en diez grupos de sustancias que a su vez desagrega a 26 categorías de drogas:

Grupo de Sustancias	Drogas en seguimiento
Tabaco	Tabaco
Alcohol	Alcohol
Cannabis	Mariguana y hachís
Cocaína	Cocaína en polvo, <i>crack</i> y otra presentación de cocaína
Inhalables	Solventes y removedores, pegamentos, esmaltes y pinturas y otros inhalables
Depresores	Benzodiacepinas, <i>Rohypnol</i> y otros depresores
Estimulantes	Anfetaminas, metanfetaminas ( <i>crystal, ICE, etc.</i> ), MDMA ( <i>éxtasis</i> ) y metanfetaminas alucinógenas; y otros estimulantes
Drogas alucinógenas y disociativas	Ácido lisérgico (LSD), plantas alucinógenas y derivados y otros alucinógenos (PCP, Ketamina)
Opiáceos	Heroína, opiáceos sintéticos, y opio y otros opioides
Otras sustancias de abuso	Sustancias con utilidad médica y otras sustancias no identificadas

**Procesamiento de datos.** Para el procesamiento estadístico de la información se utilizó el programa SPSS v.19.

Los resultados se presentan tanto en forma general como desglosada por sexo y en porcentajes válidos, es decir, se excluyeron casos “*sin información*” y aquellos que no cumplieron con las condiciones requeridas para el análisis en cada variable de estudio.

## CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS<sup>a</sup>

**Sexo.** La población se conformó por 9,598 hombres y 2,094 mujeres, lo que en porcentaje representa a un 82.1% y un 17.9%, respectivamente. Dando así una proporción aproximada de cuatro hombres (4.6) por cada mujer.

**Persona que proporciona la información.** En la mitad de las ocasiones (51.9%) los pacientes acudieron en compañía de familiares u otras personas (51.9% de los hombres y 52.3% de las mujeres), mientras que en la otra mitad (48.1%) lo hicieron solos (48.1% de los hombres y 47.7% de las mujeres).

**Edad de ingreso a tratamiento.** Se observa un rango de edad de 7 a 83 años, con un promedio de 22.6 años y una desviación estándar de diez ( $\sigma=10.4$ ), es decir que más del 80% de las personas atendidas (9,768) se encuentra entre los 13 y 33 años de edad; la edad mediana de la población es de 18 años, lo que significa que el 45.4% de los casos son menores de edad (5,305 sujetos); finalmente, la moda se ubicó en 16 años (1,282 personas atendidas).

Figura 1. Edad de ingreso según sexo



	Años	Años
<b>Media</b>	22.9	21.4
<b>Desviación estándar</b>	10.4	10.3
<b>Mediana</b>	18	17
<b>Moda</b>	16	14


Las mujeres ingresaron a tratamiento a menor edad.

<sup>a</sup> Cfr., Cuadros 1 a 8.

**Estado civil.** La mayor parte de la población refirió ser soltera (73.3%), mientras que 10.2% indicó que vivía en unión libre y 9.8% estaba casada, con ligeras diferencias entre los sexos.


**Figura 2. Estado civil según sexo**

Un mayor porcentaje de hombres contaba con una relación de pareja; mientras que en mayor proporción las mujeres se encontraban separadas, divorciadas o viudas.



**Escolaridad.** 42.7% cursaba o había cursado algún grado de educación secundaria, 37.2% al menos algún grado de bachillerato y 8.4% contaba con algún grado escolar de nivel primaria o de nivel superior.


**Figura 3. Escolaridad según sexo**



Las mujeres registraron menores niveles de escolaridad que los hombres.


**Ocupación.** 37.8% se dedicaba a estudiar, 31.3% desempeñaba alguna actividad laboral y 22.3% estaba desempleado.

**Figura 4. Principal ocupación según sexo**




**Estrato social.** Según la percepción de los terapeutas 61.8% de los pacientes se ubicaban en el estrato medio bajo, 26.7% en el estrato bajo y 10.2%, en el medio alto.

**Figura 5. Estrato social según sexo**




## FACTORES ASOCIADOS A LA DEMANDA DE TRATAMIENTO<sup>b</sup>

**Motivos de consulta.** 43.7% de las personas atendidas reportó más de un motivo para acudir a tratamiento (uso de alcohol, tabaco o drogas), mientras que 0.3% no expresó ninguno. Conviene señalar que 87.6% acudió por consumo de drogas ilícitas, 41.2% por uso de bebidas alcohólicas y 37.4% por uso de tabaco.



Los hombres superaron ligeramente a las mujeres en acudir a tratamiento por el consumo de drogas ilegales, alcohol o tabaco.


**Condicionantes de la solicitud de tratamiento.** 24.2% de los casos expresó dos o más condicionantes; 45.3% acudió por recomendación de la familia, 38.6% por iniciativa propia, 19.0% por condicionamiento o recomendación escolar, 9.9% por condicionamiento legal y 6.9% por indicación médica.



Tanto hombres como mujeres indicaron acudir principalmente por iniciativa propia y recomendación familiar; sin embargo, ellas destacaron en la asistencia a tratamiento por recomendación escolar y por indicación médica, y ellos por el condicionamiento legal o laboral.


<sup>b</sup> Cfr., Cuadros 9 a 12.

**Antecedentes de acciones contra el consumo de sustancias.** 31.0% de los pacientes expresó que antes de acudir a CIJ había intentado interrumpir el consumo por voluntad propia, 12.6% señaló que previamente había estado internado en algún anexo, 7.3% había acudido a grupos de autoayuda, 6.6% acudió a algún tipo de tratamiento psiquiátrico o psicoterapéutico y 6.1% lo había hecho por medio de juramento. Cabe señalar que 11.8% reportó haber intentado al menos dos formas distintas de acciones para abandonar el consumo de drogas, en tanto que 26.5% expresó que hasta el momento de la solicitud de tratamiento no había tomado ninguna medida en contra del consumo de drogas.



**Problemas asociados al consumo de sustancias.** 77.1% señaló problemas de tipo familiar, 40.0% de salud, 37.2% psicológicos, 36.4% escolares, 20.1% laborales, 20.6% legales, 15.3% de conducta antisocial o delictiva y 12.5% accidentes o lesiones. Cabe señalar que 73.6% de las personas atendidas mencionaron dos o más problemas asociados al consumo de sustancias, mientras que 7.1% no reportó ninguno.

**Figura 9. Problemas asociados al consumo de sustancias según sexo**



## CONSUMO DE DROGAS<sup>c</sup>

**Edad de inicio del consumo de sustancias.** La edad promedio de inicio del consumo de tabaco se situó en 14.3 años ( $\sigma=3.2$  años), la mediana en 14 años y la moda en 15 años, mientras que la edad promedio de inicio del consumo de alcohol se ubicó en 14.4 años ( $\sigma=3.0$  años) con una mediana de 14 años y una moda de 15 años. Por su parte, la edad promedio de inicio en el abuso de drogas ilícitas (incluyendo sustancias de uso médico sin prescripción) fue de 16.1 años ( $\sigma=5.2$  años), con mediana de 15 años y la moda de 14 y 15 años (1,910 casos para cada edad). Por otra parte, al considerar el primer decil como indicador de las edades de inicio más tempranas, se observa que el consumo de tabaco aparece a los 11 años, mientras que el de alcohol y drogas ilícitas se presenta un año después.

Figura 10. Edad de inicio del consumo de sustancias según sexo

No existen diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a la edad de inicio del consumo de drogas



Años




Años

	Años			Años		
	Tabaco	Alcohol	Drogas ilícitas	Tabaco	Alcohol	Drogas ilícitas
<b>Promedio</b>	14.3	14.4	16.0	14.4	14.5	16.7
<b>Desviación estándar</b>	3.1	2.8	4.8	3.6	3.7	6.6
<b>Mediana</b>	14	14	15	14	14	15
<b>Moda</b>	15	15	15	13	13	14

<sup>c</sup> Cfr., Cuadros 13 a 35

**Drogas ilícitas de inicio.** Las sustancias de inicio más reportadas fueron: en primer lugar la cannabis (70.5%), sobre todo en forma de marihuana (70.4%); en segundo lugar los inhalables (14.1%), principalmente en forma de solventes y removedores (9.8%); después la cocaína (9.7%), tanto en forma de polvo blanco (7.4%) como *crack* (2.2%); en cuarto lugar aparecen los estimulantes (2.8%), en donde destacan las metanfetaminas (1.7%); después aparecen los depresores con utilidad médica (2.0%) siendo las benzodiazepinas las más reportadas (1.9%); y en sexto lugar se ubican los opiáceos (0.4%), entre los cuales sobresale la heroína (26 casos).

**Figura 11. Principales drogas ilícitas de inicio según sexo**




**Lapso transcurrido entre el inicio del consumo de sustancias y el ingreso a tratamiento en CIJ.** El promedio de tiempo entre el inicio de consumo y la solicitud de tratamiento se situó de la siguiente manera: la de tabaco en 8.7 años ( $\sigma=9.9$  años), la de alcohol en 8.7 años ( $\sigma=9.7$  años) y la de drogas ilícitas en 6.5 años ( $\sigma=8.5$  años). Resalta, que la mitad de los usuarios dejó pasar cinco años desde el momento en que se inició el consumo de tabaco o alcohol y el momento de acudir a solicitar tratamiento. Mientras que los usuarios de drogas ilegales dejaron pasar 3 años.

**Figura 12. Lapso transcurrido entre el inicio del consumo de sustancias y el ingreso a tratamiento en CIJ según sexo**




**Tipo de consumo de drogas ilícitas.** De acuerdo con los terapeutas, 53.4% de los solicitantes de tratamiento fue diagnosticado con consumo funcional, 17.8% con consumo disfuncional, 14.9% con consumo social u ocasional, 10.2% con consumo experimental y 3.7% presentaba remisión del consumo.



**Total de drogas consumidas.** El promedio de sustancias utilizadas alguna vez en la vida, incluyendo alcohol o tabaco, fue de 4.1 drogas (94.2% reportó el uso de dos o más sustancias); en el último año fue de 3.3 drogas (87.0% consumió dos o más sustancias); y en los últimos 30 días fue de 2.1 drogas (65.3% reportó haber utilizado dos o más sustancias).

El promedio de sustancias utilizadas alguna vez en la vida, sin incluir alcohol y tabaco, fue de 2.4 drogas (57.4 % reportó el uso de dos o más sustancias); en el último año fue de 1.8 drogas (41.5% consumió dos o más sustancias); y en los últimos 30 días fue de una droga (19.3% reportó haber utilizado dos o más sustancias).

**Figura 14. Total de drogas consumidas según sexo**




**Mujeres y hombres consumieron, prácticamente, el mismo número de drogas.**

**Consumo de drogas alguna vez en la vida.**<sup>d</sup> Las proporciones de consumo alguna vez en la vida de los diez grupos de sustancias fueron: tabaco (84.2%), alcohol (87.1%); cannabis (85.4%), cocaína (41.0%), inhalables (33.4%), estimulantes (21.7%), depresores (14.6%), drogas alucinógenas y disociativas (10.5%), opiáceos (3.5%) y otras sustancias de abuso (1.5%).

En cuanto al uso de sustancias específicas (contenidas en alguno de los diez grupos antes mencionados) sobresalen: marihuana (85.4%), cocaína en polvo (34.6%) solventes y removedores (24.2%), crack (19.2%), metanfetaminas (15.4%) y benzodiacepinas (13.6%); en menor proporción los pegamentos (9.0%), LSD (7.0%) y éxtasis y otras metanfetaminas alucinógenas (6.5%).

**Figura 15. Consumo de drogas alguna vez en la vida según sexo**




<sup>d</sup> Dado que la mayoría de los casos refirió haber utilizado dos o más sustancias —tanto en esta categoría como en las de uso en el último año y en los últimos 30 días, *infra*— la suma de porcentajes no es igual a 100.

**Consumo de drogas en los últimos 12 meses.** 98.0% de las personas reportaron haber consumido alguna sustancia en el año previo a su ingreso a tratamiento en CIJ. Las proporciones de consumo de los diez grupos de sustancias utilizadas en este lapso fueron: alcohol (78.4%), tabaco (75.2%), cannabis (71.2%), cocaína (27.8%), inhalables (24.0%), estimulantes (16.5%), depresores (9.8%), drogas alucinógenas y disociativas (6.0%); opiáceos (2.5%) y otras sustancias de abuso (1.1%).


En cuanto al consumo de sustancias específicas contenidas en alguno de los grupos anteriores destacaron: marihuana (71.2%), cocaína en polvo (21.2%), solventes y removedores (17.3%), crack (13.0%) y metanfetaminas (12.2%); en menor proporción se refieren a las benzodiacepinas (9.3%) y los pegamentos (5.8%).

**Figura 16. Consumo de drogas en los últimos 12 meses según sexo**




**Droga de preferencia en los últimos 12 meses.** Entre las sustancias más frecuentemente referidas se encontraron: cannabis (45.4%), alcohol (16.6%), tabaco (12.3%), inhalables (8.1%) y metanfetaminas (5.2%). En menores proporciones aparecieron: crack (4.3%), cocaína en polvo (3.2%) y heroína (1.3%).

**Figura 17. Droga de preferencia en los últimos 12 meses según sexo**




**Droga de mayor impacto en los últimos 12 meses.** Las principales sustancias a cuyo consumo los pacientes atribuyeron los mayores daños en la salud, en el bienestar personal y familiar o en el desempeño escolar, laboral o social y por las que pudieron haber solicitado tratamiento se encuentran: cannabis (43.3%), alcohol (14.5%), inhalables (11.5%), tabaco (7.6%), metanfetaminas (7.2%), crack (5.7%) y cocaína en polvo (4.0%).

**Figura 18. Droga de mayor impacto en los últimos 12 meses según sexo**



**Uso combinado de drogas en los últimos 12 meses.<sup>e</sup>** Al menos en una ocasión en el transcurso del último año y sin tomar en cuenta el consumo de tabaco, poco menos de la mitad de la población (44.3%) reportó el consumo en un mismo día de dos o más sustancias.

**Figura 19. Uso combinado de droga en los últimos 12 meses según sexo**




<sup>e</sup> No se toman en cuenta 2,781 casos (23.8%) que no cumplieron los criterios de inclusión de esta variable; 23.5% de los hombres y 25.3% de las mujeres (ver anexo).

**Consumo de drogas en los últimos 30 días.** Incluyendo alcohol y tabaco, 89.7% de los casos reportaron consumo de sustancias en el mes anterior al ingreso a tratamiento.

Las proporciones de consumo de los diez grupos de sustancias utilizadas en este lapso fueron: tabaco (62.0%), alcohol (54.1%), cannabis (49.6%), inhalables (13.4%), cocaína (13.1%), estimulantes (8.3%), depresores (4.7%), opiáceos (1.6%), drogas alucinógenas y disociativas (1.4%) y otras sustancias de abuso (0.5%).


En cuanto al consumo de sustancias específicas destacó el de marihuana con 49.6%, le siguen: solventes/removedores (9.7%), cocaína en polvo (8.0%), metanfetaminas (6.9%) y crack (6.8%); en menor proporción se registra el consumo de benzodiacepinas (4.4%) y pegamentos (2.9%).

**Figura 20. Consumo de drogas en los últimos 30 días según sexo**



**Frecuencia de episodios de abuso en los últimos 30 días.** 38.1% de quienes reportaron consumo de tabaco en los últimos 30 días aceptó fumar seis o más cigarrillos diariamente. Así mismo, entre quienes consumieron alcohol, más de la tercera parte (36.7%) reportó consumo abusivo menos de una vez a la semana, mientras que la otra tercera parte (32.7%) abusó del alcohol una o dos veces a la semana. Finalmente, 37.0% de los usuarios de drogas ilícitas durante el último mes reportaron consumirlas todos los días, 25.7% menos de una vez a la semana y 21.7% una a dos veces a la semana.

**Figura 21. Frecuencia de episodios de abuso en los últimos 30 días según sexo**



Las frecuencias de episodios de abuso de tabaco y alcohol tienden a ser similares entre los sexos. No obstante, el porcentaje de hombres que abusaron de drogas ilegales el mes previo al tratamiento supera el de mujeres.

## REFERENCIAS

1. Sánchez-Huesca, R. y López Granados, L. (1985). **Características demográficas y patrones de inicio en el consumo de drogas en asistentes a los Centros Locales; recuperación de los archivos de siete años (1976-1982)**. México: Centros de Integración Juvenil, A.C. (reporte interno).
2. Clarac Rengade, P. y Wagner Echeagaray, F. (1987). Análisis de algunas variables en una muestra de pacientes farmacodependientes (1986). En F. Wagner Echeagaray y R. Ortiz Mondragón (Comp.) (1990). **Estudios acerca de la farmacodependencia en México realizados por Paule Clarac**. México: Centros de Integración Juvenil, A. C. (pp. 111-126).
3. García Aurrecochea, R., Díaz Negrete, B., Balanzario, M. C., Gutierrez-López, A. Castillo-Franco, I. (1999). Características sociodemográficas y de consumo de drogas en pacientes atendidos entre 1990 y 1997. México: Centros de Integración Juvenil, A.C., Dirección de Promoción Institucional. **Informe de investigación 98-12**.
4. Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA), **Informe 2009** (2010). México: Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, Dirección de Epidemiología, Dirección de Investigación Operativa Epidemiológica.  
[http://www.dgepi.salud.gob.mx/2010/PDFS/SISVEA/informes\\_sisvea\\_2009.pdf](http://www.dgepi.salud.gob.mx/2010/PDFS/SISVEA/informes_sisvea_2009.pdf)
5. Ortiz A, Martínez R., Meza D. Grupo Interinstitucional para el desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. **Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana** No. 51, Noviembre de 2011. México: Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.  
[http://www.inprf.gob.mx/opencms/export/sites/INPRFM/psicosociales/archivos/srid/rep\\_51\\_pdf.pdf](http://www.inprf.gob.mx/opencms/export/sites/INPRFM/psicosociales/archivos/srid/rep_51_pdf.pdf)
6. Díaz, D. B., Balanzario, M. C., Castillo, I., Gutiérrez, A. y García, R. (2001). Uso de drogas entre pacientes de primer ingreso en Centros de Integración Juvenil. En Secretaría de Salud. **Observatorio Epidemiológico en drogas. El fenómeno de las adicciones en México 2001**. México: Secretaría de Salud (pp. 66-71) (ISBN: 970-721-008-7). [http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/publicaciones/obs2001\\_cap4.pdf](http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/publicaciones/obs2001_cap4.pdf)
7. García-Aurrecochea, R., Díaz-Negrete, B., Balanzario, M. C., Castillo-Franco, I. (1998). **Perfil y trayectoria del consumo de drogas en pacientes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil en 1996**. En CD: B. D. Díaz Negrete, J. Arellanez, M. C. Balanzario y R. Sánchez Huesca, *Once años de estudios del*

*consumo de drogas en México, Investigaciones realizadas en Centros de Integración Juvenil entre 1997 y 2007.* México: Centros de Integración Juvenil (ISBN: 968-5411-5).

8. Castillo Franco, P. I., Gutiérrez López, A. D. (2008). Consumo de drogas en mujeres asistentes a centros de tratamiento especializado en la Ciudad de México. **Salud Mental 31 (5)**, 351-359. <http://scielo.unam.mx/pdf/sm/v31n5/v31n5a3.pdf>
9. Gracia Gutiérrez de Velasco, S. E. y Balanzario Lorenzana, M. C. (2003). El consumo de drogas en menores de 12 años en Centros de Integración Juvenil en el año 2002. México: Centros de Integración Juvenil, A.C., Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación. **Informe de Investigación 03-17.**
10. García Aurrecoechea, R., Castillo Franco, P. I. y Guerrero Huesca, J. A. (2003). El consumo de drogas en pacientes atendidos en Centros de Integración Juvenil según la etapa de vida correspondiente al ingreso a tratamiento. México: Centros de Integración Juvenil, A.C., Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación. **Informe de Investigación 03-13.**
11. García Aurrecoechea, R., Díaz Negrete, B., Balanzario, M. C. (2001). Tendencias del consumo de drogas en pacientes de primer ingreso a tratamiento en CIJ entre 1990 y 1999. México: Centros de Integración Juvenil, A.C., Dirección de Promoción Institucional. **Informe de investigación 2000-06.**
12. Gutiérrez López, AD. (2013). Tendencias del consumo de drogas alguna vez en la vida en Centros de Integración Juvenil. Segundo semestre de 2004 - Primer semestre de 2013 (Nivel Nacional y Entidades Federativas). México: Centros de Integración Juvenil, A.C., Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación. **Informe de Investigación 13-09e.** <http://www.cij.gob.mx/Programas/Investigacion/pdf/13-09e.pdf>
13. Gutiérrez López, AD. (2013). Tendencias del consumo de drogas en los últimos 30 días en Centros de Integración Juvenil. Segundo semestre de 2004 - Primer semestre de 2013 (Nivel Nacional y Entidades Federativas). México: Centros de Integración Juvenil, A.C., Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación. **Informe de Investigación 13-09f.** <http://www.cij.gob.mx/Programas/Investigacion/pdf/13-09f.pdf>
14. Gutiérrez López, A. D. (2013). Droga de mayor impacto reportada por usuarios de drogas ilícitas en el año previo a la solicitud de tratamiento en Centros de Integración Juvenil. Segundo semestre de 2004 - Primer semestre de 2013 (Nivel Nacional y

- Entidades Federativa). México: Centros de Integración Juvenil, A.C., Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación. **Informe de Investigación 13-09g**. <http://www.cij.gob.mx/Programas/Investigacion/pdf/13-09g.pdf>
15. Jiménez Silvestre K., García Aurrecochea, V. R. y González Sánchez, J. D. (2005). Patrón de Consumo de Cocaína y Crack en pacientes que ingresan a Tratamiento. México: Centros de Integración Juvenil, A.C., Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación. **Informe de investigación 05-07**.
  16. Jiménez-Silvestre, K. y Castillo-Vite N.L. Factores de reincidencia en usuarios de cocaína, crack y metanfetaminas en fase de recuperación. México: Centros de Integración Juvenil, A.C., Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación. **Informe de Investigación 04-14**.
  17. Gutiérrez López, A. D. y Castillo Franco, P. I. (2007). Características sociodemográficas y de consumo en usuarios de tabaco y alcohol de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil en 2006. México: Centros de Integración Juvenil, A.C., Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación. **Informe de Investigación 07-13**. <http://www.cij.gob.mx/Especialistas/pdf/07-13.pdf>
  18. Gutiérrez López, A.D. (2013). Consumo de tabaco y alcohol en pacientes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil. Enero - Junio 2013. México: Centros de Integración Juvenil, A.C., Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación. **Informe de Investigación 13-09d**. <http://www.cij.gob.mx/Programas/Investigacion/pdf/13-09d.pdf>
  19. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz; Instituto Nacional de Salud Pública; Secretaría de Salud (2012). **Encuesta Nacional de Adicciones 2011: Reporte de Drogas**. Villatoro Velázquez JA, Medina Mora ME, Fleiz Bautista C, Téllez Rojo MM, Mendoza Alvarado LR, Romero Martínez M, Gutiérrez Reyes JP, Castro Tinoco M, Hernández Ávila M, Tena Tamayo C, Alvear Sevilla C y Guisa Cruz V. México: INPRFM. <http://www.inprf.gob.mx>, [www.conadic.gob.mx](http://www.conadic.gob.mx), [www.cenadic.salud.gob.mx](http://www.cenadic.salud.gob.mx)
  20. Moreno K. (Coord.) (2010). **Los jóvenes y el alcohol en México. Un problema emergente en mujeres**. México: Centros de Integración Juvenil, A.C.
  21. CD: **EBCO 2007-2008. Estudio Básico de Comunidad Objetivo Vol. 1 y 2**. México: Centros de Integración Juvenil, A.C., Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación.

---

## **CUADROS**

---

**CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS USUARIOS DE DROGAS DE PRIMER INGRESO A TRATAMIENTO A CIJ EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2012**

**Cuadro 1. Pacientes de primer ingreso por unidad de atención (CIJ)**

CIJ	General		Hombres		Mujeres		Razón H:M
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	
Álvaro Obregón Norte	106	0.9	92	1.0	14	0.7	6.6:1
Álvaro Obregón Oriente	85	0.7	69	0.7	16	0.8	4.3:1
Azcapotzalco	164	1.4	143	1.5	21	1.0	6.8:1
Benito Juárez	133	1.1	96	1.0	37	1.8	2.6:1
Chalco	168	1.4	133	1.4	35	1.7	3.8:1
Coyoacán	129	1.1	102	1.1	27	1.3	3.8:1
Cuajimalpa	124	1.1	103	1.1	21	1.0	4.9:1
Cuauhtémoc Oriente	173	1.5	128	1.3	45	2.1	2.8:1
Cuauhtémoc Poniente	141	1.2	112	1.2	29	1.4	3.9:1
Ecatepec	256	2.2	225	2.3	31	1.5	7.3:1
Gustavo A. Madero Aragón	271	2.3	243	2.5	28	1.3	8.7:1
Gustavo A. Madero Oriente	30	0.3	28	0.3	2	0.1	14:1
Gustavo A. Madero Norte	184	1.6	160	1.7	24	1.1	6.7:1
Iztapalapa Oriente	523	4.5	442	4.6	81	3.9	5.5:1
Iztapalapa Poniente	135	1.2	102	1.1	33	1.6	3.1:1
Miguel Hidalgo	100	0.9	86	0.9	14	0.7	6.1:1
Naucalpan	204	1.7	169	1.8	35	1.7	4.8:1
Nezahualcóyotl	297	2.5	244	2.5	53	2.5	4.6:1
Texcoco	123	1.1	103	1.1	20	1.0	5.2:1
Tlalnepantla	208	1.8	169	1.8	39	1.9	4.3:1
Tlalpan	208	1.8	172	1.8	36	1.7	4.8:1
Toluca	224	1.9	200	2.1	24	1.1	8.3:1
Venustiano Carranza	168	1.4	138	1.4	30	1.4	4.6:1
Xochimilco	28	0.2	19	0.2	9	0.4	2.1:1
UH Ecatepec	57	0.5	55	0.6	2	0.1	27.5:1
UH Iztapalapa	72	0.6	60	0.6	12	0.6	5:1
UH Naucalpan	71	0.6	59	0.6	12	0.6	4.9:1
Acapulco	140	1.2	116	1.2	24	1.1	4.8:1
Aguascalientes	149	1.3	132	1.4	17	0.8	7.8:1
Apodaca	50	0.4	46	0.5	4	0.2	11.5:1
Cancún	177	1.5	138	1.4	39	1.9	3.5:1
Cd. del Carmen	56	0.5	49	0.5	7	0.3	7:1
Cd. Juárez Norte	97	0.8	75	0.8	22	1.1	3.4:1
Cd. Victoria	18	0.2	15	0.2	3	0.1	5:1

*(Continúa)*

**Cuadro 1. Pacientes de primer ingreso a tratamiento por Unidad de atención (CIJ)**  
(Continuación)

CIJ	General		Hombres		Mujeres		Razón H:M
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	
Celaya	222	1.9	192	2.0	30	1.4	6.4:1
Chetumal	49	0.4	44	0.5	5	0.2	8.8:1
Chihuahua	177	1.5	126	1.3	51	2.4	2.5:1
Chilpancingo	50	0.4	41	0.4	9	0.4	4.6:1
Colima	191	1.6	166	1.7	25	1.2	6.6:1
Cozumel	97	0.8	73	0.8	24	1.1	3:1
Cuernavaca	94	0.8	76	0.8	18	0.9	4.2:1
Culiacán	147	1.3	134	1.4	13	0.6	10.3:1
Durango	93	0.8	58	0.6	35	1.7	1.7:1
Escuinapa	62	0.5	58	0.6	4	0.2	14.5:1
Fresnillo Pinacoteca	51	0.4	37	0.4	14	0.7	2.6:1
Guadalajara Centro	270	2.3	225	2.3	45	2.1	5:1
Guadalajara Sur	156	1.3	134	1.4	22	1.1	6.1:1
Guadalupe	69	0.6	57	0.6	12	0.6	4.8:1
Guamúchil	29	0.2	23	0.2	6	0.3	3.8:1
Guasave	85	0.7	77	0.8	8	0.4	9.6:1
Hermosillo	158	1.4	133	1.4	25	1.2	5.3:1
Huatulco	41	0.4	28	0.3	13	0.6	2.2:1
Ixtapa Zihuatanejo	39	0.3	34	0.4	5	0.2	6.8:1
La Paz	79	0.7	63	0.7	16	0.8	3.9:1
La Piedad	51	0.4	44	0.5	7	0.3	6.3:1
Laguna Durango	63	0.5	50	0.5	13	0.6	3.8:1
León	265	2.3	221	2.3	44	2.1	5:1
Los Cabos	19	0.2	16	0.2	3	0.1	5.3:1
Los Mochis	82	0.7	66	0.7	16	0.8	4.1:1
Manzanillo	65	0.6	51	0.5	14	0.7	3.6:1
Mazatlán	92	0.8	81	0.8	11	0.5	7.4:1
Mérida	170	1.5	136	1.4	34	1.6	4:1
Mexicali	178	1.5	149	1.6	29	1.4	5.1:1
Monterrey	127	1.1	99	1.0	28	1.3	3.5:1
Morelia	87	0.7	66	0.7	21	1.0	3.1:1
Nogales	115	1.0	83	0.9	32	1.5	2.6:1
Oaxaca	79	0.7	64	0.7	15	0.7	4.3:1
Pachuca	140	1.2	114	1.2	26	1.2	4.4:1
Playa del Carmen	40	0.3	28	0.3	12	0.6	2.3:1
Poza Rica	56	0.5	44	0.5	12	0.6	3.7:1

(Continúa)

**Cuadro 1. Pacientes de primer ingreso a tratamiento por Unidad de atención (CIJ)**  
(Continuación)

CIJ	General		Hombres		Mujeres		Razón H:M
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	
Puebla	128	1.1	106	1.1	22	1.1	4.8:1
Puerto Vallarta	111	0.9	94	1.0	17	0.8	5.5:1
Querétaro	133	1.1	105	1.1	28	1.3	3.8:1
Salamanca	96	0.8	78	0.8	18	0.9	4.3:1
Saltillo	145	1.2	108	1.1	37	1.8	2.9:1
San Luis Potosí	159	1.4	130	1.4	29	1.4	4.5:1
San Nicolás de los Garza	47	0.4	39	0.4	8	0.4	4.9:1
Tampico	78	0.7	62	0.6	16	0.8	3.9:1
Tapachula	30	0.3	21	0.2	9	0.4	2.3:1
Tecomán	33	0.3	23	0.2	10	0.5	2.3:1
Tehuacán	71	0.6	62	0.6	9	0.4	6.9:1
Tepic	46	0.4	31	0.3	15	0.7	2.1:1
Tijuana Guaycura	204	1.7	157	1.6	47	2.2	3.3:1
Tijuana Soler	251	2.1	190	2.0	61	2.9	3.1:1
Tlaquepaque	182	1.6	158	1.6	24	1.1	6.6:1
Tlaxcala	16	0.1	14	0.1	2	0.1	7:1
Torreón	2	0.0	2	0.0	0	0.0	----
Torreón Oriente	158	1.4	115	1.2	43	2.1	2.7:1
Tuxtla Gutiérrez	60	0.5	50	0.5	10	0.5	5:1
Villahermosa	47	0.4	37	0.4	10	0.5	3.7:1
Xalapa	55	0.5	41	0.4	14	0.7	2.9:1
Zacatecas	94	0.8	75	0.8	19	0.9	3.9:1
Zamora	96	0.8	83	0.9	13	0.6	6.4:1
Zapopan Kena Moreno	8	0.1	7	0.1	1	0.0	7:1
Zapopan Norte	227	1.9	184	1.9	43	2.1	4.3:1
UH Ciudad Juárez	21	0.2	18	0.2	3	0.1	6:1
UH Culiacán	31	0.3	31	0.3	0	0.0	----
UH Ixbalqué	22	0.2	21	0.2	1	0.0	21:1
UH Jerez	60	0.5	48	0.5	12	0.6	4:1
UH Monterrey	33	0.3	30	0.3	3	0.1	10:1
UH Punta Diamante	42	0.4	40	0.4	2	0.1	20:1
UH Tijuana	52	0.4	44	0.5	8	0.4	5.5:1
UH Zapopan	64	0.5	49	0.5	15	0.7	3.3:1
UH Zapotlán el Grande	19	0.2	19	0.2	0	0.0	----
UTPPCH Cd. Juárez	14	0.1	12	0.1	2	0.1	6:1
<b>Total</b>	<b>11,692</b>	<b>100.0</b>	<b>9,598</b>	<b>82.1</b>	<b>2,094</b>	<b>17.9</b>	<b>4.6 : 1</b>

UH=Unidad de Hospitalización

UTPPCH=Unidad de Tratamiento a Personas con Problemas de Consumo de Heroína

**Cuadro 2. Sexo**

	Frec.	%	Razón H:M
<b>Hombres</b>	9,598	82.1	
<b>Mujeres</b>	2,094	17.9	<b>4.6 : 1</b>
<b>Total</b>	<b>11,692</b>	<b>100.0</b>	

**Cuadro 3. Persona que proporciona la información**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Usuario de drogas	5,620	48.1	4,621	48.1	999	47.7
Usuario de drogas y familiares u otras personas	6,072	51.9	4,977	51.9	1,095	52.3
<b>Total</b>	<b>11,692</b>	<b>100.0</b>	<b>9,598</b>	<b>100.0</b>	<b>2,094</b>	<b>100.0</b>

**Cuadro 4. Edad de ingreso a tratamiento**

	General*			Hombres**			Mujeres***		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Hasta 9 años	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0
10 a 14 años	1,739	14.9	14.9	1,257	13.1	13.1	482	23.0	23.0
15 a 19 años	4,848	41.5	41.5	4,007	41.7	41.8	841	40.2	40.2
20 a 24 años	1,658	14.2	14.2	1,404	14.6	14.6	254	12.1	12.1
25 a 29 años	1,041	8.9	8.9	895	9.3	9.3	146	7.0	7.0
30 a 34 años	765	6.5	6.5	652	6.8	6.8	113	5.4	5.4
35 a 39 años	601	5.1	5.1	512	5.3	5.3	89	4.3	4.3
40 a 44 años	429	3.7	3.7	361	3.8	3.8	68	3.2	3.2
45 años y más	609	5.2	5.2	508	5.3	5.3	101	4.8	4.8
<i>Sin información</i>	<i>1</i>	<i>0.0</i>	<i>Se omite</i>	<i>1</i>	<i>0.0</i>	<i>Se omite</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>	<i>Se omite</i>
<b>Total</b>	<b>11,692</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>9,598</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>2,094</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

\*  $\mu = 22.6$   $\sigma = 10.4$ ; Med.= 18; Mo.= 16; Decil1 = 14\*\*  $\mu = 22.9$ ;  $\sigma = 10.4$ ; Med.= 18; Mo.= 16; Decil1 = 14\*\*\*  $\mu = 21.4$ ;  $\sigma = 10.3$ ; Med.= 17; Mo.= 14; Decil1 = 14

**Cuadro 5. Estado civil**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Soltero	8,554	73.2	73.3	6,977	72.7	72.8	1,577	75.3	75.4
Casado	1,144	9.8	9.8	1,018	10.6	10.6	126	6.0	6.0
Unión libre	1,187	10.2	10.2	972	10.1	10.1	215	10.3	10.3
Separado	607	5.2	5.2	484	5.0	5.1	123	5.9	5.9
Divorciado	139	1.2	1.2	105	1.1	1.1	34	1.6	1.6
Viudo	45	0.4	0.4	28	0.3	0.3	17	0.8	0.8
<i>Sin información</i>	16	0.1	<i>Se omite</i>	14	0.1	<i>Se omite</i>	2	0.1	<i>Se omite</i>
<b>Total</b>	<b>11,692</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>9,598</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>2,094</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

**Cuadro 6. Escolaridad**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Ninguna (no sabe leer ni escribir)	37	0.3	0.3	33	0.3	0.3	4	0.2	0.2
Ninguna (sabe leer y escribir)	25	0.2	0.2	18	0.2	0.2	7	0.3	0.3
Primaria incompleta	369	3.2	3.2	297	3.1	3.1	72	3.4	3.4
Primaria completa	610	5.2	5.2	509	5.3	5.3	101	4.8	4.8
Secundaria incompleta	3,158	27.0	27.0	2,487	25.9	25.9	671	32.0	32.1
Secundaria completa	1,835	15.7	15.7	1,566	16.3	16.3	269	12.8	12.9
Estudios técnicos o comerciales incompletos	177	1.5	1.5	146	1.5	1.5	31	1.5	1.5
Estudios técnicos o comerciales completos	121	1.0	1.0	83	0.9	0.9	38	1.8	1.8
Bachillerato incompleto	3,592	30.7	30.7	3,008	31.3	31.3	584	27.9	27.9
Bachillerato completo	751	6.4	6.4	626	6.5	6.5	125	6.0	6.0
Estudios superiores incompletos	707	6.0	6.0	585	6.1	6.1	122	5.8	5.8
Estudios superiores completos	269	2.3	2.3	213	2.2	2.2	56	2.7	2.7
Estudios de posgrado incompletos	10	0.1	0.1	6	0.1	0.1	4	0.2	0.2
Estudios de posgrado completos	25	0.2	0.2	19	0.2	0.2	6	0.3	0.3
<i>Sin información</i>	6	0.1	<i>Se omite</i>	2	0.0	<i>Se omite</i>	4	0.2	<i>Se omite</i>
<b>Total</b>	<b>11,692</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>9,598</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>2,094</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

**Cuadro 7. Ocupación**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Desempleado(a)	2,612	22.3	22.3	2,191	22.8	22.8	421	20.1	20.1
Estudiante	4,421	37.8	37.8	3,481	36.3	36.3	940	44.9	44.9
Estudia y trabaja	533	4.6	4.6	479	5.0	5.0	54	2.6	2.6
Trabaja	3,659	31.3	31.3	3,310	34.5	34.5	349	16.7	16.7
Tareas del hogar	408	3.5	3.5	87	0.9	0.9	321	15.3	15.3
Pensionado	56	0.5	0.5	49	0.5	0.5	7	0.3	0.3
Sin información	3	0.0	Se omite	1	0.0	Se omite	2	0.1	Se omite
<b>Total</b>	<b>11,692</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>9,598</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>2,094</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

**Cuadro 8. Estrato social**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Alto	75	0.6	0.6	64	0.7	0.7	11	0.5	0.5
Medio alto	1,191	10.2	10.2	951	9.9	9.9	240	11.5	11.5
Medio bajo	7,201	61.6	61.8	5,929	61.8	61.9	1,272	60.7	61.1
Bajo	3,115	26.6	26.7	2,573	26.8	26.9	542	25.9	26.0
Pobreza extrema o marginación	79	0.7	0.7	61	0.6	0.6	18	0.9	0.9
Sin información	31	0.3	Se omite	20	0.2	Se omite	11	0.5	Se omite
<b>Total</b>	<b>11,692</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>9,598</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>2,094</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

**FACTORES ASOCIADOS A LA DEMANDA DE TRATAMIENTO EN PACIENTES DE PRIMER INGRESO A TRATAMIENTO EN CIJ EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2012**

**Cuadro 9. Motivos de consulta**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Consumo de drogas ilícitas	10,243	87.6	8,477	88.3	1,766	84.3
Consumo de bebidas alcohólicas	4,821	41.2	3,991	41.6	830	39.6
Consumo de tabaco	4,368	37.4	3,598	37.5	770	36.8
Otro motivo	298	2.5	242	2.5	56	2.7
<i>Ningún motivo específico reportado</i>	31	0.3	21	0.2	10	0.5
<i>Usuarios que reportaron dos o más motivos de consulta</i>	5,106	43.7	4,251	44.3	855	40.8

**Cuadro 10. Condicionantes de la solicitud de tratamiento**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Por propia iniciativa	4,516	38.6	3,707	38.6	809	38.6
Por condicionamiento o recomendación familiar	5,300	45.3	4,358	45.4	942	45.0
Por recomendación de pares	145	1.2	117	1.2	28	1.3
Por condicionamiento o recomendación escolar	2,216	19.0	1,790	18.6	426	20.3
Por condicionamiento legal	1,157	9.9	1,025	10.7	132	6.3
Por condicionamiento o recomendación laboral	212	1.8	198	2.1	14	0.7
Por indicación médica	809	6.9	645	6.7	164	7.8
Otros condicionante de solicitud de tratamiento	317	2.7	254	2.6	63	3.0
<i>Ningún condicionante reportado</i>	164	1.4	130	1.4	34	1.6
<i>Pacientes que reportaron dos o más condicionantes de la solicitud de tratamiento</i>	2,830	24.2	2,359	24.6	471	22.5

**Cuadro 11. Antecedentes de acciones contra el consumo de sustancias**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Juramento	719	6.1	652	6.8	67	3.2
Grupo de autoayuda	855	7.3	743	7.7	112	5.3
Internamiento en anexo	1,471	12.6	1,299	13.5	172	8.2
Intervención de emergencia	88	0.8	74	0.8	14	0.7
Programa de mantenimiento	54	0.5	48	0.5	6	0.3
Tratamiento médico no especializado	88	0.8	71	0.7	17	0.8
Tratamiento psiquiátrico o psicoterapéutico ambulatorio	571	4.9	457	4.8	114	5.4
Tratamiento psiquiátrico o psicoterapéutico residencial	226	1.9	177	1.8	49	2.3
Medicina tradicional o alternativa	46	0.4	39	0.4	7	0.3
Intento de interrupción voluntaria del consumo, sin apoyo	3,626	31.0	3,025	31.5	601	28.7
Otras acciones	2,731	23.4	2,184	22.8	547	26.1
<i>Ninguna acción previa reportada</i>	3,097	26.5	2,465	25.7	632	30.2
<i>Pacientes que reportaron dos o más acciones contra el consumo de sustancias antes de solicitar tratamiento en CIJ</i>	1,379	11.8	1,200	12.5	179	8.5

**Cuadro 12. Problemas asociados al consumo de sustancias**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Problemas de salud	4,674	40.0	3,798	39.6	876	41.8
Accidentes o lesiones	1,456	12.5	1,265	13.2	191	9.1
Problemas familiares	9,011	77.1	7,373	76.8	1,638	78.2
Problemas escolares	4,259	36.4	3,460	36.0	799	38.2
Problemas laborales	2,351	20.1	2,101	21.9	250	11.9
Problemas psicológicos	4,351	37.2	3,480	36.3	871	41.6
Problemas legales	2,404	20.6	2,161	22.5	243	11.6
Conducta antisocial o delictiva	1,791	15.3	1,553	16.2	238	11.4
Otros problemas	407	3.5	345	3.6	62	3.0
<i>Ningún problema asociado reportado</i>	827	7.1	677	7.1	150	7.2
<i>Pacientes que reportaron dos o más problemas asociados</i>	8,610	73.6	7,080	73.8	1,530	73.1

**CARACTERÍSTICAS DEL CONSUMO DE DROGAS EN PACIENTES DE PRIMER INGRESO A TRATAMIENTO EN CIJ EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2012**

**Cuadro 13. Edad de inicio del consumo de Tabaco**

	General*			Hombres**			Mujeres***		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Hasta 9 años	362	3.1	3.7	317	3.3	3.9	45	2.1	2.6
10 a 14 años	5,258	45.0	53.5	4,245	44.2	52.2	1,013	48.4	59.6
15 a 19 años	3,761	32.2	38.3	3,207	33.4	39.5	554	26.5	32.6
20 a 24 años	309	2.6	3.1	258	2.7	3.2	51	2.4	3.0
25 a 29 años	85	0.7	0.9	65	0.7	0.8	20	1.0	1.2
30 a 34 años	25	0.2	0.3	17	0.2	0.2	8	0.4	0.5
35 a 39 años	16	0.1	0.2	12	0.1	0.1	4	0.2	0.2
40 a 44 años	6	0.1	0.1	3	0.0	0.0	3	0.1	0.2
45 años y más	2	0.0	0.0	1	0.0	0.0	1	0.0	0.1
No consumió	1,850	15.8	Se omite	1,457	15.2	Se omite	393	18.8	Se omite
Sin información	18	0.2	Se omite	16	0.2	Se omite	2	0.1	Se omite
<b>Total</b>	<b>11,692</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>9,598</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>2,094</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

\*  $\mu = 14.3$ ;  $\sigma = 3.2$ ; Med.= 14; Mo.= 15; Decil1 = 11

\*\*  $\mu = 14.3$ ;  $\sigma = 3.1$ ; Med.= 14; Mo.= 15; Decil1 = 11

\*\*\*  $\mu = 14.4$ ;  $\sigma = 3.6$ ; Med.= 14; Mo.= 13; Decil1 = 11

**Cuadro 14. Edad de inicio del consumo de Alcohol.**

	General*			Hombres**			Mujeres***		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Hasta 9 años	369	3.2	3.6	302	3.1	3.6	67	3.2	3.7
10 a 14 años	4,937	42.2	48.5	3,966	41.3	47.4	971	46.4	53.8
15 a 19 años	4,452	38.1	43.8	3,789	39.5	45.3	663	31.7	36.7
20 a 24 años	314	2.7	3.1	250	2.6	3.0	64	3.1	3.5
25 a 29 años	67	0.6	0.7	48	0.5	0.6	19	0.9	1.1
30 a 34 años	19	0.2	0.2	6	0.1	0.1	13	0.6	0.7
35 a 39 años	8	0.1	0.1	3	0.0	0.0	5	0.2	0.3
40 a 44 años	4	0.0	0.0	2	0.0	0.0	2	0.1	0.1
45 años y más	2	0.0	0.0	1	0.0	0.0	1	0.0	0.1
No consumió	1,503	12.9	Se omite	1,215	12.7	Se omite	288	13.8	Se omite
Sin información	17	0.1	Se omite	16	0.2	Se omite	1	0.0	Se omite
<b>Total</b>	<b>11,692</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>9,598</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>2,094</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

\*  $\mu = 14.5$ ;  $\sigma = 3.0$ ; Med.= 14; Mo.= 15; Decil1 = 12

\*\*  $\mu = 14.4$ ;  $\sigma = 2.8$ ; Med.= 14; Mo.= 15; Decil1 = 12

\*\*\*  $\mu = 14.5$ ;  $\sigma = 3.7$ ; Med.= 14; Mo.= 13; Decil1 = 11

**Cuadro 15. Edad de inicio del consumo de Drogas ilícitas.**

	General*			Hombres**			Mujeres***		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Hasta 9 años	122	1.0	1.0	106	1.1	1.1	16	0.8	0.8
10 a 14 años	4,807	41.1	41.2	3,869	40.3	40.4	938	44.8	44.9
15 a 19 años	5,330	45.6	45.7	4,517	47.1	47.2	813	38.8	38.9
20 a 24 años	726	6.2	6.2	603	6.3	6.3	123	5.9	5.9
25 a 29 años	301	2.6	2.6	213	2.2	2.2	88	4.2	4.2
30 a 34 años	152	1.3	1.3	121	1.3	1.3	31	1.5	1.5
35 a 39 años	105	0.9	0.9	68	0.7	0.7	37	1.8	1.8
40 a 44 años	63	0.5	0.5	41	0.4	0.4	22	1.1	1.1
45 años y más	55	0.5	0.5	34	0.4	0.4	21	1.0	1.0
<i>Sin información</i>	31	0.3	<i>Se omite</i>	26	0.3	<i>Se omite</i>	5	0.2	<i>Se omite</i>
<b>Total</b>	<b>11,692</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>9,598</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>2,094</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

\*  $\mu = 16.1$ ;  $\sigma = 5.2$ ; Med.= 15; Mo.= 14 y 15; Decil1 = 12

\*\*  $\mu = 16.0$ ;  $\sigma = 4.8$ ; Med.= 15; Mo.= 15; Decil1 = 12

\*\*\*  $\mu = 16.7$ ;  $\sigma = 6.6$ ; Med.= 15; Mo.= 14; Decil1 = 12

**Cuadro 16. Drogas ilícitas de inicio**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
<b>Cannabis</b>	<b>8,248</b>	<b>70.5</b>	<b>6,945</b>	<b>72.4</b>	<b>1,303</b>	<b>62.2</b>
Mariguana	8,236	70.4	6,934	72.2	1,302	62.2
Hachís	12	0.1	11	0.1	1	0.0
<b>Cocaína</b>	<b>1,131</b>	<b>9.7</b>	<b>939</b>	<b>9.8</b>	<b>192</b>	<b>9.2</b>
Polvo blanco	867	7.4	714	7.4	153	7.3
<i>Crack</i>	261	2.2	222	2.3	39	1.9
Otra presentación	3	0.0	3	0.0	0.0	0.0
<b>Inhalables</b>	<b>1,650</b>	<b>14.1</b>	<b>1,291</b>	<b>13.5</b>	<b>359</b>	<b>17.1</b>
Solventes o removedores	1,142	9.8	899	9.4	243	11.6
Pegamentos	263	2.2	212	2.2	51	2.4
Esmaltes o pinturas	209	1.8	149	1.6	60	2.9
Otros	36	0.3	31	0.3	5	0.2
<b>Depresores</b>	<b>234</b>	<b>2.0</b>	<b>123</b>	<b>1.3</b>	<b>111</b>	<b>5.3</b>
Benzodiazepinas	221	1.9	115	1.2	106	5.1
<i>Rohypnol</i> <sup>®</sup>	8	0.1	7	0.1	1	0.0
Otros	5	0.0	1	0.0	4	0.2
<b>Estimulantes</b>	<b>323</b>	<b>2.8</b>	<b>231</b>	<b>2.4</b>	<b>92</b>	<b>4.4</b>
Anfetamina	63	0.5	54	0.6	9	0.4
Metanfetaminas	203	1.7	140	1.5	63	3.0
Éxtasis (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas	35	0.3	21	0.2	14	0.7
Otros	22	0.2	16	0.2	6	0.3
<b>Drogas alucinógenas y disociativas</b>	<b>30</b>	<b>0.3</b>	<b>22</b>	<b>0.2</b>	<b>8</b>	<b>0.4</b>
LSD	14	0.1	10	0.1	4	0.2
Plantas alucinógenas y derivados	15	0.1	12	0.1	3	0.1
Otras	1	0.0	0	0.0	1	0.0
<b>Opiáceos</b>	<b>41</b>	<b>0.4</b>	<b>29</b>	<b>0.3</b>	<b>12</b>	<b>0.6</b>
Heroína	26	0.2	22	0.2	4	0.2
Opiáceos Sintéticos	12	0.1	5	0.1	7	0.3
Opio y otros opiáceos	3	0.0	2	0.0	1	0.0
<b>Otras sustancias de abuso</b>	<b>35</b>	<b>0.3</b>	<b>18</b>	<b>0.2</b>	<b>17</b>	<b>0.8</b>
Con utilidad médica	11	0.1	3	0.0	8	0.4
Otras	24	0.2	15	0.2	9	0.4
<b>Total</b>	<b>11,692</b>	<b>100.0</b>	<b>9,598</b>	<b>100.0</b>	<b>2,094</b>	<b>100.0</b>

**Cuadro 17. Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de Tabaco y el ingreso a tratamiento en CIJ**

	General*			Hombres**			Mujeres***		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
< de un año	654	5.6	6.7	485	5.1	6.0	169	8.1	9.9
1 a 5 años	4,746	40.6	48.3	3,867	40.3	47.6	879	42.0	51.7
6 a 10 años	1,597	13.7	16.3	1,350	14.1	16.6	247	11.8	14.5
11 a 15 años	906	7.7	9.2	774	8.1	9.5	132	6.3	7.8
16 a 20 años	643	5.5	6.5	554	5.8	6.8	89	4.3	5.2
21 a 25 años	471	4.0	4.8	403	4.2	5.0	68	3.2	4.0
26 o más años	806	6.9	8.2	691	7.2	8.5	115	5.5	6.8
No consumió	1,850	15.8	Se omite	1,457	15.2	Se omite	393	18.8	Se omite
Sin información	19	0.2	Se omite	17	0.2	Se omite	2	0.1	Se omite
<b>Total</b>	<b>11,692</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>9,598</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>2,094</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

\*  $\mu = 8.7$ ;  $\sigma = 9.9$ ; Med.= 5; Mo.= 1; Decil1 = 1  
 \*\*  $\mu = 8.9$ ;  $\sigma = 10.0$ ; Med.= 5; Mo.= 1; Decil1 = 1  
 \*\*\*  $\mu = 7.5$ ;  $\sigma = 9.3$ ; Med.= 3; Mo.= 1; Decil1 = 1

**Cuadro 18. Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de Alcohol y el ingreso a tratamiento en CIJ**

	General*			Hombres**			Mujeres***		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
< de un año	613	5.2	6.0	467	4.9	5.6	146	7.0	8.1
1 a 5 años	4,949	42.3	48.7	3,970	41.4	47.5	979	46.8	54.2
6 a 10 años	1,670	14.3	16.4	1,397	14.6	16.7	273	13.0	15.1
11 a 15 años	963	8.2	9.5	822	8.6	9.8	141	6.7	7.8
16 a 20 años	670	5.7	6.6	575	6.0	6.9	95	4.5	5.3
21 a 25 años	511	4.4	5.0	439	4.6	5.2	72	3.4	4.0
26 o más años	795	6.8	7.8	696	7.3	8.3	99	4.7	5.5
No consumió	1,503	12.9	Se omite	1,215	12.7	Se omite	288	13.8	Se omite
Sin información	18	0.2	Se omite	17	0.2	Se omite	1	0.0	Se omite
<b>Total</b>	<b>11,692</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>9,598</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>2,094</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

\*  $\mu = 8.7$ ;  $\sigma = 9.7$ ; Med.= 5; Mo.= 1; Decil1 = 1  
 \*\*  $\mu = 9.0$ ;  $\sigma = 9.8$ ; Med.= 5; Mo.= 1; Decil1 = 1  
 \*\*\*  $\mu = 7.2$ ;  $\sigma = 8.8$ ; Med.= 3; Mo.= 1; Decil1 = 1

**Cuadro 19. Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de Drogas ilícitas y el ingreso a tratamiento en CIJ**

	General*			Hombres**			Mujeres***		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
< de un año	1,965	16.8	16.9	1,493	15.6	15.6	472	22.5	22.6
1 a 5 años	5,660	48.4	48.5	4,563	47.5	47.7	1,097	52.4	52.5
6 a 10 años	1,512	12.9	13.0	1,295	13.5	13.5	217	10.4	10.4
11 a 15 años	919	7.9	7.9	800	8.3	8.4	119	5.7	5.7
16 a 20 años	633	5.4	5.4	550	5.7	5.7	83	4.0	4.0
21 a 25 años	373	3.2	3.2	330	3.4	3.4	43	2.1	2.1
26 o más años	597	5.1	5.1	539	5.6	5.6	58	2.8	2.8
<i>Sin información</i>	33	0.3	<i>Se omite</i>	28	0.3	<i>Se omite</i>	5	0.2	<i>Se omite</i>
<b>Total</b>	<b>11,692</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>9,598</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>2,094</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

\*  $\mu= 6.5$ ;  $\sigma = 8.5$ ; Med.= 3; Mo.= 1; Decil1 = < un año

\*\*  $\mu= 6.9$ ;  $\sigma = 8.8$ ; Med.= 3; Mo.= 1; Decil1 = < un año

\*\*\*  $\mu= 4.7$ ;  $\sigma = 7.2$ ; Med.= 2; Mo.= 1 ; Decil1 = < un año

**Cuadro 20. Tipo de consumo de drogas ilícitas**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Experimental	1,138	9.7	10.2	847	8.8	9.2	291	13.9	14.6
Social u ocasional	1,671	14.3	14.9	1,319	13.7	14.4	352	16.8	17.6
Funcional	5,971	51.1	53.4	5,025	52.4	54.7	946	45.2	47.4
Disfuncional	1,986	17.0	17.8	1,649	17.2	17.9	337	16.1	16.9
En remisión	417	3.6	3.7	348	3.6	3.8	69	3.3	3.5
<i>Sin información</i>	509	4.4	<i>Se omite</i>	410	4.3	<i>Se omite</i>	99	4.7	<i>Se omite</i>
<b>Total</b>	<b>11,692</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>9,598</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>2,094</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

**Cuadro 21. Total de drogas consumidas alguna vez en la vida.  
(Incluye alcohol o tabaco)**

	General*		Hombres**		Mujeres***	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
1 sustancia	681	5.8	551	5.7	130	6.2
2 sustancias	1,178	10.1	916	9.5	262	12.5
3 sustancias	3,632	31.1	2,942	30.7	690	33.0
4 sustancias	2,354	20.1	1,926	20.1	428	20.4
5 sustancias	1,473	12.6	1,247	13.0	226	10.8
6 sustancias	903	7.7	742	7.7	161	7.7
7 sustancias	620	5.3	536	5.6	84	4.0
8 sustancias	321	2.7	271	2.8	50	2.4
9 sustancias	223	1.9	197	2.1	26	1.2
10 sustancias	132	1.1	113	1.2	19	0.9
11 -19 sustancias	175	1.5	157	1.6	18	0.9
<b>Total</b>	<b>11,692</b>	<b>100.0</b>	<b>9,598</b>	<b>100.0</b>	<b>2,094</b>	<b>100.0</b>

\*  $\mu= 4.1$ ;  $\sigma = 2.1$ ; Med.=4; Mo.= 3; Decil1 = 2

\*\*  $\mu= 4.2$ ;  $\sigma = 2.2$ ; Med.= 4; Mo.= 3; Decil1 = 2

\*\*\*  $\mu= 3.9$ ;  $\sigma = 1.9$ ; Med.= 3; Mo.= 3; Decil1 = 2

**Cuadro 22. Total de drogas ilícitas consumidas alguna vez en la vida  
(No incluye ni alcohol ni tabaco)**

	General*		Hombres**		Mujeres***	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
1 sustancia	4,985	42.6	3,998	41.7	987	47.1
2 sustancias	2,680	22.9	2,196	22.9	484	23.1
3 sustancias	1,569	13.4	1,319	13.7	250	11.9
4 sustancias	967	8.3	795	8.3	172	8.2
5 sustancias	629	5.4	545	5.7	84	4.0
6 sustancias	331	2.8	277	2.9	54	2.6
7 sustancias	220	1.9	195	2.0	25	1.2
8 sustancias	134	1.1	115	1.2	19	0.9
9 sustancias	76	0.7	68	0.7	8	0.4
10 sustancias	48	0.4	40	0.4	8	0.4
11-18 sustancias	53	0.5	50	0.5	3	0.1
<b>Total</b>	<b>11,692</b>	<b>100.0</b>	<b>9,598</b>	<b>100.0</b>	<b>2,094</b>	<b>100.0</b>

\*  $\mu= 2.4$ ;  $\sigma = 1.9$ ; Med.=2; Mo.= 1; Decil1 = 1

\*\*  $\mu= 2.5$ ;  $\sigma = 1.9$ ; Med.=2; Mo.= 1; Decil1 = 1

\*\*\*  $\mu= 2.2$ ;  $\sigma = 1.7$ ; Med.=2; Mo.= 1; Decil1 = 1

**Cuadro 23. Consumo de drogas alguna vez en la vida por sustancia**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
<b>Tabaco</b>	<b>9,842</b>	<b>84.2</b>	<b>8,141</b>	<b>84.8</b>	<b>1,701</b>	<b>81.2</b>
<b>Alcohol</b>	<b>10,189</b>	<b>87.1</b>	<b>8,383</b>	<b>87.3</b>	<b>1,806</b>	<b>86.2</b>
<b>Cannabis</b>	<b>9,987</b>	<b>85.4</b>	<b>8,353</b>	<b>87.0</b>	<b>1,634</b>	<b>78.0</b>
Mariguana	9,980	85.4	8,347	87.0	1,633	78.0
Hachís	606	5.2	514	5.4	92	4.4
<b>Cocaína</b>	<b>4,788</b>	<b>41.0</b>	<b>4,060</b>	<b>42.3</b>	<b>728</b>	<b>34.8</b>
Polvo blanco	4,045	34.6	3,403	35.5	642	30.7
<i>Crack</i>	2,248	19.2	1,966	20.5	282	13.5
Otra presentación de cocaína	99	0.8	93	1.0	6	0.3
<b>Inhalables</b>	<b>3,902</b>	<b>33.4</b>	<b>3,249</b>	<b>33.9</b>	<b>653</b>	<b>31.2</b>
Solventes o removedores	2,831	24.2	2,376	24.8	455	21.7
Pegamentos	1,051	9.0	893	9.3	158	7.5
Esmaltes o pinturas	573	4.9	452	4.7	121	5.8
Otros inhalables	200	1.7	167	1.7	33	1.6
<b>Depresores</b>	<b>1,711</b>	<b>14.6</b>	<b>1,389</b>	<b>14.5</b>	<b>322</b>	<b>15.4</b>
Benzodiacepinas	1,589	13.6	1,282	13.4	307	14.7
<i>Rohypnol</i>	155	1.3	144	1.5	11	0.5
Otros depresores	43	0.4	29	0.3	14	0.7
<b>Estimulantes</b>	<b>2,535</b>	<b>21.7</b>	<b>2,054</b>	<b>21.4</b>	<b>481</b>	<b>23.0</b>
Anfetamina	270	2.3	229	2.4	41	2.0
Metanfetaminas	1,795	15.4	1,489	15.5	306	14.6
Éxtasis (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas	757	6.5	574	6.0	183	8.7
Otros estimulantes	76	0.7	63	0.7	13	0.6
<b>Drogas alucinógenas y disociativas</b>	<b>1,230</b>	<b>10.5</b>	<b>1,039</b>	<b>10.8</b>	<b>191</b>	<b>9.1</b>
LSD	814	7.0	678	7.1	136	6.5
Plantas alucinógenas y derivados	662	5.7	577	6.0	85	4.1
Otras drogas alucinógenas y disoc.	67	0.6	57	0.6	10	0.5
<b>Opiáceos</b>	<b>411</b>	<b>3.5</b>	<b>346</b>	<b>3.6</b>	<b>65</b>	<b>3.1</b>
Heroína	323	2.8	280	2.9	43	2.1
Opiáceos Sintéticos	62	0.5	44	0.5	18	0.9
Opio y otros opiáceos	56	0.5	47	0.5	9	0.4
<b>Otras sustancias de abuso</b>	<b>179</b>	<b>1.5</b>	<b>124</b>	<b>1.3</b>	<b>55</b>	<b>2.6</b>
Con utilidad médica	59	0.5	36	0.4	23	1.1
Otras sustancias de abuso	123	1.1	89	0.9	34	1.6

**Cuadro 24. Total de drogas consumidas en el último año  
(Incluye alcohol o tabaco)**

	General*		Hombres**		Mujeres***	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Ninguna	230	2.0	188	2.0	42	2.0
1 sustancia	1,285	11.0	1,036	10.8	249	11.9
2 sustancias	2,286	19.6	1,839	19.2	447	21.3
3 sustancias	3,729	31.9	3,079	32.1	650	31.0
4 sustancias	1,973	16.9	1,640	17.1	333	15.9
5 sustancias	989	8.5	829	8.6	160	7.6
6 sustancias	568	4.9	461	4.8	107	5.1
7 sustancias	298	2.5	242	2.5	56	2.7
8 sustancias	145	1.2	119	1.2	26	1.2
9 sustancias	91	0.8	78	0.8	13	0.6
10 sustancias	43	0.4	37	0.4	6	0.3
11-19 sustancias	55	0.5	50	0.5	5	0.2
<b>Total</b>	<b>11,692</b>	<b>100.0</b>	<b>9,598</b>	<b>100.0</b>	<b>2,094</b>	<b>100.0</b>

\*  $\mu = 3.3$ ;  $\sigma = 1.8$ ; Med.= 3; Mo.= 3; Decil1 = 1

\*\*  $\mu = 3.3$ ;  $\sigma = 1.8$ ; Med.= 3; Mo.= 3; Decil1 = 1

\*\*\*  $\mu = 3.2$ ;  $\sigma = 1.8$ ; Med.= 3; Mo.= 3; Decil1 = 1

**Cuadro 25. Total de drogas ilícitas consumidas en el último año  
(No incluye ni alcohol ni tabaco)**

	General*		Hombres**		Mujeres***	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Ninguna	1,197	10.2	984	10.3	213	10.2
1 sustancia	5,645	48.3	4,598	47.9	1,047	50.0
2 sustancias	2,431	20.8	2,014	21.0	417	19.9
3 sustancias	1,132	9.7	941	9.8	191	9.1
4 sustancias	613	5.2	500	5.2	113	5.4
5 sustancias	325	2.8	267	2.8	58	2.8
6 sustancias	153	1.3	122	1.3	31	1.5
7 sustancias	96	0.8	84	0.9	12	0.6
8 sustancias	43	0.4	37	0.4	6	0.3
9 sustancias	27	0.2	24	0.3	3	0.1
10 sustancias	11	0.1	10	0.1	1	0.0
11-18 sustancias	19	0.2	17	0.2	2	0.1
<b>Total</b>	<b>11,692</b>	<b>100.0</b>	<b>9,598</b>	<b>100.0</b>	<b>2,094</b>	<b>100.0</b>

\*  $\mu = 1.8$ ;  $\sigma = 1.5$ ; Med.= 1; Mo.= 1; Decil1 = ninguna

\*\*  $\mu = 1.8$ ;  $\sigma = 1.5$ ; Med.= 1; Mo.= 1; Decil1 = ninguna

\*\*\*  $\mu = 1.7$ ;  $\sigma = 1.4$ ; Med.= 1; Mo.= 1; Decil1 = ninguna

**Cuadro 26. Consumo de drogas en los últimos 12 meses por sustancia**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
<b>Tabaco</b>	<b>8,796</b>	<b>75.2</b>	<b>7,271</b>	<b>75.8</b>	<b>1,525</b>	<b>72.8</b>
<b>Alcohol</b>	<b>9,161</b>	<b>78.4</b>	<b>7,555</b>	<b>78.7</b>	<b>1,606</b>	<b>76.7</b>
<b>Cannabis</b>	<b>8,327</b>	<b>71.2</b>	<b>6,964</b>	<b>72.6</b>	<b>1,363</b>	<b>65.1</b>
Mariguana	8,320	71.2	6,958	72.5	1,362	65.0
Hachís	368	3.1	311	3.2	57	2.7
<b>Cocaína</b>	<b>3,251</b>	<b>27.8</b>	<b>2,716</b>	<b>28.3</b>	<b>535</b>	<b>25.5</b>
Polvo blanco	2,476	21.2	2,030	21.2	446	21.3
<i>Crack</i>	1,524	13.0	1,324	13.8	200	9.6
Otra presentación de cocaína	61	0.5	56	0.6	5	0.2
<b>Inhalables</b>	<b>2,808</b>	<b>24.0</b>	<b>2,268</b>	<b>23.6</b>	<b>540</b>	<b>25.8</b>
Solventes o removedores	2,026	17.3	1,653	17.2	373	17.8
Pegamentos	678	5.8	557	5.8	121	5.8
Esmaltes o pinturas	396	3.4	295	3.1	101	4.8
Otros inhalables	99	0.8	78	0.8	21	1.0
<b>Depresores</b>	<b>1,143</b>	<b>9.8</b>	<b>895</b>	<b>9.3</b>	<b>248</b>	<b>11.8</b>
Benzodiacepinas	1,086	9.3	849	8.8	237	11.3
<i>Rohypnol</i>	65	0.6	61	0.6	4	0.2
Otros depresores	26	0.2	15	0.2	11	0.5
<b>Estimulantes</b>	<b>1,926</b>	<b>16.5</b>	<b>1,548</b>	<b>16.1</b>	<b>378</b>	<b>18.1</b>
Anfetamina	178	1.5	154	1.6	24	1.1
Metanfetaminas	1,426	12.2	1,170	12.2	256	12.2
Éxtasis (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas	476	4.1	346	3.6	130	6.2
Otros estimulantes	45	0.4	38	0.4	7	0.3
<b>Drogas alucinógenas y disociativas</b>	<b>699</b>	<b>6.0</b>	<b>583</b>	<b>6.1</b>	<b>116</b>	<b>5.5</b>
LSD	501	4.3	409	4.3	92	4.4
Plantas alucinógenas y derivados	295	2.5	261	2.7	34	1.6
Otras drogas alucinógenas y disoc.	29	0.2	26	0.3	3	0.1
<b>Opiáceos</b>	<b>298</b>	<b>2.5</b>	<b>251</b>	<b>2.6</b>	<b>47</b>	<b>2.2</b>
Heroína	241	2.1	210	2.2	31	1.5
Opiáceos Sintéticos	39	0.3	26	0.3	13	0.6
Opio y otros opiáceos	31	0.3	25	0.3	6	0.3
<b>Otras sustancias de abuso</b>	<b>124</b>	<b>1.1</b>	<b>82</b>	<b>0.9</b>	<b>42</b>	<b>2.0</b>
Con utilidad médica	40	0.3	23	0.2	17	0.8
Otras sustancias de abuso	87	0.7	60	0.6	27	1.3

**Cuadro 27. Droga de preferencia en los últimos 12 meses, según menciones**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
<b>Tabaco</b>	<b>1,410</b>	<b>12.1</b>	<b>12.3</b>	<b>1,116</b>	<b>11.6</b>	<b>11.9</b>	<b>294</b>	<b>14.0</b>	<b>14.4</b>
<b>Alcohol</b>	<b>1,900</b>	<b>16.3</b>	<b>16.6</b>	<b>1,563</b>	<b>16.3</b>	<b>16.6</b>	<b>337</b>	<b>16.1</b>	<b>16.5</b>
<b>Cannabis</b>	<b>5,192</b>	<b>44.4</b>	<b>45.4</b>	<b>4,461</b>	<b>46.5</b>	<b>47.5</b>	<b>731</b>	<b>34.9</b>	<b>35.8</b>
Mariguana	5,182	44.3	45.3	4,453	46.4	47.4	729	34.8	35.7
Hachís	10	0.1	0.1	8	0.1	0.1	2	0.1	0.1
<b>Cocaína</b>	<b>853</b>	<b>7.3</b>	<b>7.5</b>	<b>715</b>	<b>7.4</b>	<b>7.6</b>	<b>138</b>	<b>6.6</b>	<b>6.8</b>
Polvo blanco	361	3.1	3.2	286	3.0	3.0	75	3.6	3.7
Crack	489	4.2	4.3	427	4.4	4.5	62	3.0	3.0
Otra presentación de cocaína	3	0.0	0.0	2	0.0	0.0	1	0.0	0.0
<b>Inhalables</b>	<b>926</b>	<b>7.9</b>	<b>8.1</b>	<b>661</b>	<b>6.9</b>	<b>7.0</b>	<b>265</b>	<b>12.7</b>	<b>13.0</b>
Solventes o removedores	645	5.5	5.6	466	4.9	5.0	179	8.5	8.8
Pegamentos	142	1.2	1.2	106	1.1	1.1	36	1.7	1.8
Esmaltes o pinturas	115	1.0	1.0	70	0.7	0.7	45	2.1	2.2
Otros inhalables	24	0.2	0.2	19	0.2	0.2	5	0.2	0.2
<b>Depresores</b>	<b>130</b>	<b>1.1</b>	<b>1.1</b>	<b>66</b>	<b>0.7</b>	<b>0.7</b>	<b>64</b>	<b>3.1</b>	<b>3.1</b>
Benzodiacepinas	117	1.0	1.0	61	0.6	0.6	56	2.7	2.7
Rohypnol	3	0.0	0.0	1	0.0	0.0	2	0.1	0.1
Otros depresores	10	0.1	0.1	4	0.0	0.0	6	0.3	0.3
<b>Estimulantes</b>	<b>692</b>	<b>5.9</b>	<b>6.0</b>	<b>546</b>	<b>5.7</b>	<b>5.8</b>	<b>146</b>	<b>7.0</b>	<b>7.1</b>
Anfetamina	49	0.4	0.4	41	0.4	0.4	8	0.4	0.4
Metanfetaminas	591	5.1	5.2	470	4.9	5.0	121	5.8	5.9
Éxtasis (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas	45	0.4	0.4	30	0.3	0.3	15	0.7	0.7
Otros estimulantes	7	0.1	0.1	5	0.1	0.1	2	0.1	0.1
<b>Drogas alucinógenas y disociativas</b>	<b>41</b>	<b>0.4</b>	<b>0.4</b>	<b>35</b>	<b>0.4</b>	<b>0.4</b>	<b>6</b>	<b>0.3</b>	<b>0.3</b>
LSD	31	0.3	0.3	27	0.3	0.3	4	0.2	0.2
Plantas alucinógenas y derivados	5	0.0	0.0	5	0.1	0.1	0	0.0	0.0
Otras drogas alucinógenas y disoc.	5	0.0	0.0	3	0.0	0.0	2	0.1	0.1
<b>Opiáceos</b>	<b>175</b>	<b>0.3</b>	<b>1.5</b>	<b>147</b>	<b>1.5</b>	<b>1.6</b>	<b>28</b>	<b>1.3</b>	<b>1.4</b>
Heroína	149	1.3	1.3	133	1.4	1.4	16	0.8	0.8
Opiáceos Sintéticos	14	0.1	0.1	7	0.1	0.1	7	0.3	0.3
Opio y otros opiáceos	12	0.1	0.1	7	0.1	0.1	5	0.2	0.2
<b>Otras sustancias de abuso</b>	<b>22</b>	<b>1.0</b>	<b>0.2</b>	<b>12</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>10</b>	<b>0.5</b>	<b>0.5</b>
Con utilidad médica	9	0.1	0.1	3	0.0	0.0	6	0.3	0.3
Otras sustancias de abuso	13	0.1	0.1	9	0.1	0.1	4	0.2	0.2
<b>Ninguna</b>	<b>101</b>	<b>0.9</b>	<b>0.9</b>	<b>76</b>	<b>0.8</b>	<b>0.8</b>	<b>25</b>	<b>1.2</b>	<b>1.2</b>
No consumió en el último año	230	2.0	Se omite	188	2.0	Se omite	42	2.0	Se omite
Sin Información	20	0.2	Se omite	12	0.1	Se omite	8	0.4	Se omite

**Cuadro 28. Droga de mayor impacto en los últimos 12 meses, según menciones**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
<b>Tabaco</b>	<b>865</b>	<b>7.4</b>	<b>7.6</b>	<b>673</b>	<b>7.0</b>	<b>7.2</b>	<b>192</b>	<b>9.2</b>	<b>9.4</b>
<b>Alcohol</b>	<b>1,657</b>	<b>14.2</b>	<b>14.5</b>	<b>1,361</b>	<b>14.2</b>	<b>14.5</b>	<b>296</b>	<b>14.1</b>	<b>14.5</b>
<b>Cannabis</b>	<b>4,953</b>	<b>42.4</b>	<b>43.3</b>	<b>4,228</b>	<b>44.1</b>	<b>45.0</b>	<b>725</b>	<b>34.6</b>	<b>35.5</b>
Mariguana	4,940	42.3	43.2	4,217	43.9	44.9	723	34.5	35.4
Hachís	13	0.1	0.1	11	0.1	0.1	2	0.1	0.1
<b>Cocaína</b>	<b>1,118</b>	<b>9.5</b>	<b>9.7</b>	<b>947</b>	<b>9.9</b>	<b>10.1</b>	<b>171</b>	<b>8.2</b>	<b>8.4</b>
Polvo blanco	459	3.9	4.0	366	3.8	3.9	93	4.4	4.5
Crack	651	5.6	5.7	573	6.0	6.1	78	3.7	3.8
Otra presentación de cocaína	8	0.1	0.1	8	0.1	0.1	0	0.0	0.0
<b>Inhalables</b>	<b>1,316</b>	<b>11.3</b>	<b>11.5</b>	<b>995</b>	<b>10.4</b>	<b>10.6</b>	<b>321</b>	<b>15.3</b>	<b>15.7</b>
Solventes o removedores	910	7.8	8.0	694	7.2	7.4	216	10.3	10.6
Pegamentos	220	1.9	1.9	172	1.8	1.8	48	2.3	2.3
Esmaltes o pinturas	153	1.3	1.3	102	1.1	1.1	51	2.4	2.5
Otros inhalables	33	0.3	0.3	27	0.3	0.3	6	0.3	0.3
<b>Depresores</b>	<b>210</b>	<b>1.8</b>	<b>1.8</b>	<b>129</b>	<b>1.3</b>	<b>1.4</b>	<b>81</b>	<b>3.9</b>	<b>4.0</b>
Benzodiacepinas	191	1.6	1.7	118	1.2	1.3	73	3.5	3.6
Rohypnol	9	0.1	0.1	7	0.1	0.1	2	0.1	0.1
Otros depresores	10	0.1	0.1	4	0.0	0.0	6	0.3	0.3
<b>Estimulantes</b>	<b>965</b>	<b>8.3</b>	<b>8.4</b>	<b>766</b>	<b>8.0</b>	<b>8.2</b>	<b>199</b>	<b>9.5</b>	<b>9.7</b>
Anfetamina	59	0.5	0.5	49	0.5	0.5	10	0.5	0.5
Metanfetaminas	821	7.0	7.2	656	6.8	7.0	165	7.9	8.1
Éxtasis (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas	75	0.6	0.7	53	0.6	0.6	22	1.1	1.1
Otros estimulantes	10	0.1	0.1	8	0.1	0.1	2	0.1	0.1
<b>Drogas alucinógenas y disociativas</b>	<b>73</b>	<b>0.6</b>	<b>0.6</b>	<b>56</b>	<b>0.6</b>	<b>0.6</b>	<b>17</b>	<b>0.8</b>	<b>0.8</b>
LSD	52	0.4	0.5	39	0.4	0.4	13	0.6	0.6
Plantas alucinógenas y derivados	11	0.1	0.1	10	0.1	0.1	1	0.0	0.0
Otras drogas alucinógenas y disoc.	10	0.1	0.1	7	0.1	0.1	3	0.1	0.1
<b>Opiáceos</b>	<b>192</b>	<b>1.6</b>	<b>1.7</b>	<b>166</b>	<b>1.7</b>	<b>1.8</b>	<b>26</b>	<b>1.2</b>	<b>1.3</b>
Heroína	165	1.4	1.4	151	1.6	1.6	14	0.7	0.7
Opiáceos Sintéticos	14	0.1	0.1	7	0.1	0.1	7	0.3	0.3
Opio y otros opiáceos	13	0.1	0.1	8	0.1	0.1	5	0.2	0.2
<b>Otras sustancias de abuso</b>	<b>22</b>	<b>0.2</b>	<b>0.2</b>	<b>12</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>10</b>	<b>0.5</b>	<b>0.5</b>
Con utilidad médica	10	0.1	0.1	4	0.0	0.0	6	0.3	0.3
Otras sustancias de abuso	12	0.1	0.1	8	0.1	0.1	4	0.2	0.2
<b>Ninguna</b>	<b>71</b>	<b>0.6</b>	<b>0.6</b>	<b>64</b>	<b>0.7</b>	<b>0.7</b>	<b>7</b>	<b>0.3</b>	<b>0.3</b>
No consumió en el último año	230	2.0	Se omite	188	2.0	Se omite	42	2.0	Se omite
Sin Información	20	0.2	Se omite	13	0.1	Se omite	7	0.3	Se omite

**Cuadro 29. Uso combinado de drogas en los últimos 12 meses**

(No incluye tabaco)

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Si combinó drogas	3,952	33.8	44.3	3,321	34.6	45.2	631	30.1	40.3
No combinó drogas	4,959	42.4	55.7	4,025	41.9	54.8	934	44.6	59.7
<i>No aplica</i>	2,781	23.8	<i>Se omite</i>	2,252	23.5	<i>Se omite</i>	529	25.3	<i>Se omite</i>
<b>Total</b>	<b>11,692</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>9,598</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>2,094</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

**Cuadro 30. Total de drogas consumidas en los últimos 30 días**

(Incluye alcohol o tabaco)

	General*		Hombres**		Mujeres***	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Ninguna	1,207	10.3	947	9.9	260	12.4
1 sustancia	2,848	24.4	2,280	23.8	568	27.1
2 sustancias	3,299	28.2	2,707	28.2	592	28.3
3 sustancias	2,765	23.6	2,336	24.3	429	20.5
4 sustancias	1,022	8.7	862	9.0	160	7.6
5 sustancias	349	3.0	300	3.1	49	2.3
6 sustancias	142	1.2	115	1.2	27	1.3
7 sustancias	36	0.3	29	0.3	7	0.3
8 sustancias	15	0.1	13	0.1	2	0.1
9 sustancias	6	0.1	6	0.1	0	0.0
10 sustancias	2	0.0	2	0.0	0	0.0
13 sustancias	1	0.0	1	0.0	0	0.0
<b>Total</b>	<b>11,692</b>	<b>100.0</b>	<b>9,598</b>	<b>100.0</b>	<b>2,094</b>	<b>100.0</b>

\*  $\mu = 2.1$ ;  $\sigma = 1.4$ ; Med.= 2; Mo.= 2; Decil1 = ninguna

\*\*  $\mu = 2.2$ ;  $\sigma = 1.4$ ; Med.= 2; Mo.= 2; Decil1 = 1

\*\*\*  $\mu = 2.0$ ;  $\sigma = 1.3$ ; Med.=2; Mo.= 2; Decil1 = ninguna

**Cuadro 31. Total de drogas ilícitas consumidas en los últimos 30 días  
(No incluye ni alcohol ni tabaco)**

	General*		Hombres**		Mujeres***	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Ninguna	3,732	31.9	2,998	31.2	734	35.1
1 sustancia	5,705	48.8	4,711	49.1	994	47.5
2 sustancias	1,523	13.0	1,265	13.2	258	12.3
3 sustancias	480	4.1	414	4.3	66	3.2
4 sustancias	185	1.6	155	1.6	30	1.4
5 sustancias	41	0.4	31	0.3	10	0.5
6 sustancias	17	0.1	15	0.2	2	0.1
7 sustancias	5	0.0	5	0.1	0	0.0
8 sustancias	3	0.0	3	0.0	0	0.0
12 sustancias	1	0.0	1	0.0	0	0.0
<b>Total</b>	<b>11,692</b>	<b>100.0</b>	<b>9,598</b>	<b>100.0</b>	<b>2,094</b>	<b>100.0</b>

\*  $\mu= 1.0$ ;  $\sigma = 0.9$ ; Med.= 1; Mo.= 1; Decil1 = ninguna

\*\*  $\mu= 1$ ;  $\sigma = 0.9$ ; Med.= 1; Mo.= 1; Decil1 = ninguna

\*\*\*  $\mu= 0.9$ ;  $\sigma = 0.9$ ; Med.= 1; Mo.= 1; Decil1 = ninguna

**Cuadro 32. Consumo de drogas en los últimos 30 días por sustancia**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
<b>Tabaco</b>	<b>7,250</b>	<b>62.0</b>	<b>6,046</b>	<b>63.0</b>	<b>1,204</b>	<b>57.5</b>
<b>Alcohol</b>	<b>6,326</b>	<b>54.1</b>	<b>5,269</b>	<b>54.9</b>	<b>1,057</b>	<b>50.5</b>
<b>Cannabis</b>	<b>5,804</b>	<b>49.6</b>	<b>4,939</b>	<b>51.5</b>	<b>865</b>	<b>41.3</b>
Mariguana	5,801	49.6	4,937	51.4	864	41.3
Hachís	105	0.9	89	0.9	16	0.8
<b>Cocaína</b>	<b>1,536</b>	<b>13.1</b>	<b>1,305</b>	<b>13.6</b>	<b>231</b>	<b>11.0</b>
Polvo blanco	935	8.0	771	8.0	164	7.8
<i>Crack</i>	790	6.8	705	7.3	85	4.1
Otra presentación de cocaína	22	0.2	21	0.2	1	0.0
<b>Inhalables</b>	<b>1,570</b>	<b>13.4</b>	<b>1,266</b>	<b>13.2</b>	<b>304</b>	<b>14.5</b>
Solventes o removedores	1,136	9.7	917	9.6	219	10.5
Pegamentos	335	2.9	274	2.9	61	2.9
Esmaltes o pinturas	185	1.6	142	1.5	43	2.1
Otros inhalables	24	0.2	21	0.2	3	0.1
<b>Depresores</b>	<b>545</b>	<b>4.7</b>	<b>391</b>	<b>4.1</b>	<b>154</b>	<b>7.4</b>
Benzodiacepinas	520	4.4	374	3.9	146	7.0
<i>Rohypnol</i>	18	0.2	17	0.2	1	0.0
Otros depresores	14	0.1	5	0.1	9	0.4
<b>Estimulantes</b>	<b>969</b>	<b>8.3</b>	<b>775</b>	<b>8.1</b>	<b>194</b>	<b>9.3</b>
Anfetamina	58	0.5	51	0.5	7	0.3
Metanfetaminas	807	6.9	656	6.8	151	7.2
Éxtasis (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas	120	1.0	77	0.8	43	2.1
Otros estimulantes	14	0.1	11	0.1	3	0.1
<b>Drogas alucinógenas y disociativas</b>	<b>162</b>	<b>1.4</b>	<b>140</b>	<b>1.5</b>	<b>22</b>	<b>1.1</b>
LSD	120	1.0	103	1.1	17	0.8
Plantas alucinógenas y derivados	48	0.4	43	0.4	5	0.2
Otras drogas alucinógenas y disoc.	7	0.1	6	0.1	1	0.0
<b>Opiáceos</b>	<b>183</b>	<b>1.6</b>	<b>157</b>	<b>1.6</b>	<b>26</b>	<b>1.2</b>
Heroína	155	1.3	139	1.4	16	0.8
Opiáceos Sintéticos	20	0.2	12	0.1	8	0.4
Opio y otros opiáceos	10	0.1	8	0.1	2	0.1
<b>Otras sustancias de abuso</b>	<b>63</b>	<b>0.5</b>	<b>40</b>	<b>0.4</b>	<b>23</b>	<b>1.1</b>
Con utilidad médica	23	0.2	12	0.1	11	0.5
Otras sustancias de abuso	42	0.4	28	0.3	14	0.7

**Cuadro 33. Frecuencia de episodios de abuso del consumo de Tabaco<sup>1</sup> en los últimos 30 días**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Ni una vez	2,251	19.3	31.7	1,888	19.7	31.8	363	17.3	31.0
< de 1 vez a la semana	835	7.1	11.7	683	7.1	11.5	152	7.3	13.0
1 o 2 veces a la semana	832	7.1	11.7	701	7.3	11.8	131	6.3	11.2
Cada tercer día	486	4.2	6.8	405	4.2	6.8	81	3.9	6.9
Diario	2,706	23.1	38.1	2,263	23.6	38.1	443	21.2	37.9
No consumió en los últimos 30 días	4,442	38.0	Se omite	3,552	37.0	Se omite	890	42.5	Se omite
Sin información	140	1.2	Se omite	106	1.1	Se omite	34	1.6	Se omite
<b>Total</b>	<b>11,692</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>9,598</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>2,094</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

<sup>1</sup> Consumo de seis o más cigarrillos en un solo día.

**Cuadro 34. Frecuencia de episodios de abuso del consumo de Alcohol<sup>1</sup> en los últimos 30 días**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Ni una vez	1,045	8.9	16.9	859	8.9	16.7	186	8.9	18.1
< de 1 vez a la semana	2,267	19.4	36.7	1,899	19.8	36.8	368	17.6	35.8
1 o 2 veces a la semana	2,025	17.3	32.7	1,688	17.6	32.7	337	16.1	32.8
Cada tercer día	463	4.0	7.5	387	4.0	7.5	76	3.6	7.4
Diario	384	3.3	6.2	323	3.4	6.3	61	2.9	5.9
No consumió en los últimos 30 días	5,366	45.9	Se omite	4,329	45.1	Se omite	1,037	49.5	Se omite
Sin información	142	1.2	Se omite	113	1.2	Se omite	29	1.4	Se omite
<b>Total</b>	<b>11,692</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>9,598</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>2,094</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

<sup>1</sup> Consumo de más de cuatro copas en un día para los hombres y de más de tres copas en un día para las mujeres.

**Cuadro 35. Frecuencia de episodios de abuso del consumo de drogas ilícitas<sup>1</sup> en los últimos 30 días**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
< de 1 vez a la semana	1,706	14.6	25.7	1,351	14.1	24.4	355	17.0	32.2
1 o 2 veces a la semana	1,437	12.3	21.7	1,214	12.6	22.0	223	10.6	20.3
Cada tercer día	1,031	8.8	15.6	880	9.2	15.9	151	7.2	13.7
Diario	2,455	21.0	37.0	2,083	21.7	37.7	372	17.8	33.8
No consumió en los últimos 30 días	3,732	31.9	Se omite	2,998	31.2	Se omite	734	35.1	Se omite
Sin información	1,331	11.4	Se omite	1,072	11.2	Se omite	259	12.4	Se omite
<b>Total</b>	<b>11,692</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>9,598</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>2,094</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

<sup>1</sup> Consumo de cualquier dosis.

## GLOSARIO

<b>Droga ilícita de inicio</b>	Es la sustancia ilegal que el usuario refirió como la droga con la cual inicio el consumo de sustancias. No incluye el inicio del consumo con alcohol o tabaco.
<b>Droga de mayor impacto en los últimos 12 meses</b>	Sustancia que el propio usuario de drogas solicitante de tratamiento refiere como la que más problemas le ha ocasionado en los ámbitos de salud, personal, familiar, escolar, laboral o social, en el transcurso del último año.
<b>Droga de preferencia en los últimos 12 meses</b>	Sustancia que el propio usuario solicitante de tratamiento ha elegido o preferido consumir en el transcurso del último año.
<b>Estrato social</b>	Estimación que hace el terapeuta, según su percepción, del estrato al que pertenece el usuario de drogas, considerando aspectos como lugar de residencia, escolaridad, empleo y características manifiestas como higiene y aliño, calidad del vestido, expresión verbal y vocabulario, etc.
<b>Tipo de consumo de drogas ilícitas</b>	Características de consumo de sustancias ilegales según motivo, frecuencia y problemas asociados. No incluye el uso de alcohol y/o tabaco y se clasifica como: experimental, social u ocasional, funcional, disfuncional y en remisión.
<b>Total de drogas consumidas</b>	Número de drogas consumidas (se incluyen las 26 sustancias de seguimiento) en las siguientes categorías: alguna vez en la vida, en el último año y en los últimos 30 días.
<b>Uso combinado de drogas en los últimos 12 meses</b>	Consumo de dos o más sustancias (incluyendo alcohol y cualquier droga ilícita o de uso médico, utilizada sin prescripción, pero excluyendo tabaco) en el transcurso de un mismo día, en el año previo a la solicitud de tratamiento en CIJ.