

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



**Centros de
Integración
Juvenil, A.C.**

*SISTEMA DE INFORMACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DEL
CONSUMO DE DROGAS*

**CONSUMO DE SUSTANCIAS EN PACIENTES
DE PRIMER INGRESO A TRATAMIENTO.
PRIMER SEMESTRE DEL 2014.
USUARIOS DE DROGAS ILÍCITAS**

**Valeriano Raúl García Aurrecoechea
Alma Delia Gutiérrez López**

**Dirección de Investigación y Enseñanza
Subdirección de Investigación
México, octubre de 2014**

SIECD

Informe de Investigación 14-10a



DIRECTORIO

PRESIDENTE HONORARIO VITALICIO DEL PATRONATO NACIONAL

Dr. Jesús Kumate Rodríguez

PRESIDENTE DEL PATRONATO NACIONAL

Dr. Roberto Tapia Conyer

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA

Sra. Kena Moreno

DIRECTORA GENERAL

Lic. Carmen Fernández Cáceres

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE OPERACIÓN Y PATRONATOS

Dr. José Ángel Prado García

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE NORMATIVIDAD

Dr. Ricardo Sánchez Huesca

DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA

Dr. Jaime Arturo Quintanilla Bendek

SUBDIRECTOR DE INVESTIGACIÓN

Mtro. David Bruno Díaz Negrete

JEFA DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA Y EPIDEMIOLÓGICA

Dra. Solveig Eréndira Rodríguez Kuri

CONTENIDO	PÁG.
ANTECEDENTES	5
MÉTODO	6
CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS	8
FACTORES ASOCIADOS A LA DEMANDA DE TRATAMIENTO	11
CONSUMO DE DROGAS	14
REFERENCIAS	24
CUADROS	27
GLOSARIO	51

ÍNDICE DE CUADROS

PÁG.

Cuadro 1	Pacientes de primer ingreso a tratamiento por unidad de atención (CIJ)	28
Cuadro 2	Sexo	31
Cuadro 3	Persona que proporciona la información	31
Cuadro 4	Edad de ingreso a tratamiento	31
Cuadro 5	Estado civil	32
Cuadro 6	Escolaridad	32
Cuadro 7	Ocupación	33
Cuadro 8	Estrato social	33
Cuadro 9	Motivos de consulta	34
Cuadro 10	Condicionantes de la solicitud de tratamiento	34
Cuadro 11	Antecedentes de acciones contra el consumo de sustancias	35
Cuadro 12	Problemas asociados al consumo de sustancias	35
Cuadro 13	Edad de inicio del consumo de tabaco	36
Cuadro 14	Edad de inicio del consumo de alcohol	36
Cuadro 15	Edad de inicio del consumo de drogas ilícitas	37
Cuadro 16	Drogas ilícitas de inicio	38
Cuadro 17	Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de tabaco y el ingreso a tratamiento a CIJ	39
Cuadro 18	Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de alcohol y el ingreso a tratamiento a CIJ	39
Cuadro 19	Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de drogas ilícitas y el ingreso a tratamiento a CIJ	40
Cuadro 20	Tipo de consumo de drogas ilícitas	40
Cuadro 21	Total de drogas consumidas alguna vez en la vida (incluye alcohol o tabaco)	41
Cuadro 22	Total de drogas ilícitas consumidas alguna vez en la vida (no incluye ni alcohol ni tabaco)	41
Cuadro 23	Consumo de drogas alguna vez en la vida por sustancia	42
Cuadro 24	Total de drogas consumidas en el último año (incluye alcohol o tabaco)	43
Cuadro 25	Total de drogas ilícitas consumidas en el último año (no incluye ni alcohol ni tabaco)	43
Cuadro 26	Consumo de drogas en los últimos 12 meses por sustancia	44
Cuadro 27	Droga de preferencia en los últimos 12 meses, según menciones	45
Cuadro 28	Droga de mayor impacto en los últimos 12 meses, según menciones	46
Cuadro 29	Uso combinado de drogas en los últimos 12 meses (no incluye tabaco)	47
Cuadro 30	Total de drogas consumidas en los últimos 30 días (incluye alcohol o tabaco)	47
Cuadro 31	Total de drogas ilícitas consumidas en los últimos 30 días (no incluye ni alcohol ni tabaco)	48
Cuadro 32	Consumo de drogas en los últimos 30 días por sustancia	49
Cuadro 33	Frecuencia de episodios de abuso del consumo de Tabaco en los últimos 30 días	50
Cuadro 34	Frecuencia de episodios de abuso del consumo de Alcohol en los últimos 30 días	50
Cuadro 35	Frecuencia de episodios de abuso del consumo de drogas ilícitas en los últimos 30 días	50

RESUMEN

El informe se realizó con base en 11,673 registros clínicos de la entrevista inicial de usuarios de sustancias psicoactivas que reportaron consumo de al menos una droga ilícita y que acudieron por primera vez a consulta a Centros de Integración Juvenil entre enero y junio de 2014. Los objetivos del estudio son: a) actualizar la información del perfil sociodemográfico de los pacientes, de los factores asociados a la demanda de tratamiento y del patrón de consumo de sustancias; b) contribuir a retroalimentar sistemas nacionales de información del consumo de drogas; c) generar información que oriente el desarrollo de estudios con pacientes o consumidores(as) de drogas en México; y d) contribuir al desarrollo, diseño y ajuste de los servicios institucionales de prevención y tratamiento del consumo de drogas.

Los datos que se presentan en este informe permiten ver que el uso de drogas ilícitas sigue siendo un trastorno que afecta en mayor proporción a la población masculina que solicita tratamiento, en una proporción de 4.3 hombres por cada mujer. La edad media de ingreso a tratamiento fue de 22.1 años. En promedio, los hombres ingresaron a tratamiento a mayor edad que las mujeres (22.5 y 20.4 años respectivamente). La edad promedio del inicio del consumo de tabaco y la de alcohol se situaron en los 14.3 años, mientras que la de drogas ilícitas en 15.8 años. Tanto hombres como mujeres iniciaron el consumo de estas sustancias alrededor de las edades mencionadas, lo que muestra que la edad de inicio no presenta diferencias relevantes por sexo.

Las drogas de mayor consumo alguna vez en la vida fueron alcohol (86.5%), *cannabis* (86.4%), tabaco (83.9%), cocaína/*crack* (38.9%), inhalables (32.5%), estimulantes (21.6%, principalmente metanfetaminas: 16.0% y éxtasis: 6.0%), depresores (14.2%), drogas alucinógenas y disociativas (9.9%) y opiáceos (3.4%). En cuanto al consumo en el mes previo al ingreso a tratamiento, las sustancias más utilizadas fueron tabaco (59.8%), alcohol (53.6%), *cannabis* (51.4%), inhalables (13.5%) y cocaína/*crack* (12.7%). Las sustancias de mayor impacto fueron marihuana (45.2%), alcohol (13.7%), metanfetaminas (8.1%), solventes y removedores (7.1%), tabaco (6.6%), *crack* (5.5%), y cocaína en polvo (3.9%).

En cuanto a los factores asociados a la demanda de tratamiento se observó que los usuarios de drogas acudieron principalmente por condicionamiento o recomendación de la familia (45.9%) o por iniciativa propia (36.8%); que solicitaron atención debido a su consumo de drogas ilícitas (88.6%), de alcohol (40.3%) y de tabaco (35.7%); que previo al tratamiento algunos de ellos (30.3%) intentaron interrumpir de manera voluntaria y sin apoyo el consumo y otros (27.4%) no habían tomado ninguna medida contra el problema; y que entre los problemas más frecuentemente asociados al consumo se reconocieron los de tipo familiar (79.2%), los escolares (58.9%), los de salud (40.7%) y los psicológicos (38.5%).

ANTECEDENTES

Centros de Integración Juvenil ha reportado información epidemiológica del consumo de drogas de los solicitantes de tratamiento desde 1976¹. En 1983 inicia la aplicación de una cédula homogénea a los pacientes de nuevo ingreso², aunque no es sino a partir de 1990 que la recolección de datos se realiza en forma sistemática³, con la implementación del *Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas* (SIECD), el cual se ha ido consolidando a través de los años y ha realizado el seguimiento oportuno de un conjunto de variables, con las cuales ha podido contribuir en la toma de decisiones del diseño y ajuste de servicios institucionales, además de aportar conocimientos sobre la forma y tendencias del uso de drogas y de aportar información a los Sistemas Epidemiológicos de las Adicciones en el país, como es el caso del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA)⁴ de la Secretaría de Salud, del Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas (SRID) –perteneciente al Instituto Nacional de Psiquiatría “*Ramón de la Fuente*” (INP)⁵– y del Observatorio Epidemiológico en Drogas de la Secretaría Salud⁶.

El SIECD, también ha apoyado en el desarrollo de diferentes estudios epidemiológicos especializados, con temas que van desde el perfil de usuarios de drogas y su trayectoria de consumo⁷, el consumo de drogas en las mujeres⁸, en la población infantil⁹ o de acuerdo con las etapas de la vida¹⁰, hasta llegar a los estudios de tendencias^{11,12,13,14}. Toda esta información ha facilitado el enfrentamiento oportuno de las problemáticas generadas por el creciente consumo de estimulantes y simultáneamente ha sido de utilidad para apoyar el diseño eficaz de estudios sobre características particulares de los consumidores de estos alcaloides^{15,16}.

Por otro lado, la información reportada ha dado pie al desarrollo de estudios epidemiológicos particulares enfocados en profundizar en las características del consumo de drogas legales de pacientes atendidos. Así, desde el año 2006, el SIECD genera un informe por separado de las características de los pacientes consumidores de tabaco y alcohol¹⁷, con lo cual se ha logrado identificar una emergencia epidemiológica del consumo de alcohol entre las pacientes atendidas con relación a los años anteriores¹⁸; suceso que también ha sido reportado por la Encuesta Nacional de Adicciones (ENA), sobre todo para el caso de las mujeres jóvenes¹⁹ y ha dado pie a CIJ para profundizar en esta problemática²⁰.

Adicionalmente, es importante destacar que la información generada por el SIECD durante el lapso de más de dos décadas ha sido consistente con la de las Encuestas Nacionales de Adicciones (ENA) de este periodo, ya sea en el nivel nacional o en el regional²¹ y también ha sido referente para el desarrollo de metodologías de investigación en variados estudios clínicos, psicosociales y evaluativos de la Institución, como es el caso de diversos *Estudios de la Comunidad Objetivo* (EBCO)²² realizados por los CIJ a lo largo y ancho del país.

El presente informe se elaboró con base en la información obtenida por el SIECD de Centros de Integración Juvenil (CIJ) durante el primer semestre de 2014 y tiene el objetivo de proporcionar datos actualizados sobre las características sociodemográficas, factores asociados a la demanda de tratamiento y del patrón de consumo de drogas de los solicitantes de tratamiento, con el propósito adicional de apoyar el diseño, planeación y ajuste de los programas institucionales de prevención, tratamiento y rehabilitación, además de colaborar con los sistemas de información en drogas de los Gobiernos y de aportar elementos para el diseño y elaboración de investigaciones en el campo de las adicciones.

MÉTODO

Diseño de estudio: Censo, estudio transversal y descriptivo.

Población: 11,673 usuarios de drogas ilícitas procedentes de 106 unidades de CIJ, que acudieron por primera vez a consulta entre enero y junio de 2014 y que proporcionaron personalmente la información (cuadro 1. Anexo).

Fuente de información: Formato de Entrevista Inicial, aplicado en la primera consulta por parte del personal médico-técnico responsable del ingreso de pacientes a tratamiento, que forma parte del expediente clínico en cualquiera de sus dos versiones: formato electrónico (base de datos recuperada el día 18 de julio del 2014, con 11,338 registros capturados por los/as terapeutas responsables de realizar la entrevista inicial) o formato impreso (335 registros capturados por personal del departamento de Investigación Clínica y Epidemiológica mediante el programa *Control de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas* desarrollado por CIJ).

Variables de estudio: Las características sociodemográficas estudiadas comprenden: persona que proporciona la información, sexo, edad de ingreso a tratamiento, estado civil, escolaridad, ocupación y estrato social; las variables de los factores asociados a la demanda de tratamiento: motivo(s) de consulta, condicionante(s) de la solicitud de tratamiento, antecedente(s) de acciones tomadas frente al uso de sustancias y

problema(s) asociado(s) al mismo; y las variables de patrón de consumo: edad de inicio, tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de sustancias y el ingreso a tratamiento, consumo alguna vez en la vida, en el último año y en los últimos 30 días; drogas de preferencia y de mayor impacto en el último año (estas dos últimas variables de acuerdo con el punto de vista del paciente), uso combinado de sustancias, tipo de consumo de drogas ilícitas, episodios de abuso y total de drogas consumidas.

La información sobre el consumo de drogas se presenta categorizada en diez grupos de sustancias que a su vez desagrega a 26 categorías de drogas:

Grupo de Sustancias	Drogas en seguimiento
Tabaco	Cigarrillos
Alcohol	Bebidas alcohólicas
<i>Cannabis</i>	Mariguana y hachís
Cocaína	Cocaína en polvo, <i>crack</i> y otra presentación de cocaína
Inhalables	Solventes y removedores, pegamentos, esmaltes y pinturas y otros inhalables
Depresores	Benzodiacepinas, <i>Rohypnol</i> y otros depresores
Estimulantes	Anfetaminas, metanfetaminas (<i>crystal</i> o <i>ICE</i>), MDMA (<i>éxtasis</i>) y metanfetaminas alucinógenas; y otros estimulantes
Drogas alucinógenas y disociativas	Ácido lisérgico (LSD), plantas alucinógenas y derivados y otros alucinógenos (PCP y ketamina)
Opiáceos	Heroína, opiáceos sintéticos y opio, y otros opioides
Otras sustancias de abuso	Sustancias con utilidad médica y otras sustancias no identificadas

Procesamiento de datos. Para el procesamiento estadístico de la información se utilizó el programa SPSS v.19.

Los resultados se presentan tanto en forma general como desglosada por sexo y en porcentajes válidos, excluyendo los casos “*sin información*” y aquellos que no cumplieron con las condiciones requeridas para el análisis en cada variable de estudio.

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS^a

Sexo. La población se conformó por 9,451 hombres y 2,222 mujeres, lo que en porcentaje representa a un 81.0% y un 19.0%, respectivamente. Dando así una proporción aproximada de cuatro hombres (4.3) por cada mujer.

Persona que proporciona la información. En el 60.5% de las ocasiones los pacientes acudieron en compañía de familiares u otras personas (60.2% de los hombres y 62.0% de las mujeres), mientras que en 39.5% lo hicieron solos (39.8% de los hombres y 38.0% de las mujeres).


Edad de ingreso a tratamiento. Se observa un rango de edad de 9 a 88 años, con un promedio de 22.1 años y una desviación estándar de diez punto cuatro ($\sigma=10.4$); es decir que más del 84.5% de las personas atendidas (9,838) se encontró entre los 12 y 32 años de edad; la edad mediana de la población fue de 18 años, cabe señalar que 48.4% de los casos fueron menores de edad (5,655 sujetos), mientras que la moda se ubicó en 15 años (1,294 personas atendidas).

Figura 1. Edad de ingreso según sexo


	 Años	 Años	
Rango	9 a 88	11 a 72	Las mujeres ingresaron a tratamiento a menor edad
Media	22.5	20.4	
Desviación estándar	10.5	9.9	
Mediana	18	16	
Moda	15	15	

^a Cfr., Cuadros 1 a 8.

Estado civil. La mayor parte de la población refirió ser soltera (74.8%), mientras que 9.4% indicó que vivía en unión libre y 9.3% estaba casada, con diferencias entre los sexos.




Escolaridad. 46.6% cursaba o había cursado algún grado de educación secundaria, 34.1% al menos algún grado de bachillerato, 8.6% contaba con algún grado escolar de nivel primaria y 7.9 de nivel superior o posgrado.




Ocupación. 39.6% se dedicaba a estudiar, 29.0% desempeñaba alguna actividad laboral y 23.4% estaba desempleado.

Figura 4. Principal ocupación según sexo




Estrato social. Según la percepción de los terapeutas 61.6% de los pacientes se ubicaban en el estrato medio bajo, 27.7% en el estrato bajo y 9.3%, en el medio alto.

Figura 5. Estrato social según sexo




FACTORES ASOCIADOS A LA DEMANDA DE TRATAMIENTO^b

Motivos de consulta. 43.3% de las personas atendidas reportó más de un motivo para acudir a tratamiento (uso de alcohol, tabaco o drogas), mientras que 0.2% no expresó ninguno. Conviene señalar que 88.6% acudió por consumo de drogas ilícitas, 40.3% por uso de bebidas alcohólicas y 35.7% por uso de tabaco.




Condicionantes de la solicitud de tratamiento. 25.1% de los casos expresó dos o más condicionantes para acudir a tratamiento; 45.9% acudió por recomendación de la familia, 36.8% por iniciativa propia, 20.8% por condicionamiento o recomendación escolar, 9.4% por condicionamiento legal y 7.7% por indicación médica.




^b Cfr. Cuadros 9 a 12.

Antecedentes de acciones contra el consumo de sustancias. 30.3% de los pacientes expresó que antes de acudir a CIJ había intentado interrumpir el consumo por voluntad propia, 11.9% señaló que previamente había estado internado en algún anexo, 6.7% había acudido a grupos de autoayuda, 5.2% lo había hecho por medio de juramento y 4.8% acudió a algún tipo de tratamiento psiquiátrico o psicoterapéutico. Cabe señalar que 10.6% reportó haber intentado al menos dos formas distintas de acciones para abandonar el consumo de drogas, en tanto que 27.4% expresó que hasta el momento de la solicitud de tratamiento no había tomado ninguna medida en contra del consumo de drogas.



Problemas asociados al consumo de sustancias. 79.2% señaló problemas de tipo familiar, 58.9% escolares (un incremento frente a los 36.4% del semestre anterior), 40.7% de salud, 38.5% psicológicos, 20.3% laborales, 21.0% legales, 16.2% de conducta antisocial o delictiva y 12.1% accidentes o lesiones. Cabe señalar que 75.5% de las personas atendidas mencionaron dos o más problemas asociados al consumo de sustancias, mientras que 4.4% no reportó ninguno.

Figura 9. Problemas asociados al consumo de sustancias según sexo



CONSUMO DE DROGAS^c

Edad de inicio del consumo de sustancias. La edad promedio de inicio del consumo de tabaco se situó en 14.3 años ($\sigma=3.2$ años), la mediana en 14 años y la moda en 13 años, mientras que la edad promedio de inicio del consumo de alcohol se ubicó en 14.3 años ($\sigma=3.0$ años) con una mediana de 14 años y una moda de 15 años. Por su parte, la edad promedio de inicio en el abuso de drogas ilícitas (incluyendo sustancias de uso médico sin prescripción) fue de 15.8 años ($\sigma=4.8$ años), con mediana de 15 años y la moda de 14 años. Por otra parte, al considerar el primer decil como indicador de las edades de inicio más tempranas, se observa que el consumo de tabaco y alcohol aparece a los 11 años, mientras que la de drogas ilícitas se presenta un año después.


Figura 10. Edad de inicio del consumo de sustancias según sexo

	 Años			 Años		
	Tabaco	Alcohol	Drogas ilícitas	Tabaco	Alcohol	Drogas ilícitas
Promedio	14.2	14.3	15.7	14.4	14.3	16.1
Desviación estándar	3.1	3.0	4.5	3.7	3.2	5.7
Mediana	14	14	15	14	14	15
Moda	15	15	14	13	14	14

^c Cfr., Cuadros 13 a 35

Drogas ilícitas de inicio. Las sustancias de inicio más reportadas fueron: en primer lugar la cannabis, principalmente en forma de marihuana (72.3%); en segundo lugar los inhalables (13.2%), mayormente en forma de solventes y removedores (8.8%); después la cocaína (9.0%), tanto en forma de polvo blanco (6.8%) como *crack* (2.2%); en cuarto lugar aparecen los estimulantes (2.9%), donde destacan las metanfetaminas (2.0%); después aparecen los depresores con utilidad médica (1.8%) siendo las benzodiazepinas las más reportadas (1.6%); y en sexto lugar se ubican los opiáceos (0.2%), entre los cuales sobresale la heroína (17 casos).

Figura 11. Principales drogas ilícitas de inicio según sexo




Lapso transcurrido entre el inicio del consumo de sustancias y el ingreso a tratamiento en CIJ. El promedio de años entre el inicio de consumo y la solicitud de tratamiento se situó de la siguiente manera: tabaco de 8.3 años ($\sigma=9.9$ años), alcohol de 8.3 años ($\sigma=9.8$ años) y drogas ilícitas de 6.3 años ($\sigma=8.7$ años). Resalta, que la mitad de los usuarios dejó pasar cuatro años desde el momento en que se inició el consumo de tabaco o alcohol y el momento de acudir a solicitar tratamiento, mientras que la mitad de los usuarios de drogas ilegales dejaron pasar 3 años.

Figura 12. Lapso transcurrido entre el inicio del consumo de sustancias y el ingreso a tratamiento en CIJ según sexo

Las mujeres solicitaron tratamiento en forma más oportuna	Años			Años		
	Tabaco	Alcohol	Drogas ilícitas	Tabaco	Alcohol	Drogas ilícitas
Promedio	8.7	8.8	6.8	6.6	6.5	4.3
Desviación estándar	10.0	9.8	9.0	9.1	8.7	7.2
Mediana	4	5	3	3	3	2
Moda	1	1	1	1	1	< un año

Tipo de consumo de drogas ilícitas. De acuerdo con los terapeutas, 50.5% de los solicitantes de tratamiento fue diagnosticado con consumo funcional, 17.7% con consumo disfuncional, 16.6% con consumo social u ocasional, 11.7% con consumo experimental y 3.5% presentaba remisión del consumo.




Las mujeres presentaron patrones de consumo de menor gravedad que los hombres

Total de drogas consumidas. El promedio de sustancias utilizadas alguna vez en la vida, incluyendo alcohol o tabaco, fue de 4.1 drogas (94.0% reportó el uso de dos o más sustancias); en el último año fue de 3.3 drogas (87.3% consumió dos o más sustancias); y en los últimos 30 días fue de 2.1 drogas (64.9% reportó haber utilizado dos o más sustancias).

El promedio de sustancias utilizadas alguna vez en la vida, sin incluir alcohol y tabaco, fue de 2.4 drogas (56.5 % reportó el uso de dos o más sustancias); en el último año fue de 1.8 drogas (41.4% consumió dos o más sustancias); y en los últimos 30 días fue de una droga (20.1% reportó haber utilizado dos o más sustancias).

Figura 14. Total de drogas consumidas según sexo




Mujeres y hombres consumieron, en promedio, un número similar de drogas

Consumo de drogas alguna vez en la vida.^d Las proporciones de consumo alguna vez en la vida de los diez grupos de sustancias fueron: tabaco (83.9%), alcohol (86.5%); *cannabis* (86.4%), cocaína (38.9%), inhalables (32.5%), estimulantes (21.6%), depresores (14.2%), drogas alucinógenas y disociativas (9.9%), opiáceos (3.4%) y otras sustancias de abuso (2.1%).

En cuanto al uso de sustancias específicas (contenidas en alguno de los diez grupos antes mencionados) sobresalen: marihuana (86.4%), cocaína en polvo (33.0%) solventes y removedores (22.7%), *crack* (18.5%), metanfetaminas (16.0%) y benzodiacepinas (13.4%); en menor proporción los pegamentos (8.9%), LSD (6.8%) y *éxtasis* y otras metanfetaminas alucinógenas (6.0%).

Figura 15. Consumo de drogas alguna vez en la vida según sexo




^d Dado que la mayoría de los casos refirió haber utilizado dos o más sustancias —tanto en esta categoría como en las de uso en el último año y en los últimos 30 días, *infra*— la suma de porcentajes no resulta 100%.

Consumo de drogas en los últimos 12 meses. 98.1% de las personas reportaron haber consumido alguna sustancia en el año previo a su ingreso a tratamiento en CIJ. Las proporciones de consumo de los diez grupos de sustancias utilizadas en este lapso fueron: alcohol (78.5%), tabaco (74.6%), *cannabis* (73.5%), cocaína (27.1%), inhalables (23.5%), estimulantes (16.8%), depresores (9.8%), drogas alucinógenas y disociativas (5.6%); opiáceos (2.4%) y otras sustancias de abuso (1.4%).


En cuanto al consumo de sustancias específicas contenidas en alguno de los grupos anteriores destacaron: marihuana (73.4%), cocaína en polvo (20.9%), solventes y removedores (16.4%), *crack* (12.9%) y metanfetaminas (13.1%); en menor proporción se refieren a las benzodiacepinas (9.4%) y los pegamentos (5.8%).

Figura 16. Consumo de drogas en los últimos 12 meses según sexo




Droga de preferencia en los últimos 12 meses. Entre las sustancias más frecuentemente referidas se encontraron: cannabis (47.2%), alcohol (15.7%), tabaco (11.9%), inhalables (7.5%) y metanfetaminas (5.6%). En menores proporciones aparecieron: crack (4.2%), cocaína en polvo (2.9%) y heroína (1.5%).

Figura 17. Droga de preferencia en los últimos 12 meses según sexo




Droga de mayor impacto en los últimos 12 meses. Las principales sustancias a cuyo consumo los pacientes atribuyeron los mayores daños en la salud, en el bienestar personal y familiar o en el desempeño escolar, laboral o social y por las que pudieron haber solicitado tratamiento se encuentran: *cannabis* (45.4%), alcohol (13.7%), inhalables (11.0%), tabaco (6.6%), metanfetaminas (8.1%), *crack* (5.5%) y cocaína en polvo (3.9%).

Figura 18. Droga de mayor impacto en los últimos 12 meses según sexo



Uso combinado de drogas en los últimos 12 meses.^e Al menos en una ocasión en el transcurso del último año y sin tomar en cuenta el consumo de tabaco, poco menos de la mitad de la población (43.6%) reportó el consumo en un mismo día de dos o más sustancias.

Figura 19. Uso combinado de droga en los últimos 12 meses según sexo




^e No se toman en cuenta 2,698 casos (23.1%) que no cumplieron los criterios de inclusión de esta variable; 22.6% de los hombres y 25.2% de las mujeres (ver anexo).

Consumo de drogas en los últimos 30 días. Incluyendo alcohol y tabaco, 89.3% de los casos reportaron consumo de sustancias en el mes anterior al ingreso a tratamiento.

Las proporciones de consumo de los diez grupos de sustancias utilizadas en este lapso fueron: tabaco (59.8%), alcohol (53.6%), *cannabis* (51.4%), inhalables (13.5%), cocaína (12.7%), estimulantes (8.8%), depresores (4.8%), opiáceos (1.6%), drogas alucinógenas y disociativas (1.2%) y otras sustancias de abuso (0.7%).


En cuanto al consumo de sustancias específicas destacó el de marihuana con 51.4%, le siguen: solventes/removedores (9.3%), cocaína en polvo (7.6%), metanfetaminas (7.5%) y crack (6.6%); en menor proporción se registra el consumo de benzodiacepinas (4.6%) y pegamentos (2.8%).

Figura 20. Consumo de drogas en los últimos 30 días según sexo



Frecuencia de episodios de abuso en los últimos 30 días. 36.9% de quienes reportaron consumo de tabaco en los últimos 30 días aceptó fumar seis o más cigarrillos diariamente. Así mismo, entre quienes consumieron alcohol, la mayor parte (35.7%) reportó consumo abusivo menos de una vez a la semana y una o dos veces a la semana (31.6%). Por otra parte, 38.5% de los usuarios de drogas ilícitas durante el último mes reportaron consumirlas todos los días, 25.2% menos de una vez a la semana y 21.0% una a dos veces a la semana.

Figura 21. Frecuencia de episodios de abuso en los últimos 30 días según sexo



Las frecuencias de episodios de abuso de tabaco y alcohol tienden a ser similares entre los sexos, no obstante, es mayor el porcentaje de hombres que abusaron de drogas ilegales el mes previo al tratamiento

REFERENCIAS

1. Sánchez-Huesca, R. y López Granados, L. (1985). ***Características demográficas y patrones de inicio en el consumo de drogas en asistentes a los Centros Locales; recuperación de los archivos de siete años (1976-1982)***. México: Centros de Integración Juvenil, A.C. (reporte interno).
2. Clarac Rengade, P. y Wagner Echeagaray, F. (1987). Análisis de algunas variables en una muestra de pacientes farmacodependientes (1986). En F. Wagner Echeagaray y R. Ortiz Mondragón (Comp.) (1990). ***Estudios acerca de la farmacodependencia en México realizados por Paule Clarac***. México: Centros de Integración Juvenil, A. C. (pp. 111-126).
3. García Aurrecochea, R., Díaz Negrete, B., Balanzario, M. C., Gutierrez-López, A. Castillo-Franco, I. (1999). Características sociodemográficas y de consumo de drogas en pacientes atendidos entre 1990 y 1997. México: Centros de Integración Juvenil, A.C., Dirección de Promoción Institucional. ***Informe de investigación 98-12***.
4. Secretaría de Salud, Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, Dirección General de Epidemiología. Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (***SISVEA***) ***Informe 2009***. México.
5. Ortiz, A., Martínez, R., Meza, D. (2014) Grupo Interinstitucional para el desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. ***Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas"***. *Tendencias en el área metropolitana No. 54*. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.
6. Díaz, D. B., Balanzario, M. C., Castillo, I., Gutiérrez, A. y García, R. (2001). Uso de drogas entre pacientes de primer ingreso en Centros de Integración Juvenil. En Secretaría de Salud. ***Observatorio Epidemiológico en drogas. El fenómeno de las adicciones en México 2001***. México: Secretaría de Salud (pp. 66-71) (ISBN: 970-721-008-7). http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/publicaciones/obs2001_cap4.pdf
7. García-Aurrecochea, R., Díaz-Negrete, B., Balanzario, M. C., Castillo-Franco, I. (1998). ***Perfil y trayectoria del consumo de drogas en pacientes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil en 1996***. En CD: B. D. Díaz Negrete, J. Arellanez, M. C. Balanzario y R. Sánchez Huesca, *Once años de estudios del consumo de drogas en México, Investigaciones realizadas en Centros de Integración Juvenil entre 1997 y 2007*. México: Centros de Integración Juvenil.

8. Castillo Franco, P. I., Gutiérrez López, A. D. (2008). Consumo de drogas en mujeres asistentes a centros de tratamiento especializado en la Ciudad de México. **Salud Mental 31 (5)**, 351-359. <http://scielo.unam.mx/pdf/sm/v31n5/v31n5a3.pdf>
9. Gracia Gutiérrez de Velasco, S. E. y Balanzario Lorenzana, M. C. (2003). El consumo de drogas en menores de 12 años en Centros de Integración Juvenil en el año 2002. México: Centros de Integración Juvenil, A.C., Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación. **Informe de Investigación 03-17**.
10. García Aurrecoechea, R., Castillo Franco, P. I. y Guerrero Huesca, J. A. (2003). El consumo de drogas en pacientes atendidos en Centros de Integración Juvenil según la etapa de vida correspondiente al ingreso a tratamiento. México: Centros de Integración Juvenil, A.C., Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación. **Informe de Investigación 03-13**.
11. García Aurrecoechea, R., Díaz Negrete, B., Balanzario, M. C. (2001). Tendencias del consumo de drogas en pacientes de primer ingreso a tratamiento en CIJ entre 1990 y 1999. México: Centros de Integración Juvenil, A.C., Dirección de Promoción Institucional. **Informe de investigación 2000-06**.
12. Gutiérrez López, AD. (2014). Tendencias del consumo de drogas alguna vez en la vida en Centros de Integración Juvenil. Segundo semestre de 2004 - Segundo semestre de 2013 (Nivel Nacional y Entidades Federativas). México: Centros de Integración Juvenil, A.C., Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación. **Informe de Investigación 14-03e**. <http://www.cij.gob.mx/Programas/Investigacion/pdf/14-03e.pdf>
13. Gutiérrez López, AD. (2014). Tendencias del consumo de drogas en los últimos 30 días en Centros de Integración Juvenil. Segundo semestre de 2004 - Segundo semestre de 2013 (Nivel Nacional y Entidades Federativas). México: Centros de Integración Juvenil, A.C., Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación. **Informe de Investigación 14-03f**. <http://www.cij.gob.mx/Programas/Investigacion/pdf/14-03f.pdf>
14. Gutiérrez López, A. D. (2014). Droga de mayor impacto reportada por usuarios de drogas ilícitas en el año previo a la solicitud de tratamiento en Centros de Integración Juvenil. Segundo semestre de 2004 - Segundo semestre de 2013 (Nivel Nacional y Entidades Federativa). México: Centros de Integración Juvenil, A.C., Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación. **Informe de Investigación 14-03g**. <http://www.cij.gob.mx/Programas/Investigacion/pdf/14-03g.pdf>

15. Jiménez Silvestre K., García Aurrecochea, V. R. y González Sánchez, J. D. (2005). Patrón de Consumo de Cocaína y Crack en pacientes que ingresan a Tratamiento. México: Centros de Integración Juvenil, A.C., Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación. **Informe de investigación 05-07.**
16. Jiménez-Silvestre, K. y Castillo-Vite N.L. Factores de reincidencia en usuarios de cocaína, crack y metanfetaminas en fase de recuperación. México: Centros de Integración Juvenil, A.C., Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación. **Informe de Investigación 04-14.**
17. Gutiérrez López, A. D. y Castillo Franco, P. I. (2007). Características sociodemográficas y de consumo en usuarios de tabaco y alcohol de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil en 2006. México: Centros de Integración Juvenil, A.C., Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación. **Informe de Investigación 07-13.** <http://www.cij.gob.mx/Especialistas/pdf/07-13.pdf>
18. Velázquez Altamirano, M. (2014). Consumo de tabaco y alcohol en pacientes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil. Julio – Diciembre, 2013. México: Centros de Integración Juvenil, A.C., Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación. **Informe de Investigación 14-03d.** <http://www.cij.gob.mx/Programas/Investigacion/pdf/14-03d.pdf>
19. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz; Instituto Nacional de Salud Pública; Secretaría de Salud (2012). **Encuesta Nacional de Adicciones 2011: Reporte de Alcohol.** Medina-Mora ME, Villatoro JA, Fleiz C, Téllez MM, Mendoza LR, Romero M, Gutiérrez JP, Castro M, Hernández M, Tena C, Alvear C y Guisa V. México: INPRFM.
20. Moreno, K. (Coord.) (2010). **Los jóvenes y el alcohol en México. Un problema emergente en mujeres.** México: Centros de Integración Juvenil, A.C.
21. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz; Instituto Nacional de Salud Pública; Secretaría de Salud (2012). **Encuesta Nacional de Adicciones 2011: Reporte de Drogas.** Villatoro JA, Medina Mora ME, Fleiz C, Téllez MM, Mendoza LR, Romero M, Gutiérrez JP, Castro M, Hernández M, Tena C, Alvear C y Guisa V. México: INPRFM.
22. CD: **EBCO 2007-2008. Estudio Básico de Comunidad Objetivo Vol. 1 y 2.** México: Centros de Integración Juvenil, A.C., Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación.

CUADROS

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS USUARIOS DE DROGAS DE PRIMER INGRESO A TRATAMIENTO A CIJ EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2014

Cuadro 1. Pacientes de primer ingreso por unidad de atención (CIJ, UH y UTPPCH)

CIJ	General		Hombres		Mujeres		Razón H:M
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	
Álvaro Obregón Norte	106	0.9	89	0.9	17	0.8	5.2:1
Álvaro Obregón Oriente	74	0.6	66	0.7	8	0.4	8.3:1
Azcapotzalco	159	1.4	127	1.3	32	1.4	4.0:1
Benito Juárez	148	1.3	116	1.2	32	1.4	3.6:1
Chalco	165	1.4	131	1.4	34	1.5	3.9:1
Coyoacán	150	1.3	125	1.3	25	1.1	5.0:1
Cuajimalpa	88	0.8	70	0.7	18	0.8	3.9:1
Cuauhtémoc Oriente	135	1.2	103	1.1	32	1.4	3.2:1
Cuauhtémoc Poniente	159	1.4	119	1.3	40	1.8	3.0:1
Ecatepec	226	1.9	193	2.0	33	1.5	5.8:1
Gustavo A. Madero Aragón	247	2.1	210	2.2	37	1.7	5.7:1
Gustavo A. Madero Norte	234	2.0	200	2.1	34	1.5	5.9:1
Gustavo A. Madero Oriente	32	0.3	22	0.2	10	0.5	2.2:1
Iztapalapa Oriente	455	3.9	382	4.0	73	3.3	5.2:1
Iztapalapa Poniente	138	1.2	100	1.1	38	1.7	2.6:1
Miguel Hidalgo	123	1.1	99	1.0	24	1.1	4.1:1
Naucalpan	204	1.7	163	1.7	41	1.8	4.0:1
Nezahualcóyotl	249	2.1	205	2.2	44	2.0	4.7:1
Texcoco	106	0.9	88	0.9	18	0.8	4.9:1
Tlalnepantla	174	1.5	149	1.6	25	1.1	6.0:1
Tlalpan	180	1.5	152	1.6	28	1.3	5.4:1
Venustiano Carranza	165	1.4	131	1.4	34	1.5	3.9:1
Xochimilco	32	0.3	26	0.3	6	0.3	4.3:1
UH Ecatepec	67	0.6	65	0.7	2	0.1	32.5:1
UH Iztapalapa	65	0.6	56	0.6	9	0.4	6.2:1
UH Naucalpan	56	0.5	48	0.5	8	0.4	6.0:1
Acapulco	166	1.4	131	1.4	35	1.6	3.7:1
Aguascalientes	169	1.4	141	1.5	28	1.3	5.0:1
Apodaca	46	0.4	40	0.4	6	0.3	6.7:1
Cancún	185	1.6	144	1.5	41	1.8	3.5:1
Cd. del Carmen	69	0.6	54	0.6	15	0.7	3.6:1
Cd. Juárez Norte	86	0.7	67	0.7	19	0.9	3.5:1
Cd. Victoria	23	0.2	20	0.2	3	0.1	6.7:1

(Continúa)

Cuadro 1. Pacientes de primer ingreso a tratamiento por Unidad de atención (CIJ, UH y UTPPCH)
(Continuación)

CIJ	General		Hombres		Mujeres		Razón H:M
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	
Celaya	234	2.0	177	1.9	57	2.6	3.1:1
Chetumal	69	0.6	58	0.6	11	0.5	5.3:1
Chihuahua	186	1.6	154	1.6	32	1.4	4.8:1
Chilpancingo	64	0.5	54	0.6	10	0.5	5.4:1
Colima	202	1.7	174	1.8	28	1.3	6.2:1
Cozumel	64	0.5	51	0.5	13	0.6	3.9:1
Cuernavaca	97	0.8	79	0.8	18	0.8	4.4:1
Culiacán	143	1.2	130	1.4	13	0.6	10.0:1
Durango	98	0.8	60	0.6	38	1.7	1.6:1
Escuinapa	86	0.7	72	0.8	14	0.6	5.1:1
Fresnillo Pinacoteca	40	0.3	33	0.3	7	0.3	4.7:1
Guadalajara	238	2.0	195	2.1	43	1.9	4.5:1
Guadalajara Sur	148	1.3	121	1.3	27	1.2	4.5:1
Guadalupe	99	0.8	82	0.9	17	0.8	4.8:1
Guamúchil	32	0.3	29	0.3	3	0.1	9.7:1
Guasave	64	0.5	57	0.6	7	0.3	8.1:1
Hermosillo	183	1.6	148	1.6	35	1.6	4.2:1
Huatulco	43	0.4	37	0.4	6	0.3	6.2:1
Ixtapa Zihuatanejo	38	0.3	31	0.3	7	0.3	4.4:1
La Paz	70	0.6	54	0.6	16	0.7	3.4:1
La Piedad	48	0.4	30	0.3	18	0.8	1.7:1
Laguna Durango	74	0.6	55	0.6	19	0.9	2.9:1
León	207	1.8	155	1.6	52	2.3	3.0:1
Los Cabos	40	0.3	34	0.4	6	0.3	5.7:1
Los Mochis	81	0.7	67	0.7	14	0.6	4.8:1
Manzanillo	62	0.5	57	0.6	5	0.2	11.4:1
Mazatlán	120	1.0	101	1.1	19	0.9	5.3:1
Mérida	122	1.0	103	1.1	19	0.9	5.4:1
Mexicali	151	1.3	116	1.2	35	1.6	3.3:1
Monterrey	126	1.1	100	1.1	26	1.2	3.8:1
Morelia	72	0.6	53	0.6	19	0.9	2.8:1
Nogales	100	0.9	81	0.9	19	0.9	4.3:1
Oaxaca	114	1.0	90	1.0	24	1.1	3.8:1
Pachuca	130	1.1	100	1.1	30	1.4	3.3:1
Playa del Carmen	33	0.3	29	0.3	4	0.2	7.3:1
Poza Rica	50	0.4	35	0.4	15	0.7	2.3:1
Puebla	127	1.1	105	1.1	22	1.0	4.8:1

(Continúa)

Cuadro 1. Pacientes de primer ingreso a tratamiento por Unidad de atención (CIJ, UH y UTPPCH)
(Continuación)

CIJ	General		Hombres		Mujeres		Razón H:M
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	
Puerto Vallarta	105	0.9	84	0.9	21	0.9	4.0:1
Querétaro	144	1.2	121	1.3	23	1.0	5.3:1
Reynosa	24	0.2	21	0.2	3	0.1	7.0:1
Salamanca	68	0.6	55	0.6	13	0.6	4.2:1
Saltillo	206	1.8	146	1.5	60	2.7	2.4:1
San Luis Potosí	165	1.4	135	1.4	30	1.4	4.5:1
San Nicolás de los Garza	66	0.6	50	0.5	16	0.7	3.1:1
Tampico	77	0.7	53	0.6	24	1.1	2.2:1
Tapachula	25	0.2	18	0.2	7	0.3	2.6:1
Tecomán	42	0.4	35	0.4	7	0.3	5.0:1
Tehuacán	96	0.8	81	0.9	15	0.7	5.4:1
Tepic	39	0.3	31	0.3	8	0.4	3.9:1
Tijuana Guaycura	225	1.9	177	1.9	48	2.2	3.7:1
Tijuana Soler	219	1.9	158	1.7	61	2.7	2.6:1
Tlaquepaque	207	1.8	166	1.8	41	1.8	4.0:1
Tlaxcala	15	0.1	12	0.1	3	0.1	4.0:1
Toluca	210	1.8	180	1.9	30	1.4	6.0:1
Torreón Oriente	169	1.4	121	1.3	48	2.2	2.5:1
Tuxtla Gutiérrez	84	0.7	67	0.7	17	0.8	3.9:1
Villahermosa	71	0.6	57	0.6	14	0.6	4.1:1
Xalapa	91	0.8	71	0.8	20	0.9	3.6:1
Zacatecas	79	0.7	69	0.7	10	0.5	6.9:1
Zamora	72	0.6	59	0.6	13	0.6	4.5:1
Zapopan Kena Moreno	10	0.1	9	0.1	1	0.0	9.0:1
Zapopan Norte	202	1.7	157	1.7	45	2.0	3.5:1
UH Ciudad Juárez (UMAA)	32	0.3	28	0.3	4	0.2	7.0:1
UH Culiacán	31	0.3	31	0.3	0	0.0	-----
UH Ixbalanqué	13	0.1	13	0.1	0	0.0	-----
UH Jerez	65	0.6	57	0.6	8	0.4	7.1:1
UH Monterrey	47	0.4	39	0.4	8	0.4	4.9:1
UH Punta Diamante	44	0.4	35	0.4	9	0.4	3.9:1
UH Tijuana	55	0.5	49	0.5	6	0.3	8.2:1
UH Zapopan	63	0.5	55	0.6	8	0.4	6.9:1
UH Zapotlán el Grande	12	0.1	12	0.1	0	0.0	-----
UTPPCH Cd. Juárez	39	0.3	38	0.4	1	0.0	38.0:1
UTPPCH Tijuana	25	0.2	22	0.2	3	0.1	7.3:1
Total	11,673	100.0	9,451	100.0	2,222	100.0	4.3:1

UH=Unidad de Hospitalización

UTPPCH=Unidad de Tratamiento a Personas con Problemas de Consumo de Heroína

Cuadro 2. Sexo

	Frec.	%	Razón H:M
Hombres	9,451	81.0	4.3 : 1
Mujeres	2,222	19.0	
Total	11,673	100.0	

Cuadro 3. Persona que proporciona la información

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Usuario de drogas	4,216	39.5	3,448	39.8	768	38.0
Usuario de drogas y familiares u otras personas	6,465	60.5	5,214	60.2	1,251	62.0
Sin información	992	<i>Se omite</i>	789	<i>Se omite</i>	203	<i>Se omite</i>
Total	11,673	100.0	9,451	100.0	2,222	100.0

Cuadro 4. Edad de ingreso a tratamiento

	General*			Hombres**			Mujeres***		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Hasta 9 años	6	0.1	0.1	6	0.1	0.1	0	--	--
10 a 14 años	2,026	17.4	17.4	1,462	15.5	15.5	564	25.4	25.4
15 a 19 años	4,920	42.2	42.2	3,952	41.8	41.8	968	43.6	43.6
20 a 24 años	1,510	12.9	12.9	1,271	13.4	13.4	239	10.8	10.8
25 a 29 años	962	8.2	8.2	822	8.7	8.7	140	6.3	6.3
30 a 34 años	701	6.0	6.0	609	6.4	6.4	92	4.1	4.1
35 a 39 años	564	4.8	4.8	491	5.2	5.2	73	3.3	3.3
40 a 44 años	410	3.5	3.5	366	3.9	3.9	44	2.0	2.0
45 años y más	574	4.9	4.9	472	5.0	5.0	102	4.6	4.6
Total	11,673	100.0	100.0	9,451	100.0	100.0	2,222	100.0	100.0

* $\mu = 22.1$ $\sigma = 10.4$; *Mdn*= 18; *Mo*= 15; Decil1 = 14

** $\mu = 22.5$; $\sigma = 10.5$; *Mdn*= 18; *Mo*= 15; Decil1 = 14

*** $\mu = 20.4$; $\sigma = 9.9$; *Mdn*= 16; *Mo*= 15; Decil1 = 13

Cuadro 5. Estado civil

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Soltero	8,722	74.7	74.8	6,949	73.5	73.6	1,773	79.8	79.8
Casado	1,081	9.3	9.3	953	10.1	10.1	128	5.8	5.8
Unión libre	1,099	9.4	9.4	923	9.8	9.8	176	7.9	7.9
Separado	593	5.1	5.1	494	5.2	5.2	99	4.5	4.5
Divorciado	148	1.3	1.3	115	1.2	1.2	33	1.5	1.5
Viudo	24	0.2	0.2	12	0.1	0.1	12	0.5	0.5
<i>Sin información</i>	6	0.1	<i>Se omite</i>	5	0.1	<i>Se omite</i>	1	0.0	<i>Se omite</i>
Total	11,673	100.0	100.0	9,451	100.0	100.0	2,222	100.0	100.0

Cuadro 6. Escolaridad

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Ninguna (no sabe leer ni escribir)	36	0.3	0.3	33	0.3	0.3	3	0.1	0.1
Ninguna (sabe leer y escribir)	22	0.2	0.2	15	0.2	0.2	7	0.3	0.3
Primaria incompleta	428	3.7	3.7	357	3.8	3.8	71	3.2	3.2
Primaria completa	577	4.9	4.9	482	5.1	5.1	95	4.3	4.3
Secundaria incompleta	3,774	32.3	32.3	2,938	31.1	31.1	836	37.6	37.6
Secundaria completa	1,668	14.3	14.3	1431	15.1	15.1	237	10.7	10.7
Estudios técnicos o comerciales incompletos	165	1.4	1.4	124	1.3	1.3	41	1.8	1.8
Estudios técnicos o comerciales completos	102	0.9	0.9	74	0.8	0.8	28	1.3	1.3
Bachillerato incompleto	3,278	28.1	28.1	2,671	28.3	28.3	607	27.3	27.3
Bachillerato completo	701	6.0	6.0	575	6.1	6.1	126	5.7	5.7
Estudios superiores incompletos	656	5.6	5.6	535	5.7	5.7	121	5.4	5.4
Estudios superiores completos	238	2.0	2.0	195	2.1	2.1	43	1.9	1.9
Estudios de posgrado incompletos	5	0.0	0.0	3	0.0	0.0	2	0.1	0.1
Estudios de posgrado completos	20	0.2	0.2	16	0.2	0.2	4	0.2	0.2
<i>Sin información</i>	3	0.0	<i>Se omite</i>	2	0.0	<i>Se omite</i>	1	0.0	<i>Se omite</i>
Total	11,673	100.0	100.0	9,451	100.0	100.0	2,222	100.0	100.0

Cuadro 7. Ocupación

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Desempleado(a)	2,727	23.4	23.4	2,267	24.0	24.0	460	20.7	20.7
Estudiante	4,620	39.6	39.6	3,521	37.3	37.3	1,099	49.5	49.5
Estudia y trabaja	533	4.6	4.6	474	5.0	5.0	59	2.7	2.7
Trabaja	3,379	28.9	29.0	3,033	32.1	32.1	346	15.6	15.6
Tareas del hogar	353	3.0	3.0	104	1.1	1.1	249	11.2	11.2
Pensionado	57	0.5	0.5	48	0.5	0.5	9	0.4	0.4
Sin información	4	0.0	Se omite	4	0.0	Se omite	0	0.0	Se omite
Total	11,673	100.0	100.0	9,451	100.0	100.0	2,222	100.0	100.0

Cuadro 8. Estrato social

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Alto	84	0.7	0.7	64	0.7	0.7	20	0.9	0.9
Medio alto	1,086	9.3	9.3	848	9.0	9.0	238	10.7	10.7
Medio bajo	7,169	61.4	61.6	5,800	61.4	61.5	1,369	61.6	61.8
Bajo	3,222	27.6	27.7	2,647	28.0	28.1	575	25.9	25.9
Pobreza extrema o marginación	84	0.7	0.7	69	0.7	0.7	15	0.7	0.7
Sin información	28	0.2	Se omite	23	0.2	Se omite	5	0.2	Se omite
Total	11,673	100.0	100.0	9,451	100.0	100.0	2,222	100.0	100.0

FACTORES ASOCIADOS A LA DEMANDA DE TRATAMIENTO EN PACIENTES DE PRIMER INGRESO A TRATAMIENTO EN CIJ EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2014

Cuadro 9. Motivos de consulta

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Consumo de drogas ilícitas	10,341	88.6	8,433	89.2	1,908	85.9
Consumo de bebidas alcohólicas	4,709	40.3	3,821	40.4	888	40.0
Consumo de tabaco	4,163	35.7	3,373	35.7	790	35.6
Otro motivo	354	3.0	261	2.8	93	4.2
<i>Ningún motivo específico reportado</i>	29	0.2	23	0.2	6	0.3
<i>Usuarios que reportaron dos o más motivos de consulta</i>	5,049	43.3	4119	43.6	930	41.9

Cuadro 10. Condicionantes de la solicitud de tratamiento

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Por propia iniciativa	4,301	36.8	3,453	36.5	848	38.2
Por condicionamiento o recomendación familiar	5,362	45.9	4,327	45.8	1,035	46.6
Por recomendación de pares	174	1.5	145	1.5	29	1.3
Por condicionamiento o recomendación escolar	2,427	20.8	1,917	20.3	510	23.0
Por condicionamiento legal	1,102	9.4	964	10.2	138	6.2
Por condicionamiento o recomendación laboral	194	1.7	188	2.0	6	0.3
Por indicación médica	901	7.7	713	7.5	188	8.5
Por solicitud de novia(o)	41	0.4	36	0.4	5	0.2
Otros condicionante de solicitud de tratamiento	323	2.8	263	2.8	60	2.7
<i>Ningún condicionante reportado</i>	171	1.5	143	1.5	28	1.3
<i>Pacientes que reportaron dos o más condicionantes de la solicitud de tratamiento</i>	2,931	25.1	2,379	25.2	552	24.8

Cuadro 11. Antecedentes de acciones contra el consumo de sustancias

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Juramento	604	5.2	533	5.6	71	3.2
Grupo de autoayuda	786	6.7	673	7.1	113	5.1
Internamiento en anexo	1,391	11.9	1,219	12.9	172	7.7
Intervención de emergencia	51	0.4	43	0.5	8	0.4
Programa de mantenimiento	66	0.6	62	0.7	4	0.2
Tratamiento médico no especializado	64	0.5	52	0.6	12	0.5
Tratamiento psiquiátrico o psicoterapéutico ambulatorio	563	4.8	441	4.7	122	5.5
Tratamiento psiquiátrico o psicoterapéutico residencial	230	2.0	188	2.0	42	1.9
Medicina tradicional o alternativa	46	0.4	39	0.4	7	0.3
Intento de interrupción voluntaria del consumo, sin apoyo	3,535	30.3	2,943	31.1	592	26.6
Otras acciones	2,812	24.1	2,204	23.3	608	27.4
<i>Ninguna acción previa reportada</i>	<i>3,202</i>	<i>27.4</i>	<i>2,501</i>	<i>26.5</i>	<i>701</i>	<i>31.5</i>
<i>Pacientes que reportaron dos o más acciones contra el consumo de sustancias antes de solicitar tratamiento en CIJ</i>	<i>1,234</i>	<i>10.6</i>	<i>1050</i>	<i>11.1</i>	<i>184</i>	<i>8.3</i>

Cuadro 12. Problemas asociados al consumo de sustancias

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Problemas de salud	4,751	40.7	3,832	40.6	919	41.4
Accidentes o lesiones	1,415	12.1	1,204	12.7	211	9.5
Problemas familiares	9,250	79.2	7,474	79.1	1,776	79.9
Problemas escolares	6,871	58.9	5,667	60.0	1,204	54.2
Problemas laborales	2,366	20.3	2,129	22.5	237	10.7
Problemas psicológicos	4,499	38.5	3,516	37.2	983	44.2
Problemas legales	2,448	21.0	2,212	23.4	236	10.6
Conducta antisocial o delictiva	1,887	16.2	1,630	17.2	257	11.6
Otros problemas	414	3.5	335	3.5	79	3.6
<i>Ningún problema asociado reportado</i>	<i>508</i>	<i>4.4</i>	<i>395</i>	<i>4.2</i>	<i>113</i>	<i>5.1</i>
<i>Pacientes que reportaron dos o más problemas asociados</i>	<i>8,809</i>	<i>75.5</i>	<i>7,162</i>	<i>75.8</i>	<i>1,647</i>	<i>74.1</i>

CARACTERÍSTICAS DEL CONSUMO DE DROGAS EN PACIENTES DE PRIMER INGRESO A TRATAMIENTO EN CIJ EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2014

Cuadro 13. Edad de inicio del consumo de tabaco

	General*			Hombres**			Mujeres***		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Hasta 9 años	337	2.9	3.4	288	3.0	3.6	49	2.2	2.7
10 a 14 años	5,343	45.8	54.7	4,326	45.8	54.2	1,017	45.8	56.8
15 a 19 años	3,659	31.3	37.4	3,034	32.1	38.0	625	28.1	34.9
20 a 24 años	305	2.6	3.1	249	2.6	3.1	56	2.5	3.1
25 a 29 años	70	0.6	0.7	48	0.5	0.6	22	1.0	1.2
30 a 34 años	37	0.3	0.4	25	0.3	0.3	12	0.5	0.7
35 a 39 años	10	0.1	0.1	5	0.1	0.1	5	0.2	0.3
40 a 44 años	8	0.1	0.1	7	0.1	0.1	1	0.0	0.1
45 años y más	4	0.0	0.0	2	0.0	0.0	2	0.1	0.1
No consumió	1,884	16.1	Se omite	1,452	15.4	Se omite	432	19.4	Se omite
Sin información	16	0.1	Se omite	15	0.2	Se omite	1	0.0	Se omite
Total	11,673	100.0	100.0	9,451	100.0	100.0	2,222	100.0	100.0

* $\mu= 14.3$; $\sigma = 3.2$; $Mdn= 14$; $Mo= 13$; Decil1 = 11

** $\mu= 14.2$; $\sigma = 3.1$; $Mdn= 14$; $Mo= 15$; Decil1 = 11

*** $\mu= 14.4$; $\sigma = 3.7$; $Mdn= 14$; $Mo= 13$; Decil1 = 11

Cuadro 14. Edad de inicio del consumo de alcohol

	General*			Hombres**			Mujeres***		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Hasta 9 años	447	3.8	4.4	377	4.0	4.6	70	3.2	3.7
10 a 14 años	4,992	42.8	49.5	3,951	41.8	48.3	1,041	46.8	55.0
15 a 19 años	4,249	36.4	42.2	3,551	37.6	43.4	698	31.4	36.9
20 a 24 años	301	2.6	3.0	250	2.6	3.1	51	2.3	2.7
25 a 29 años	62	0.5	0.6	42	0.4	0.5	20	0.9	1.1
30 a 34 años	23	0.2	0.2	14	0.1	0.2	9	0.4	0.5
35 a 39 años	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1	0.0	0.1
40 a 44 años	3	0.0	0.0	1	0.0	0.0	2	0.1	0.1
45 años y más	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0
No consumió	1,579	13.5	Se omite	1,251	13.2	Se omite	328	14.8	Se omite
Sin información	15	0.1	Se omite	13	0.1	Se omite	2	0.1	Se omite
Total	11,673	100.0	100.0	9,451	100.0	100.0	2,222	100.0	100.0

* $\mu= 14.3$; $\sigma = 3.0$; $Mdn= 14$; $Mo= 15$; Decil1 = 11

** $\mu= 14.3$; $\sigma = 3.0$; $Mdn= 14$; $Mo= 15$; Decil1 = 11

*** $\mu= 14.3$; $\sigma = 3.2$; $Mdn= 14$; $Mo= 14$; Decil1 = 11

Cuadro 15. Edad de inicio del consumo de drogas ilícitas

	General*			Hombres**			Mujeres***		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Hasta 9 años	129	1.1	1.1	115	1.2	1.2	14	0.6	0.6
10 a 14 años	5,143	44.1	44.1	4,084	43.2	43.3	1,059	47.7	47.8
15 a 19 años	5,073	43.5	43.5	4,208	44.5	44.6	865	38.9	39.0
20 a 24 años	722	6.2	6.2	596	6.3	6.3	126	5.7	5.7
25 a 29 años	295	2.5	2.5	229	2.4	2.4	66	3.0	3.0
30 a 34 años	125	1.1	1.1	93	1.0	1.0	32	1.4	1.4
35 a 39 años	78	0.7	0.7	55	0.6	0.6	23	1.0	1.0
40 a 44 años	47	0.4	0.4	31	0.3	0.3	16	0.7	0.7
45 años y más	40	0.3	0.3	24	0.3	0.3	16	0.7	0.7
Sin información	21	0.2	Se omite	16	0.2	Se omite	5	0.2	Se omite
Total	11,673	100.0	100.0	9,451	100.0	100.0	2,222	100.0	100.0

* $\mu= 15.8$; $\sigma = 4.8$; $Mdn= 15$; $Mo= 14$; Decil1 = 12

** $\mu= 15.7$; $\sigma = 4.5$; $Mdn= 15$; $Mo= 14$; Decil1 = 12

*** $\mu= 16.1$; $\sigma = 5.7$; $Mdn= 15$; $Mo= 14$; Decil1 = 12

Cuadro 16. Drogas ilícitas de inicio

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Cannabis	8,441	72.3	6,998	74.0	1,443	64.9
Mariguana	8,434	72.3	6,993	74.0	1,441	64.9
Hachís	7	0.1	5	0.1	2	0.1
Cocaína	1,049	9.0	875	9.3	174	7.8
Polvo blanco	796	6.8	661	7.0	135	6.1
<i>Crack</i>	252	2.2	213	2.3	39	1.8
Otra presentación	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Inhalables	1,539	13.2	1,159	12.3	380	17.1
Solventes o removedores	1,031	8.8	792	8.4	239	10.8
Pegamentos	241	2.1	186	2.0	55	2.5
Esmaltes o pinturas	228	2.0	153	1.6	75	3.4
Otros	39	0.3	28	0.3	11	0.5
Depresores	209	1.8	92	1.0	117	5.3
Benzodiacepinas	192	1.6	82	0.9	110	5.0
<i>Rohypnol</i> [®]	12	0.1	7	0.1	5	0.2
Otros	5	0.0	3	0.0	2	0.1
Estimulantes	341	2.9	264	2.8	77	3.5
Anfetamina	71	0.6	67	0.7	4	0.2
Metanfetaminas	231	2.0	170	1.8	61	2.7
Éxtasis (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas	29	0.2	17	0.2	12	0.5
Otros	10	0.1	10	0.1	0	0.0
Drogas alucinógenas y disociativas	22	0.2	17	0.2	5	0.2
LSD	9	0.1	7	0.1	2	0.1
Plantas alucinógenas y derivados	12	0.1	9	0.1	3	0.1
Otras	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Opiáceos	29	0.2	20	0.2	9	0.4
Heroína	17	0.1	13	0.1	4	0.2
Opiáceos Sintéticos	9	0.1	5	0.1	4	0.2
Opio y otros opiáceos	3	0.0	2	0.0	1	0.0
Otras sustancias de abuso	43	0.4	26	0.3	17	0.8
Con utilidad médica	13	0.1	5	0.1	8	0.4
Otras	30	0.3	21	0.2	9	0.4
Total	11,673	100.0	9,451	100.0	2,222	100.0

Cuadro 17. Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de tabaco y el ingreso a tratamiento en CIJ

	General*			Hombres**			Mujeres***		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
< de un año	795	6.8	8.1	586.0	6.2	7.3	209	9.4	11.7
1 a 5 años	4,862	41.7	49.7	3,855.0	40.8	48.3	1,007	45.3	56.3
6 a 10 años	1,470	12.6	15.0	1,243.0	13.2	15.6	227	10.2	12.7
11 a 15 años	813	7.0	8.3	701.0	7.4	8.8	112	5.0	6.3
16 a 20 años	635	5.4	6.5	556.0	5.9	7.0	79	3.6	4.4
21 a 25 años	445	3.8	4.6	395.0	4.2	4.9	50	2.3	2.8
26 o más años	753	6.5	7.7	648.0	6.9	8.1	105	4.7	5.9
No consumió	1,884	16.1	Se omite	1,452.0	15.4	Se omite	432	19.4	Se omite
Sin información	16	0.1	Se omite	15.0	0.2	Se omite	1	0.0	Se omite
Total	11,673	100.0	100.0	9,451.0	100.0	100.0	2,222	100.0	100.0

* $\mu= 8.3$; $\sigma=9.9$; $Mdn= 4$; $Mo= 1$; Decil1 = 1

** $\mu= 8.7$; $\sigma = 10.0$; $Mdn= 4$; $Mo= 1$; Decil1 = 1

*** $\mu= 6.6$; $\sigma = 9.1$; $Mdn= 3$; $Mo= 1$; Decil1 = < un año

Cuadro 18. Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de alcohol y el ingreso a tratamiento en CIJ

	General*			Hombres**			Mujeres***		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
< de un año	776	6.6	7.7	557	5.9	6.8	219	9.9	11.6
1 a 5 años	4,955	42.4	49.2	3,919	41.5	47.9	1,036	46.6	54.8
6 a 10 años	1,579	13.5	15.7	1,306	13.8	16.0	273	12.3	14.4
11 a 15 años	903	7.7	9.0	775	8.2	9.5	128	5.8	6.8
16 a 20 años	645	5.5	6.4	557	5.9	6.8	88	4.0	4.7
21 a 25 años	484	4.1	4.8	433	4.6	5.3	51	2.3	2.7
26 o más años	737	6.3	7.3	640	6.8	7.8	97	4.4	5.1
No consumió	1,579	13.5	Se omite	1,251	13.2	Se omite	328	14.8	Se omite
Sin información	15	0.1	Se omite	13	0.1	Se omite	2	0.1	Se omite
Total	11,673	100.0	100.0	9,451	100.0	100.0	2,222	100.0	100.0

* $\mu= 8.3$; $\sigma = 9.8$; $Mdn= 4$; $Mo= 1$; Decil1 = 1

** $\mu= 8.8$; $\sigma = 10.0$; $Mdn= 5$; $Mo= 1$; Decil1 = 1

*** $\mu= 6.5$; $\sigma = 8.7$; $Mdn= 3$; $Mo= 1$; Decil1 = < un año

Cuadro 19. Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de drogas ilícitas y el ingreso a tratamiento en CIJ

	General*			Hombres**			Mujeres***		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
< de un año	2,168	18.6	18.6	1,562	16.5	16.6	606	27.3	27.3
1 a 5 años	5,710	48.9	49.0	4,569	48.3	48.4	1,141	51.4	51.5
6 a 10 años	1,403	12.0	12.0	1,200	12.7	12.7	203	9.1	9.2
11 a 15 años	817	7.0	7.0	713	7.5	7.6	104	4.7	4.7
16 a 20 años	599	5.1	5.1	534	5.7	5.7	65	2.9	2.9
21 a 25 años	371	3.2	3.2	339	3.6	3.6	32	1.4	1.4
26 o más años	584	5.0	5.0	518	5.5	5.5	66	3.0	3.0
Sin información	21	0.2	Se omite	16	0.2	Se omite	5	0.2	Se omite
Total	11,673	100.0	100.0	9,451	100.0	100.0	2,222	100.0	100.0

* $\mu= 6.3$; $\sigma = 8.7$; $Mdn= 3$; $Mo= 1$; Decil1 = < un año

** $\mu= 6.8$; $\sigma = 9.0$; $Mdn= 3$; $Mo= 1$; Decil1 = < un año

*** $\mu= 4.3$; $\sigma = 7.2$; $Mdn= 2$; $Mo= < un año$; Decil1 = < un año

Cuadro 20. Tipo de consumo de drogas ilícitas

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Experimental	1,339	11.5	11.7	968	10.2	10.5	371	16.7	17.2
Social u ocasional	1,897	16.3	16.6	1,466	15.5	15.9	431	19.4	20.0
Funcional	5,755	49.3	50.5	4,767	50.4	51.5	988	44.5	45.8
Disfuncional	2,021	17.3	17.7	1,726	18.3	18.7	295	13.3	13.7
En remisión	395	3.4	3.5	321	3.4	3.5	74	3.3	3.4
Sin información	266	2.3	Se omite	203	2.1	Se omite	63	2.8	Se omite
Total	11,673	100.0	100.0	9,451	100.0	100.0	2,222	100.0	100.0

**Cuadro 21. Total de drogas consumidas alguna vez en la vida
(Incluye alcohol o tabaco)**

	General*		Hombres**		Mujeres***	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
1 sustancia	702	6.0	544	5.8	158	7.1
2 sustancias	1,218	10.4	929	9.8	289	13.0
3 sustancias	3,675	31.5	2,933	31.0	742	33.4
4 sustancias	2,326	19.9	1,904	20.1	422	19.0
5 sustancias	1,424	12.2	1,161	12.3	263	11.8
6 sustancias	932	8.0	775	8.2	157	7.1
7 sustancias	546	4.7	475	5.0	71	3.2
8 sustancias	352	3.0	297	3.1	55	2.5
9 sustancias	227	1.9	190	2.0	37	1.7
10 sustancias	126	1.1	113	1.2	13	0.6
11 -18 sustancias	145	1.2	130	1.4	15	0.7
Total	11,673	100.0	9,451	100.0	2,222	100.0

* $\mu= 4.1$; $\sigma = 2.1$; $Mdn=4$; $Mo= 3$; Decil1 = 2

** $\mu= 4.2$; $\sigma = 2.1$; $Mdn= 4$; $Mo= 3$; Decil1 = 2

*** $\mu= 3.9$; $\sigma = 1.9$; $Mdn= 3$; $Mo= 3$; Decil1 = 2

**Cuadro 22. Total de drogas ilícitas consumidas alguna vez en la vida
(No incluye ni alcohol ni tabaco)**

	General*		Hombres**		Mujeres***	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
1 sustancia	5,080	43.5	3,995	42.3	1,085	48.8
2 sustancias	2,656	22.8	2,155	22.8	501	22.5
3 sustancias	1,546	13.2	1,269	13.4	277	12.5
4 sustancias	962	8.2	803	8.5	159	7.2
5 sustancias	566	4.8	486	5.1	80	3.6
6 sustancias	348	3.0	296	3.1	52	2.3
7 sustancias	237	2.0	198	2.1	39	1.8
8 sustancias	130	1.1	116	1.2	14	0.6
9 sustancias	76	0.7	67	0.7	9	0.4
10 sustancias	31	0.3	28	0.3	3	0.1
11-16 sustancias	41	0.4	38	0.4	3	0.1
Total	11,673	100.0	9,451	100.0	2,222	100.0

* $\mu= 2.4$; $\sigma = 1.9$; $Mdn=2$; $Mo= 1$; Decil1 = 1

** $\mu= 2.4$; $\sigma = 1.9$; $Mdn=2$; $Mo= 1$; Decil1 = 1

*** $\mu= 2.2$; $\sigma = 1.7$; $Mdn=2$; $Mo= 1$; Decil1 = 1

Cuadro 23. Consumo de drogas alguna vez en la vida por sustancia

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Tabaco	9,789	83.9	7,999	84.6	1,790	80.6
Alcohol	10,094	86.5	8,200	86.8	1,894	85.2
Cannabis	10,087	86.4	8,327	88.1	1,760	79.2
Mariguana	10,084	86.4	8,326	88.1	1,758	79.1
Hachís	573	4.9	487	5.2	86	3.9
Cocaína	4,542	38.9	3,857	40.8	685	30.8
Polvo blanco	3,849	33.0	3,263	34.5	586	26.4
<i>Crack</i>	2,155	18.5	1,891	20.0	264	11.9
Otra presentación de cocaína	78	0.7	71	0.8	7	0.3
Inhalables	3,788	32.5	3,061	32.4	727	32.7
Solventes o removedores	2,650	22.7	2,169	22.9	481	21.6
Pegamentos	1,035	8.9	854	9.0	181	8.1
Esmaltes o pinturas	705	6.0	535	5.7	170	7.7
Otros inhalables	175	1.5	140	1.5	35	1.6
Depresores	1,654	14.2	1,300	13.8	354	15.9
Benzodiazepinas	1,559	13.4	1,219	12.9	340	15.3
<i>Rohypnol</i>	136	1.2	123	1.3	13	0.6
Otros depresores	30	0.3	25	0.3	5	0.2
Estimulantes	2,522	21.6	2,060	21.8	462	20.8
Anfetamina	255	2.2	218	2.3	37	1.7
Metanfetaminas	1,871	16.0	1,554	16.4	317	14.3
<i>Éxtasis</i> (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas	695	6.0	533	5.6	162	7.3
Otros estimulantes	57	0.5	52	0.6	5	0.2
Drogas alucinógenas y disociativas	1,155	9.9	970	10.3	185	8.3
LSD	789	6.8	650	6.9	139	6.3
Plantas alucinógenas y derivados	580	5.0	497	5.3	83	3.7
Otras drogas alucinógenas y disoc.	47	0.4	41	0.4	6	0.3
Opiáceos	397	3.4	347	3.7	50	2.3
Heroína	345	3.0	306	3.2	39	1.8
Opiáceos Sintéticos	34	0.3	25	0.3	9	0.4
Opio y otros opiáceos	41	0.4	36	0.4	5	0.2
Otras sustancias de abuso	242	2.1	179	1.9	63	2.8
Con utilidad médica	65	0.6	46	0.5	19	0.9
Otras sustancias de abuso	186	1.6	137	1.4	49	2.2

**Cuadro 24. Total de drogas consumidas en el último año
(Incluye alcohol o tabaco)**

	General*		Hombres**		Mujeres***	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Ninguna	219	1.9	183	1.9	36	1.6
1 sustancia	1,256	10.8	984	10.4	272	12.2
2 sustancias	2,297	19.7	1,826	19.3	471	21.2
3 sustancias	3,762	32.2	3,084	32.6	678	30.5
4 sustancias	1,918	16.4	1,575	16.7	343	15.4
5 sustancias	990	8.5	790	8.4	200	9.0
6 sustancias	581	5.0	471	5.0	110	5.0
7 sustancias	299	2.6	251	2.7	48	2.2
8 sustancias	150	1.3	119	1.3	31	1.4
9 sustancias	104	0.9	88	0.9	16	0.7
10 sustancias	50	0.4	43	0.5	7	0.3
11-15 sustancias	47	0.4	37	0.4	10	0.5
Total	11,673	100.0	9,451	100.0	2,222	100.0

* $\mu= 3.3$; $\sigma = 1.8$; $Mdn= 3$; $Mo= 3$; Decil1 = 1

** $\mu= 3.3$; $\sigma = 1.8$; $Mdn= 3$; $Mo= 3$; Decil1 = 1

*** $\mu= 3.2$; $\sigma = 1.8$; $Mdn= 3$; $Mo= 3$; Decil1 = 1

**Cuadro 25. Total de drogas ilícitas consumidas en el último año
(No incluye ni alcohol ni tabaco)**

	General*		Hombres**		Mujeres***	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Ninguna	1,052	9.0	842	8.9	210	9.5
1 sustancia	5,794	49.6	4,668	49.4	1,126	50.7
2 sustancias	2,388	20.5	1,961	20.7	427	19.2
3 sustancias	1,126	9.6	904	9.6	222	10.0
4 sustancias	628	5.4	514	5.4	114	5.1
5 sustancias	314	2.7	258	2.7	56	2.5
6 sustancias	156	1.3	125	1.3	31	1.4
7 sustancias	114	1.0	96	1.0	18	0.8
8 sustancias	54	0.5	46	0.5	8	0.4
9 sustancias	30	0.3	22	0.2	8	0.4
10 sustancias	6	0.1	5	0.1	1	0.0
11-13 sustancias	11	0.1	10	0.1	1	0.0
Total	11,673	100.0	9,451	100.0	2,222	100.0

* $\mu= 1.8$; $\sigma = 1.5$; $Mdn= 1$; $Mo= 1$; Decil1 = ninguna

** $\mu= 1.8$; $\sigma = 1.5$; $Mdn= 1$; $Mo= 1$; Decil1 = ninguna

*** $\mu= 1.7$; $\sigma = 1.5$; $Mdn= 1$; $Mo= 1$; Decil1 = ninguna

Cuadro 26. Consumo de drogas en los últimos 12 meses por sustancia

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Tabaco	8,708	74.6	7,090	75.0	1,618	72.8
Alcohol	9,160	78.5	7,440	78.7	1,720	77.4
Cannabis	8,574	73.5	7,072	74.8	1,502	67.6
Mariguana	8,569	73.4	7,069	74.8	1,500	67.5
Hachís	364	3.1	299	3.2	65	2.9
Cocaína	3,167	27.1	2,650	28.0	517	23.3
Polvo blanco	2,434	20.9	2,019	21.4	415	18.7
<i>Crack</i>	1,508	12.9	1,308	13.8	200	9.0
Otra presentación de cocaína	33	0.3	31	0.3	2	0.1
Inhalables	2,745	23.5	2,138	22.6	607	27.3
Solventes o removedores	1,918	16.4	1,521	16.1	397	17.9
Pegamentos	674	5.8	527	5.6	147	6.6
Esmaltes o pinturas	504	4.3	362	3.8	142	6.4
Otros inhalables	97	0.8	75	0.8	22	1.0
Depresores	1,148	9.8	867	9.2	281	12.6
Benzodiacepinas	1,094	9.4	824	8.7	270	12.2
<i>Rohypnol</i>	54	0.5	46	0.5	8	0.4
Otros depresores	20	0.2	15	0.2	5	0.2
Estimulantes	1,964	16.8	1,578	16.7	386	17.4
Anfetamina	168	1.4	139	1.5	29	1.3
Metanfetaminas	1,524	13.1	1,248	13.2	276	12.4
<i>Éxtasis</i> (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas	434	3.7	312	3.3	122	5.5
Otros estimulantes	31	0.3	29	0.3	2	0.1
Drogas alucinógenas y disociativas	659	5.6	526	5.6	133	6.0
LSD	481	4.1	378	4.0	103	4.6
Plantas alucinógenas y derivados	267	2.3	216	2.3	51	2.3
Otras drogas alucinógenas y disoc.	21	0.2	15	0.2	6	0.3
Opiáceos	276	2.4	240	2.5	36	1.6
Heroína	242	2.1	214	2.3	28	1.3
Opiáceos Sintéticos	23	0.2	17	0.2	6	0.3
Opio y otros opiáceos	22	0.2	17	0.2	5	0.2
Otras sustancias de abuso	169	1.4	121	1.3	48	2.2
Con utilidad médica	48	0.4	34	0.4	14	0.6
Otras sustancias de abuso	125	1.1	88	0.9	37	1.7

Cuadro 27. Droga de preferencia en los últimos 12 meses, según menciones

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Tabaco	1,357	11.6	11.9	1,062	11.2	11.5	295	13.3	13.5
Alcohol	1,790	15.3	15.7	1,407	14.9	15.2	383	17.2	17.6
Cannabis	5,390	46.2	47.2	4,545	48.1	49.2	845	38.0	38.8
Mariguana	5,374	46.0	47.0	4,532	48.0	49.0	842	37.9	38.6
Hachís	16	0.1	0.1	13	0.1	0.1	3	0.1	0.1
Cocaína	815	7.0	7.1	682	7.2	7.4	133	6.0	6.1
Polvo blanco	334	2.9	2.9	263	2.8	2.8	71	3.2	3.3
Crack	481	4.1	4.2	419	4.4	4.5	62	2.8	2.8
Inhalables	872	7.5	7.6	602	6.4	6.5	270	12.2	12.4
Solventes o removedores	576	4.9	5.0	404	4.3	4.4	172	7.7	7.9
Pegamentos	147	1.3	1.3	102	1.1	1.1	45	2.0	2.1
Esmaltes o pinturas	118	1.0	1.0	73	0.8	0.8	45	2.0	2.1
Otros inhalables	31	0.3	0.3	23	0.2	0.2	8	0.4	0.4
Depresores	127	1.1	1.1	57	0.6	0.6	70	3.2	3.2
Benzodiacepinas	113	1.0	1.0	53	0.6	0.6	60	2.7	2.8
Rohypnol	3	0.0	0.0	2	0.0	0.0	1	0.0	0.0
Otros depresores	11	0.1	0.1	2	0.0	0.0	9	0.4	0.4
Estimulantes	716	6.1	6.3	590	6.2	6.4	126	5.7	5.8
Anfetamina	39	0.3	0.3	32	0.3	0.3	7	0.3	0.3
Metanfetaminas	645	5.5	5.6	536	5.7	5.8	109	4.9	5.0
Éxtasis (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas	22	0.2	0.2	13	0.1	0.1	9	0.4	0.4
Otros estimulantes	10	0.1	0.1	9	0.1	0.1	1	0.0	0.0
Drogas alucinógenas y disociativas	39	0.3	0.3	31	0.3	0.3	8	0.4	0.4
LSD	29	0.2	0.3	22	0.2	0.2	7	0.3	0.3
Plantas alucinógenas y derivados	9	0.1	0.1	8	0.1	0.1	1	0.0	0.0
Otras drogas alucinógenas y disoc.	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0
Opiáceos	190	1.6	1.7	170	1.8	1.8	20	0.9	0.9
Heroína	173	1.5	1.5	158	1.7	1.7	15	0.7	0.7
Opiáceos Sintéticos	12	0.1	0.1	8	0.1	0.1	4	0.2	0.2
Opio y otros opiáceos	5	0.0	0.0	4	0.0	0.0	1	0.0	0.0
Otras sustancias de abuso	20	0.2	0.2	15	0.2	0.2	5	0.2	0.2
Con utilidad médica	13	0.1	0.1	9	0.1	0.1	4	0.2	0.2
Otras sustancias de abuso	7	0.1	0.1	6	0.1	0.1	1	0.0	0.0
Ninguna	106	0.9	0.9	81	0.9	0.9	25	1.1	1.1
No consumió en el último año	219	1.9	Se omite	183	1.9	Se omite	36	1.6	Se omite
Sin Información	32	0.3	Se omite	26	0.3	Se omite	6	0.3	Se omite

Cuadro 28. Droga de mayor impacto en los últimos 12 meses, según menciones

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Tabaco	757	6.5	6.6	578	6.1	6.3	179	8.1	8.2
Alcohol	1,564	13.4	13.7	1,237	13.1	13.4	327	14.7	15.0
Cannabis	5,181	44.4	45.4	4,329	45.8	46.8	852	38.3	39.1
Mariguana	5,164	44.2	45.2	4,317	45.7	46.7	847	38.1	38.9
Hachís	17	0.1	0.1	12	0.1	0.1	5	0.2	0.2
Cocaína	1,076	9.2	9.4	909	9.6	9.8	167	7.5	7.7
Polvo blanco	444	3.8	3.9	356	3.8	3.9	88	4.0	4.0
Crack	625	5.4	5.5	546	5.8	5.9	79	3.6	3.6
Otra presentación de cocaína	7	0.1	0.1	7	0.1	0.1	0	0.0	0.0
Inhalables	1,252	10.7	11.0	912	9.6	9.9	340	15.3	15.6
Solventes o removedores	813	7.0	7.1	596	6.3	6.4	217	9.8	10.0
Pegamentos	211	1.8	1.8	158	1.7	1.7	53	2.4	2.4
Esmaltes o pinturas	189	1.6	1.7	126	1.3	1.4	63	2.8	2.9
Otros inhalables	39	0.3	0.3	32	0.3	0.3	7	0.3	0.3
Depresores	200	1.7	1.8	110	1.2	1.2	90	4.1	4.1
Benzodiacepinas	180	1.5	1.6	99	1.0	1.1	81	3.6	3.7
Rohypnol	6	0.1	0.1	5	0.1	0.1	1	0.0	0.0
Otros depresores	14	0.1	0.1	6	0.1	0.1	8	0.4	0.4
Estimulantes	1,030	8.8	9.0	859	9.1	9.3	171	7.7	7.8
Anfetamina	55	0.5	0.5	48	0.5	0.5	7	0.3	0.3
Metanfetaminas	926	7.9	8.1	776	8.2	8.4	150	6.8	6.9
Éxtasis (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas	34	0.3	0.3	22	0.2	0.2	12	0.5	0.6
Otros estimulantes	15	0.1	0.1	13	0.1	0.1	2	0.1	0.1
Drogas alucinógenas y disociativas	70	0.6	0.6	58	0.6	0.6	12	0.5	0.6
LSD	57	0.5	0.5	45	0.5	0.5	12	0.5	0.6
Plantas alucinógenas y derivados	10	0.1	0.1	10	0.1	0.1	0	0.0	0.0
Otras drogas alucinógenas y disoc.	3	0.0	0.0	3	0.0	0.0	0	0.0	0.0
Opiáceos	205	1.8	1.8	182	1.9	2.0	23	1.0	1.1
Heroína	188	1.6	1.6	170	1.8	1.8	18	0.8	0.8
Opiáceos Sintéticos	12	0.1	0.1	8	0.1	0.1	4	0.2	0.2
Opio y otros opiáceos	5	0.0	0.0	4	0.0	0.0	1	0.0	0.0
Otras sustancias de abuso	24	0.2	0.2	17	0.2	0.2	7	0.3	0.3
Con utilidad médica	16	0.1	0.1	10	0.1	0.1	6	0.3	0.3
Otras sustancias de abuso	8	0.1	0.1	7	0.1	0.1	1	0.0	0.0
Ninguna	63	0.5	0.6	51	0.5	0.6	12	0.5	0.6
No consumió en el último año	219	1.9	Se omite	183	1.9	Se omite	36	1.6	Se omite
Sin Información	32	0.3	Se omite	26	0.3	Se omite	6	0.3	Se omite

Cuadro 29. Uso combinado de drogas en los últimos 12 meses

(No incluye tabaco)

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Si combinó drogas	3,915	33.5	43.6	3,231	34.2	44.2	684	30.8	41.2
No combinó drogas	5,060	43.3	56.4	4,083	43.2	55.8	977	44.0	58.8
<i>No aplica</i>	2,698	23.1	<i>Se omite</i>	2,137	22.6	<i>Se omite</i>	561	25.2	<i>Se omite</i>
Total	11,673	100.0	100.0	9,451	100.0	100.0	2,222	100.0	100.0

**Cuadro 30. Total de drogas consumidas en los últimos 30 días
(Incluye alcohol o tabaco)**

	General*		Hombres**		Mujeres***	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Ninguna	1,253	10.7	943	10.0	310	14.0
1 sustancia	2,847	24.4	2,209	23.4	638	28.7
2 sustancias	3,263	28.0	2,684	28.4	579	26.1
3 sustancias	2,717	23.3	2,301	24.3	416	18.7
4 sustancias	1,019	8.7	853	9.0	166	7.5
5 sustancias	361	3.1	292	3.1	69	3.1
6 sustancias	147	1.3	117	1.2	30	1.4
7 sustancias	43	0.4	36	0.4	7	0.3
8 sustancias	17	0.1	12	0.1	5	0.2
9 sustancias	4	0.0	3	0.0	1	0.0
11 sustancias	1	0.0	0	0.0	1	0.0
14 sustancias	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Total	11,673	100.0	9,451	100.0	2,222	100.0

* $\mu = 2.1$ $\sigma = 1.4$; *Mdn*= 2; *Mo*= 2; Decil1 = ninguna

** $\mu = 2.2$; $\sigma = 1.4$; *Mdn*= 2; *Mo*= 2; Decil1 = 1

*** $\mu = 1.9$; $\sigma = 1.4$; *Mdn*=2; *Mo*= 1; Decil1 = ninguna

**Cuadro 31. Total de drogas ilícitas consumidas en los últimos 30 días
(No incluye ni alcohol ni tabaco)**

	General*		Hombres**		Mujeres***	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Ninguna	3,611	30.9	2,807	29.7	804	36.2
1 sustancia	5,714	49.0	4,699	49.7	1,015	45.7
2 sustancias	1,602	13.7	1,343	14.2	259	11.7
3 sustancias	489	4.2	396	4.2	93	4.2
4 sustancias	173	1.5	140	1.5	33	1.5
5 sustancias	55	0.5	46	0.5	9	0.4
6 sustancias	20	0.2	15	0.2	5	0.2
7 sustancias	7	0.1	4	0.0	3	0.1
9 sustancias	1	0.0	0	0.0	1	0.0
12 sustancias	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Total	11,673	100.0	9,451	100.0	2,222	100.0

* $\mu= 1.0$; $\sigma = 0.9$; $Mdn= 1$; $Mo= 1$; Decil1 = ninguna

** $\mu= 1$; $\sigma = 0.9$; $Mdn= 1$; $Mo= 1$; Decil1 = ninguna

*** $\mu= 0.9$; $\sigma = 1.0$; $Mdn= 1$; $Mo= 1$; Decil1 = ninguna

Cuadro 32. Consumo de drogas en los últimos 30 días por sustancia

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Tabaco	6,986	59.8	5,788	61.2	1,198	53.9
Alcohol	6,257	53.6	5,162	54.6	1,095	49.3
Cannabis	6,001	51.4	5,053	53.5	948	42.7
Mariguana	5,997	51.4	5,050	53.4	947	42.6
Hachís	119	1.0	99	1.0	20	0.9
Cocaína	1,483	12.7	1,264	13.4	219	9.9
Polvo blanco	892	7.6	742	7.9	150	6.8
Crack	776	6.6	677	7.2	99	4.5
Otra presentación de cocaína	9	0.1	9	0.1	0	0.0
Inhalables	1,579	13.5	1,213	12.8	366	16.5
Solventes o removedores	1,082	9.3	843	8.9	239	10.8
Pegamentos	330	2.8	260	2.8	70	3.2
Esmaltes o pinturas	259	2.2	183	1.9	76	3.4
Otros inhalables	32	0.3	24	0.3	8	0.4
Depresores	559	4.8	397	4.2	162	7.3
Benzodiacepinas	542	4.6	385	4.1	157	7.1
Rohypnol	12	0.1	10	0.1	2	0.1
Otros depresores	10	0.1	7	0.1	3	0.1
Estimulantes	1,024	8.8	844	8.9	180	8.1
Anfetamina	49	0.4	38	0.4	11	0.5
Metanfetaminas	877	7.5	741	7.8	136	6.1
Éxtasis (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas	125	1.1	85	0.9	40	1.8
Otros estimulantes	4	0.0	4	0.0	0	0.0
Drogas alucinógenas y disociativas	145	1.2	108	1.1	37	1.7
LSD	123	1.1	90	1.0	33	1.5
Plantas alucinógenas y derivados	25	0.2	17	0.2	8	0.4
Otras drogas alucinógenas y disoc.	7	0.1	7	0.1	0	0.0
Opiáceos	186	1.6	166	1.8	20	0.9
Heroína	167	1.4	151	1.6	16	0.7
Opiáceos Sintéticos	15	0.1	11	0.1	4	0.2
Opio y otros opiáceos	7	0.1	5	0.1	2	0.1
Otras sustancias de abuso	80	0.7	55	0.6	25	1.1
Con utilidad médica	28	0.2	16	0.2	12	0.5
Otras sustancias de abuso	55	0.5	39	0.4	16	0.7

Cuadro 33. Frecuencia de episodios de abuso del consumo de tabaco¹ en los últimos 30 días

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Ni una vez	2,278	19.5	33.3	1,902	20.1	33.5	376	16.9	32.0
< de 1 vez a la semana	834	7.1	12.2	683	7.2	12.0	151	6.8	12.8
1 o 2 veces a la semana	761	6.5	11.1	615	6.5	10.8	146	6.6	12.4
Cada tercer día	445	3.8	6.5	369	3.9	6.5	76	3.4	6.5
Diario	2,529	21.7	36.9	2,102	22.2	37.1	427	19.2	36.3
No consumió en los últimos 30 días	4,687	40.2	Se omite	3,663	38.8	Se omite	1,024	46.1	Se omite
Sin información	139	1.2	Se omite	117	1.2	Se omite	22	1.0	Se omite
Total	11,673	100.0	100.0	9,451	100.0	100.0	2,222	100.0	100.0

¹ Consumo de seis o más cigarrillos en un solo día.

Cuadro 34. Frecuencia de episodios de abuso del consumo de alcohol¹ en los últimos 30 días

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Ni una vez	1,152	9.9	18.9	920	9.7	18.3	232	10.4	21.7
< de 1 vez a la semana	2,182	18.7	35.7	1,784	18.9	35.4	398	17.9	37.3
1 o 2 veces a la semana	1,927	16.5	31.6	1,639	17.3	32.5	288	13.0	27.0
Cada tercer día	441	3.8	7.2	350	3.7	6.9	91	4.1	8.5
Diario	403	3.5	6.6	344	3.6	6.8	59	2.7	5.5
No consumió en los últimos 30 días	5,416	46.4	Se omite	4,289	45.4	Se omite	1,127	50.7	Se omite
Sin información	152	1.3	Se omite	125	1.3	Se omite	27	1.2	Se omite
Total	11,673	100.0	100.0	9,451	100.0	100.0	2,222	100.0	100.0

¹ Consumo de más de cuatro copas en un día para los hombres y de más de tres copas en un día para las mujeres.

Cuadro 35. Frecuencia de episodios de abuso del consumo de drogas ilícitas¹ en los últimos 30 días

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
< de 1 vez a la semana	1,692	14.5	25.2	1,305	13.8	23.6	387	17.4	33.1
1 o 2 veces a la semana	1,411	12.1	21.0	1,176	12.4	21.2	235	10.6	20.1
Cada tercer día	1,024	8.8	15.3	857	9.1	15.5	167	7.5	14.3
Diario	2,581	22.1	38.5	2,202	23.3	39.7	379	17.1	32.4
No consumió en los últimos 30 días	3,611	30.9	Se omite	2,807	29.7	Se omite	804	36.2	Se omite
Sin información	1,354	11.6	Se omite	1,104	11.7	Se omite	250	11.3	Se omite
Total	11,673	100.0	100.0	9,451	100.0	100.0	2,222	100.0	100.0

¹ Consumo de cualquier dosis.

GLOSARIO

Droga ilícita de inicio	Es la sustancia ilegal que el usuario refirió como la droga con la cual inicio el consumo de sustancias. No incluye el inicio del consumo con alcohol o tabaco.
Droga de mayor impacto en los últimos 12 meses	Sustancia que el propio usuario de drogas solicitante de tratamiento refiere como la que más problemas le ha ocasionado en los ámbitos de salud, personal, familiar, escolar, laboral o social, en el transcurso del último año.
Droga de preferencia en los últimos 12 meses	Sustancia que el propio usuario solicitante de tratamiento ha elegido o preferido consumir en el transcurso del último año.
Estrato social	Estimación que hace el terapeuta, según su percepción, del estrato al que pertenece el usuario de drogas, considerando aspectos como lugar de residencia, escolaridad, empleo y características manifiestas como higiene y aliño, calidad del vestido, expresión verbal y vocabulario, etc.
Tipo de consumo de drogas ilícitas	Características de consumo de sustancias ilegales según motivo, frecuencia y problemas asociados. No incluye el uso de alcohol y/o tabaco y se clasifica como: experimental, social u ocasional, funcional, disfuncional y en remisión.
Total de drogas consumidas	Número de drogas consumidas (se incluyen las 26 sustancias de seguimiento) en las siguientes categorías: alguna vez en la vida, en el último año y en los últimos 30 días.
Uso combinado de drogas en los últimos 12 meses	Consumo de dos o más sustancias (incluyendo alcohol y cualquier droga ilícita o de uso médico, utilizada sin prescripción, pero excluyendo tabaco) en el transcurso de un mismo día, en el año previo a la solicitud de tratamiento en CIJ.