

SALUD

SECRETARÍA DE SALUD



**Centros de
Integración
Juvenil, A.C.**

*SISTEMA DE INFORMACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DEL
CONSUMO DE DROGAS*

**CONSUMO DE SUSTANCIAS EN PACIENTES
DE PRIMER INGRESO A TRATAMIENTO.
SEGUNDO SEMESTRE DEL 2014.
USUARIOS DE DROGAS ILÍCITAS**

Alma Delia Gutiérrez López

Dirección de Investigación y Enseñanza

Subdirección de Investigación

México, abril de 2015

SIECD

Informe de Investigación 15-02a



DIRECTORIO

PRESIDENTE HONORARIO VITALICIO DEL PATRONATO NACIONAL

Dr. Jesús Kumate Rodríguez

PRESIDENTE DEL PATRONATO NACIONAL

Dr. Roberto Tapia Conyer

FUNDADORA DE CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL, A.C.

Y VICEPRESIDENTA VITALICIA DEL PATRONATO NACIONAL

Sra. Kena Moreno

DIRECTORA GENERAL

Lic. Carmen Fernández Cáceres

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE OPERACIÓN Y PATRONATOS

Dr. José Ángel Prado García

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE NORMATIVIDAD

Dr. Ricardo Sánchez Huesca

DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA

Dr. Jaime Arturo Quintanilla Bendek

SUBDIRECTOR DE INVESTIGACIÓN

Mtro. David Bruno Díaz Negrete

JEFA DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA Y EPIDEMIOLÓGICA

Dra. Solveig Eréndira Rodríguez Kuri

CONTENIDO	PÁG.
ANTECEDENTES	5
MÉTODO	6
CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS	8
FACTORES ASOCIADOS A LA DEMANDA DE TRATAMIENTO	11
CONSUMO DE DROGAS	14
REFERENCIAS	24
CUADROS	27
GLOSARIO	51

ÍNDICE DE CUADROS

PÁG.

Cuadro 1	Pacientes de primer ingreso a tratamiento por unidad de atención (CIJ)	28
Cuadro 2	Sexo	31
Cuadro 3	Persona que proporciona la información	31
Cuadro 4	Edad de ingreso a tratamiento	31
Cuadro 5	Estado civil	32
Cuadro 6	Escolaridad	32
Cuadro 7	Ocupación	33
Cuadro 8	Estrato social	33
Cuadro 9	Motivos de consulta	34
Cuadro 10	Condicionantes de la solicitud de tratamiento	34
Cuadro 11	Antecedentes de acciones contra el consumo de sustancias	35
Cuadro 12	Problemas asociados al consumo de sustancias	35
Cuadro 13	Edad de inicio del consumo de tabaco	36
Cuadro 14	Edad de inicio del consumo de alcohol	36
Cuadro 15	Edad de inicio del consumo de drogas ilícitas	37
Cuadro 16	Drogas ilícitas de inicio	38
Cuadro 17	Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de tabaco y el ingreso a tratamiento a CIJ	39
Cuadro 18	Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de alcohol y el ingreso a tratamiento a CIJ	39
Cuadro 19	Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de drogas ilícitas y el ingreso a tratamiento a CIJ	40
Cuadro 20	Tipo de consumo de drogas ilícitas	40
Cuadro 21	Total de drogas consumidas alguna vez en la vida (incluye alcohol o tabaco)	41
Cuadro 22	Total de drogas ilícitas consumidas alguna vez en la vida (no incluye ni alcohol ni tabaco)	41
Cuadro 23	Consumo de drogas alguna vez en la vida por sustancia	42
Cuadro 24	Total de drogas consumidas en el último año (incluye alcohol o tabaco)	43
Cuadro 25	Total de drogas ilícitas consumidas en el último año (no incluye ni alcohol ni tabaco)	43
Cuadro 26	Consumo de drogas en los últimos 12 meses por sustancia	44
Cuadro 27	Droga de preferencia en los últimos 12 meses, según menciones	45
Cuadro 28	Droga de mayor impacto en los últimos 12 meses, según menciones	46
Cuadro 29	Uso combinado de drogas en los últimos 12 meses (no incluye tabaco)	47
Cuadro 30	Total de drogas consumidas en los últimos 30 días (incluye alcohol o tabaco)	47
Cuadro 31	Total de drogas ilícitas consumidas en los últimos 30 días (no incluye ni alcohol ni tabaco)	48
Cuadro 32	Consumo de drogas en los últimos 30 días por sustancia	49
Cuadro 33	Frecuencia de episodios de abuso del consumo de Tabaco en los últimos 30 días	50
Cuadro 34	Frecuencia de episodios de abuso del consumo de Alcohol en los últimos 30 días	50
Cuadro 35	Frecuencia de episodios de abuso del consumo de drogas ilícitas en los últimos 30 días	50

RESUMEN

El informe se realizó con base en 10,792 registros clínicos de la entrevista inicial de usuarios de sustancias psicoactivas que reportaron consumo de al menos una droga ilícita y que acudieron por primera vez a consulta a Centros de Integración Juvenil entre julio y diciembre de 2014. Los objetivos del estudio son: a) actualizar la información del perfil sociodemográfico de los pacientes, de los factores asociados a la demanda de tratamiento y del patrón de consumo de sustancias; b) contribuir a retroalimentar sistemas nacionales de información del consumo de drogas; c) generar información que oriente el desarrollo de estudios con pacientes o consumidores(as) de drogas en México; y d) contribuir al desarrollo, diseño y ajuste de los servicios institucionales de prevención y tratamiento del consumo de drogas.

Los datos que se presentan en este informe permiten ver que el uso de drogas ilícitas sigue siendo un trastorno que afecta en mayor proporción a la población masculina que solicita tratamiento, en una proporción de 4.6 hombres por cada mujer. La edad media de ingreso a tratamiento fue de 22.2 años. En promedio, los hombres ingresaron a tratamiento a mayor edad que las mujeres (22.6 y 20.7 años respectivamente). La edad promedio del inicio del consumo de tabaco y la de alcohol se situaron en los 14.3 y 14.4 años respectivamente, mientras que la de drogas ilícitas en 15.9 años. Tanto hombres como mujeres iniciaron el consumo de estas sustancias alrededor de las edades mencionadas, lo que muestra que la edad de inicio no presenta diferencias relevantes por sexo.

Las drogas de mayor consumo alguna vez en la vida fueron *cannabis* (87.4%), alcohol (86.5%), tabaco (83.5%), cocaína/*crack* (39.1%), inhalables (31.8%), estimulantes (22.9%, principalmente metanfetaminas: 17.8% y éxtasis: 6.3%), depresores (14.2%), drogas alucinógenas y disociativas (9.8%) y opiáceos (3.8%). En cuanto al consumo en el mes previo al ingreso a tratamiento, las sustancias más utilizadas fueron tabaco (60.2%), alcohol (53.5%), *cannabis* (53.8%), inhalables (13.2%) y cocaína/*crack* (12.6%). Las sustancias de mayor impacto fueron marihuana (46.4%), alcohol (13.2%), metanfetaminas (8.5%), solventes y removedores (7.4%), tabaco (6.3%), *crack* (5.3%) y cocaína en polvo (3.9%).

En cuanto a los factores asociados a la demanda de tratamiento se observó que los usuarios de drogas acudieron principalmente por condicionamiento o recomendación de la familia (44.0%) o por iniciativa propia (36.4%); que solicitaron atención debido a su consumo de drogas ilícitas (89.1%), de alcohol (40.3%) y de tabaco (35.6%); que previo al tratamiento algunos de ellos (29.3%) intentaron interrumpir de manera voluntaria y sin apoyo el consumo y otros (28.3%) no habían tomado ninguna medida contra el problema; y que entre los problemas más frecuentemente asociados al consumo se reconocieron los de tipo familiar (79.7%), los escolares (41.9%), los de salud (41.8%) y los psicológicos (38.6%).

ANTECEDENTES

Centros de Integración Juvenil ha reportado información epidemiológica del consumo de drogas de los solicitantes de tratamiento desde 1976¹. En 1983 inicia la aplicación de una cédula homogénea a los pacientes de nuevo ingreso², aunque no es sino a partir de 1990 que la recolección de datos se realiza en forma sistemática³, implementándose posteriormente el *Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas* (SIECD), el cual se ha ido consolidando a través de los años y ha realizado el seguimiento oportuno de un conjunto de variables, con las cuales ha podido contribuir en la toma de decisiones del diseño y ajuste de servicios institucionales, además de aportar conocimientos sobre la forma y tendencias del uso de drogas y de aportar información a los Sistemas Epidemiológicos de las Adicciones en el país, como es el caso del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA)⁴ de la Secretaría de Salud, del Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas (SRID) –perteneciente al Instituto Nacional de Psiquiatría “*Ramón de la Fuente*” (INP)⁵–, del Observatorio Epidemiológico en Drogas de la Secretaría Salud⁶.

El SIECD, también ha apoyado en el desarrollo de diferentes estudios epidemiológicos especializados, con temas que van desde el perfil de usuarios de drogas y su trayectoria de consumo⁷, el consumo de drogas en las mujeres⁸, en la población infantil⁹ o de acuerdo con las etapas de la vida¹⁰, hasta llegar a los estudios de tendencias^{11,12,13,14}. Toda esta información ha facilitado el enfrentamiento oportuno de las problemáticas generadas por el creciente consumo de estimulantes y simultáneamente ha sido de utilidad para apoyar el diseño eficaz de estudios sobre características particulares de los consumidores de estos alcaloides^{15,16}.

Por otro lado, la información reportada ha permitido el desarrollo de estudios epidemiológicos particulares enfocados en profundizar en las características del consumo de drogas legales de pacientes atendidos. Así, desde el año 2006, el SIECD genera un informe por separado de las características de los pacientes consumidores de tabaco y alcohol¹⁷, con lo cual se ha logrado identificar una emergencia epidemiológica del consumo de alcohol entre las pacientes atendidas con relación a los años anteriores¹⁸; suceso que ha dado pie a CIJ para profundizar en esta problemática¹⁹ y que también ha sido reportado por la Encuesta Nacional de Adicciones (ENA), sobre todo para el caso de las mujeres jóvenes²⁰.

Adicionalmente, es importante destacar que la información generada por el SIECD durante el lapso de más de dos décadas ha sido consistente con la de las Encuestas Nacionales de Adicciones (ENA) de este periodo, ya sea en el nivel nacional o en el regional²¹ y también ha sido referente para el desarrollo de metodologías de investigación en variados estudios clínicos, psicosociales y evaluativos de la Institución, como es el caso de diversos *Estudios de la Comunidad Objetivo* (EBCO)²² realizados por los CIJ a lo largo y ancho del país.

El presente informe se elaboró con base en la información obtenida por el SIECD durante el segundo semestre de 2014 y tiene el objetivo de proporcionar datos actualizados sobre las características sociodemográficas, factores asociados a la demanda de tratamiento y del patrón de consumo de drogas de los solicitantes de tratamiento, con el propósito adicional de apoyar el diseño, planeación y ajuste de los programas institucionales de prevención, tratamiento y rehabilitación, además de colaborar con otros sistemas de información en drogas y de aportar elementos para el diseño y elaboración de investigaciones en el campo de las adicciones.

MÉTODO

Diseño de estudio: Censo, estudio transversal y descriptivo.

Población: 10,792 usuarios de drogas ilícitas procedentes de 108 unidades de CIJ, que acudieron por primera vez a consulta entre julio y diciembre de 2014 y que proporcionaron personalmente la información (cuadro 1. Anexo).

Fuente de información: Formato de Entrevista Inicial, aplicado en la primera consulta por parte del personal médico-técnico responsable del ingreso de pacientes a tratamiento, que forma parte del expediente clínico en cualquiera de sus dos versiones: formato electrónico (base de datos recuperada el día 4 de febrero de 2015 a las 10:15 hrs., con 10,564 registros capturados por los/as terapeutas responsables de realizar la entrevista inicial) o formato impreso (228 registros capturados por personal del departamento de Investigación Clínica y Epidemiológica mediante el programa *Control de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas* desarrollado por CIJ).

Variables de estudio: Las características sociodemográficas estudiadas comprenden: persona que proporciona la información, sexo, edad de ingreso a tratamiento, estado civil, escolaridad, ocupación y estrato social; las variables de los factores asociados a la demanda de tratamiento: motivo(s) de consulta, condicionante(s) de la solicitud de tratamiento, antecedente(s) de acciones tomadas frente al uso de sustancias y

problema(s) asociado(s) al mismo; y las variables de patrón de consumo: edad de inicio, tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de sustancias y el ingreso a tratamiento, consumo alguna vez en la vida, en el último año y en los últimos 30 días; drogas de preferencia y de mayor impacto en el último año (estas dos últimas variables de acuerdo con el punto de vista del paciente), uso combinado de sustancias, tipo de consumo de drogas ilícitas, episodios de abuso y total de drogas consumidas.

La información sobre el consumo de drogas se presenta categorizada en diez grupos de sustancias que a su vez desagrega a 26 categorías de drogas:

Grupo de Sustancias	Drogas en seguimiento
Tabaco	Cigarrillos
Alcohol	Bebidas alcohólicas
<i>Cannabis</i>	Mariguana y hachís
Cocaína	Cocaína en polvo, <i>crack</i> y otra presentación de cocaína
Inhalables	Solventes y removedores, pegamentos, esmaltes y pinturas y otros inhalables
Depresores	Benzodiacepinas, <i>Rohypnol</i> y otros depresores
Estimulantes	Anfetaminas, metanfetaminas (<i>crystal</i> o <i>ICE</i>), MDMA (<i>éxtasis</i>) y metanfetaminas alucinógenas; y otros estimulantes
Drogas alucinógenas y disociativas	Ácido lisérgico (LSD), plantas alucinógenas y derivados y otros alucinógenos (PCP y ketamina)
Opiáceos	Heroína, opiáceos sintéticos y opio, y otros opioides
Otras sustancias de abuso	Sustancias con utilidad médica y otras sustancias no identificadas

Procesamiento de datos. Para el procesamiento estadístico de la información se utilizó el programa SPSS v.19.

Los resultados se presentan tanto en forma general como desglosada por sexo y en porcentajes válidos, excluyendo los casos “*sin información*” y aquellos que no cumplieron con las condiciones requeridas para el análisis en cada variable de estudio.



CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS^a

Sexo. La población se conformó por 8,874 hombres y 1,918 mujeres, lo que en porcentaje representa a un 82.2% y un 17.8%, respectivamente. Dando así una proporción aproximada de cuatro hombres (4.6) por cada mujer.

Persona que proporciona la información. En el 54.7% de las ocasiones los pacientes acudieron en compañía de familiares u otras personas (54.4% de los hombres y 56.2% de las mujeres), mientras que en 45.3% lo hicieron solos (45.6% de los hombres y 43.8% de las mujeres).

Edad de ingreso a tratamiento. Se observa un rango de edad de 6 a 81 años, con un promedio de 22.2 años y una desviación estándar de diez punto cuatro; es decir que cerca del 84% de las personas atendidas (9,057) se encontró entre los 12 y 32 años de edad; la edad mediana de la población fue de 18 años (48.1% de los casos fueron menores de edad; 5,195 sujetos), mientras que la moda se ubicó en 16 años (1,174 personas atendidas).


Figura 1. Edad de ingreso según sexo

	 Años	 Años	
Rango	6 a 81	11 a 76	Las mujeres ingresaron a tratamiento a menor edad
Media	22.6	20.7	
Desviación estándar	10.5	9.8	
Mediana	18	17	
Moda	16	16	

^a Cfr., Cuadros 1 a 8.


Estado civil. La mayor parte de la población refirió ser soltera (74.3%), mientras que 9.7% indicó que vivía en unión libre y 8.8% estaba casada, con leves diferencias entre los sexos.

Figura 2. Estado civil según sexo




Escolaridad. 42.9% cursaba o había cursado algún grado de educación secundaria, 37.6% al menos algún grado de bachillerato, 8.2% contaba con algún grado escolar de nivel primaria y 8.2% de nivel superior o posgrado.

Figura 3. Escolaridad según sexo



Ocupación. 40.9% se dedicaba a estudiar, 28.5% desempeñaba alguna actividad laboral y 21.7% estaba desempleado.


Figura 4. Principal ocupación según sexo



Estrato social. Según la percepción de los terapeutas 66.6% de los pacientes se ubicaban en el estratos medio o medio bajo, 23.8% en el estrato bajo y 8.1%, en el medio alto.


Figura 5. Estrato social según sexo

Según la percepción de los terapeutas tanto hombres como mujeres presentaron condiciones sociales similares




FACTORES ASOCIADOS A LA DEMANDA DE TRATAMIENTO^b

Motivos de consulta. 43.3% de las personas atendidas reportó más de un motivo para acudir a tratamiento (uso de alcohol, tabaco o drogas), mientras que 0.2% no expresó ninguno. Conviene señalar que 89.1% acudió por consumo de drogas ilícitas, 40.3% por uso de bebidas alcohólicas y 35.6% por uso de tabaco.




Condicionantes de la solicitud de tratamiento. 25.1% de los casos expresó dos o más condicionantes para acudir a tratamiento; 44.0% acudió por recomendación de la familia, 36.4% por iniciativa propia, 22.7% por condicionamiento o recomendación escolar, 9.3% por condicionamiento legal y 8.4% por indicación médica.



^b Cfr. Cuadros 9 a 12.

Antecedentes de acciones contra el consumo de sustancias. 29.3% de los pacientes expresó que antes de acudir a CIJ había intentado interrumpir el consumo por voluntad propia, 11.7% señaló que previamente había estado internado en algún anexo, 7.0% había acudido a grupos de autoayuda, 4.9% lo había hecho por medio de juramento y 6.9% acudió a algún tipo de tratamiento psiquiátrico o psicoterapéutico. Cabe señalar que 10.5% reportó haber intentado al menos dos formas distintas de acciones para abandonar el consumo de drogas, en tanto que 28.34% expresó que hasta el momento de la solicitud de tratamiento no había tomado ninguna medida en contra del consumo de drogas.


Figura 8. Antecedentes de acciones contra el consumo de sustancias según sexo



Un mayor porcentaje de mujeres ingresaron a CIJ sin haber realizado acciones previas mientras que los hombres intentaron en mayor proporción que las mujeres dejar el consumo voluntariamente o habían recurrido a algún tipo de apoyo no especializado

Problemas asociados al consumo de sustancias. 79.7% señaló problemas de tipo familiar, 41.9% escolares (una disminución frente a los 58.9% del semestre anterior), 41.8% de salud, 38.6% psicológicos, 20.8% laborales, 21.0% legales, 15.8% de conducta antisocial o delictiva y 12.7% accidentes o lesiones. Cabe señalar que 76.8% de las personas atendidas mencionaron dos o más problemas asociados al consumo de sustancias, mientras que 4.2% no reportó ninguno.



Figura 9. Problemas asociados al consumo de sustancias según sexo



CONSUMO DE DROGAS^c

Edad de inicio del consumo de sustancias. La edad promedio de inicio del consumo de tabaco se situó en 14.3 años ($\sigma=3.3$ años), la mediana en 14 años y la moda en 13 años, mientras que la edad promedio de inicio del consumo de alcohol se ubicó en 14.4 años ($\sigma=3.0$ años) con una mediana de 14 años y una moda de 15 años. Por su parte, la edad promedio de inicio en el abuso de drogas ilícitas (incluyendo sustancias de uso médico sin prescripción) fue de 15.9 años ($\sigma=5.0$ años), con mediana de 15 años y la moda de 14 años. Por otra parte, al considerar el primer decil como indicador de las edades de inicio más tempranas, se observa que el consumo de tabaco aparece a los 11 años, mientras que la de alcohol y drogas ilícitas se presenta un año después.

Figura 10. Edad de inicio del consumo de sustancias según sexo

	 Años			 Años		
	Tabaco	Alcohol	Drogas ilícitas	Tabaco	Alcohol	Drogas ilícitas
Promedio	14.2	14.4	15.8	14.4	14.4	16.3
Desviación estándar	3.2	2.8	4.7	3.5	3.5	6.3
Mediana	14	14	15	14	14	15
Moda	14	15	15	13	15	14


No existen diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a la edad de inicio del consumo de drogas

Drogas ilícitas de inicio. Las sustancias de inicio más reportadas fueron: en primer lugar la cannabis, principalmente en forma de marihuana (73.9%); en segundo lugar los inhalables (11.5%), mayormente en forma de solventes y removedores (7.9%); después la cocaína (9.1%), tanto en forma de polvo blanco (6.9%) como *crack* (2.1); en cuarto lugar aparecen los estimulantes (2.6%), donde destacan las metanfetaminas (2.0%); después aparecen los depresores con utilidad médica (1.8%) siendo las

^c Cfr., Cuadros 13 a 35



benzodiazepinas las más reportadas (1.7%); y en sexto lugar se ubican los opiáceos (0.4%), entre los cuales sobresale la heroína (33 casos).

Figura 11. Principales drogas ilícitas de inicio según sexo




Lapso transcurrido entre el inicio del consumo de sustancias y el ingreso a tratamiento en CIJ. El promedio de años entre el inicio de consumo y la solicitud de tratamiento se situó de la siguiente manera: tabaco de 8.3 años ($\sigma=9.9$ años), alcohol de 8.4 años ($\sigma=9.8$ años) y drogas ilícitas de 6.4 años ($\sigma=8.7$ años). Resalta, que la mitad de los usuarios dejó pasar cuatro años desde el momento en que se inició el consumo de tabaco o alcohol y el momento de acudir a solicitar tratamiento, mientras que la mitad de los usuarios de drogas ilegales dejaron pasar 3 años.

Figura 12. Lapso transcurrido entre el inicio del consumo de sustancias y el ingreso a tratamiento en CIJ según sexo

	 Años			 Años		
	Tabaco	Alcohol	Drogas ilícitas	Tabaco	Alcohol	Drogas ilícitas
Promedio	8.7	8.8	6.8	6.4	6.3	4.3
Desviación estándar	10.2	10.0	9.0	8.5	8.2	6.8
Mediana	4	5	3	3	3	2
Moda	1	1	1	1	1	< un año

Las mujeres solicitaron tratamiento en forma más oportuna

Tipo de consumo de drogas ilícitas. De acuerdo con los terapeutas, 51.0% de los solicitantes de tratamiento fue diagnosticado con consumo funcional, 17.5% con consumo disfuncional, 16.6% con consumo social u ocasional, 11.2% con consumo experimental y 3.7% presentaba remisión del consumo.




Las mujeres presentaron patrones de consumo de menor gravedad que los hombres

Total de drogas consumidas. El promedio de sustancias utilizadas alguna vez en la vida, incluyendo alcohol o tabaco, fue de 4.1 drogas (93.8% reportó el uso de dos o más sustancias); en el último año fue de 3.4 drogas (88.1% consumió dos o más sustancias); y en los últimos 30 días fue de 2.1 drogas (65.6% reportó haber utilizado dos o más sustancias).

El promedio de sustancias utilizadas alguna vez en la vida, sin incluir alcohol y tabaco, fue de 2.4 drogas (56.2 % reportó el uso de dos o más sustancias); en el último año fue de 1.8 drogas (42.7% consumió dos o más sustancias); y en los últimos 30 días fue de una droga (20.6% reportó haber utilizado dos o más sustancias).

Figura 14. Total de drogas consumidas según sexo




Mujeres y hombres consumieron, en promedio, un número similar de drogas

Consumo de drogas alguna vez en la vida.^d Las proporciones de consumo alguna vez en la vida de los diez grupos de sustancias fueron: tabaco (83.5%), alcohol (86.5%); *cannabis* (87.4%), cocaína (39.1%), inhalables (31.8%), estimulantes (22.9%), depresores (14.2%), drogas alucinógenas y disociativas (9.8%), opiáceos (3.8%) y otras sustancias de abuso (1.6%).

En cuanto al uso de sustancias específicas (contenidas en alguno de los diez grupos antes mencionados) sobresalen: marihuana (87.3%), cocaína en polvo (33.3%) solventes y removedores (22.6%), *crack* (18.0%), metanfetaminas (17.8%) y benzodiacepinas (13.5%); en menor proporción los pegamentos (8.9%), LSD (6.6%) y *éxtasis* y otras metanfetaminas alucinógenas (6.3%).

Figura 15. Consumo de drogas alguna vez en la vida según sexo




^d Dado que la mayoría de los casos refirió haber utilizado dos o más sustancias —tanto en esta categoría como en las de uso en el último año y en los últimos 30 días, *infra*— la suma de porcentajes no resulta 100%.

Consumo de drogas en los últimos 12 meses. 98.8% de las personas reportaron haber consumido alguna sustancia en el año previo a su ingreso a tratamiento en CIJ. Las proporciones de consumo de los diez grupos de sustancias utilizadas en este lapso fueron: alcohol (75.3%), tabaco (78.9%), *cannabis* (75.0%), cocaína (27.4%), inhalables (23.9%), estimulantes (17.8%), depresores (10.1%), drogas alucinógenas y disociativas (5.6%); opiáceos (2.8%) y otras sustancias de abuso (1.3%).

En cuanto al consumo de sustancias específicas contenidas en alguno de los grupos anteriores destacaron: marihuana (75.0%), cocaína en polvo (21.3%), solventes y removedores (16.8%), metanfetaminas (14.4%) y *crack* (12.9%); en menor proporción se refieren a las benzodiacepinas (9.8%) y los pegamentos (6.1%).


Figura 16. Consumo de drogas en los últimos 12 meses según sexo



Las drogas más consumidas en el último año por ambos sexos fueron alcohol, tabaco y *cannabis*; aunque las mujeres usaron en mayor proporción inhalables, benzodiacepinas, *éxtasis* y alucinógenos, mientras que los hombres reportaron mayor en el resto de las sustancias.


Droga de preferencia en los últimos 12 meses. Entre las sustancias más frecuentemente referidas se encontraron: cannabis (48.7%), alcohol (15.3%), tabaco (11.3%), inhalables (7.4%) y metanfetaminas (5.7%). En menores proporciones aparecieron: crack (4.0%), cocaína en polvo (2.9%) y heroína (1.5%).

Figura 17. Droga de preferencia en los últimos 12 meses según sexo




Droga de mayor impacto en los últimos 12 meses. Las principales sustancias a cuyo consumo los pacientes atribuyeron los mayores daños en la salud, en el bienestar personal y familiar o en el desempeño escolar, laboral o social y por las que pudieron haber solicitado tratamiento se encuentran: *cannabis* (16.4%), alcohol (13.2%), inhalables (10.6%), metanfetaminas (8.5%), tabaco (6.3%), *crack* (5.3%) y cocaína en polvo (3.9%).

Figura 18. Droga de mayor impacto en los últimos 12 meses según sexo



Uso combinado de drogas en los últimos 12 meses.^e Al menos en una ocasión en el transcurso del último año y sin tomar en cuenta el consumo de tabaco, poco menos de la mitad de la población (43.6%) reportó el consumo en un mismo día de dos o más sustancias.

Figura 19. Uso combinado de droga en los últimos 12 meses según sexo




^e No se toman en cuenta 2,371 casos (22.0%) que no cumplieron los criterios de inclusión de esta variable; 21.6% de los hombres y 23.5% de las mujeres (ver anexo).

Consumo de drogas en los últimos 30 días. Incluyendo alcohol y tabaco, 91.2% de los casos reportaron consumo de sustancias en el mes anterior al ingreso a tratamiento.

Las proporciones de consumo de los diez grupos de sustancias utilizadas en este lapso fueron: tabaco (60.2%), alcohol (53.5%), *cannabis* (53.8%), inhalables (13.2%), cocaína (12.6%), estimulantes (9.2%), depresores (4.8%), opiáceos (1.6%), drogas alucinógenas y disociativas (1.0%) y otras sustancias de abuso (0.8%).

En cuanto al consumo de sustancias específicas destacó el de marihuana con 53.8%, le siguen: solventes/removedores (9.4%), cocaína en polvo (8.1%), metanfetaminas (8.0%) y crack (6.1%); en menor proporción se registra el consumo de benzodiacepinas (4.7%) y pegamentos (3.0%).


Figura 20. Consumo de drogas en los últimos 30 días según sexo



Tanto hombres como mujeres consumieron predominantemente tabaco, alcohol y cannabis, los hombres en mayor proporción, las mujeres reportaron mayor consumo de inhalables, benzodiacepinas y alucinógenos

Frecuencia de episodios de abuso en los últimos 30 días. 36.8% de quienes reportaron consumo de tabaco en los últimos 30 días aceptó fumar seis o más cigarrillos diariamente. Así mismo, entre quienes consumieron alcohol, la mayor parte (36.7%) reportó consumo abusivo menos de una vez a la semana y una o dos veces a la semana (31.5%). Por otra parte, 38.1% de los usuarios de drogas ilícitas durante el último mes reportaron consumirlas todos los días, 24.8% menos de una vez a la semana y 20.9% una a dos veces a la semana.

Figura 21. Frecuencia de episodios de abuso en los últimos 30 días según sexo



La frecuencia de episodios de abuso de tabaco tiende a ser similar entre los sexos, mientras que es mayor el porcentaje de hombres que abusaron de alcohol y drogas ilegales el mes previo al tratamiento

REFERENCIAS

1. Sánchez-Huesca, R. y López Granados, L. (1985). ***Características demográficas y patrones de inicio en el consumo de drogas en asistentes a los Centros Locales; recuperación de los archivos de siete años (1976-1982)***. México: Centros de Integración Juvenil, A.C. (reporte interno).
2. Clarac Rengade, P. y Wagner Echeagaray, F. (1987). Análisis de algunas variables en una muestra de pacientes farmacodependientes (1986). En F. Wagner Echeagaray y R. Ortiz Mondragón (Comp.) (1990). ***Estudios acerca de la farmacodependencia en México realizados por Paule Clarac***. México: Centros de Integración Juvenil, A. C. (pp. 111-126).
3. García Aurrecochea, R., Diaz Negrete, B., Balanzario, M. C., Gutierrez-López, A. Castillo-Franco, I. (1999). Características sociodemográficas y de consumo de drogas en pacientes atendidos entre 1990 y 1997. México: Centros de Integración Juvenil, A.C., Dirección de Promoción Institucional. ***Informe de investigación 98-12***.
4. Secretaria de Salud, Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud, Dirección General de Epidemiología. Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (***SISVEA***) ***Informe 2009***. México.
5. Ortiz, A., Martínez, R., Meza, D. (2014) Grupo Interinstitucional para el desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. ***Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas"***. *Tendencias en el área metropolitana No. 55*. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.
6. Diaz, D. B., Balanzario, M. C., Castillo, I., Gutiérrez, A. y García, R. (2001). Uso de drogas entre pacientes de primer ingreso en Centros de Integración Juvenil. En Secretaría de Salud. ***Observatorio Epidemiológico en drogas. El fenómeno de las adicciones en México 2001***. México: Secretaría de Salud (pp. 66-71) (ISBN: 970-721-008-7). http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/publicaciones/obs2001_cap4.pdf
7. García-Aurrecochea, R., Diaz-Negrete, B., Balanzario, M. C., Castillo-Franco, I. (1998). ***Perfil y trayectoria del consumo de drogas en pacientes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil en 1996***. En CD: B. D. Diaz Negrete, J. Arellanez, M. C. Balanzario y R. Sánchez Huesca, *Once años de estudios del consumo de drogas en México, Investigaciones realizadas en Centros de Integración Juvenil entre 1997 y 2007*. México: Centros de Integración Juvenil.

8. Castillo Franco, P. I., Gutiérrez López, A. D. (2008). Consumo de drogas en mujeres asistentes a centros de tratamiento especializado en la Ciudad de México. **Salud Mental 31 (5)**, 351-359. <http://scielo.unam.mx/pdf/sm/v31n5/v31n5a3.pdf>
9. Gracia Gutiérrez de Velasco, S. E. y Balanzario Lorenzana, M. C. (2003). El consumo de drogas en menores de 12 años en Centros de Integración Juvenil en el año 2002. México: Centros de Integración Juvenil, A.C., Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación. **Informe de Investigación 03-17**.
10. García Aurrecoechea, R., Castillo Franco, P. I. y Guerrero Huesca, J. A. (2003). El consumo de drogas en pacientes atendidos en Centros de Integración Juvenil según la etapa de vida correspondiente al ingreso a tratamiento. México: Centros de Integración Juvenil, A.C., Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación. **Informe de Investigación 03-13**.
11. García Aurrecoechea, R., Díaz Negrete, B., Balanzario, M. C. (2001). Tendencias del consumo de drogas en pacientes de primer ingreso a tratamiento en CIJ entre 1990 y 1999. México: Centros de Integración Juvenil, A.C., Dirección de Promoción Institucional. **Informe de investigación 2000-06**.
12. Gutiérrez López, AD. (2014). Tendencias del consumo de drogas alguna vez en la vida en Centros de Integración Juvenil. Segundo semestre de 2004 – Primer semestre de 2014 (Nivel Nacional y Entidades Federativas). México: Centros de Integración Juvenil, A.C., Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación. **Informe de Investigación 14-10e**. <http://www.cij.gob.mx/Programas/Investigacion/pdf/14-10e.pdf>
13. Gutiérrez López, AD. (2014). Tendencias del consumo de drogas en los últimos 30 días en Centros de Integración Juvenil. Segundo semestre de 2004 - Primer semestre de 2014 (Nivel Nacional y Entidades Federativas). México: Centros de Integración Juvenil, A.C., Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación. **Informe de Investigación 14-10f**. <http://www.cij.gob.mx/Programas/Investigacion/pdf/14-10f.pdf>
14. Gutiérrez López, A. D. (2014). Droga de mayor impacto reportada por usuarios de drogas ilícitas en el año previo a la solicitud de tratamiento en Centros de Integración Juvenil. Segundo semestre de 2004 - Primer semestre de 2014 (Nivel Nacional y Entidades Federativa). México: Centros de Integración Juvenil, A.C., Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación. **Informe de Investigación 14-10g**. <http://www.cij.gob.mx/Programas/Investigacion/pdf/14-10g.pdf>

15. Jiménez Silvestre K., García Aurrecochea, V. R. y González Sánchez, J. D. (2005). Patrón de Consumo de Cocaína y Crack en pacientes que ingresan a Tratamiento. México: Centros de Integración Juvenil, A.C., Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación. **Informe de investigación 05-07.**
16. Jiménez-Silvestre, K. y Castillo-Vite N.L. Factores de reincidencia en usuarios de cocaína, crack y metanfetaminas en fase de recuperación. México: Centros de Integración Juvenil, A.C., Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación. **Informe de Investigación 04-14.**
17. Gutiérrez López, A. D. y Castillo Franco, P. I. (2007). Características sociodemográficas y de consumo en usuarios de tabaco y alcohol de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil en 2006. México: Centros de Integración Juvenil, A.C., Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación. **Informe de Investigación 07-13.** <http://www.cij.gob.mx/Especialistas/pdf/07-13.pdf>
18. García Aurrecochea, R., Velázquez Altamirano, M. y Gutiérrez López, A. D. (2014). Consumo de sustancias en pacientes de primer ingreso a tratamiento. Primer semestre del 2014. Usuarios de tabaco y alcohol. México: Centros de Integración Juvenil, A.C., Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación. **Informe de Investigación 14-10d.** <http://www.cij.gob.mx/Programas/Investigacion/pdf/14-10d.pdf>
19. Moreno, K. (Coord.) (2010). **Los jóvenes y el alcohol en México. Un problema emergente en mujeres.** México: Centros de Integración Juvenil, A.C.
20. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz; Instituto Nacional de Salud Pública; Secretaría de Salud (2012). **Encuesta Nacional de Adicciones 2011: Reporte de Alcohol.** Medina-Mora ME, Villatoro JA, Fleiz C, Téllez MM, Mendoza LR, Romero M, Gutiérrez JP, Castro M, Hernández M, Tena C, Alvear C y Guisa V. México: INPRFM.
21. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz; Instituto Nacional de Salud Pública; Secretaría de Salud (2012). **Encuesta Nacional de Adicciones 2011: Reporte de Drogas.** Villatoro JA, Medina Mora ME, Fleiz C, Téllez MM, Mendoza LR, Romero M, Gutiérrez JP, Castro M, Hernández M, Tena C, Alvear C y Guisa V. México: INPRFM.
22. CD: **EBCO 2007-2008. Estudio Básico de Comunidad Objetivo Vol. 1 y 2.** México: Centros de Integración Juvenil, A.C., Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación.

CUADROS

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS USUARIOS DE DROGAS DE PRIMER INGRESO A TRATAMIENTO A CIJ EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014

Cuadro 1. Pacientes de Segundo ingreso por unidad de atención (CIJ, UH y UTUH)

CIJ	General		Hombres		Mujeres		Razón H:M
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	
Álvaro Obregón Norte	101	0.9	77	0.9	24	1.3	3.2 : 1
Álvaro Obregón Oriente	68	0.6	57	0.6	11	0.6	5.2 : 1
Azcapotzalco	140	1.3	113	1.3	27	1.4	4.2 : 1
Benito Juárez	117	1.1	85	1.0	32	1.7	2.7 : 1
Chalco	166	1.5	146	1.6	20	1.0	7.3 : 1
Coyoacán	123	1.1	103	1.2	20	1.0	5.2 : 1
Cuajimalpa	77	0.7	61	0.7	16	0.8	3.8 : 1
Cuauhtémoc Oriente	142	1.3	114	1.3	28	1.5	4.1 : 1
Cuauhtémoc Poniente	148	1.4	111	1.3	37	1.9	3.0 : 1
Ecatepec	190	1.8	164	1.8	26	1.4	6.3 : 1
Gustavo A. Madero Aragón	17	0.2	14	0.2	3	0.2	4.7 : 1
Gustavo A. Madero Norte	174	1.6	155	1.7	19	1.0	8.2 : 1
Gustavo A. Madero Oriente	182	1.7	147	1.7	35	1.8	4.2 : 1
Iztapalapa Oriente	432	4.0	368	4.1	64	3.3	5.8 : 1
Iztapalapa Poniente	145	1.3	117	1.3	28	1.5	4.2 : 1
Miguel Hidalgo	89	0.8	70	0.8	19	1.0	3.7 : 1
Naucalpan	168	1.6	147	1.7	21	1.1	7.0 : 1
Nezahualcóyotl	204	1.9	167	1.9	37	1.9	4.5 : 1
Texcoco	108	1.0	94	1.1	14	0.7	6.7 : 1
Tlalnepantla	177	1.6	145	1.6	32	1.7	4.5 : 1
Tlalpan	150	1.4	126	1.4	24	1.3	5.3 : 1
Venustiano Carranza	141	1.3	116	1.3	25	1.3	4.6 : 1
Xochimilco	26	0.2	22	0.2	4	0.2	5.5 : 1
UH Ecatepec	53	0.5	51	0.6	2	0.1	25.5 : 1
UH Iztapalapa	52	0.5	44	0.5	8	0.4	5.5 : 1
UH Naucalpan	51	0.5	39	0.4	12	0.6	3.3 : 1
Acapulco	140	1.3	106	1.2	34	1.8	3.1 : 1
Aguascalientes	139	1.3	110	1.2	29	1.5	3.8 : 1
Apodaca	56	0.5	48	0.5	8	0.4	6.0 : 1
Cancún	159	1.5	138	1.6	21	1.1	6.6 : 1
Cd. del Carmen	69	0.6	50	0.6	19	1.0	2.6 : 1
Cd. Juárez Norte	88	0.8	69	0.8	19	1.0	3.6 : 1
Cd. Victoria	31	0.3	28	0.3	3	0.2	9.3 : 1
Celaya	232	2.1	191	2.2	41	2.1	4.7 : 1

(Continúa)

Cuadro 1. Pacientes de Segundo ingreso a tratamiento por Unidad de atención (CIJ, UH y UTUH)
(Continuación)

CIJ	General		Hombres		Mujeres		Razón H:M
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	
Chetumal	41	0.4	37	0.4	4	0.2	9.3 : 1
Chihuahua	208	1.9	178	2.0	30	1.6	5.9 : 1
Chilpancingo	42	0.4	33	0.4	9	0.5	3.7 : 1
Colima	206	1.9	180	2.0	26	1.4	6.9 : 1
Cozumel	102	0.9	71	0.8	31	1.6	2.3 : 1
Cuernavaca	112	1.0	85	1.0	27	1.4	3.1 : 1
Culiacán	131	1.2	113	1.3	18	0.9	6.3 : 1
Durango	80	0.7	61	0.7	19	1.0	3.2 : 1
Escuinapa	49	0.5	41	0.5	8	0.4	5.1 : 1
Fresnillo Pinacoteca	45	0.4	39	0.4	6	0.3	6.5 : 1
Guadalajara	242	2.2	205	2.3	37	1.9	5.5 : 1
Guadalajara Sur	121	1.1	91	1.0	30	1.6	3.0 : 1
Guadalupe	91	0.8	71	0.8	20	1.0	3.6 : 1
Guamúchil	44	0.4	38	0.4	6	0.3	6.3 : 1
Guasave	67	0.6	56	0.6	11	0.6	5.1 : 1
Hermosillo	166	1.5	140	1.6	26	1.4	5.4 : 1
Huatulco	34	0.3	28	0.3	6	0.3	4.7 : 1
Ixtapa Zihuatanejo	37	0.3	30	0.3	7	0.4	4.3 : 1
La Paz	49	0.5	43	0.5	6	0.3	7.2 : 1
La Piedad	60	0.6	42	0.5	18	0.9	2.3 : 1
Laguna Durango	70	0.6	49	0.6	21	1.1	2.3 : 1
León	193	1.8	159	1.8	34	1.8	4.7 : 1
Los Cabos	34	0.3	27	0.3	7	0.4	3.9 : 1
Los Mochis	69	0.6	65	0.7	4	0.2	16.3 : 1
Manzanillo	53	0.5	42	0.5	11	0.6	3.8 : 1
Mazatlán	96	0.9	81	0.9	15	0.8	5.4 : 1
Mérida	54	0.5	38	0.4	16	0.8	2.4 : 1
Mexicali	142	1.3	117	1.3	25	1.3	4.7 : 1
Monterrey	148	1.4	124	1.4	24	1.3	5.2 : 1
Morelia	62	0.6	55	0.6	7	0.4	7.9 : 1
Nogales	109	1.0	85	1.0	24	1.3	3.5 : 1
Oaxaca	53	0.5	40	0.5	13	0.7	3.1 : 1
Pachuca	107	1.0	92	1.0	15	0.8	6.1 : 1
Piedras Negras	1	0.0	1	0.0	0	0.0	---
Playa del Carmen	24	0.2	20	0.2	4	0.2	5.0 : 1
Poza Rica	47	0.4	39	0.4	8	0.4	4.9 : 1
Puebla	120	1.1	107	1.2	13	0.7	8.2 : 1
Puerto Vallarta	124	1.1	104	1.2	20	1.0	5.2 : 1

(Continúa)

Cuadro 1. Pacientes de Segundo ingreso a tratamiento por Unidad de atención (CIJ, UH y UTUH)
(Continuación)

CIJ	General		Hombres		Mujeres		Razón H:M
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	
Querétaro	129	1.2	101	1.1	28	1.5	3.6 : 1
Reynosa	10	0.1	10	0.1	0	0.0	---
Salamanca	95	0.9	80	0.9	15	0.8	5.3 : 1
Saltillo	181	1.7	150	1.7	31	1.6	4.8 : 1
San Luis Potosí	128	1.2	103	1.2	25	1.3	4.1 : 1
San Nicolás de los Garza	68	0.6	51	0.6	17	0.9	3.0 : 1
Tampico	67	0.6	51	0.6	16	0.8	3.2 : 1
Tapachula	33	0.3	25	0.3	8	0.4	3.1 : 1
Tecomán	54	0.5	42	0.5	12	0.6	3.5 : 1
Tehuacán	56	0.5	48	0.5	8	0.4	6.0 : 1
Tepic	29	0.3	20	0.2	9	0.5	2.2 : 1
Tijuana Guaycura	197	1.8	159	1.8	38	2.0	4.2 : 1
Tijuana Soler	194	1.8	142	1.6	52	2.7	2.7 : 1
Tlaquepaque	223	2.1	174	2.0	49	2.6	3.6 : 1
Tlaxcala	16	0.1	15	0.2	1	0.1	15.0 : 1
Toluca	199	1.8	174	2.0	25	1.3	7.0 : 1
Torreón Oriente	143	1.3	103	1.1	40	2.1	2.6 : 1
Tuxtla Gutiérrez	76	0.7	61	0.7	15	0.8	4.1 : 1
Villahermosa	80	0.7	73	0.8	7	0.4	10.4 : 1
Xalapa	80	0.7	66	0.7	14	0.7	4.7 : 1
Yucatán	159	1.5	132	1.5	27	1.4	4.9 : 1
Zacatecas	113	1.0	96	1.1	17	0.9	5.6 : 1
Zamora	79	0.7	67	0.8	12	0.6	5.6 : 1
Zapopan Kena Moreno	11	0.1	8	0.1	3	0.2	2.7 : 1
Zapopan Norte	209	1.9	177	2.0	32	1.7	5.5 : 1
UH Ciudad Juárez (UMAA)	24	0.2	20	0.2	4	0.2	5.0 : 1
UH Culiacán	29	0.3	29	0.3	0	0.0	---
UH Ixbalanqué	1	0.0	1	0.0	0	0.0	---
UH Jerez	56	0.5	50	0.6	6	0.3	8.3 : 1
UH Monterrey	50	0.5	41	0.5	9	0.5	4.6 : 1
UH Punta Diamante	43	0.4	38	0.4	5	0.3	7.6 : 1
UH Tijuana	68	0.6	58	0.7	10	0.5	5.8 : 1
UH Zapopan	44	0.4	36	0.4	8	0.4	4.5 : 1
UH Zapotlán el Grande	13	0.1	12	0.1	1	0.1	12.0 : 1
UTUH Cd. Juárez	13	0.1	12	0.1	1	0.1	12.0 : 1
UTUH Tijuana	34	0.3	29	0.3	5	0.3	5.8 : 1
Total	10,792	100.0	8,874	100.0	1,918	100.0	4.6 : 1

UH=Unidad de Hospitalización
UTUH=Unidad de Tratamiento para Usuarios de Heroína

Cuadro 2. Sexo

	Frec.	%	Razón H:M
Hombres	8,874	82.2	
Mujeres	1,918	17.8	4.6 : 1
Total	10,792	100.0	

Cuadro 3. Persona que proporciona la información

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Usuario de drogas	4,884	45.3	4,043	45.6	841	43.8
Usuario de drogas y familiares u otras personas	5,908	54.7	4,831	54.4	1,077	56.2
Total	10,792	100.0	8,874	100.0	1,918	100.0

Cuadro 4. Edad de ingreso a tratamiento

	General*			Hombres**			Mujeres***		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Hasta 9 años	4	0.0	0.0	4	0.0	0.0	0	0.0	0.0
10 a 14 años	1,872	17.3	17.3	1,403	15.8	15.8	469	24.5	24.5
15 a 19 años	4,473	41.4	41.4	3,671	41.4	41.4	802	41.8	41.8
20 a 24 años	1,482	13.7	13.7	1,242	14.0	14.0	240	12.5	12.5
25 a 29 años	845	7.8	7.8	726	8.2	8.2	119	6.2	6.2
30 a 34 años	654	6.1	6.1	557	6.3	6.3	97	5.1	5.1
35 a 39 años	504	4.7	4.7	440	5.0	5.0	64	3.3	3.3
40 a 44 años	393	3.6	3.6	350	3.9	3.9	43	2.2	2.2
45 años y más	565	5.2	5.2	481	5.4	5.4	84	4.4	4.4
Total	10,792	100.0	100.0	8,874	100.0	100.0	1,918	100.0	100.0

* $\mu = 22.2$ $\sigma = 10.4$; *Mdn*= 18; *Mo*= 16; Decil1 = 14

** $\mu = 22.6$; $\sigma = 10.5$; *Mdn*= 18; *Mo*= 16; Decil1 = 14

*** $\mu = 20.7$; $\sigma = 9.8$; *Mdn*= 17; *Mo*= 16; Decil1 = 13

Cuadro 5. Estado civil

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Soltero	8,020	74.3	74.3	6,520	73.5	73.5	1,500	78.2	78.2
Casado	948	8.8	8.8	854	9.6	9.6	94	4.9	4.9
Unión libre	1,051	9.7	9.7	873	9.8	9.8	178	9.3	9.3
Separado	621	5.8	5.8	510	5.7	5.7	111	5.8	5.8
Divorciado	118	1.1	1.1	97	1.1	1.1	21	1.1	1.1
Viudo	29	0.3	0.3	16	0.2	0.2	13	0.7	0.7
<i>Sin información</i>	5	0.0	<i>Se omite</i>	4	0.0	<i>Se omite</i>	1	0.1	<i>Se omite</i>
Total	10,792	100.0	100.0	8,874	100.0	100.0	1,918	100.0	100.0

Cuadro 6. Escolaridad

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Ninguna (no sabe leer ni escribir)	37	0.3	0.3	32	0.4	0.4	5	0.3	0.3
Ninguna (sabe leer y escribir)	22	0.2	0.2	17	0.2	0.2	5	0.3	0.3
Primaria incompleta	366	3.4	3.4	318	3.6	3.6	48	2.5	2.5
Primaria completa	522	4.8	4.8	432	4.9	4.9	90	4.7	4.7
Secundaria incompleta	3,117	28.9	28.9	2,481	28.0	28.0	636	33.2	33.2
Secundaria completa	1,507	14.0	14.0	1,290	14.5	14.5	217	11.3	11.3
Estudios técnicos o comerciales incompletos	152	1.4	1.4	130	1.5	1.5	22	1.1	1.1
Estudios técnicos o comerciales completos	120	1.1	1.1	85	1.0	1.0	35	1.8	1.8
Bachillerato incompleto	3,398	31.5	31.5	2,812	31.7	31.7	586	30.6	30.6
Bachillerato completo	661	6.1	6.1	558	6.3	6.3	103	5.4	5.4
Estudios superiores incompletos	641	5.9	5.9	523	5.9	5.9	118	6.2	6.2
Estudios superiores completos	215	2.0	2.0	173	1.9	2.0	42	2.2	2.2
Estudios de posgrado incompletos	8	0.1	0.1	3	0.0	0.0	5	0.3	0.3
Estudios de posgrado completos	21	0.2	0.2	17	0.2	0.2	4	0.2	0.2
<i>Sin información</i>	5	0.0	<i>Se omite</i>	3	0.0	<i>Se omite</i>	2	0.1	<i>Se omite</i>
Total	10,792	100.0	100.0	8,874	100.0	100.0	1,918	100.0	100.0

Cuadro 7. Ocupación

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Desempleado(a)	2,337	21.7	21.7	1,952	22.0	22.0	385	20.1	20.1
Estudiante	4,416	40.9	40.9	3,481	39.2	39.2	935	48.7	48.7
Estudia y trabaja	533	4.9	4.9	462	5.2	5.2	71	3.7	3.7
Trabaja	3,077	28.5	28.5	2,803	31.6	31.6	274	14.3	14.3
Tareas del hogar	368	3.4	3.4	122	1.4	1.4	246	12.8	12.8
Pensionado	61	0.6	0.6	54	0.6	0.6	7	0.4	0.4
Sin información	0	0.0	Se omite	0	0.0	Se omite	0	0.0	Se omite
Total	10,792	100.0	100.0	8,874	100.0	100.0	1,918	100.0	100.0

Cuadro 8. Estrato social

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Alto	81	0.8	0.8	64	0.7	0.7	17	0.9	0.9
Medio alto	868	8.0	8.1	714	8.0	8.1	154	8.0	8.0
Medio	1,473	13.6	13.7	1,200	13.5	13.5	273	14.2	14.2
Medio bajo	5,708	52.9	52.9	4,716	53.1	53.2	992	51.7	51.7
Bajo	2,562	23.7	23.8	2,097	23.6	23.7	465	24.2	24.3
Pobreza extrema o marginación	90	0.8	0.8	74	0.8	0.8	16	0.8	0.8
Sin información	10	0.1	Se omite	9	0.1	Se omite	1	0.1	Se omite
Total	10,792	100.0	100.0	8,874	100.0	100.0	1,918	100.0	100.0

**FACTORES ASOCIADOS A LA DEMANDA DE TRATAMIENTO EN PACIENTES DE SEGUNDO INGRESO
A TRATAMIENTO EN CIJ EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014**

Cuadro 9. Motivos de consulta

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Consumo de drogas ilícitas	9,611	89.1	7,954	89.6	1,657	86.4
Consumo de bebidas alcohólicas	4,353	40.3	3,589	40.4	764	39.8
Consumo de tabaco	3,843	35.6	3,157	35.6	686	35.8
Otro motivo	310	2.9	2,37	2.7	73	3.8
<i>Ningún motivo específico reportado</i>	26	0.2	17	0.2	9	0.5
<i>Usuarios que reportaron dos o más motivos de consulta</i>	4,674	43.3	3,858	43.5	816	42.5

Cuadro 10. Condicionantes de la solicitud de tratamiento

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Por propia iniciativa	3,928	36.4	3,225	36.3	703	36.7
Por condicionamiento o recomendación familiar	4,744	44.0	3,889	43.8	855	44.6
Por recomendación de pares	123	1.1	105	1.2	18	0.9
Por condicionamiento o recomendación escolar	2,452	22.7	1,997	22.5	455	23.7
Por condicionamiento legal	1,004	9.3	888	10.0	116	6.0
Por condicionamiento o recomendación laboral	174	1.6	160	1.8	14	0.7
Por indicación médica	906	8.4	728	8.2	178	9.3
Por solicitud de novia(o)	30	0.3	24	0.3	6	0.3
Otros condicionante de solicitud de tratamiento	302	2.8	229	2.6	73	3.8
<i>Ningún condicionante reportado</i>	174	1.6	140	1.6	34	1.8
<i>Pacientes que reportaron dos o más condicionantes de la solicitud de tratamiento</i>	2,711	25.1	2,245	25.3	466	24.3

Cuadro 11. Antecedentes de acciones contra el consumo de sustancias

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Juramento	534	4.9	475	5.4	59	3.1
Grupo de autoayuda	759	7.0	664	7.5	95	5.0
Internamiento en anexo	1,267	11.7	1,117	12.6	150	7.8
Intervención de emergencia	54	0.5	45	0.5	9	0.5
Programa de mantenimiento	48	0.4	41	0.5	7	0.4
Tratamiento médico no especializado	67	0.6	52	0.6	15	0.8
Tratamiento psiquiátrico o psicoterapéutico ambulatorio	566	5.2	462	5.2	104	5.4
Tratamiento psiquiátrico o psicoterapéutico residencial	216	2.0	175	2.0	41	2.1
Medicina tradicional o alternativa	54	0.5	48	0.5	6	0.3
Intento de interrupción voluntaria del consumo, sin apoyo	3,165	29.3	2,673	30.1	492	25.7
Otras acciones	2,583	23.9	2,070	23.3	513	26.7
<i>Ninguna acción previa reportada</i>	3,055	28.3	2,424	27.3	631	32.9
<i>Pacientes que reportaron dos o más acciones contra el consumo de sustancias antes de solicitar tratamiento en CIJ</i>	1,131	10.5	975	11.0	156	8.1

Cuadro 12. Problemas asociados al consumo de sustancias

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Problemas de salud	4,508	41.8	3,701	41.7	807	42.1
Accidentes o lesiones	1,367	12.7	1,167	13.2	200	10.4
Problemas familiares	8,604	79.7	7,053	79.5	1,551	80.9
Problemas escolares	4,527	41.9	3,644	41.1	883	46.0
Problemas laborales	2,246	20.8	2,024	22.8	222	11.6
Problemas psicológicos	4,170	38.6	3,346	37.7	824	43.0
Problemas legales	2,267	21.0	2,019	22.8	248	12.9
Conducta antisocial o delictiva	1,708	15.8	1,481	16.7	227	11.8
Otros problemas	368	3.4	304	3.4	64	3.3
<i>Ningún problema asociado reportado</i>	456	4.2	383	4.3	73	3.8
<i>Pacientes que reportaron dos o más problemas asociados</i>	8,289	76.8	6,811	76.8	1,478	77.1

CARACTERÍSTICAS DEL CONSUMO DE DROGAS EN PACIENTES DE SEGUNDO INGRESO A TRATAMIENTO EN CIJ EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014

Cuadro 13. Edad de inicio del consumo de tabaco

	General*			Hombres**			Mujeres***		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Hasta 9 años	333	3.1	3.7	292	3.3	3.9	41	2.1	2.6
10 a 14 años	4,957	45.9	55.1	4,063	45.8	54.6	894	46.6	57.3
15 a 19 años	3,329	30.8	37.0	2,784	31.4	37.4	545	28.4	34.9
20 a 24 años	255	2.4	2.8	210	2.4	2.8	45	2.3	2.9
25 a 29 años	68	0.6	0.8	44	0.5	0.6	24	1.3	1.5
30 a 34 años	30	0.3	0.3	25	0.3	0.3	5	0.3	0.3
35 a 39 años	14	0.1	0.2	10	0.1	0.1	4	0.2	0.3
40 a 44 años	7	0.1	0.1	6	0.1	0.1	1	0.1	0.1
45 años y más	5	0.0	0.1	3	0.0	0.0	2	0.1	0.1
No consumió	1,778	16.5	Se omite	1,423	16.0	Se omite	355	18.5	Se omite
Sin información	16	0.1	Se omite	14	0.2	Se omite	2	0.1	Se omite
Total	10,792	100.0	100.0	8,874	100.0	100.0	1,918	100.0	100.0

* $\mu= 14.3$; $\sigma = 3.3$; $Mdn= 14$; $Mo= 13$; Decil1 = 11

** $\mu= 14.2$; $\sigma = 3.2$; $Mdn= 14$; $Mo= 14$; Decil1 = 11

*** $\mu= 14.4$; $\sigma = 3.5$; $Mdn= 14$; $Mo= 13$; Decil1 = 11

Cuadro 14. Edad de inicio del consumo de alcohol

	General*			Hombres**			Mujeres***		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Hasta 9 años	346	3.2	3.7	294	3.3	3.8	52	2.7	3.2
10 a 14 años	4,586	42.5	49.2	3,707	41.8	48.2	879	45.8	54.2
15 a 19 años	4,056	37.6	43.5	3,436	38.7	44.7	620	32.3	38.2
20 a 24 años	239	2.2	2.6	194	2.2	2.5	45	2.3	2.8
25 a 29 años	67	0.6	0.7	52	0.6	0.7	15	0.8	0.9
30 a 34 años	9	0.1	0.1	5	0.1	0.1	4	0.2	0.2
35 a 39 años	4	0.0	0.0	2	0.0	0.0	2	0.1	0.1
40 a 44 años	5	0.0	0.1	1	0.0	0.0	4	0.2	0.2
45 años y más	3	0.0	0.0	1	0.0	0.0	2	0.1	0.1
No consumió	1,460	13.5	Se omite	1,166	13.1	Se omite	294	15.3	Se omite
Sin información	17	0.2	Se omite	16	0.2	Se omite	1	0.1	Se omite
Total	10,792	100.0	100.0	8,874	100.0	100.0	1,918	100.0	100.0

* $\mu= 14.4$; $\sigma = 3.0$; $Mdn= 14$; $Mo= 15$; Decil1 = 12

** $\mu= 14.4$; $\sigma = 2.8$; $Mdn= 14$; $Mo= 15$; Decil1 = 12

*** $\mu= 14.4$; $\sigma = 3.5$; $Mdn= 14$; $Mo= 15$; Decil1 = 11

Cuadro 15. Edad de inicio del consumo de drogas ilícitas

	General*			Hombres**			Mujeres***		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Hasta 9 años	122	1.1	1.1	110	1.2	1.2	12	0.6	0.6
10 a 14 años	4,714	43.7	43.8	3,806	42.9	43.0	908	47.3	47.5
15 a 19 años	4,724	43.8	43.9	3,992	45.0	45.1	732	38.2	38.3
20 a 24 años	644	6.0	6.0	525	5.9	5.9	119	6.2	6.2
25 a 29 años	260	2.4	2.4	201	2.3	2.3	59	3.1	3.1
30 a 34 años	126	1.2	1.2	100	1.1	1.1	26	1.4	1.4
35 a 39 años	80	0.7	0.7	61	0.7	0.7	19	1.0	1.0
40 a 44 años	39	0.4	0.4	27	0.3	0.3	12	0.6	0.6
45 años y más	62	0.6	0.6	36	0.4	0.4	26	1.4	1.4
<i>Sin información</i>	21	0.2	<i>Se omite</i>	16	0.2	<i>Se omite</i>	5	0.3	<i>Se omite</i>
Total	10,792	100.0	100.0	8,874	100.0	100.0	1,918	100.0	100.0

* $\mu = 15.9$; $\sigma = 5.0$; *Mdn*= 15; *Mo*= 14; Decil1 = 12

** $\mu = 15.8$; $\sigma = 4.7$; *Mdn*= 15; *Mo*= 15; Decil1 = 12

*** $\mu = 16.3$; $\sigma = 6.3$; *Mdn*= 15; *Mo*= 14; Decil1 = 12

Cuadro 16. Drogas ilícitas de inicio

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Cannabis	7,987	74.0	6,699	75.5	1,288	67.2
Mariguana	7,981	73.9	6,694	75.4	1,287	67.1
Hachís	6	0.1	5	0.1	1	0.1
Cocaína	981	9.1	854	9.6	127	6.6
Polvo blanco	748	6.9	654	7.4	94	4.9
<i>Crack</i>	232	2.1	199	2.2	33	1.7
Otra presentación	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Inhalables	1,245	11.5	959	10.8	286	14.9
Solventes o removedores	849	7.9	647	7.3	202	10.5
Pegamentos	221	2.0	187	2.1	34	1.8
Esmaltes o pinturas	149	1.4	102	1.1	47	2.5
Otros	26	0.2	23	0.3	3	0.2
Depresores	190	1.8	90	1.0	100	5.2
Benzodiacepinas	179	1.7	84	0.9	95	5.0
<i>Rohypnol</i> [®]	3	0.0	3	0.0	0	0.0
Otros	8	0.1	3	0.0	5	0.3
Estimulantes	285	2.6	205	2.3	80	4.2
Anfetamina	34	0.3	30	0.3	4	0.2
Metanfetaminas	217	2.0	156	1.8	61	3.2
Éxtasis (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas	33	0.3	19	0.2	14	0.7
Otros	1	0.0	0	0.0	1	0.1
Drogas alucinógenas y disociativas	29	0.3	23	0.3	6	0.3
LSD	11	0.1	8	0.1	3	0.2
Plantas alucinógenas y derivados	16	0.1	14	0.2	2	0.1
Otras	2	0.0	1	0.0	1	0.1
Opiáceos	48	0.4	34	0.4	14	0.7
Heroína	33	0.3	28	0.3	5	0.3
Opiáceos Sintéticos	15	0.1	6	0.1	9	0.5
Opio y otros opiáceos	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Otras sustancias de abuso	27	0.3	10	0.1	17	0.9
Con utilidad médica	13	0.1	5	0.1	8	0.4
Otras	14	0.1	5	0.1	9	0.5
Total	10,792	100.0	8,874	100.0	1,918	100.0

Cuadro 17. Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de tabaco y el ingreso a tratamiento en CIJ

	General*			Hombres**			Mujeres***		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
< de un año	694	6.4	7.7	517	5.8	7.0	177	9.2	11.3
1 a 5 años	4,535	42.0	50.4	3,665	41.3	49.3	870	45.4	55.7
6 a 10 años	1,379	12.8	15.3	1,168	13.2	15.7	211	11.0	13.5
11 a 15 años	716	6.6	8.0	606	6.8	8.1	110	5.7	7.0
16 a 20 años	579	5.4	6.4	506	5.7	6.8	73	3.8	4.7
21 a 25 años	372	3.4	4.1	333	3.8	4.5	39	2.0	2.5
26 o más años	723	6.7	8.0	642	7.2	8.6	81	4.2	5.2
No consumió	1,778	16.5	Se omite	1,423	16.0	Se omite	355	18.5	Se omite
Sin información	16	0.1	Se omite	14	0.2	Se omite	2	0.1	Se omite
Total	10,792	100.0	100.0	8,874	100.0	100.0	1,918	100.0	100.0

* $\mu=8.3$; $\sigma=9.9$; $Mdn=4$; $Mo=1$; Decil1 = 1

** $\mu=8.7$; $\sigma=10.2$; $Mdn=4$; $Mo=1$; Decil1 = 1

*** $\mu=6.4$; $\sigma=8.5$; $Mdn=3$; $Mo=1$; Decil1 = < un año

Cuadro 18. Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de alcohol y el ingreso a tratamiento en CIJ

	General*			Hombres**			Mujeres***		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
< de un año	764	7.1	8.2	569	6.4	7.4	195	10.2	12.0
1 a 5 años	4,537	42.0	48.7	3,662	41.3	47.6	875	45.6	53.9
6 a 10 años	1,452	13.5	15.6	1,211	13.6	15.7	241	12.6	14.8
11 a 15 años	803	7.4	8.6	682	7.7	8.9	121	6.3	7.5
16 a 20 años	602	5.6	6.5	532	6.0	6.9	70	3.6	4.3
21 a 25 años	439	4.1	4.7	394	4.4	5.1	45	2.3	2.8
26 o más años	717	6.6	7.7	641	7.2	8.3	76	4.0	4.7
No consumió	1,460	13.5	Se omite	1,166	13.1	Se omite	294	15.3	Se omite
Sin información	18	0.2	Se omite	17	0.2	Se omite	1	0.1	Se omite
Total	10,792	100.0	100.0	8,874	100.0	100.0	1,918	100.0	100.0

* $\mu=8.4$; $\sigma=9.8$; $Mdn=4$; $Mo=1$; Decil1 = 1

** $\mu=8.8$; $\sigma=10.0$; $Mdn=5$; $Mo=1$; Decil1 = 1

*** $\mu=6.3$; $\sigma=8.2$; $Mdn=3$; $Mo=1$; Decil1 = < un año

Cuadro 19. Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de drogas ilícitas y el ingreso a tratamiento en CIJ

	General*			Hombres**			Mujeres***		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
< de un año	1,948	18.1	18.1	1,458	16.4	16.5	490	25.5	25.6
1 a 5 años	5,300	49.1	49.2	4,323	48.7	48.8	977	50.9	51.1
6 a 10 años	1,340	12.4	12.4	1,128	12.7	12.7	212	11.1	11.1
11 a 15 años	741	6.9	6.9	630	7.1	7.1	111	5.8	5.8
16 a 20 años	522	4.8	4.8	479	5.4	5.4	43	2.2	2.2
21 a 25 años	352	3.3	3.3	325	3.7	3.7	27	1.4	1.4
26 o más años	568	5.3	5.3	515	5.8	5.8	53	2.8	2.8
Sin información	21	0.2	Se omite	16	0.2	Se omite	5	0.3	Se omite
Total	10,792	100.0	100.0	8,874	100.0	100.0	1,918	100.0	100.0

* $\mu= 6.4$; $\sigma = 8.7$; $Mdn= 3$; $Mo= 1$; Decil1 = < un año

** $\mu= 6.8$; $\sigma = 9.0$; $Mdn= 3$; $Mo= 1$; Decil1 = < un año

*** $\mu= 4.3$; $\sigma = 6.8$; $Mdn= 2$; $Mo= < un año$; Decil1 = < un año

Cuadro 20. Tipo de consumo de drogas ilícitas

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Experimental	1,207	11.2	11.2	903	10.2	10.2	304	15.8	15.9
Social u ocasional	1,782	16.5	16.6	1,424	16.0	16.1	358	18.7	18.7
Funcional	5,496	50.9	51.0	4,630	52.2	52.3	866	45.2	45.3
Disfuncional	1,879	17.4	17.5	1,574	17.7	17.8	305	15.9	15.9
En remisión	402	3.7	3.7	322	3.6	3.6	80	4.2	4.2
Sin información	26	0.2	Se omite	21	0.2	Se omite	5	0.3	Se omite
Total	10,792	100.0	100.0	8,874	100.0	100.0	1,918	100.0	100.0

**Cuadro 21. Total de drogas consumidas alguna vez en la vida
(Incluye alcohol o tabaco)**

	General*		Hombres**		Mujeres***	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
1 sustancia	666	6.2	523	5.9	143	7.5
2 sustancias	1,130	10.5	907	10.2	223	11.6
3 sustancias	3,383	31.3	2,738	30.9	645	33.6
4 sustancias	2,108	19.5	1,740	19.6	368	19.2
5 sustancias	1,355	12.6	1,126	12.7	229	11.9
6 sustancias	821	7.6	685	7.7	136	7.1
7 sustancias	487	4.5	424	4.8	63	3.3
8 sustancias	367	3.4	318	3.6	49	2.6
9 sustancias	214	2.0	190	2.1	24	1.3
10 sustancias	123	1.1	105	1.2	18	0.9
11 -19 sustancias	138	1.3	118	1.3	20	1.0
Total	10,792	100.0	8,874	100.0	1,918	100.0

* $\mu = 4.1$; $\sigma = 2.1$; $Mdn=4$; $Mo=3$; Decil1 = 2

** $\mu = 4.2$; $\sigma = 2.1$; $Mdn=4$; $Mo=3$; Decil1 = 2

*** $\mu = 3.9$; $\sigma = 2.0$; $Mdn=3$; $Mo=3$; Decil1 = 2

**Cuadro 22. Total de drogas ilícitas consumidas alguna vez en la vida
(No incluye ni alcohol ni tabaco)**

	General*		Hombres**		Mujeres***	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
1 sustancia	4,725	43.8	3,803	42.9	922	48.1
2 sustancias	2,372	22.0	1,945	21.9	427	22.3
3 sustancias	1,476	13.7	1,230	13.9	246	12.8
4 sustancias	860	8.0	715	8.1	145	7.6
5 sustancias	505	4.7	439	4.9	66	3.4
6 sustancias	370	3.4	321	3.6	49	2.6
7 sustancias	215	2.0	192	2.2	23	1.2
8 sustancias	128	1.2	108	1.2	20	1.0
9 sustancias	66	0.6	55	0.6	11	0.6
10 sustancias	36	0.3	31	0.3	5	0.3
11-17 sustancias	39	0.4	35	0.4	4	0.2
Total	10,792	100.0	8,874	100.0	1,918	100.0

* $\mu = 2.4$; $\sigma = 1.9$; $Mdn=2$; $Mo=1$; Decil1 = 1

** $\mu = 2.5$; $\sigma = 1.9$; $Mdn=2$; $Mo=1$; Decil1 = 1

*** $\mu = 2.2$; $\sigma = 1.7$; $Mdn=2$; $Mo=1$; Decil1 = 1

Cuadro 23. Consumo de drogas alguna vez en la vida por sustancia

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Tabaco	9,014	83.5	7,451	84.0	1,563	81.5
Alcohol	9,331	86.5	7,707	86.8	1,624	84.7
Cannabis	9,428	87.4	7,870	88.7	1,558	81.2
Mariguana	9,425	87.3	7,868	88.7	1,557	81.2
Hachís	548	5.1	470	5.3	78	4.1
Cocaína	4,223	39.1	3,634	41.0	589	30.7
Polvo blanco	3,595	33.3	3,089	34.8	506	26.4
<i>Crack</i>	1,939	18.0	1,703	19.2	236	12.3
Otra presentación de cocaína	62	0.6	53	0.6	9	0.5
Inhalables	3,433	31.8	2,822	31.8	611	31.9
Solventes o removedores	2,440	22.6	2,014	22.7	426	22.2
Pegamentos	958	8.9	810	9.1	148	7.7
Esmaltes o pinturas	555	5.1	441	5.0	114	5.9
Otros inhalables	158	1.5	126	1.4	32	1.7
Depresores	1,533	14.2	1,231	13.9	302	15.7
Benzodiazepinas	1,452	13.5	1,161	13.1	291	15.2
<i>Rohypnol</i>	117	1.1	109	1.2	8	0.4
Otros depresores	37	0.3	24	0.3	13	0.7
Estimulantes	2,466	22.9	2,042	23.0	424	22.1
Anfetamina	190	1.8	156	1.8	34	1.8
Metanfetaminas	1,921	17.8	1,620	18.3	301	15.7
<i>Éxtasis</i> (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas	683	6.3	532	6.0	151	7.9
Otros estimulantes	37	0.3	32	0.4	5	0.3
Drogas alucinógenas y disociativas	1,057	9.8	887	10.0	170	8.9
LSD	713	6.6	586	6.6	127	6.6
Plantas alucinógenas y derivados	573	5.3	491	5.5	82	4.3
Otras drogas alucinógenas y disoc.	44	0.4	39	0.4	5	0.3
Opiáceos	407	3.8	346	3.9	61	3.2
Heroína	332	3.1	290	3.3	42	2.2
Opiáceos Sintéticos	59	0.5	43	0.5	16	0.8
Opio y otros opiáceos	36	0.3	32	0.4	4	0.2
Otras sustancias de abuso	175	1.6	122	1.4	53	2.8
Con utilidad médica	76	0.7	52	0.6	24	1.3
Otras sustancias de abuso	102	0.9	72	0.8	30	1.6

**Cuadro 24. Total de drogas consumidas en el último año
(Incluye alcohol o tabaco)**

	General*		Hombres**		Mujeres***	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Ninguna	134	1.2	113	1.3	21	1.1
1 sustancia	1,160	10.7	925	10.4	235	12.3
2 sustancias	2,052	19.0	1,682	19.0	370	19.3
3 sustancias	3,485	32.3	2,888	32.5	597	31.1
4 sustancias	1,848	17.1	1,517	17.1	331	17.3
5 sustancias	974	9.0	813	9.2	161	8.4
6 sustancias	520	4.8	419	4.7	101	5.3
7 sustancias	267	2.5	222	2.5	45	2.3
8 sustancias	168	1.6	138	1.6	30	1.6
9 sustancias	90	0.8	82	0.9	8	0.4
10 sustancias	44	0.4	32	0.4	12	0.6
11-19 sustancias	50	0.5	43	0.5	7	0.4
Total	10,792	100.0	8,874	100.0	1,918	100.0

* $\mu = 3.4$; $\sigma = 1.8$; $Mdn = 3$; $Mo = 3$; Decil1 = 1

** $\mu = 3.4$; $\sigma = 1.8$; $Mdn = 3$; $Mo = 3$; Decil1 = 1

*** $\mu = 3.3$; $\sigma = 1.8$; $Mdn = 3$; $Mo = 3$; Decil1 = 1

**Cuadro 25. Total de drogas ilícitas consumidas en el último año
(No incluye ni alcohol ni tabaco)**

	General*		Hombres**		Mujeres***	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Ninguna	870	8.1	713	8.0	157	8.2
1 sustancia	5,312	49.2	4,356	49.1	956	49.8
2 sustancias	2,260	20.9	1,860	21.0	400	20.9
3 sustancias	1,122	10.4	933	10.5	189	9.9
4 sustancias	576	5.3	467	5.3	109	5.7
5 sustancias	282	2.6	234	2.6	48	2.5
6 sustancias	176	1.6	145	1.6	31	1.6
7 sustancias	97	0.9	89	1.0	8	0.4
8 sustancias	46	0.4	33	0.4	13	0.7
9 sustancias	25	0.2	21	0.2	4	0.2
10 sustancias	9	0.1	6	0.1	3	0.2
11-17 sustancias	17	0.2	17	0.2	0	0.0
Total	10,792	100.0	8,874	100.0	1,918	100.0

* $\mu = 1.8$; $\sigma = 1.5$; $Mdn = 1$; $Mo = 1$; Decil1 = 1

** $\mu = 1.8$; $\sigma = 1.5$; $Mdn = 1$; $Mo = 1$; Decil1 = 1

*** $\mu = 1.8$; $\sigma = 1.5$; $Mdn = 1$; $Mo = 1$; Decil1 = 1

Cuadro 26. Consumo de drogas en los últimos 12 meses por sustancia

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Tabaco	8,121	75.3	6,692	75.4	1,429	74.5
Alcohol	8,517	78.9	7,029	79.2	1,488	77.6
Cannabis	8,093	75.0	6,732	75.9	1,361	71.0
Mariguana	8,092	75.0	6,732	75.9	1,360	70.9
Hachís	351	3.3	296	3.3	55	2.9
Cocaína	2,952	27.4	2,520	28.4	432	22.5
Polvo blanco	2,295	21.3	1,937	21.8	358	18.7
<i>Crack</i>	1,388	12.9	1,220	13.7	168	8.8
Otra presentación de cocaína	38	0.4	30	0.3	8	0.4
Inhalables	2,583	23.9	2,056	23.2	527	27.5
Solventes o removedores	1,815	16.8	1,456	16.4	359	18.7
Pegamentos	653	6.1	529	6.0	124	6.5
Esmaltes o pinturas	394	3.7	302	3.4	92	4.8
Otros inhalables	88	0.8	63	0.7	25	1.3
Depresores	1,092	10.1	845	9.5	247	12.9
Benzodiacepinas	1,055	9.8	817	9.2	238	12.4
<i>Rohypnol</i>	49	0.5	45	0.5	4	0.2
Otros depresores	19	0.2	11	0.1	8	0.4
Estimulantes	1,924	17.8	1,592	17.9	332	17.3
Anfetamina	113	1.0	95	1.1	18	0.9
Metanfetaminas	1,555	14.4	1,307	14.7	248	12.9
<i>Éxtasis</i> (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas	438	4.1	335	3.8	103	5.4
Otros estimulantes	23	0.2	20	0.2	3	0.2
Drogas alucinógenas y disociativas	604	5.6	485	5.5	119	6.2
LSD	426	3.9	334	3.8	92	4.8
Plantas alucinógenas y derivados	268	2.5	223	2.5	45	2.3
Otras drogas alucinógenas y disoc.	18	0.2	15	0.2	3	0.2
Opiáceos	305	2.8	251	2.8	54	2.8
Heroína	255	2.4	218	2.5	37	1.9
Opiáceos Sintéticos	43	0.4	29	0.3	14	0.7
Opio y otros opiáceos	17	0.2	14	0.2	3	0.2
Otras sustancias de abuso	145	1.3	99	1.1	46	2.4
Con utilidad médica	66	0.6	45	0.5	21	1.1
Otras sustancias de abuso	80	0.7	55	0.6	25	1.3

Cuadro 27. Droga de preferencia en los últimos 12 meses, según menciones

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Tabaco	1,201	11.1	11.3	942	10.6	10.8	259	13.5	13.7
Alcohol	1,622	15.0	15.3	1,318	14.9	15.1	304	15.8	16.1
Cannabis	5,176	48.0	48.7	4,411	49.7	50.5	765	39.9	40.5
Mariguana	5,165	47.9	48.6	4,401	49.6	50.4	764	39.8	40.4
Hachís	11	0.1	0.1	10	0.1	0.1	1	0.1	0.1
Cocaína	737	6.8	6.9	646	7.3	7.4	91	4.7	4.8
Polvo blanco	311	2.9	2.9	266	3.0	3.0	45	2.3	2.4
Crack	421	3.9	4.0	376	4.2	4.3	45	2.3	2.4
Otra presentación de cocaína	5	0.0	0.0	4	0.0	0.0	1	0.1	0.1
Inhalables	789	7.3	7.4	562	6.3	6.4	227	11.8	12.0
Solventes o removedores	561	5.2	5.3	400	4.5	4.6	161	8.4	8.5
Pegamentos	135	1.3	1.3	101	1.1	1.2	34	1.8	1.8
Esmaltes o pinturas	71	0.7	0.7	45	0.5	0.5	26	1.4	1.4
Otros inhalables	22	0.2	0.2	16	0.2	0.2	6	0.3	0.3
Depresores	116	1.1	1.1	61	0.7	0.7	55	2.9	2.9
Benzodiacepinas	106	1.0	1.0	59	0.7	0.7	47	2.5	2.5
Rohypnol	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
Otros depresores	10	0.1	0.1	2	0.0	0.0	8	0.4	0.4
Estimulantes	656	6.0	6.1	527	5.9	6.0	125	6.5	6.6
Anfetamina	20	0.2	0.2	18	0.2	0.2	2	0.1	0.1
Metanfetaminas	603	5.6	5.7	490	5.5	5.6	113	5.9	6.0
Éxtasis (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas	29	0.3	0.3	19	0.2	0.2	10	0.5	0.5
Otros estimulantes	4	0.0	0.0	4	0.0	0.0	0	0.0	0.0
Drogas alucinógenas y disociativas	18	0.2	0.2	14	0.2	0.2	4	0.2	0.2
LSD	14	0.1	0.1	10	0.1	0.1	4	0.2	0.2
Plantas alucinógenas y derivados	3	0.0	0.0	3	0.0	0.0	0	0.0	0.0
Otras drogas alucinógenas y disoc.	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0
Opiáceos	184	1.7	1.7	149	1.7	1.7	35	1.8	1.9
Heroína	162	1.5	1.5	139	1.6	1.6	23	1.2	1.2
Opiáceos Sintéticos	16	0.1	0.2	6	0.1	0.1	10	0.5	0.5
Opio y otros opiáceos	6	0.1	0.1	4	0.0	0.0	2	0.1	0.1
Otras sustancias de abuso	16	0.1	0.2	7	0.1	0.1	9	0.5	0.5
Con utilidad médica	11	0.1	0.1	5	0.1	0.1	6	0.3	0.3
Otras sustancias de abuso	5	0.0	0.0	2	0.0	0.0	3	0.2	0.2
Ninguna	110	1.0	1.0	94	1.1	1.1	16	0.8	0.8
No consumió en el último año	134	1.2	Se omite	113	1.3	Se omite	21	1.1	Se omite
Sin Información	33	0.3	Se omite	26	0.3	Se omite	7	0.4	Se omite
Total	10,792	100.0	100.0	8,874	100.0	100.0	1,918	100.0	100.0

Cuadro 28. Droga de mayor impacto en los últimos 12 meses, según menciones

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Tabaco	671	6.2	6.3	523	5.9	6.0	148	7.7	7.8
Alcohol	1,401	13.0	13.2	1,126	12.7	12.9	275	14.3	14.6
Cannabis	4,928	45.7	46.4	4,185	47.2	47.9	743	38.7	39.4
Mariguana	4,914	45.5	46.3	4,174	47.0	47.8	740	38.6	39.2
Hachís	14	0.1	0.1	11	0.1	0.1	3	0.2	0.2
Cocaína	981	9.1	9.2	857	9.7	9.8	124	6.5	6.6
Polvo blanco	410	3.8	3.9	349	3.9	4.0	61	3.2	3.2
Crack	567	5.3	5.3	504	5.7	5.8	63	3.3	3.3
Otra presentación de cocaína	4	0.0	0.0	4	0.0	0.0	0	0.0	0.0
Inhalables	1,156	10.4	10.6	839	9.5	9.6	284	14.8	15.0
Solventes o removedores	782	7.2	7.4	585	6.6	6.7	197	10.3	10.4
Pegamentos	218	2.0	2.1	170	1.9	1.9	48	2.5	2.5
Esmaltes o pinturas	123	1.1	1.2	84	0.9	1.0	39	2.0	2.1
Otros inhalables	33	0.3	0.3	21	0.2	0.2	12	0.6	0.6
Depresores	185	1.7	1.7	110	1.2	1.3	75	3.9	4.0
Benzodiacepinas	168	1.6	1.6	102	1.1	1.2	66	3.4	3.5
Rohypnol	2	0.0	0.0	2	0.0	0.0	0	0.0	0.0
Otros depresores	15	0.1	0.1	6	0.1	0.1	9	0.5	0.5
Estimulantes	981	9.0	9.2	809	9.1	9.3	163	8.5	8.6
Anfetamina	28	0.3	0.3	25	0.3	0.3	3	0.2	0.2
Metanfetaminas	903	8.4	8.5	756	8.5	8.7	147	7.7	7.8
Éxtasis (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas	41	0.4	0.4	28	0.3	0.3	13	0.7	0.7
Otros estimulantes	9	0.1	0.1	7	0.1	0.1	2	0.1	0.1
Drogas alucinógenas y disociativas	33	0.3	0.3	24	0.3	0.3	9	0.5	0.5
LSD	24	0.2	0.2	15	0.2	0.2	9	0.5	0.5
Plantas alucinógenas y derivados	6	0.1	0.1	6	0.1	0.1	0	0.0	0.0
Otras drogas alucinógenas y disoc.	3	0.0	0.0	3	0.0	0.0	0	0.0	0.0
Opiáceos	198	1.8	1.9	162	1.8	1.9	36	1.9	1.9
Heroína	174	1.6	1.6	151	1.7	1.7	23	1.2	1.2
Opiáceos Sintéticos	18	0.2	0.2	7	0.1	0.1	11	0.6	0.6
Opio y otros opiáceos	6	0.1	0.1	4	0.0	0.0	2	0.1	0.1
Otras sustancias de abuso	18	0.2	0.2	9	0.1	0.1	9	0.5	0.5
Con utilidad médica	11	0.1	0.1	5	0.1	0.1	6	0.3	0.3
Otras sustancias de abuso	7	0.1	0.1	4	0.0	0.0	3	0.2	0.2
Ninguna	70	0.6	0.7	62	0.7	0.7	8	0.4	0.4
No consumió en el último año	134	1.2	Se omite	113	1.3	Se omite	21	1.1	Se omite
Sin Información	36	0.3	Se omite	27	0.3	Se omite	9	0.5	Se omite
Total	10,792	100.0	100.0	8,874	100.0	100.0	1,918	100.0	100.0

**Cuadro 29. Uso combinado de drogas en los últimos 12 meses
(No incluye tabaco)**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Si combinó drogas	3,671	34.0	43.6	3,069	34.6	44.1	602	31.4	41.0
No combinó drogas	4,750	44.0	56.4	3,884	43.8	55.9	866	45.2	59.0
<i>No aplica</i>	2,371	22.0	<i>Se omite</i>	1,921	21.6	<i>Se omite</i>	450	23.5	<i>Se omite</i>
Total	10,792	100.0	100.0	8,874	100.0	100.0	1,918	100.0	100.0

**Cuadro 30. Total de drogas consumidas en los últimos 30 días
(Incluye alcohol o tabaco)**

	General*		Hombres**		Mujeres***	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Ninguna	1,063	9.8	840	9.5	223	11.6
1 sustancia	2,650	24.6	2,133	24.0	517	27.0
2 sustancias	3,001	27.8	2,474	27.9	527	27.5
3 sustancias	2,575	23.9	2,184	24.6	391	20.4
4 sustancias	971	9.0	807	9.1	164	8.6
5 sustancias	344	3.2	287	3.2	57	3.0
6 sustancias	129	1.2	96	1.1	33	1.7
7 sustancias	40	0.4	37	0.4	3	0.2
8 sustancias	10	0.1	8	0.1	2	0.1
9 sustancias	4	0.0	3	0.0	1	0.1
10 sustancias	4	0.0	4	0.0	0	0.0
11 sustancias	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Total	10,792	100.0	8,874	100.0	1,918	100.0

* $\mu=2.1$ $\sigma=1.4$; $Mdn=2$; $Mo=2$; Decil1 = 1

** $\mu=2.2$; $\sigma=1.4$; $Mdn=2$; $Mo=2$; Decil1 = 1

*** $\mu=2.0$; $\sigma=1.4$; $Mdn=2$; $Mo=2$; Decil1 = ninguna

**Cuadro 31. Total de drogas ilícitas consumidas en los últimos 30 días
(No incluye ni alcohol ni tabaco)**

	General*		Hombres**		Mujeres***	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Ninguna	3,121	28.9	2,502	28.2	619	32.3
1 sustancia	5,449	50.5	4,540	51.2	909	47.4
2 sustancias	1,531	14.2	1,269	14.3	262	13.7
3 sustancias	452	4.2	370	4.2	82	4.3
4 sustancias	174	1.6	134	1.5	40	2.1
5 sustancias	42	0.4	39	0.4	3	0.2
6 sustancias	14	0.1	12	0.1	2	0.1
7 sustancias	4	0.0	3	0.0	1	0.1
8 sustancias	3	0.0	3	0.0	0	0.0
9 sustancias	1	0.0	1	0.0	0	0.0
10 sustancias	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Total	10,792	100.0	8,874	100.0	1,918	100.0

* $\mu= 1.0$; $\sigma = 0.9$; $Mdn= 1$; $Mo= 1$; Decil1 = ninguna

** $\mu= 1.0$; $\sigma = 0.9$; $Mdn= 1$; $Mo= 1$; Decil1 = ninguna

*** $\mu= 1.0$; $\sigma = 0.9$; $Mdn= 1$; $Mo= 1$; Decil1 = ninguna

Cuadro 32. Consumo de drogas en los últimos 30 días por sustancia

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Tabaco	6,497	60.2	5,409	61.0	1,088	56.7
Alcohol	5,777	53.5	4,809	54.2	968	50.5
Cannabis	5,810	53.8	4,900	55.2	910	47.4
Mariguana	5,806	53.8	4,898	55.2	908	47.3
Hachís	108	1.0	96	1.1	12	0.6
Cocaína	1,362	12.6	1,175	13.2	187	9.7
Polvo blanco	877	8.1	738	8.3	139	7.2
<i>Crack</i>	659	6.1	589	6.6	70	3.6
Otra presentación de cocaína	11	0.1	9	0.1	2	0.1
Inhalables	1,427	13.2	1,105	12.5	322	16.8
Solventes o removedores	1,012	9.4	787	8.9	225	11.7
Pegamentos	324	3.0	249	2.8	75	3.9
Esmaltes o pinturas	172	1.6	130	1.5	42	2.2
Otros inhalables	24	0.2	17	0.2	7	0.4
Depresores	520	4.8	382	4.3	138	7.2
Benzodicepinas	505	4.7	372	4.2	133	6.9
<i>Rohypnol</i>	11	0.1	8	0.1	3	0.2
Otros depresores	9	0.1	4	0.0	5	0.3
Estimulantes	990	9.2	837	9.4	153	8.0
Anfetamina	38	0.4	32	0.4	6	0.3
Metanfetaminas	863	8.0	747	8.4	116	6.0
<i>Éxtasis (MDMA)</i> y Metanfetaminas alucinógenas	114	1.1	80	0.9	34	1.8
Otros estimulantes	7	0.1	6	0.1	1	0.1
Drogas alucinógenas y disociativas	110	1.0	85	1.0	25	1.3
LSD	75	0.7	56	0.6	19	1.0
Plantas alucinógenas y derivados	43	0.4	36	0.4	7	0.4
Otras drogas alucinógenas y disoc.	2	0.0	2	0.0	0	0.0
Opiáceos	177	1.6	138	1.6	39	2.0
Heroína	147	1.4	122	1.4	25	1.3
Opiáceos Sintéticos	30	0.3	18	0.2	12	0.6
Opio y otros opiáceos	3	0.0	1	0.0	2	0.1
Otras sustancias de abuso	87	0.8	57	0.6	30	1.6
Con utilidad médica	39	0.4	24	0.3	15	0.8
Otras sustancias de abuso	49	0.5	34	0.4	15	0.8

Cuadro 33. Frecuencia de episodios de abuso del consumo de tabaco¹ en los últimos 30 días

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Ni una vez	2,094	19.4	32.8	1,746	19.7	32.9	348	18.1	32.4
< de 1 vez a la semana	785	7.3	12.3	637	7.2	12.0	148	7.7	13.8
1 o 2 veces a la semana	716	6.6	11.2	585	6.6	11.0	131	6.8	12.2
Cada tercer día	434	4.0	6.8	372	4.2	7.0	62	3.2	5.8
Diario	2,346	21.7	36.8	1,961	22.1	37.0	385	20.1	35.8
No consumió en los últimos 30 días	4,295	39.8	Se omite	3,465	39.0	Se omite	830	43.3	Se omite
Sin información	122	1.1	Se omite	108	1.2	Se omite	14	0.7	Se omite
Total	10,792	100.0	100.0	8,874	100.0	100.0	1,918	100.0	100.0

¹ Consumo de seis o más cigarrillos en un solo día.**Cuadro 34. Frecuencia de episodios de abuso del consumo de alcohol¹ en los últimos 30 días**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Ni una vez	1,030	9.5	18.2	822	9.3	17.5	208	10.8	22.0
< de 1 vez a la semana	2,072	19.2	36.7	1,720	19.4	36.6	352	18.4	37.2
1 o 2 veces a la semana	1,776	16.5	31.5	1,502	16.9	32.0	274	14.3	28.9
Cada tercer día	401	3.7	7.1	336	3.8	7.2	65	3.4	6.9
Diario	367	3.4	6.5	319	3.6	6.8	48	2.5	5.1
No consumió en los últimos 30 días	5,015	46.5	Se omite	4,065	45.8	Se omite	950	49.5	Se omite
Sin información	131	1.2	Se omite	110	1.2	Se omite	21	1.1	Se omite
Total	10,792	100.0	100.0	8,874	100.0	100.0	1,918	100.0	100.0

¹ Consumo de más de cuatro copas en un día para los hombres y de más de tres copas en un día para las mujeres.**Cuadro 35. Frecuencia de episodios de abuso del consumo de drogas ilícitas¹ en los últimos 30 días**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
< de 1 vez a la semana	1,614	15.0	24.8	1,264	14.2	23.2	350	18.2	32.5
1 o 2 veces a la semana	1,360	12.6	20.9	1,138	12.8	20.9	222	11.6	20.6
Cada tercer día	1,063	9.8	16.3	925	10.4	17.0	138	7.2	12.8
Diario	2,481	23.0	38.1	2,114	23.8	38.9	367	19.1	34.1
No consumió en los últimos 30 días	3,122	28.9	Se omite	2,503	28.2	Se omite	619	32.3	Se omite
Sin información	1,152	10.7	Se omite	930	10.5	Se omite	222	11.6	Se omite
Total	10,792	100.0	100.0	8,874	100.0	100.0	1,918	100.0	100.0

¹ Consumo de cualquier dosis.

GLOSARIO

Droga ilícita de inicio	Es la sustancia ilegal que el usuario refirió como la droga con la cual inicio el consumo de sustancias. No incluye el inicio del consumo con alcohol o tabaco.
Droga de mayor impacto en los últimos 12 meses	Sustancia que el propio usuario de drogas solicitante de tratamiento refiere como la que más problemas le ha ocasionado en los ámbitos de salud, personal, familiar, escolar, laboral o social, en el transcurso del último año.
Droga de preferencia en los últimos 12 meses	Sustancia que el propio usuario solicitante de tratamiento ha elegido o preferido consumir en el transcurso del último año.
Estrato social	Estimación que hace el terapeuta, según su percepción, del estrato al que pertenece el usuario de drogas, considerando aspectos como lugar de residencia, escolaridad, empleo y características manifiestas como higiene y aliño, calidad del vestido, expresión verbal y vocabulario, etc.
Tipo de consumo de drogas ilícitas	Características de consumo de sustancias ilegales según motivo, frecuencia y problemas asociados. No incluye el uso de alcohol y/o tabaco y se clasifica como: experimental, social u ocasional, funcional, disfuncional y en remisión.
Total de drogas consumidas	Número de drogas consumidas (se incluyen las 26 sustancias de seguimiento) en las siguientes categorías: alguna vez en la vida, en el último año y en los últimos 30 días.
Uso combinado de drogas en los últimos 12 meses	Consumo de dos o más sustancias (incluyendo alcohol y cualquier droga ilícita o de uso médico, utilizada sin prescripción, pero excluyendo tabaco) en el transcurso de un mismo día, en el año previo a la solicitud de tratamiento en CIJ.