

**SALUD**

SECRETARÍA DE SALUD



**Centros de  
Integración  
Juvenil, A.C.**

*SISTEMA DE INFORMACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DEL  
CONSUMO DE DROGAS*

**CONSUMO DE SUSTANCIAS EN PACIENTES  
DE PRIMER INGRESO A TRATAMIENTO.  
PRIMER SEMESTRE DEL 2015.  
USUARIOS DE DROGAS ILÍCITAS**

Marina Velázquez Altamirano

Alma Delia Gutiérrez López

Dirección de Investigación y Enseñanza

Subdirección de Investigación

México, Octubre de 2015

**SIECD**

Informe de Investigación 15-07a



## **DIRECTORIO**

---

**PRESIDENTE HONORARIO VITALICIO DEL PATRONATO NACIONAL**

Dr. Jesús Kumate Rodríguez

**PRESIDENTE DEL PATRONATO NACIONAL**

Dr. Roberto Tapia Conyer

**FUNDADORA DE CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL, A.C.**

**Y VICEPRESIDENTA VITALICIA DEL PATRONATO NACIONAL**

Sra. Kena Moreno

**DIRECTORA GENERAL**

Lic. Carmen Fernández Cáceres

**DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE OPERACIÓN Y PATRONATOS**

Dr. José Ángel Prado García

**DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE NORMATIVIDAD**

Dr. Ricardo Sánchez Huesca

**DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA**

Dr. Jaime Arturo Quintanilla Bendek

**SUBDIRECTOR DE INVESTIGACIÓN**

Mtro. David Bruno Díaz Negrete

**JEFA DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA Y EPIDEMIOLÓGICA**

Dra. Solveig Eréndira Rodríguez Kuri

<b>CONTENIDO</b>	<b>PÁG.</b>
ANTECEDENTES	5
MÉTODO	6
CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS	8
FACTORES ASOCIADOS A LA DEMANDA DE TRATAMIENTO	11
CONSUMO DE DROGAS	14
REFERENCIAS	24
CUADROS	27
GLOSARIO	51

## ÍNDICE DE CUADROS

PÁG.

Cuadro 1	Pacientes de primer ingreso a tratamiento por unidad de atención (CIJ)	28
Cuadro 2	Sexo	31
Cuadro 3	Persona que proporciona la información	31
Cuadro 4	Edad de ingreso a tratamiento	31
Cuadro 5	Estado civil	32
Cuadro 6	Escolaridad	32
Cuadro 7	Ocupación	33
Cuadro 8	Estrato social	33
Cuadro 9	Motivos de consulta	34
Cuadro 10	Condicionantes de la solicitud de tratamiento	34
Cuadro 11	Antecedentes de acciones contra el consumo de sustancias	35
Cuadro 12	Problemas asociados al consumo de sustancias	35
Cuadro 13	Edad de inicio del consumo de tabaco	36
Cuadro 14	Edad de inicio del consumo de alcohol	36
Cuadro 15	Edad de inicio del consumo de drogas ilícitas	37
Cuadro 16	Drogas ilícitas de inicio	38
Cuadro 17	Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de tabaco y el ingreso a tratamiento a CIJ	39
Cuadro 18	Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de alcohol y el ingreso a tratamiento a CIJ	39
Cuadro 19	Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de drogas ilícitas y el ingreso a tratamiento a CIJ	40
Cuadro 20	Tipo de consumo de drogas ilícitas	40
Cuadro 21	Total de drogas consumidas alguna vez en la vida (incluye alcohol o tabaco)	41
Cuadro 22	Total de drogas ilícitas consumidas alguna vez en la vida (no incluye ni alcohol ni tabaco)	41
Cuadro 23	Consumo de drogas alguna vez en la vida por sustancia	42
Cuadro 24	Total de drogas consumidas en el último año (incluye alcohol o tabaco)	43
Cuadro 25	Total de drogas ilícitas consumidas en el último año (no incluye ni alcohol ni tabaco)	43
Cuadro 26	Consumo de drogas en los últimos 12 meses por sustancia	44
Cuadro 27	Droga de preferencia en los últimos 12 meses, según menciones	45
Cuadro 28	Droga de mayor impacto en los últimos 12 meses, según menciones	46
Cuadro 29	Uso combinado de drogas en los últimos 12 meses (no incluye tabaco)	47
Cuadro 30	Total de drogas consumidas en los últimos 30 días (incluye alcohol o tabaco)	47
Cuadro 31	Total de drogas ilícitas consumidas en los últimos 30 días (no incluye ni alcohol ni tabaco)	48
Cuadro 32	Consumo de drogas en los últimos 30 días por sustancia	49
Cuadro 33	Frecuencia de episodios de abuso del consumo de Tabaco en los últimos 30 días	50
Cuadro 34	Frecuencia de episodios de abuso del consumo de Alcohol en los últimos 30 días	50
Cuadro 35	Frecuencia de episodios de abuso del consumo de drogas ilícitas en los últimos 30 días	50

## RESUMEN

El informe se realizó con base en 11,804 registros clínicos de la entrevista inicial de usuarios de sustancias psicoactivas que reportaron consumo de al menos una droga ilícita y que acudieron por primera vez a consulta a Centros de Integración Juvenil entre enero y junio de 2015. Los objetivos del estudio son: a) actualizar la información del perfil sociodemográfico de los pacientes, de los factores asociados a la demanda de tratamiento y del patrón de consumo de sustancias; b) contribuir a retroalimentar sistemas nacionales de información del consumo de drogas; c) generar información que oriente el desarrollo de estudios con pacientes o consumidores(as) de drogas en México; y d) contribuir al desarrollo, diseño y ajuste de los servicios institucionales de prevención y tratamiento del consumo de drogas.

Los datos que se presentan en este informe permiten ver que el uso de drogas ilícitas sigue siendo un trastorno que afecta en mayor proporción a la población masculina que solicita tratamiento, en una proporción de 4.3 hombres por cada mujer. La edad media de ingreso a tratamiento fue de 22.2 años. En promedio, los hombres ingresaron a tratamiento a mayor edad que las mujeres (22.3 y 20.7 años, respectivamente). La edad promedio del inicio tanto del consumo de tabaco como de alcohol fue a los 14.3 años, mientras que la de drogas ilícitas a los 15.8 años. Tanto hombres como mujeres iniciaron el consumo de estas sustancias alrededor de las edades mencionadas, lo que muestra que la edad de inicio no presenta diferencias relevantes por sexo.

Las drogas de mayor consumo alguna vez en la vida fueron *cannabis* (87.8%), alcohol (85.5%), tabaco (83.4%), cocaína/*crack* (38.5%), inhalables (29.9%), estimulantes (23.6%, principalmente metanfetaminas: 18.5% y éxtasis: 5.7%), depresores (14.3%), drogas alucinógenas y disociativas (8.8%) y opiáceos (3.5%). En cuanto al consumo en el mes previo al ingreso a tratamiento, las sustancias más utilizadas fueron tabaco (60.3%), alcohol (52.5%), *cannabis* (54.0%), inhalables (12.0%) y cocaína/*crack* (12.4%). Las sustancias de mayor impacto fueron marihuana (47.1%), alcohol (12.5%), metanfetaminas (9.8%), solventes y removedores (6.6%), tabaco (6.0%), *crack* (5.0%) y cocaína en polvo (3.8%).

En cuanto a los factores asociados a la demanda de tratamiento se observó que los usuarios de drogas acudieron principalmente por condicionamiento o recomendación de la familia (46.4%) o por iniciativa propia (35.1%); que solicitaron atención debido a su consumo de drogas ilícitas (89.8%), de alcohol (39.5%) y de tabaco (36.0%); que previo al tratamiento algunos de ellos (29.4%) intentaron interrumpir de manera voluntaria y sin apoyo el consumo y otros (27.9%) no habían tomado ninguna medida contra el problema; y que entre los problemas más frecuentemente asociados al consumo se reconocieron los de tipo familiar (80.0%), los escolares (43.6%), los de salud (41.2%) y los psicológicos (40.1%).

## ANTECEDENTES

Centros de Integración Juvenil ha reportado información epidemiológica del consumo de drogas de los solicitantes de tratamiento desde 1976<sup>1</sup>. En 1983 inicia la aplicación de una cédula homogénea a los pacientes de nuevo ingreso<sup>2</sup>, aunque no es sino a partir de 1990 que la recolección de datos se realiza en forma sistemática<sup>3</sup>, implementándose posteriormente el *Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas* (SIECD), el cual se ha ido consolidando a través de los años y ha realizado el seguimiento oportuno de un conjunto de variables, con las cuales ha podido contribuir en la toma de decisiones del diseño y ajuste de servicios institucionales, además de aportar conocimientos sobre la forma y tendencias del uso de drogas y de aportar información a los Sistemas Epidemiológicos de las Adicciones en el país, como es el caso del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA)<sup>4</sup> de la Secretaría de Salud, del Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas (SRID) –perteneciente al Instituto Nacional de Psiquiatría “*Ramón de la Fuente*” (INP)<sup>5</sup>–, del Observatorio Epidemiológico en Drogas de la Secretaría Salud<sup>6</sup>.

El SIECD, también ha apoyado en el desarrollo de diferentes estudios epidemiológicos especializados, con temas que van desde el perfil de usuarios de drogas y su trayectoria de consumo<sup>7</sup>, el consumo de drogas en las mujeres<sup>8</sup>, en la población infantil<sup>9</sup> o de acuerdo con las etapas de la vida<sup>10</sup>, hasta llegar a los estudios de tendencias<sup>11,12,13,14</sup>. Toda esta información ha facilitado el enfrentamiento oportuno de las problemáticas generadas por el creciente consumo de estimulantes y simultáneamente ha sido de utilidad para apoyar el diseño eficaz de estudios sobre características particulares de los consumidores de estos alcaloides<sup>15,16</sup>.

Por otro lado, la información reportada ha permitido el desarrollo de estudios epidemiológicos particulares enfocados en profundizar en las características del consumo de drogas legales de pacientes atendidos. Así, desde el año 2006, el SIECD genera un informe por separado de las características de los pacientes consumidores de tabaco y alcohol<sup>17</sup>, con lo cual se ha logrado identificar una emergencia epidemiológica del consumo de alcohol entre las pacientes atendidas con relación a los años anteriores<sup>18</sup>; suceso que ha dado pie a CIJ para profundizar en esta problemática<sup>19</sup> y que también ha sido reportado por la Encuesta Nacional de Adicciones (ENA), sobre todo para el caso de las mujeres jóvenes<sup>20</sup>.

Adicionalmente, es importante destacar que la información generada por el SIECD durante el lapso de más de dos décadas ha sido consistente con la de las Encuestas Nacionales de Adicciones (ENA) de este periodo, ya sea en el nivel nacional o en el regional<sup>21</sup> y también ha sido referente para el desarrollo de metodologías de investigación en variados estudios clínicos, psicosociales y evaluativos de la Institución, como es el caso de diversos *Estudios de la Comunidad Objetivo (EBCO)*<sup>22</sup> realizados por los CIJ a lo largo y ancho del país.

El presente informe se elaboró con base en la información obtenida por el SIECD durante el primer semestre de 2015 y tiene el objetivo de proporcionar datos actualizados sobre las características sociodemográficas, factores asociados a la demanda de tratamiento y del patrón de consumo de drogas de los solicitantes de tratamiento, con el propósito adicional de apoyar el diseño, planeación y ajuste de los programas institucionales de prevención, tratamiento y rehabilitación, además de colaborar con otros sistemas de información en drogas y de aportar elementos para el diseño y elaboración de investigaciones en el campo de las adicciones.

## MÉTODO

**Diseño de estudio:** Censo, estudio transversal y descriptivo.

**Población:** 11,804 usuarios de drogas ilícitas procedentes de 107 unidades de CIJ, que acudieron por primera vez a consulta entre enero y junio de 2015 y que proporcionaron personalmente la información (cuadro 1. Anexo).

**Fuente de información:** Formato de Entrevista Inicial, aplicado en la primera consulta por parte del personal médico-técnico responsable del ingreso de pacientes a tratamiento, que forma parte del expediente clínico en cualquiera de sus dos versiones: formato electrónico (base de datos recuperada el día 13 de julio de 2015 a las 8:55 hrs., con 11,580 registros capturados por los/as terapeutas responsables de realizar la entrevista inicial) o formato impreso (224 registros capturados por personal del departamento de Investigación Clínica y Epidemiológica mediante el programa *Control de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas* desarrollado por CIJ).

**Variables de estudio:** Las características sociodemográficas estudiadas comprenden: persona que proporciona la información, sexo, edad de ingreso a tratamiento, estado civil, escolaridad, ocupación y estrato social; las variables de factores asociados a la demanda de tratamiento incluyen: motivo(s) de consulta, condicionante(s) de la solicitud de tratamiento, antecedente(s) de acciones tomadas frente al uso de sustancias y

problema(s) asociado(s) al mismo; y las variables de patrón de consumo: edad de inicio, tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de sustancias y el ingreso a tratamiento, consumo alguna vez en la vida, en el último año y en los últimos 30 días; drogas de preferencia y de mayor impacto en el último año (estas dos últimas variables de acuerdo con el punto de vista del paciente), uso combinado de sustancias, tipo de consumo de drogas ilícitas, episodios de abuso y total de drogas consumidas.

La información sobre el consumo de drogas se presenta categorizada en diez grupos de sustancias que a su vez desagrega a 26 categorías de drogas:

<b>Grupo de Sustancias</b>	<b>Drogas en seguimiento</b>
Tabaco	Cigarrillos
Alcohol	Bebidas alcohólicas
<i>Cannabis</i>	Mariguana y hachís
Cocaína	Cocaína en polvo, <i>crack</i> y otra presentación de cocaína
Inhalables	Solventes y removedores, pegamentos, esmaltes y pinturas y otros inhalables
Depresores	Benzodiacepinas, <i>Rohypnol</i> y otros depresores
Estimulantes	Anfetaminas, metanfetaminas ( <i>crystal</i> o <i>ICE</i> ), MDMA ( <i>éxtasis</i> ) y metanfetaminas alucinógenas; y otros estimulantes
Drogas alucinógenas y disociativas	Ácido lisérgico (LSD), plantas alucinógenas y derivados y otros alucinógenos (PCP y ketamina)
Opiáceos	Heroína, opiáceos sintéticos y opio, y otros opioides
Otras sustancias de abuso	Sustancias con utilidad médica y otras sustancias no identificadas

**Procesamiento de datos.** Para el procesamiento estadístico de la información se utilizó el programa SPSS v.19.

Los resultados se presentan tanto en forma general como desglosada por sexo y en porcentajes válidos, excluyendo los casos “*sin información*” y aquellos que no cumplieron con las condiciones requeridas para el análisis en cada variable de estudio.

## CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS<sup>a</sup>

**Sexo.** La población se conformó por 9,609 hombres y 2,195 mujeres, lo que en porcentaje representa a un 81.4% y un 18.6%, respectivamente. Dando así una proporción aproximada de cuatro hombres (4.3) por cada mujer.

**Persona que proporciona la información.** 61.9% de los pacientes acudieron en compañía de familiares u otras personas (61.5% de los hombres y 63.8% de las mujeres), mientras que en 38.1% lo hicieron solos (38.5% de los hombres y 36.2% de las mujeres).

**Edad de ingreso a tratamiento.** Se observa un rango de edad de 8 a 79 años, con un promedio de 22.2 años y una desviación estándar de diez punto cinco; es decir que cerca del 84% de las personas atendidas (9,961) se encontró entre los 12 y 32 años de edad; la edad mediana de la población fue de 18 años (48.1% de los casos fueron menores de edad; 5,195 sujetos), mientras que la moda se ubicó en 15 años (1,331 personas atendidas).


**Figura 1. Edad de ingreso según sexo**

	 Años	 Años	
<b>Rango</b>	8 a 79	8 a 79	<b><i>Las mujeres ingresaron a tratamiento a menor edad</i></b>
<b>Media</b>	22.3	20.7	
<b>Desviación estándar</b>	10.5	10.2	
<b>Mediana</b>	18	16	
<b>Moda</b>	16	14	

<sup>a</sup> Cfr., Cuadros 1 a 8.


**Estado civil.** La mayor parte de la población refirió ser soltera (75.9%), mientras que 9.0% indicó que vivía en unión libre y 8.5% estaba casada, con leves diferencias entre los sexos.

**Figura 2. Estado civil según sexo**



**Escolaridad.** 47.7% cursaba o había cursado algún grado de educación secundaria, 34.3% al menos algún grado de bachillerato, 7.5% contaba con algún grado escolar de nivel primaria y 7.7% de nivel superior o posgrado.


**Figura 3. Escolaridad según sexo**



*El nivel de escolaridad es ligeramente mayor en hombres que en mujeres*

**Ocupación.** 41.3% se dedicaba a estudiar, 28.4% desempeñaba alguna actividad laboral y 21.8% estaba desempleado.


**Figura 4. Principal ocupación según sexo**



**Estrato social.** Según la percepción de los terapeutas la mitad de los pacientes (50.1%) se ubicaban en el estrato medio bajo, 22.4% en un nivel bajo y 20.5% en el estrato medio.


**Figura 5. Estrato social según sexo**

*Según la percepción de los terapeutas tanto hombres como mujeres presentaron condiciones sociales similares*




## FACTORES ASOCIADOS A LA DEMANDA DE TRATAMIENTO<sup>b</sup>

**Motivos de consulta.** 43.5% de las personas atendidas reportó más de un motivo para acudir a tratamiento (uso de alcohol, tabaco o drogas), mientras que 0.3% no expresó ninguno. El 89.8% de los pacientes acudió por consumo de drogas ilícitas, 39.5% por uso de bebidas alcohólicas y 36% por uso de tabaco.




**Condicionantes de la solicitud de tratamiento.** 25.8% de los casos expresó dos o más condicionantes para acudir a tratamiento; 46.4% acudió por recomendación de la familia, 35.1% por iniciativa propia, 23.2% por condicionamiento o recomendación escolar, 8.9% por condicionamiento legal y 8.0% por indicación médica.



<sup>b</sup> Cfr. Cuadros 9 a 12.

**Antecedentes de acciones contra el consumo de sustancias.** 29.4% de los pacientes expresó que antes de acudir a CIJ había intentado interrumpir el consumo por voluntad propia, 11.3% señaló que previamente había estado internado en algún anexo, 6.9% había acudido a grupos de autoayuda, 4.9% lo había hecho por medio de juramento y 5.1% acudió a algún tipo de tratamiento psiquiátrico o psicoterapéutico. Cabe señalar que 11.1% reportó haber intentado al menos dos formas distintas de acciones para abandonar el consumo de drogas, en tanto que 27.9% expresó que hasta el momento de la solicitud de tratamiento no había tomado ninguna medida en contra del consumo de drogas.


**Figura 8. Antecedentes de acciones contra el consumo de sustancias según sexo**



*Un mayor porcentaje de mujeres ingresaron a CIJ sin haber realizado acciones previas mientras que los hombres intentaron en mayor proporción que las mujeres dejar el consumo voluntariamente o habían recurrido a algún tipo de apoyo no especializado*

**Problemas asociados al consumo de sustancias.** 80.0% de los pacientes señaló problemas de tipo familiar, 43.6% escolares, 41.2% de salud, 40.1% psicológicos, 19.7% laborales, 19.8% legales, 15.2% de conducta antisocial o delictiva y 12.0% accidentes o lesiones. Cabe señalar que 77.3% de las personas atendidas mencionaron dos o más problemas asociados al consumo de sustancias, mientras que 3.8% no reportó ninguno.

**Figura 9. Problemas asociados al consumo de sustancias según sexo**



## CONSUMO DE DROGAS<sup>c</sup>

**Edad de inicio del consumo de sustancias.** La edad promedio de inicio del consumo de tabaco se situó en 14.3 años ( $\sigma=3.3$  años), la mediana en 14 años y la moda en 14 años, mientras que la edad promedio de inicio del consumo de alcohol se ubicó en 14.3 años ( $\sigma=3.0$  años) con una mediana de 14 años y una moda de 15 años. Por su parte, la edad promedio de inicio en el abuso de drogas ilícitas (incluyendo sustancias de uso médico sin prescripción) fue de 15.8 años ( $\sigma=5.2$  años), con una mediana de 15 años y la moda fue de 14 años. Por otra parte, al considerar el primer decil como indicador de las edades de inicio más tempranas, se observa que el consumo de tabaco y de alcohol aparece a los 11 años, mientras que el de drogas ilícitas se presenta un año después.

**Figura 10. Edad de inicio del consumo de sustancias según sexo**

	 Años			 Años		
	Tabaco	Alcohol	Drogas ilícitas	Tabaco	Alcohol	Drogas ilícitas
<b>Promedio</b>	14.3	14.4	15.7	14.3	14.3	16.4
<b>Desviación estándar</b>	3.3	2.9	4.7	3.5	3.4	6.3
<b>Mediana</b>	14	14	15	14	14	14
<b>Moda</b>	14	15	14	14	14	14


**No existen diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a la edad de inicio del consumo de drogas**

**Drogas ilícitas de inicio.** Las sustancias de inicio más reportadas fueron: en primer lugar la cannabis, principalmente en forma de marihuana (75.0%); en segundo lugar los inhalables (10.9%), mayormente en forma de solventes y removedores (7.3%); después la cocaína (8.4%), tanto en forma de polvo blanco (6.5%) como *crack* (1.9); en cuarto lugar aparecen los estimulantes (3.0%), donde destacan las metanfetaminas (2.2%); después aparecen los depresores con utilidad médica (1.7%) siendo las

<sup>c</sup> Cfr., Cuadros 13 a 35

benzodiazepinas las más reportadas (1.6%); y en sexto lugar se ubican los opiáceos (0.4%), entre los cuales sobresale la heroína (37 casos).

**Figura 11. Principales drogas ilícitas de inicio según sexo**




**Lapso transcurrido entre el inicio del consumo de sustancias y el ingreso a tratamiento en CIJ.** El promedio de años entre el inicio de consumo y la solicitud de tratamiento se situó de la siguiente manera: tabaco de 8.2 años ( $\sigma=9.9$  años), alcohol de 8.2 años ( $\sigma=9.8$  años) y drogas ilícitas de 6.2 años ( $\sigma=8.6$  años). Sin embargo, la mitad de los usuarios dejó pasar cuatro años desde el momento en que se inició el consumo de tabaco o alcohol y el momento de acudir a solicitar tratamiento, mientras que la mitad de los usuarios dejaron pasar 3 años desde el inicio de drogas ilegales.

**Figura 12. Lapso transcurrido entre el inicio del consumo de sustancias y el ingreso a tratamiento en CIJ según sexo**

	 Años			 Años		
	Tabaco	Alcohol	Drogas ilícitas	Tabaco	Alcohol	Drogas ilícitas
<b>Promedio</b>	8.7	8.6	6.6	6.8	6.7	4.3
<b>Desviación estándar</b>	10.0	10.0	8.9	9.0	8.8	6.7
<b>Mediana</b>	4	4	3	3	3	2
<b>Moda</b>	1	1	1	1	1	< un año

**Las mujeres solicitaron tratamiento en forma más oportuna**

**Tipo de consumo de drogas ilícitas.** De acuerdo con los terapeutas, 50.2% de los solicitantes de tratamiento fue diagnosticado con consumo funcional, 17.5% con consumo disfuncional, 16.3% con consumo social u ocasional, 12.9% con consumo experimental y 3.2% presentaba remisión del consumo.




**Las mujeres presentaron patrones de consumo de menor gravedad que los hombres**

**Total de drogas consumidas.** El promedio de sustancias utilizadas alguna vez en la vida, incluyendo alcohol o tabaco, fue de 4.1 drogas (93.6% reportó el uso de dos o más sustancias); en el último año fue de 3.3 drogas (87.9% consumió dos o más sustancias); y en los últimos 30 días fue de 2.1 drogas (65.3% reportó haber utilizado dos o más sustancias).

El promedio de sustancias utilizadas alguna vez en la vida, sin incluir alcohol y tabaco, fue de 2.4 drogas (55.4 % reportó el uso de dos o más sustancias); en el último año fue de 1.8 drogas (42.0% consumió dos o más sustancias); y en los últimos 30 días fue de una droga (20.1% reportó haber utilizado dos o más sustancias).

**Figura 14. Total de drogas consumidas según sexo**




*Mujeres y hombres consumieron, en promedio, un número similar de drogas*

**Consumo de drogas alguna vez en la vida.**<sup>d</sup> Las proporciones de consumo alguna vez en la vida de los diez grupos de sustancias fueron: tabaco (83.4%), alcohol (85.5%); *cannabis* (87.8%), cocaína (38.5%), inhalables (29.9%), estimulantes (23.6%), depresores (14.3%), drogas alucinógenas y disociativas (8.8%), opiáceos (3.8%) y otras sustancias de abuso (1.6%).

En cuanto al uso de sustancias específicas (contenidas en alguno de los diez grupos antes mencionados) sobresalen: marihuana (87.7%), cocaína en polvo (33.2%) solventes y removedores (21.2%), *crack* (16.9%), metanfetaminas (18.5%) y benzodiacepinas (13.7%); en menor proporción los pegamentos (8.1%), LSD (6.0%) y *éxtasis* y otras metanfetaminas alucinógenas (5.7%).

**Figura 15. Consumo de drogas alguna vez en la vida según sexo**




<sup>d</sup> Los casos pudieron haber reportado el consumo de dos o más sustancias, por lo que el total de los porcentajes no suma 100%.

**Consumo de drogas en los últimos 12 meses.** 98.6% de las personas reportaron haber consumido alguna sustancia en el año previo a su ingreso a tratamiento en CIJ. Las proporciones de consumo de los diez grupos de sustancias utilizadas en este lapso fueron: alcohol (77.9%), tabaco (75.4%), *cannabis* (75.9%), cocaína (27.0%), inhalables (22.0%), estimulantes (18.7%), depresores (10.4%), drogas alucinógenas y disociativas (5.3%); opiáceos (2.7%) y otras sustancias de abuso (1.1%).

En cuanto al consumo de sustancias específicas contenidas en alguno de los grupos anteriores destacaron: marihuana (75.9%), cocaína en polvo (21.3%), solventes y removedores (15.7%), metanfetaminas (15.2%) y *crack* (12.1%); en menor proporción se refieren a las benzodiacepinas (10.1%) y los pegamentos (5.5%).


**Figura 16. Consumo de drogas en los últimos 12 meses según sexo**



***Las drogas más consumidas en el último año por ambos sexos fueron alcohol, tabaco y cannabis; aunque las mujeres usaron en mayor proporción inhalables, benzodiacepinas, éxtasis y alucinógenos, los hombres reportaron mayor en el resto de las sustancias***


**Droga de preferencia en los últimos 12 meses.** Entre las sustancias más frecuentemente referidas se encontraron: cannabis (49.3%), alcohol (15.4%), tabaco (11.4%), inhalables (6.4%) y metanfetaminas (6.6%). En menores proporciones aparecieron: crack (3.5%), cocaína en polvo (2.7%) y heroína (1.3%).

**Figura 17. Droga de preferencia en los últimos 12 meses según sexo**




**Droga de mayor impacto en los últimos 12 meses.** Las principales sustancias a cuyo consumo los pacientes atribuyeron los mayores daños en la salud, en el bienestar personal y familiar o en el desempeño escolar, laboral o social y por las que pudieron haber solicitado tratamiento se encuentran: *cannabis* (47.2%), alcohol (12.5%), inhalables (9.8%), metanfetaminas (9.8%), tabaco (6.0%), *crack* (5.0%) y cocaína en polvo (3.8%).

**Figura 18. Droga de mayor impacto en los últimos 12 meses según sexo**



**Uso combinado de drogas en los últimos 12 meses.<sup>e</sup>** Al menos en una ocasión en el transcurso del último año y sin tomar en cuenta el consumo de tabaco, poco menos de la mitad de la población (42.7%) reportó el consumo en un mismo día de dos o más sustancias.

**Figura 19. Uso combinado de droga en los últimos 12 meses según sexo**




<sup>e</sup> No se toman en cuenta 2,657 casos (22.5%) que no cumplieron los criterios de inclusión de esta variable; 22.0% de los hombres y 24.8% de las mujeres (ver anexo).

**Consumo de drogas en los últimos 30 días.** Incluyendo alcohol y tabaco, 89.8% de los casos reportaron consumo de sustancias en el mes anterior al ingreso a tratamiento.

Las proporciones de consumo de los diez grupos de sustancias utilizadas en este lapso fueron: tabaco (60.3%), alcohol (52.5%), *cannabis* (54.0%), inhalables (12.0%), cocaína (12.4%), estimulantes (9.8%), depresores (5.1%), opiáceos (1.6%), drogas alucinógenas y disociativas (1.1%) y otras sustancias de abuso (0.6%).

En cuanto al consumo de sustancias específicas destacó el de marihuana con 54.0%, le siguen: solventes/removedores (8.5%), cocaína en polvo (8.1%), metanfetaminas (8.8%) y crack (6.0%); en menor proporción se registra el consumo de benzodiazepinas (5.0%) y pegamentos (2.6%).


**Figura 20. Consumo de drogas en los últimos 30 días según sexo**



***Hombres y mujeres consumieron predominantemente tabaco, alcohol y cannabis -los hombres en mayor proporción. Las mujeres reportaron mayor consumo de inhalables, benzodiazepinas y alucinógenos***

**Frecuencia de episodios de abuso en los últimos 30 días.** 36.0% de quienes reportaron consumo de tabaco en los últimos 30 días aceptó fumar seis o más cigarrillos diariamente. Así mismo, entre quienes consumieron alcohol, la mayor parte (37.4%) reportó consumo abusivo menos de una vez a la semana y una o dos veces a la semana (30.1%). Por otra parte, 37.1% de los usuarios de drogas ilícitas durante el último mes reportaron consumirlas todos los días, 26.3% menos de una vez a la semana y 20.7% una a dos veces a la semana.

**Figura 21. Frecuencia de episodios de abuso en los últimos 30 días según sexo**



*La frecuencia de episodios de abuso de tabaco tiende a ser similar entre los sexos, si bien es mayor el porcentaje de hombres que abusaron de tabaco y drogas ilegales el mes previo al tratamiento*

## REFERENCIAS

1. Sánchez-Huesca, R. y López Granados, L. (1985). ***Características demográficas y patrones de inicio en el consumo de drogas en asistentes a los Centros Locales; recuperación de los archivos de siete años (1976-1982)***. México: Centros de Integración Juvenil, A.C. (reporte interno).
2. Clarac Rengade, P. y Wagner Echeagaray, F. (1987). Análisis de algunas variables en una muestra de pacientes farmacodependientes (1986). En F. Wagner Echeagaray y R. Ortiz Mondragón (Comp.) (1990). ***Estudios acerca de la farmacodependencia en México realizados por Paule Clarac***. México: Centros de Integración Juvenil, A. C. (pp. 111-126).
3. García Aurrecochea, R., Diaz Negrete, B., Balanzario, M. C., Gutiérrez-López, A. Castillo-Franco, I. (1999). Características sociodemográficas y de consumo de drogas en pacientes atendidos entre 1990 y 1997. México: Centros de Integración Juvenil, A.C., Dirección de Promoción Institucional. ***Informe de investigación 98-12***.
4. Secretaría de Salud, Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, Dirección General de Epidemiología. Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (***SISVEA***) ***Informe 2009***. México.
5. Ortiz, A., Martínez, R., Meza, D. (2014) Grupo Interinstitucional para el desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. ***Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas"***. *Tendencias en el área metropolitana No. 55*. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.
6. Diaz, D. B., Balanzario, M. C., Castillo, I., Gutiérrez, A. y García, R. (2001). Uso de drogas entre pacientes de primer ingreso en Centros de Integración Juvenil. En Secretaría de Salud. ***Observatorio Epidemiológico en drogas. El fenómeno de las adicciones en México 2001***. México: Secretaría de Salud (pp. 66-71) (ISBN: 970-721-008-7). [http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/publicaciones/obs2001\\_cap4.pdf](http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/publicaciones/obs2001_cap4.pdf)
7. García-Aurrecochea, R., Diaz-Negrete, B., Balanzario, M. C., Castillo-Franco, I. (1998). ***Perfil y trayectoria del consumo de drogas en pacientes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil en 1996***. En CD: B. D. Diaz Negrete, J. Arellanez, M. C. Balanzario y R. Sánchez Huesca, *Once años de estudios del consumo de drogas en México, Investigaciones realizadas en Centros de Integración Juvenil entre 1997 y 2007*. México: Centros de Integración Juvenil.

8. Castillo Franco, P. I., Gutiérrez López, A. D. (2008). Consumo de drogas en mujeres asistentes a centros de tratamiento especializado en la Ciudad de México. **Salud Mental 31 (5)**, 351-359. <http://scielo.unam.mx/pdf/sm/v31n5/v31n5a3.pdf>
9. Gracia Gutiérrez de Velasco, S. E. y Balanzario Lorenzana, M. C. (2003). El consumo de drogas en menores de 12 años en Centros de Integración Juvenil en el año 2002. México: Centros de Integración Juvenil, A.C., Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación. **Informe de Investigación 03-17**.
10. García Aurrecoechea, R., Castillo Franco, P. I. y Guerrero Huesca, J. A. (2003). El consumo de drogas en pacientes atendidos en Centros de Integración Juvenil según la etapa de vida correspondiente al ingreso a tratamiento. México: Centros de Integración Juvenil, A.C., Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación. **Informe de Investigación 03-13**.
11. García Aurrecoechea, R., Díaz Negrete, B., Balanzario, M. C. (2001). Tendencias del consumo de drogas en pacientes de primer ingreso a tratamiento en CIJ entre 1990 y 1999. México: Centros de Integración Juvenil, A.C., Dirección de Promoción Institucional. **Informe de investigación 2000-06**.
12. Gutiérrez López, AD. (2015). Tendencias del consumo de drogas alguna vez en la vida en Centros de Integración Juvenil. Segundo semestre de 2004 – Segundo semestre de 2014 (Nivel Nacional y Entidades Federativas). México: Centros de Integración Juvenil, A.C., Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación. **Informe de Investigación 15-02e**. <http://www.cij.gob.mx/Programas/Investigacion/pdf/15-02e.pdf>
13. Gutiérrez López, AD. (2015). Tendencias del consumo de drogas en los últimos 30 días en Centros de Integración Juvenil. Segundo semestre de 2004 - Segundo semestre de 2014 (Nivel Nacional y Entidades Federativas). México: Centros de Integración Juvenil, A.C., Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación. **Informe de Investigación 15-02f**. <http://www.cij.gob.mx/Programas/Investigacion/pdf/15-02f.pdf>
14. Gutiérrez López, A. D. (2015). Droga de mayor impacto reportada por usuarios de drogas ilícitas en el año previo a la solicitud de tratamiento en Centros de Integración Juvenil. Segundo semestre de 2004 - Segundo semestre de 2014 (Nivel Nacional y Entidades Federativa). México: Centros de Integración Juvenil, A.C., Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación. **Informe de Investigación 15-02g**. <http://www.cij.gob.mx/Programas/Investigacion/pdf/15-02g.pdf>

15. Jiménez Silvestre K., García Aurrecochea, V. R. y González Sánchez, J. D. (2005). Patrón de Consumo de Cocaína y Crack en pacientes que ingresan a Tratamiento. México: Centros de Integración Juvenil, A.C., Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación. **Informe de investigación 05-07.**
16. Jiménez-Silvestre, K. y Castillo-Vite N.L. Factores de reincidencia en usuarios de cocaína, crack y metanfetaminas en fase de recuperación. México: Centros de Integración Juvenil, A.C., Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación. **Informe de Investigación 04-14.**
17. Gutiérrez López, A. D. y Castillo Franco, P. I. (2007). Características sociodemográficas y de consumo en usuarios de tabaco y alcohol de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil en 2006. México: Centros de Integración Juvenil, A.C., Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación. **Informe de Investigación 07-13.** <http://www.cij.gob.mx/Especialistas/pdf/07-13.pdf>
18. Gutiérrez López, A. D. (2015). Consumo de sustancias en pacientes de primer ingreso a tratamiento. Segundo semestre del 2014. Usuarios de tabaco y alcohol. México: Centros de Integración Juvenil, A.C., Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación. **Informe de Investigación 15-02d.** <http://www.cij.gob.mx/Programas/Investigacion/pdf/15-02d.pdf>
19. Moreno, K. (Coord.) (2010). **Los jóvenes y el alcohol en México. Un problema emergente en mujeres.** México: Centros de Integración Juvenil, A.C.
20. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz; Instituto Nacional de Salud Pública; Secretaría de Salud (2012). **Encuesta Nacional de Adicciones 2011: Reporte de Alcohol.** Medina-Mora ME, Villatoro JA, Fleiz C, Téllez MM, Mendoza LR, Romero M, Gutiérrez JP, Castro M, Hernández M, Tena C, Alvear C y Guisa V. México: INPRFM.
21. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz; Instituto Nacional de Salud Pública; Secretaría de Salud (2012). **Encuesta Nacional de Adicciones 2011: Reporte de Drogas.** Villatoro JA, Medina Mora ME, Fleiz C, Téllez MM, Mendoza LR, Romero M, Gutiérrez JP, Castro M, Hernández M, Tena C, Alvear C y Guisa V. México: INPRFM.
22. CD: **EBCO 2007-2008. Estudio Básico de Comunidad Objetivo Vol. 1 y 2.** México: Centros de Integración Juvenil, A.C., Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación.

---

## **CUADROS**

---

**CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS USUARIOS DE DROGAS DE PRIMER INGRESO A TRATAMIENTO A CIJ EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2015**

**Cuadro 1. Pacientes de primer ingreso por unidad de atención (CIJ, UH y UTH)**

CIJ	General		Hombres		Mujeres		Razón H:M
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	
Álvaro Obregón Norte	115	1.0	88	0.9	27	1.2	3.3 : 1
Álvaro Obregón Oriente	52	0.4	43	0.4	9	0.4	4.8 : 1
Azcapotzalco	158	1.3	135	1.4	23	1.0	5.9 : 1
Benito Juárez	137	1.2	114	1.2	23	1.0	5.0 : 1
Chalco	128	1.1	110	1.1	18	0.8	6.1 : 1
Coyoacán	143	1.2	114	1.2	29	1.3	3.9 : 1
Cuajimalpa	81	0.7	66	0.7	15	0.7	4.4 : 1
Cuauhtémoc Oriente	143	1.2	108	1.1	35	1.6	3.1 : 1
Cuauhtémoc Poniente	183	1.6	140	1.5	43	2.0	3.3 : 1
Ecatepec	190	1.6	164	1.7	26	1.2	6.3 : 1
Gustavo A. Madero Aragón	224	1.9	203	2.1	21	1.0	9.7 : 1
Gustavo A. Madero Norte	163	1.4	140	1.5	23	1.0	6.1 : 1
Gustavo A. Madero Oriente	24	0.2	19	0.2	5	0.2	3.8 : 1
Iztapalapa Oriente	432	3.7	360	3.7	72	3.3	5.0 : 1
Iztapalapa Poniente	148	1.3	112	1.2	36	1.6	3.1 : 1
Miguel Hidalgo	79	0.7	64	0.7	15	0.7	4.3 : 1
Naucalpan	178	1.5	149	1.6	29	1.3	5.1 : 1
Nezahualcóyotl	241	2.0	204	2.1	37	1.7	5.5 : 1
Texcoco	128	1.1	110	1.1	18	0.8	6.1 : 1
Tlalnepantla	166	1.4	140	1.5	26	1.2	5.4 : 1
Tlalpan	154	1.3	123	1.3	31	1.4	4.0 : 1
Toluca	227	1.9	198	2.1	29	1.3	6.8 : 1
Venustiano Carranza	125	1.1	95	1.0	30	1.4	3.2 : 1
Xochimilco	21	0.2	20	0.2	1	0.0	20.0 : 1
UH Ecatepec	66	0.6	65	0.7	1	0.0	65.0 : 1
UH Iztapalapa	86	0.7	77	0.8	9	0.4	8.6 : 1
UH Naucalpan	51	0.4	46	0.5	5	0.2	9.2 : 1
Acapulco	126	1.1	109	1.1	17	0.8	6.4 : 1
Aguascalientes	208	1.8	168	1.7	40	1.8	4.2 : 1
Apodaca	59	0.5	50	0.5	9	0.4	5.6 : 1
Cancún	210	1.8	162	1.7	48	2.2	3.4 : 1
Cd. del Carmen	49	0.4	39	0.4	10	0.5	3.9 : 1
Cd. Juárez Norte	109	0.9	76	0.8	33	1.5	2.3 : 1
Cd. Victoria	26	0.2	24	0.2	2	0.1	12.0 : 1
Celaya	216	1.8	182	1.9	34	1.5	5.4 : 1

*(Continúa)*

**Cuadro 1. Pacientes de primer ingreso a tratamiento por Unidad de atención (CIJ, UH y UTUH)**  
(Continuación)

CIJ	General		Hombres		Mujeres		Razón H:M
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	
Chetumal	38	0.3	33	0.3	5	0.2	6.6 : 1
Chihuahua	280	2.4	224	2.3	56	2.6	4.0 : 1
Chilpancingo	55	0.5	43	0.4	12	0.5	3.6 : 1
Colima	193	1.6	144	1.5	49	2.2	2.9 : 1
Cozumel	94	0.8	74	0.8	20	0.9	3.7 : 1
Cuernavaca	104	0.9	82	0.9	22	1.0	3.7 : 1
Culiacán	142	1.2	124	1.3	18	0.8	6.9 : 1
Durango	115	1.0	84	0.9	31	1.4	2.7 : 1
Escuinapa	51	0.4	39	0.4	12	0.5	3.3 : 1
Fresnillo Pinacoteca	44	0.4	28	0.3	16	0.7	1.8 : 1
Guadalajara Centro	269	2.3	219	2.3	50	2.3	4.4 : 1
Guadalajara Sur	142	1.2	126	1.3	16	0.7	7.9 : 1
Guadalupe	104	0.9	80	0.8	24	1.1	3.3 : 1
Guamúchil	44	0.4	39	0.4	5	0.2	7.8 : 1
Guasave	92	0.8	83	0.9	9	0.4	9.2 : 1
Hermosillo	189	1.6	143	1.5	46	2.1	3.1 : 1
Huatulco	36	0.3	30	0.3	6	0.3	5.0 : 1
Ixtapa Zihuatanejo	56	0.5	51	0.5	5	0.2	10.2 : 1
La Paz	69	0.6	54	0.6	15	0.7	3.6 : 1
La Piedad	38	0.3	27	0.3	11	0.5	2.5 : 1
Laguna Coahuila	2	0.0	2	0.0	0	0.0	---
Laguna Durango	77	0.7	66	0.7	11	0.5	6.0 : 1
León	195	1.7	145	1.5	50	2.3	2.9 : 1
Los Cabos	57	0.5	42	0.4	15	0.7	2.8 : 1
Los Mochis	77	0.7	67	0.7	10	0.5	6.7 : 1
Manzanillo	72	0.6	61	0.6	11	0.5	5.5 : 1
Mazatlán	103	0.9	84	0.9	19	0.9	4.4 : 1
Mérida	61	0.5	47	0.5	14	0.6	3.4 : 1
Mexicali	182	1.5	143	1.5	39	1.8	3.7 : 1
Monterrey	130	1.1	112	1.2	18	0.8	6.2 : 1
Morelia	70	0.6	55	0.6	15	0.7	3.7 : 1
Nogales	141	1.2	122	1.3	19	0.9	6.4 : 1
Oaxaca	89	0.8	75	0.8	14	0.6	5.4 : 1
Pachuca	133	1.1	102	1.1	31	1.4	3.3 : 1
Playa del Carmen	30	0.3	23	0.2	7	0.3	3.3 : 1
Poza Rica	48	0.4	39	0.4	9	0.4	4.3 : 1
Puebla	132	1.1	113	1.2	19	0.9	5.9 : 1
Puerto Vallarta	123	1.0	95	1.0	28	1.3	3.4 : 1

(Continúa)

**Cuadro 1. Pacientes de primer ingreso a tratamiento por Unidad de atención (CIJ, UH y UTUH)**  
(Continuación)

CIJ	General		Hombres		Mujeres		Razón H:M
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	
Querétaro	140	1.2	114	1.2	26	1.2	4.4 : 1
Reynosa	20	0.2	16	0.2	4	0.2	4.0 : 1
Salamanca	107	0.9	89	0.9	18	0.8	4.9 : 1
Saltillo	227	1.9	177	1.8	50	2.3	3.5 : 1
San Luis Potosí	167	1.4	126	1.3	41	1.9	3.1 : 1
San Nicolás de los Garza	69	0.6	62	0.6	7	0.3	8.9 : 1
Tampico	114	1.0	94	1.0	20	0.9	4.7 : 1
Tapachula	33	0.3	28	0.3	5	0.2	5.6 : 1
Tecomán	55	0.5	48	0.5	7	0.3	6.9 : 1
Tehuacán	79	0.7	70	0.7	9	0.4	7.8 : 1
Tepic	34	0.3	25	0.3	9	0.4	2.8 : 1
Tijuana Guaycura	232	2.0	184	1.9	48	2.2	3.8 : 1
Tijuana Soler	202	1.7	149	1.6	53	2.4	2.8 : 1
Tlaquepaque	187	1.6	142	1.5	45	2.1	3.2 : 1
Tlaxcala	28	0.2	24	0.2	4	0.2	6.0 : 1
Torreón Oriente	202	1.7	158	1.6	44	2.0	3.6 : 1
Tuxtla Gutiérrez	75	0.6	66	0.7	9	0.4	7.3 : 1
Villahermosa	59	0.5	46	0.5	13	0.6	3.5 : 1
Xalapa	71	0.6	53	0.6	18	0.8	2.9 : 1
Yucatán	143	1.2	112	1.2	31	1.4	3.6 : 1
Zacatecas	130	1.1	105	1.1	25	1.1	4.2 : 1
Zamora	73	0.6	60	0.6	13	0.6	4.6 : 1
Zapopan Kena Moreno	10	0.1	7	0.1	3	0.1	2.3 : 1
Zapopan Norte	214	1.8	167	1.7	47	2.1	3.6 : 1
UH Ciudad Juárez (UMAA)	23	0.2	20	0.2	3	0.1	6.7 : 1
UH Culiacán	39	0.3	39	0.4	0	0.0	---
UH Jerez	63	0.5	54	0.6	9	0.4	6.0 : 1
UH Monterrey	73	0.6	61	0.6	12	0.5	5.1 : 1
UH Punta Diamante	44	0.4	35	0.4	9	0.4	3.9 : 1
UH Tijuana	56	0.5	43	0.4	13	0.6	3.3 : 1
UH Zapopan	44	0.4	38	0.4	6	0.3	6.3 : 1
UH Zapotlán el Grande	12	0.1	12	0.1	0	0.0	---
UTUH Cd. Juárez	27	0.2	24	0.2	3	0.1	8.0 : 1
UTUH Tijuana	29	0.2	24	0.2	5	0.2	4.8 : 1
<b>Total</b>	<b>11,804</b>	<b>100.0</b>	<b>9,609</b>	<b>100.0</b>	<b>2,195</b>	<b>100.0</b>	<b>4.4 : 1</b>

UH=Unidad de Hospitalización  
UTUH=Unidad de Tratamiento para Usuarios de Heroína

**Cuadro 2. Sexo**

	Frec.	%	Razón H:M
<b>Hombres</b>	9,609	81.4	
<b>Mujeres</b>	2,195	18.6	<b>4.3 : 1</b>
<b>Total</b>	<b>11,804</b>	<b>100.0</b>	

**Cuadro 3. Persona que proporciona la información**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
<b>Usuario de drogas</b>	4,125	38.1	3,395	38.5	730	36.2
<b>Usuario de drogas y familiares u otras personas</b>	6,708	61.9	5,421	61.5	1,287	63.8
<b>Total</b>	<b>11,804</b>	<b>100.0</b>	<b>9,609</b>	<b>100.0</b>	<b>2,195</b>	<b>100.0</b>

**Cuadro 4. Edad de ingreso a tratamiento**

	General*			Hombres**			Mujeres***		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Hasta 9 años	7	0.1	0.1	5	0.1	0.1	2	0.1	0.1
10 a 14 años	2,206	18.7	18.7	1,627	16.9	16.9	579	26.4	26.4
15 a 19 años	4,842	41.0	41.0	3,969	41.3	41.3	873	39.8	39.8
20 a 24 años	1,542	13.1	13.1	1,302	13.5	13.5	240	10.9	10.9
25 a 29 años	960	8.1	8.1	806	8.4	8.4	154	7.0	7.0
30 a 34 años	693	5.9	5.9	582	6.1	6.1	111	5.1	5.1
35 a 39 años	518	4.4	4.4	438	4.6	4.6	80	3.6	3.6
40 a 44 años	409	3.5	3.5	358	3.7	3.7	51	2.3	2.3
45 años y más	627	5.3	5.3	522	5.4	5.4	105	4.8	4.8
<b>Total</b>	<b>11,804</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>9,609</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>2,195</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

\*  $\mu = 22.0$   $\sigma = 10.5$ ;  $Mdn = 18$ ;  $Mo = 15$ ; Decil1 = 14

\*\*  $\mu = 22.3$ ;  $\sigma = 10.5$ ;  $Mdn = 18$ ;  $Mo = 16$ ; Decil1 = 14

\*\*\*  $\mu = 20.7$ ;  $\sigma = 10.2$ ;  $Mdn = 16$ ;  $Mo = 14$ ; Decil1 = 13

**Cuadro 5. Estado civil**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Soltero	8,951	75.8	75.9	7,256	75.5	75.6	1,695	77.2	77.4
Casado	1,007	8.5	8.5	892	9.3	9.3	115	5.2	5.3
Unión libre	1,056	8.9	9.0	868	9.0	9.0	188	8.6	8.6
Separado	609	5.2	5.2	465	4.8	4.8	144	6.6	6.6
Divorciado	128	1.1	1.1	103	1.1	1.1	25	1.1	1.1
Viudo	43	0.4	0.4	20	0.2	0.2	23	1.0	1.1
<i>Sin información</i>	10	0.1	<i>Se omite</i>	5	0.1	<i>Se omite</i>	5	0.2	<i>Se omite</i>
<b>Total</b>	<b>11,804</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>9,609</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>2,195</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

**Cuadro 6. Escolaridad**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Ninguna (no sabe leer ni escribir)	38	0.3	0.3	33	0.3	0.3	5	0.2	0.2
Ninguna (sabe leer y escribir)	28	0.2	0.2	21	0.2	0.2	7	0.3	0.3
Primaria incompleta	372	3.2	3.2	321	3.3	3.3	51	2.3	2.3
Primaria completa	512	4.3	4.3	436	4.5	4.5	76	3.5	3.5
Secundaria incompleta	4,013	34.0	34.0	3,103	32.3	32.3	910	41.5	41.5
Secundaria completa	1,619	13.7	13.7	1,379	14.4	14.4	240	10.9	10.9
Estudios técnicos o comerciales incompletos	164	1.4	1.4	133	1.4	1.4	31	1.4	1.4
Estudios técnicos o comerciales completos	106	0.9	0.9	72	0.7	0.7	34	1.5	1.5
Bachillerato incompleto	3,333	28.2	28.2	2,805	29.2	29.2	528	24.1	24.1
Bachillerato completo	710	6.0	6.0	604	6.3	6.3	106	4.8	4.8
Estudios superiores incompletos	646	5.5	5.5	508	5.3	5.3	138	6.3	6.3
Estudios superiores completos	224	1.9	1.9	173	1.8	1.8	51	2.3	2.3
Estudios de posgrado incompletos	10	0.1	0.1	4	0.0	0.0	6	0.3	0.3
Estudios de posgrado completos	23	0.2	0.2	14	0.1	0.1	9	0.4	0.4
<i>Sin información</i>	6	0.1	0.1	3	0.0	0.0	3	0.1	0.1
<b>Total</b>	<b>11,804</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>9,609</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>2,195</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

**Cuadro 7. Ocupación**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Desempleado(a)	2,571	21.8	21.8	2,201	22.9	22.9	370	16.9	16.9
Estudiante	4,872	41.3	41.3	3,729	38.8	38.9	1,143	52.1	52.1
Estudia y trabaja	553	4.7	4.7	489	5.1	5.1	64	2.9	2.9
Trabaja	3,349	28.4	28.4	3,017	31.4	31.4	332	15.1	15.1
Tareas del hogar	393	3.3	3.3	118	1.2	1.2	275	12.5	12.5
Pensionado	54	0.5	0.5	43	0.4	0.4	11	0.5	0.5
Sin información	12	0.1	Se omite	12	0.1	Se omite	0.0	0.0	Se omite
<b>Total</b>	<b>11,804</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>9,609</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>2,195</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

**Cuadro 8. Estrato social**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Alto	77	0.7	0.7	70	0.7	0.7	7	0.3	0.3
Medio alto	671	5.7	5.7	535	5.6	5.6	136	6.2	6.2
Medio	2,417	20.5	20.5	1,914	19.9	19.9	503	22.9	22.9
Medio bajo	5,905	50.0	50.1	4,845	50.4	50.5	1,060	48.3	48.3
Bajo	2,637	22.3	22.4	2,165	22.5	22.6	472	21.5	21.5
Pobreza extrema o marginación	82	0.7	0.7	66	0.7	0.7	16	0.7	0.7
Sin información	15	0.1	Se omite	14	0.1	Se omite	1	0.0	Se omite
<b>Total</b>	<b>11,804</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>9,609</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>2,195</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

**FACTORES ASOCIADOS A LA DEMANDA DE TRATAMIENTO EN PACIENTES DE PRIMER INGRESO A TRATAMIENTO EN CIJ EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2015**

**Cuadro 9. Motivos de consulta**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Consumo de drogas ilícitas	10,603	89.8	8,699	90.5	1,904	86.7
Consumo de bebidas alcohólicas	4,668	39.5	3,811	39.7	857	39.0
Consumo de tabaco	4,245	36.0	3,464	36.0	781	35.6
Otro motivo	365	3.1	266	2.8	99	4.5
<i>Ningún motivo específico reportado</i>	30	0.3	25	0.3	5	0.2
<i>Usuarios que reportaron dos o más motivos de consulta</i>	5,138	43.5	4,202	43.7	936	42.6

**Cuadro 10. Condicionantes de la solicitud de tratamiento**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Por propia iniciativa	4,142	35.1	3,368	35.1	774	35.3
Por condicionamiento o recomendación familiar	5,479	46.4	4,498	46.8	981	44.7
Por recomendación de pares	153	1.3	120	1.2	33	1.5
Por condicionamiento o recomendación escolar	2,744	23.2	2,152	22.4	592	27.0
Por condicionamiento legal	1,014	8.6	873	9.1	141	6.4
Por condicionamiento o recomendación laboral	228	1.9	220	2.3	8	0.4
Por indicación médica	940	8.0	746	7.8	194	8.8
Por solicitud de novia(o)	37	0.3	27	0.3	10	0.5
Otros condicionante de solicitud de tratamiento	362	3.1	298	3.1	64	2.9
<i>Ningún condicionante reportado</i>	196	1.7	161	1.7	35	1.6
<i>Pacientes que reportaron dos o más condicionantes de la solicitud de tratamiento</i>	3,047	25.8	2,487	25.9	560	25.5

**Cuadro 11. Antecedentes de acciones contra el consumo de sustancias**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Juramento	575	4.9	525	5.5	50	2.3
Grupo de autoayuda	813	6.9	703	7.3	110	5.0
Internamiento en anexo	1,336	11.3	1,173	12.2	163	7.4
Intervención de emergencia	85	0.7	71	0.7	14	0.6
Programa de mantenimiento	71	0.6	60	0.6	11	0.5
Tratamiento médico no especializado	71	0.6	55	0.6	16	0.7
Tratamiento psiquiátrico o psicoterapéutico ambulatorio	602	5.1	457	4.8	145	6.6
Tratamiento psiquiátrico o psicoterapéutico residencial	226	1.9	180	1.9	46	2.1
Medicina tradicional o alternativa	42	0.4	33	0.3	9	0.4
Intento de interrupción voluntaria del consumo, sin apoyo	3,472	29.4	2,904	30.2	568	25.9
Otras acciones	3,067	26.0	2,445	25.4	622	28.3
<i>Ninguna acción previa reportada</i>	3,292	27.9	2,615	27.2	677	30.8
<i>Pacientes que reportaron dos o más acciones contra el consumo de sustancias antes de solicitar tratamiento en CIJ</i>	1,312	11.1	1,134	11.8	178	8.1

**Cuadro 12. Problemas asociados al consumo de sustancias**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Problemas de salud	4,860	41.2	3,946	41.1	914	41.6
Accidentes o lesiones	1,420	12.0	1,190	12.4	230	10.5
Problemas familiares	9,439	80.0	7,697	80.1	1,742	79.4
Problemas escolares	5,149	43.6	4,133	43.0	1,016	46.3
Problemas laborales	2,320	19.7	2,106	21.9	214	9.7
Problemas psicológicos	4,731	40.1	3,771	39.2	960	43.7
Problemas legales	2,338	19.8	2,098	21.8	240	10.9
Conducta antisocial o delictiva	1,796	15.2	1,562	16.3	234	10.7
Otros problemas	401	3.4	319	3.3	82	3.7
<i>Ningún problema asociado reportado</i>	452	3.8	372	3.9	80	3.6
<i>Pacientes que reportaron dos o más problemas asociados</i>	9,124	77.3	7,460	77.6	1,664	75.8

**CARACTERÍSTICAS DEL CONSUMO DE DROGAS EN PACIENTES DE PRIMER INGRESO A TRATAMIENTO EN CIJ EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2015**

**Cuadro 13. Edad de inicio del consumo de tabaco**

	General*			Hombres**			Mujeres***		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Hasta 9 años	329	2.8	3.3	289	3.0	3.6	40	1.8	2.3
10 a 14 años	5,500	46.6	55.9	4,436	46.2	54.8	1,064	48.5	61.0
15 a 19 años	3,596	30.5	36.5	3,037	31.6	37.5	559	25.5	32.1
20 a 24 años	254	2.2	2.6	204	2.1	2.5	50	2.3	2.9
25 a 29 años	98	0.8	1.0	83	0.9	1.0	15	0.7	0.9
30 a 34 años	29	0.2	0.3	25	0.3	0.3	4	0.2	0.2
35 a 39 años	19	0.2	0.2	16	0.2	0.2	3	0.1	0.2
40 a 44 años	11	0.1	0.1	5	0.1	0.1	6	0.3	0.3
45 años y más	7	0.1	0.1	5	0.1	0.1	2	0.1	0.1
No consumió	1,956	16.6	Se omite	1,504	15.7	Se omite	452	20.6	Se omite
Sin información	5	0.0	Se omite	5	0.1	Se omite	0	0.0	Se omite
<b>Total</b>	<b>11,804</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>9,609</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>2,195</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

\*  $\mu= 14.3$ ;  $\sigma = 3.3$ ;  $Mdn= 14$ ;  $Mo= 14$ ; Decil1 = 11

\*\*  $\mu= 14.3$ ;  $\sigma = 3.3$ ;  $Mdn= 14$ ;  $Mo= 14$ ; Decil1 = 11

\*\*\*  $\mu= 14.3$ ;  $\sigma = 3.5$ ;  $Mdn= 14$ ;  $Mo= 14$ ; Decil1 = 11

**Cuadro 14. Edad de inicio del consumo de alcohol**

	General*			Hombres**			Mujeres***		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Hasta 9 años	393	3.3	3.9	328	3.4	4.0	65	3.0	3.6
10 a 14 años	5,055	42.8	50.1	4,036	42.0	48.8	1,019	46.4	56.0
15 a 19 años	4,251	36.0	42.1	3,599	37.5	43.5	652	29.7	35.8
20 a 24 años	303	2.6	3.0	243	2.5	2.9	60	2.7	3.3
25 a 29 años	60	0.5	0.6	45	0.5	0.5	15	0.7	0.8
30 a 34 años	15	0.1	0.1	10	0.1	0.1	5	0.2	0.3
35 a 39 años	5	0.0	0.0	3	0.0	0.0	2	0.1	0.1
40 a 44 años	2	0.0	0.0	1	0.0	0.0	1	0.0	0.1
45 años y más	4	0.0	0.0	2	0.0	0.0	2	0.1	0.1
No consumió	1,709	14.5	Se omite	1,337	13.9	Se omite	372	16.9	Se omite
Sin información	7	0.1	Se omite	5	0.1	Se omite	2	0.1	Se omite
<b>Total</b>	<b>11,804</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>9,609</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>2,195</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

\*  $\mu= 14.3$ ;  $\sigma = 3.0$ ;  $Mdn= 14$ ;  $Mo= 15$ ; Decil1 = 11

\*\*  $\mu= 14.4$ ;  $\sigma = 2.9$ ;  $Mdn= 14$ ;  $Mo= 15$ ; Decil1 = 12

\*\*\*  $\mu= 14.3$ ;  $\sigma = 3.4$ ;  $Mdn= 14$ ;  $Mo= 14$ ; Decil1 = 11

**Cuadro 15. Edad de inicio del consumo de drogas ilícitas**

	General*			Hombres**			Mujeres***		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Hasta 9 años	114	1.0	1.0	105	1.1	1.1	9	0.4	0.4
10 a 14 años	5,376	45.5	45.7	4,290	44.6	44.8	1,086	49.5	49.7
15 a 19 años	5,013	42.5	42.6	4,220	43.9	44.0	793	36.1	36.3
20 a 24 años	649	5.5	5.5	529	5.5	5.5	120	5.5	5.5
25 a 29 años	267	2.3	2.3	203	2.1	2.1	64	2.9	2.9
30 a 34 años	151	1.3	1.3	113	1.2	1.2	38	1.7	1.7
35 a 39 años	81	0.7	0.7	54	0.6	0.6	27	1.2	1.2
40 a 44 años	52	0.4	0.4	34	0.4	0.4	18	0.8	0.8
45 años y más	67	0.6	0.6	35	0.4	0.4	32	1.5	1.5
<i>Sin información</i>	34	0.3	<i>Se omite</i>	26	0.3	<i>Se omite</i>	8	0.4	<i>Se omite</i>
<b>Total</b>	<b>11,804</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>9,609</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>2,195</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

\*  $\mu = 15.8$ ;  $\sigma = 5.2$ ;  $Mdn = 15$ ;  $Mo = 14$ ; Decil1 = 12

\*\*  $\mu = 15.7$ ;  $\sigma = 4.7$ ;  $Mdn = 15$ ;  $Mo = 14$ ; Decil1 = 12

\*\*\*  $\mu = 16.4$ ;  $\sigma = 6.3$ ;  $Mdn = 14$ ;  $Mo = 14$ ; Decil1 = 12

**Cuadro 16. Drogas ilícitas de inicio**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
<b>Cannabis</b>	<b>8,857</b>	<b>75.0</b>	<b>7,335</b>	<b>76.3</b>	<b>1,522</b>	<b>69.3</b>
Mariguana	8,852	75.0	7,331	76.3	1,521	69.3
Hachís	5	0.0	4	0.0	1	0.0
<b>Cocaína</b>	<b>996</b>	<b>8.4</b>	<b>859</b>	<b>8.9</b>	<b>137</b>	<b>6.2</b>
Polvo blanco	773	6.5	665	6.9	108	4.9
<i>Crack</i>	223	1.9	194	2.0	29	1.3
Otra presentación	0	0.0	0	0.0	0	0.0
<b>Inhalables</b>	<b>1,282</b>	<b>10.9</b>	<b>981</b>	<b>10.2</b>	<b>301</b>	<b>13.7</b>
Solventes o removedores	860	7.3	659	6.9	201	9.2
Pegamentos	211	1.8	164	1.7	47	2.1
Esmaltes o pinturas	186	1.6	138	1.4	48	2.2
Otros	25	0.2	20	0.2	5	0.2
<b>Depresores</b>	<b>203</b>	<b>1.7</b>	<b>84</b>	<b>0.9</b>	<b>119</b>	<b>5.4</b>
Benzodiacepinas	193	1.6	79	0.8	114	5.2
<i>Rohypnol</i> <sup>®</sup>	3	0.0	3	0.0	0	0.0
Otros	7	0.1	2	0.0	5	0.2
<b>Estimulantes</b>	<b>354</b>	<b>3.0</b>	<b>270</b>	<b>2.8</b>	<b>84</b>	<b>3.8</b>
Anfetamina	73	0.6	66	0.7	7	0.3
Metanfetaminas	255	2.2	182	1.9	73	3.3
Éxtasis (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas	21	0.2	17	0.2	4	0.2
Otros	5	0.0	5	0.1	0	0.0
<b>Drogas alucinógenas y disociativas</b>	<b>24</b>	<b>0.2</b>	<b>22</b>	<b>0.2</b>	<b>2</b>	<b>0.0</b>
LSD	11	0.1	10	0.1	1	0.0
Plantas alucinógenas y derivados	12	0.1	11	0.1	1	0.0
Otras	1	0.0	1	0.0	0	0.0
<b>Opiáceos</b>	<b>52</b>	<b>0.4</b>	<b>39</b>	<b>0.4</b>	<b>13</b>	<b>0.6</b>
Heroína	37	0.3	30	0.3	7	0.3
Opiáceos Sintéticos	14	0.1	8	0.1	6	0.3
Opio y otros opiáceos	1	0.0	1	0.0	0	0.0
<b>Otras sustancias de abuso</b>	<b>36</b>	<b>0.3</b>	<b>19</b>	<b>0.2</b>	<b>17</b>	<b>0.8</b>
Con utilidad médica	15	0.1	6	0.1	9	0.4
Otras	21	0.2	13	0.1	8	0.4
<b>Total</b>	<b>11,804</b>	<b>100.0</b>	<b>9,609</b>	<b>100.0</b>	<b>2,195</b>	<b>100.0</b>

**Cuadro 17. Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de tabaco y el ingreso a tratamiento en CIJ**

	General*			Hombres**			Mujeres***		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
< de un año	886	7.5	9.0	663	6.9	8.2	223	10.2	12.8
1 a 5 años	4,865	41.2	49.4	3,950	41.1	48.8	915	41.7	52.5
6 a 10 años	1,456	12.3	14.8	1,236	12.9	15.3	220	10.0	12.6
11 a 15 años	856	7.3	8.7	715	7.4	8.8	141	6.4	8.1
16 a 20 años	613	5.2	6.2	516	5.4	6.4	97	4.4	5.6
21 a 25 años	415	3.5	4.2	369	3.8	4.6	46	2.1	2.6
26 o más años	752	6.4	7.6	651	6.8	8.0	101	4.6	5.8
No consumió	1,956	16.6	Se omite	1,504	15.7	Se omite	452	20.6	Se omite
Sin información	5	0.0	Se omite	5	0.1	Se omite	0	0.0	Se omite
<b>Total</b>	<b>11,804</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>9,609</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>2,195</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

\*  $\mu= 8.2$ ;  $\sigma=9.9$ ;  $Mdn= 4$ ;  $Mo= 1$ ; Decil1 = 1

\*\*  $\mu= 8.4$ ;  $\sigma= 10.0$ ;  $Mdn= 4$ ;  $Mo= 1$ ; Decil1 = 1

\*\*\*  $\mu= 6.8$ ;  $\sigma= 9.0$ ;  $Mdn= 3$ ;  $Mo= 1$ ; Decil1 = < un año

**Cuadro 18. Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de alcohol y el ingreso a tratamiento en CIJ**

	General*			Hombres**			Mujeres***		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
< de un año	874	7.4	8.7	664	6.9	8.0	210	9.6	11.5
1 a 5 años	4,871	41.3	48.3	3,904	40.6	47.2	967	44.1	53.1
6 a 10 años	1,635	13.9	16.2	1,383	14.4	16.7	252	11.5	13.8
11 a 15 años	877	7.4	8.7	737	7.7	8.9	140	6.4	7.7
16 a 20 años	621	5.3	6.2	519	5.4	6.3	102	4.6	5.6
21 a 25 años	425	3.6	4.2	371	3.9	4.5	54	2.5	3.0
26 o más años	785	6.7	7.8	689	7.2	8.3	96	4.4	5.3
No consumió	1,709	14.5	Se omite	1,337	13.9	Se omite	372	16.9	Se omite
Sin información	7	.1	Se omite	5	0.1	Se omite	2	0.1	Se omite
<b>Total</b>	<b>11,804</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>9,609</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>2,195</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

\*  $\mu= 8.2$ ;  $\sigma= 9.8$ ;  $Mdn= 4$ ;  $Mo= 1$ ; Decil1 = 1

\*\*  $\mu= 8.6$ ;  $\sigma= 10.0$ ;  $Mdn= 4$ ;  $Mo= 1$ ; Decil1 = 1

\*\*\*  $\mu= 6.7$ ;  $\sigma= 8.8$ ;  $Mdn= 3$ ;  $Mo= 1$ ; Decil1 = < un año

**Cuadro 19. Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de drogas ilícitas y el ingreso a tratamiento en CIJ**

	General*			Hombres**			Mujeres***		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
< de un año	2,236	18.9	19.0	1,659	17.3	17.3	577	26.3	26.4
1 a 5 años	5,696	48.3	48.4	4,582	47.7	47.8	1,114	50.8	50.9
6 a 10 años	1,502	12.7	12.8	1,294	13.5	13.5	208	9.5	9.5
11 a 15 años	793	6.7	6.7	663	6.9	6.9	130	5.9	5.9
16 a 20 años	590	5.0	5.0	521	5.4	5.4	69	3.1	3.2
21 a 25 años	370	3.1	3.1	332	3.5	3.5	38	1.7	1.7
26 o más años	581	4.9	4.9	530	5.5	5.5	51	2.3	2.3
Sin información	36	0.3	Se omite	28	0.3	Se omite	8	0.4	Se omite
<b>Total</b>	<b>11,804</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>9,609</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>2,195</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

\*  $\mu=6.2$ ;  $\sigma=8.6$ ;  $Mdn=3$ ;  $Mo=< \text{un año}$ ; Decil1 = < un año

\*\*  $\mu=6.6$ ;  $\sigma=8.9$ ;  $Mdn=3$ ;  $Mo=1$ ; Decil1 = < un año

\*\*\*  $\mu=4.3$ ;  $\sigma=6.7$ ;  $Mdn=2$ ;  $Mo=< \text{un año}$ ; Decil1 = < un año

**Cuadro 20. Tipo de consumo de drogas ilícitas**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Experimental	1,521	12.9	12.9	1,093	11.4	11.4	428	19.5	19.6
Social u ocasional	1,914	16.2	16.3	1,524	15.9	15.9	390	17.8	17.8
Funcional	5,903	50.0	50.2	4,893	50.9	51.1	1,010	46.0	46.2
Disfuncional	2,055	17.4	17.5	1,763	18.3	18.4	292	13.3	13.4
En remisión	374	3.2	3.2	308	3.2	3.2	66	3.0	3.0
Sin información	37	0.3	Se omite	28	0.3	Se omite	9	0.4	Se omite
<b>Total</b>	<b>11,804</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>9,609</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>2,195</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

**Cuadro 21. Total de drogas consumidas alguna vez en la vida  
(Incluye alcohol o tabaco)**

	General*		Hombres**		Mujeres***	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
1 sustancia	757	6.4	571	5.9	186	8.5
2 sustancias	1,265	10.7	992	10.3	273	12.4
3 sustancias	3,777	32.0	3,060	31.8	717	32.7
4 sustancias	2,244	19.0	1,806	18.8	438	20.0
5 sustancias	1,485	12.6	1,229	12.8	256	11.7
6 sustancias	882	7.5	748	7.8	134	6.1
7 sustancias	581	4.9	500	5.2	81	3.7
8 sustancias	337	2.9	286	3.0	51	2.3
9 sustancias	212	1.8	176	1.8	36	1.6
10 sustancias	126	1.1	117	1.2	9	0.4
11-17 sustancias	138	1.2	124	1.3	14	0.6
<b>Total</b>	<b>11,804</b>	<b>100.0</b>	<b>9,609</b>	<b>100.0</b>	<b>2,195</b>	<b>100.0</b>

\*  $\mu = 4.1$ ;  $\sigma = 2.1$ ;  $Mdn=4$ ;  $Mo= 3$ ; Decil1 = 2

\*\*  $\mu = 4.1$ ;  $\sigma = 2.1$ ;  $Mdn= 4$ ;  $Mo= 3$ ; Decil1 = 2

\*\*\*  $\mu = 3.8$ ;  $\sigma = 1.9$ ;  $Mdn= 3$ ;  $Mo= 3$ ; Decil1 = 2

**Cuadro 22. Total de drogas ilícitas consumidas alguna vez en la vida  
(No incluye ni alcohol ni tabaco)**

	General*		Hombres**		Mujeres***	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
1 sustancia	5,265	44.6	4,196	43.7	1,069	48.7
2 sustancias	2,584	21.9	2,083	21.7	501	22.8
3 sustancias	1,592	13.5	1,309	13.6	283	12.9
4 sustancias	928	7.9	784	8.2	144	6.6
5 sustancias	602	5.1	516	5.4	86	3.9
6 sustancias	352	3.0	300	3.1	52	2.4
7 sustancias	215	1.8	179	1.9	36	1.6
8 sustancias	126	1.1	116	1.2	10	0.5
9 sustancias	59	0.5	54	0.6	5	0.2
10 sustancias	43	0.4	37	0.4	6	0.3
11-15 sustancias	38	0.3	35	0.4	3	0.1
<b>Total</b>	<b>11,804</b>	<b>100.0</b>	<b>9,609</b>	<b>100.0</b>	<b>2,195</b>	<b>100.0</b>

\*  $\mu = 2.4$ ;  $\sigma = 1.8$ ;  $Mdn=2$ ;  $Mo= 1$ ; Decil1 = 1

\*\*  $\mu = 2.4$ ;  $\sigma = 1.9$ ;  $Mdn=2$ ;  $Mo= 1$ ; Decil1 = 1

\*\*\*  $\mu = 2.1$ ;  $\sigma = 1.6$ ;  $Mdn=2$ ;  $Mo= 1$ ; Decil1 = 1

**Cuadro 23. Consumo de drogas alguna vez en la vida por sustancia**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
<b>Tabaco</b>	<b>9,848</b>	<b>83.4</b>	<b>8,105</b>	<b>84.3</b>	<b>1,743</b>	<b>79.4</b>
<b>Alcohol</b>	<b>10,095</b>	<b>85.5</b>	<b>8,272</b>	<b>86.1</b>	<b>1,823</b>	<b>83.1</b>
<b>Cannabis</b>	<b>10,359</b>	<b>87.8</b>	<b>8,557</b>	<b>89.1</b>	<b>1,802</b>	<b>82.1</b>
Mariguana	10,358	87.7	8,556	89.0	1,802	82.1
Hachís	607	5.1	524	5.5	83	3.8
<b>Cocaína</b>	<b>4,540</b>	<b>38.5</b>	<b>3,877</b>	<b>40.3</b>	<b>663</b>	<b>30.2</b>
Polvo blanco	3,918	33.2	3,330	34.7	588	26.8
<i>Crack</i>	1,998	16.9	1,769	18.4	229	10.4
Otra presentación de cocaína	57	0.5	49	0.5	8	0.4
<b>Inhalables</b>	<b>3,533</b>	<b>29.9</b>	<b>2,903</b>	<b>30.2</b>	<b>630</b>	<b>28.7</b>
Solventes o removedores	2,506	21.2	2,078	21.6	428	19.5
Pegamentos	959	8.1	804	8.4	155	7.1
Esmaltes o pinturas	600	5.1	465	4.8	135	6.2
Otros inhalables	164	1.4	140	1.5	24	1.1
<b>Depresores</b>	<b>1,688</b>	<b>14.3</b>	<b>1,340</b>	<b>13.9</b>	<b>348</b>	<b>15.9</b>
Benzodiazepinas	1,616	13.7	1,277	13.3	339	15.4
<i>Rohypnol</i>	108	0.9	103	1.1	5	0.2
Otros depresores	26	0.2	16	0.2	10	0.5
<b>Estimulantes</b>	<b>2,780</b>	<b>23.6</b>	<b>2,293</b>	<b>23.9</b>	<b>487</b>	<b>22.2</b>
Anfetamina	245	2.1	202	2.1	43	2.0
Metanfetaminas	2,185	18.5	1,806	18.8	379	17.3
<i>Éxtasis</i> (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas	673	5.7	535	5.6	138	6.3
Otros estimulantes	30	0.3	28	0.3	2	0.1
<b>Drogas alucinógenas y disociativas</b>	<b>1,038</b>	<b>8.8</b>	<b>854</b>	<b>8.9</b>	<b>184</b>	<b>8.4</b>
LSD	711	6.0	570	5.9	141	6.4
Plantas alucinógenas y derivados	527	4.5	448	4.7	79	3.6
Otras drogas alucinógenas y disoc.	51	0.4	47	0.5	4	0.2
<b>Opiáceos</b>	<b>419</b>	<b>3.5</b>	<b>356</b>	<b>3.7</b>	<b>63</b>	<b>2.9</b>
Heroína	362	3.1	313	3.3	49	2.2
Opiáceos Sintéticos	42	0.4	30	0.3	12	0.5
Opio y otros opiáceos	41	0.3	35	0.4	6	0.3
<b>Otras sustancias de abuso</b>	<b>190</b>	<b>1.6</b>	<b>137</b>	<b>1.4</b>	<b>53</b>	<b>2.4</b>
Con utilidad médica	57	0.5	41	0.4	16	0.7
Otras sustancias de abuso	133	1.1	96	1.0	37	1.7

**Cuadro 24. Total de drogas consumidas en el último año  
(Incluye alcohol o tabaco)**

	General*		Hombres**		Mujeres***	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Ninguna	166	1.4	133	1.4	33	1.5
1 sustancia	1,265	10.7	989	10.3	276	12.6
2 sustancias	2,261	19.2	1,795	18.7	466	21.2
3 sustancias	3,863	32.7	3,174	33.0	689	31.4
4 sustancias	1,981	16.8	1,615	16.8	366	16.7
5 sustancias	1,061	9.0	876	9.1	185	8.4
6 sustancias	540	4.6	454	4.7	86	3.9
7 sustancias	310	2.6	264	2.7	46	2.1
8 sustancias	165	1.4	139	1.4	26	1.2
9 sustancias	105	0.9	89	0.9	16	0.7
10 sustancias	46	0.4	43	0.4	3	0.1
11-15 sustancias	41	0.3	38	0.4	3	0.1
<b>Total</b>	<b>11,804</b>	<b>100.0</b>	<b>9,609</b>	<b>100.0</b>	<b>2,195</b>	<b>100.0</b>

\*  $\mu = 3.3$ ;  $\sigma = 1.8$ ;  $Mdn = 3$ ;  $Mo = 3$ ; Decil1 = 1

\*\*  $\mu = 3.4$ ;  $\sigma = 1.8$ ;  $Mdn = 3$ ;  $Mo = 3$ ; Decil1 = 1

\*\*\*  $\mu = 3.2$ ;  $\sigma = 1.7$ ;  $Mdn = 3$ ;  $Mo = 3$ ; Decil1 = 1

**Cuadro 25. Total de drogas ilícitas consumidas en el último año  
(No incluye ni alcohol ni tabaco)**

	General*		Hombres**		Mujeres***	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Ninguna	934	7.9	751	7.8	183	8.3
1 sustancia	5,910	50.1	4,770	49.6	1,140	51.9
2 sustancias	2,431	20.6	1,981	20.6	450	20.5
3 sustancias	1,209	10.2	988	10.3	221	10.1
4 sustancias	607	5.1	511	5.3	96	4.4
5 sustancias	338	2.9	282	2.9	56	2.6
6 sustancias	177	1.5	151	1.6	26	1.2
7 sustancias	107	0.9	91	0.9	16	0.7
8 sustancias	50	0.4	46	0.5	4	0.2
9 sustancias	17	0.1	15	0.2	2	0.1
10 sustancias	13	0.1	12	0.1	1	0.0
11-13 sustancias	11	0.1	11	0.1	0	0.0
<b>Total</b>	<b>11,804</b>	<b>100.0</b>	<b>9,609</b>	<b>100.0</b>	<b>2,195</b>	<b>100.0</b>

\*  $\mu = 1.8$ ;  $\sigma = 1.5$ ;  $Mdn = 1$ ;  $Mo = 1$ ; Decil1 = 1

\*\*  $\mu = 1.8$ ;  $\sigma = 1.5$ ;  $Mdn = 1$ ;  $Mo = 1$ ; Decil1 = 1

\*\*\*  $\mu = 1.7$ ;  $\sigma = 1.3$ ;  $Mdn = 1$ ;  $Mo = 1$ ; Decil1 = 1

**Cuadro 26. Consumo de drogas en los últimos 12 meses por sustancia**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
<b>Tabaco</b>	<b>8,899</b>	<b>75.4</b>	<b>7,319</b>	<b>76.2</b>	<b>1,580</b>	<b>72.0</b>
<b>Alcohol</b>	<b>9,194</b>	<b>77.9</b>	<b>7,551</b>	<b>78.6</b>	<b>1,643</b>	<b>74.9</b>
<b>Cannabis</b>	<b>8,963</b>	<b>75.9</b>	<b>7,400</b>	<b>77.0</b>	<b>1,563</b>	<b>71.2</b>
Mariguana	8,961	75.9	7,398	77.0	1,563	71.2
Hachís	390	3.3	342	3.6	48	2.2
<b>Cocaína</b>	<b>3,190</b>	<b>27.0</b>	<b>2,708</b>	<b>28.2</b>	<b>482</b>	<b>22.0</b>
Polvo blanco	2,517	21.3	2,111	22.0	406	18.5
<i>Crack</i>	1,426	12.1	1,260	13.1	166	7.6
Otra presentación de cocaína	35	0.3	29	0.3	6	0.3
<b>Inhalables</b>	<b>2,601</b>	<b>22.0</b>	<b>2,101</b>	<b>21.9</b>	<b>500</b>	<b>22.8</b>
Solventes o removedores	1,851	15.7	1,510	15.7	341	15.5
Pegamentos	647	5.5	527	5.5	120	5.5
Esmaltes o pinturas	414	3.5	316	3.3	98	4.5
Otros inhalables	79	0.7	67	0.7	12	0.5
<b>Depresores</b>	<b>1,223</b>	<b>10.4</b>	<b>948</b>	<b>9.9</b>	<b>275</b>	<b>12.5</b>
Benzodiacepinas	1,188	10.1	918	9.6	270	12.3
<i>Rohypnol</i>	40	0.3	39	0.4	1	0.0
Otros depresores	18	0.2	10	0.1	8	0.4
<b>Estimulantes</b>	<b>2,202</b>	<b>18.7</b>	<b>1,808</b>	<b>18.8</b>	<b>394</b>	<b>17.9</b>
Anfetamina	172	1.5	146	1.5	26	1.2
Metanfetaminas	1,795	15.2	1,473	15.3	322	14.7
<i>Éxtasis</i> (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas	395	3.3	308	3.2	87	4.0
Otros estimulantes	18	0.2	16	0.2	2	0.1
<b>Drogas alucinógenas y disociativas</b>	<b>627</b>	<b>5.3</b>	<b>512</b>	<b>5.3</b>	<b>115</b>	<b>5.2</b>
LSD	469	4.0	379	3.9	90	4.1
Plantas alucinógenas y derivados	246	2.1	209	2.2	37	1.7
Otras drogas alucinógenas y disoc.	21	0.2	20	0.2	1	0.0
<b>Opiáceos</b>	<b>313</b>	<b>2.7</b>	<b>264</b>	<b>2.7</b>	<b>49</b>	<b>2.2</b>
Heroína	270	2.3	234	2.4	36	1.6
Opiáceos Sintéticos	34	0.3	24	0.2	10	0.5
Opio y otros opiáceos	21	0.2	17	0.2	4	0.2
<b>Otras sustancias de abuso</b>	<b>133</b>	<b>1.1</b>	<b>92</b>	<b>1.0</b>	<b>41</b>	<b>1.9</b>
Con utilidad médica	38	0.3	28	0.3	10	0.5
Otras sustancias de abuso	95	0.8	64	0.7	31	1.4

**Cuadro 27. Droga de preferencia en los últimos 12 meses, según menciones**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
<b>Tabaco</b>	1,321	11.2	11.4	1,027	10.7	10.9	294	13.4	13.6
<b>Alcohol</b>	1,790	15.2	15.4	1,424	14.8	15.1	366	16.7	17.0
<b>Cannabis</b>	<b>5,717</b>	<b>48.4</b>	<b>49.3</b>	<b>4,822</b>	<b>50.2</b>	<b>51.1</b>	<b>895</b>	<b>40.8</b>	<b>41.6</b>
Mariguana	5,707	48.3	49.2	4,816	50.1	51.0	891	40.6	41.4
Hachís	10	0.1	0.1	6	0.1	0.1	4	0.2	0.2
<b>Cocaína</b>	<b>729</b>	<b>6.2</b>	<b>6.3</b>	<b>642</b>	<b>6.7</b>	<b>6.8</b>	<b>87</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
Polvo blanco	315	2.7	2.7	274	2.9	2.9	41	1.9	1.9
Crack	411	3.5	3.5	366	3.8	3.9	45	2.1	2.1
Otra presentación de cocaína	3	0.0	0.0	2	0.0	0.0	1	0.0	0.0
<b>Inhalables</b>	<b>740</b>	<b>6.3</b>	<b>6.4</b>	<b>540</b>	<b>5.6</b>	<b>5.7</b>	<b>200</b>	<b>9.1</b>	<b>9.3</b>
Solventes o removedores	516	4.4	4.5	380	4.0	4.0	136	6.2	6.3
Pegamentos	121	1.0	1.0	87	0.9	0.9	34	1.5	1.6
Esmaltes o pinturas	86	0.7	0.7	59	0.6	0.6	27	1.2	1.3
Otros inhalables	17	0.1	0.1	14	0.1	0.1	3	0.1	0.1
<b>Depresores</b>	<b>127</b>	<b>1.1</b>	<b>1.1</b>	<b>56</b>	<b>0.6</b>	<b>0.6</b>	<b>71</b>	<b>3.2</b>	<b>3.3</b>
Benzodiacepinas	113	1.0	1.0	48	0.5	0.5	65	3.0	3.0
Rohypnol	2	0.0	0.0	2	0.0	0.0	6	0.3	0.3
Otros depresores	12	0.1	0.1	6	0.1	0.1	0	0.0	0.0
<b>Estimulantes</b>	<b>833</b>	<b>7.1</b>	<b>7.2</b>	<b>656</b>	<b>6.8</b>	<b>6.9</b>	<b>177</b>	<b>8.1</b>	<b>8.2</b>
Anfetamina	48	0.4	0.4	44	0.5	0.5	4	0.2	0.2
Metanfetaminas	760	6.4	6.6	599	6.2	6.3	161	7.3	7.5
Éxtasis (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas	22	0.2	0.2	11	0.1	0.1	11	0.5	0.5
Otros estimulantes	3	0.0	0.0	2	0.0	0.0	1	0.0	0.0
<b>Drogas alucinógenas y disociativas</b>	<b>30</b>	<b>0.3</b>	<b>0.3</b>	<b>25</b>	<b>0.3</b>	<b>0.3</b>	<b>5</b>	<b>0.2</b>	<b>0.2</b>
LSD	24	0.2	0.2	19	0.2	0.2	5	0.2	0.2
Plantas alucinógenas y derivados	3	0.0	0.0	3	0.0	0.0	0	0.0	0.0
Otras drogas alucinógenas y disoc.	3	0.0	0.0	3	0.0	0.0	0	0.0	0.0
<b>Opiáceos</b>	<b>178</b>	<b>1.5</b>	<b>1.5</b>	<b>149</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>29</b>	<b>1.3</b>	<b>1.3</b>
Heroína	154	1.3	1.3	133	1.4	1.4	21	1.0	1.0
Opiáceos Sintéticos	18	0.2	0.2	10	0.1	0.1	8	0.4	0.4
Opio y otros opiáceos	6	0.1	0.1	6	0.1	0.1	0	0.0	0.0
<b>Otras sustancias de abuso</b>	<b>12</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>9</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>3</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>
Con utilidad médica	6	0.1	0.1	4	0.0	0.0	2	0.1	0.1
Otras sustancias de abuso	6	0.1	0.1	5	0.1	0.1	1	0.0	0.0
<b>Ninguna</b>	<b>117</b>	<b>1.0</b>	<b>1.0</b>	<b>90</b>	<b>0.9</b>	<b>1.0</b>	<b>27</b>	<b>1.2</b>	<b>1.3</b>
No consumió en el último año	166	1.4	Se omite	133	1.4	Se omite	33	1.5	Se omite
Sin Información	44	0.4	Se omite	36	0.4	Se omite	8	0.4	Se omite
<b>Total</b>	<b>11,804</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>9,609</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>2,195</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

**Cuadro 28. Droga de mayor impacto en los últimos 12 meses, según menciones**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
<b>Tabaco</b>	698	5.9	6.0	539	5.6	5.7	159	7.2	7.4
<b>Alcohol</b>	1,453	12.3	12.5	1,154	12.0	12.2	299	13.6	13.9
<b>Cannabis</b>	<b>5,471</b>	<b>46.3</b>	<b>47.2</b>	<b>4,584</b>	<b>47.7</b>	<b>48.6</b>	<b>887</b>	<b>40.4</b>	<b>41.2</b>
Mariguana	5,456	46.2	47.1	4,574	47.6	48.5	882	40.2	41.0
Hachís	15	0.1	0.1	10	0.1	0.1	5	0.2	0.2
<b>Cocaína</b>	<b>1,025</b>	<b>8.7</b>	<b>8.8</b>	<b>890</b>	<b>9.3</b>	<b>9.4</b>	<b>135</b>	<b>6.2</b>	<b>6.3</b>
Polvo blanco	445	3.8	3.8	369	3.8	3.9	76	3.5	3.5
Crack	575	4.9	5.0	517	5.4	5.5	58	2.6	2.7
Otra presentación de cocaína	5	0.0	0.0	4	0.0	0.0	1	0.0	0.0
<b>Inhalables</b>	<b>1,134</b>	<b>9.6</b>	<b>9.8</b>	<b>867</b>	<b>9.0</b>	<b>9.2</b>	<b>267</b>	<b>12.2</b>	<b>12.4</b>
Solventes o removedores	769	6.5	6.6	598	6.2	6.3	171	7.8	7.9
Pegamentos	204	1.7	1.8	154	1.6	1.6	50	2.3	2.3
Esmaltes o pinturas	138	1.2	1.2	96	1.0	1.0	42	1.9	2.0
Otros inhalables	23	0.2	0.2	19	0.2	0.2	4	0.2	0.2
<b>Depresores</b>	<b>213</b>	<b>1.8</b>	<b>1.8</b>	<b>114</b>	<b>1.2</b>	<b>1.2</b>	<b>99</b>	<b>4.5</b>	<b>4.6</b>
Benzodiacepinas	196	1.7	1.7	104	1.1	1.1	92	4.2	4.3
Rohypnol	2	0.0	0.0	2	0.0	0.0	0	0.0	0.0
Otros depresores	15	0.1	0.1	8	0.1	0.1	7	0.3	0.3
<b>Estimulantes</b>	<b>1,233</b>	<b>10.4</b>	<b>10.6</b>	<b>997</b>	<b>10.4</b>	<b>10.6</b>	<b>177</b>	<b>8.1</b>	<b>8.2</b>
Anfetamina	64	0.5	0.6	59	0.6	0.6	4	0.2	0.2
Metanfetaminas	1,131	9.6	9.8	908	9.4	9.6	161	7.3	7.5
Éxtasis (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas	33	0.3	0.3	26	0.3	0.3	11	0.5	0.5
Otros estimulantes	5	0.0	0.0	4	0.0	0.0	1	0.0	0.0
<b>Drogas alucinógenas y disociativas</b>	<b>55</b>	<b>0.5</b>	<b>0.5</b>	<b>40</b>	<b>0.4</b>	<b>0.4</b>	<b>5</b>	<b>0.2</b>	<b>0.2</b>
LSD	44	0.4	0.4	30	0.3	0.3	5	0.2	0.2
Plantas alucinógenas y derivados	8	0.1	0.1	8	0.1	0.1	0	0.0	0.0
Otras drogas alucinógenas y disoc.	3	0.0	0.0	2	0.0	0.0	0	0.0	0.0
<b>Opiáceos</b>	<b>196</b>	<b>1.7</b>	<b>1.7</b>	<b>167</b>	<b>1.7</b>	<b>1.8</b>	<b>29</b>	<b>1.3</b>	<b>1.3</b>
Heroína	169	1.4	1.5	148	1.5	1.6	21	1.0	1.0
Opiáceos Sintéticos	20	0.2	0.2	12	0.1	0.1	8	0.4	0.4
Opio y otros opiáceos	7	0.1	0.1	7	0.1	0.1	0	0.0	0.0
<b>Otras sustancias de abuso</b>	<b>22</b>	<b>0.2</b>	<b>0.2</b>	<b>13</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>1</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
Con utilidad médica	12	0.1	0.1	7	0.1	0.1	3	0.1	0.1
Otras sustancias de abuso	10	0.1	0.1	6	0.1	0.1	2	0.1	0.1
<b>Ninguna</b>	<b>87</b>	<b>0.7</b>	<b>0.8</b>	<b>70</b>	<b>0.7</b>	<b>0.7</b>	<b>27</b>	<b>1.2</b>	<b>1.3</b>
<i>No consumió en el último año</i>	166	1.4	Se omite	133	1.4	Se omite	33	1.5	Se omite
<i>Sin Información</i>	51	0.4	Se omite	41	0.4	Se omite	8	0.4	Se omite
<b>Total</b>	<b>11,804</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>9,609</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>2,195</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

**Cuadro 29. Uso combinado de drogas en los últimos 12 meses  
(No incluye tabaco)**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Si combinó drogas	3,907	33.1	42.7	3,287	34.2	43.8	620	28.2	37.6
No combinó drogas	5,240	44.4	57.3	4,210	43.8	56.2	1,030	46.9	62.4
<i>No aplica</i>	2,657	22.5	<i>Se omite</i>	2,112	22.0	<i>Se omite</i>	545	24.8	<i>Se omite</i>
<b>Total</b>	<b>11,804</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>9,609</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>2,195</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

**Cuadro 30. Total de drogas consumidas en los últimos 30 días  
(Incluye alcohol o tabaco)**

	General*		Hombres**		Mujeres***	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Ninguna	1,209	10.2	913	9.5	296	13.5
1 sustancia	2,897	24.5	2,279	23.7	618	28.2
2 sustancias	3,273	27.7	2,699	28.1	574	26.2
3 sustancias	2,789	23.6	2,337	24.3	452	20.6
4 sustancias	1,088	9.2	923	9.6	165	7.5
5 sustancias	342	2.9	288	3.0	54	2.5
6 sustancias	143	1.2	120	1.2	23	1.0
7 sustancias	32	0.3	25	0.3	7	0.3
8 sustancias	21	0.2	17	0.2	4	0.2
9 sustancias	2	0.0	1	0.0	1	0.0
10 sustancias	5	0.0	5	0.1	0	0.0
11-14 sustancias	3	0.0	2	0.0	1	0.0
<b>Total</b>	<b>11,804</b>	<b>100.0</b>	<b>9,609</b>	<b>100.0</b>	<b>2,195</b>	<b>100.0</b>

\*  $\mu=2.1$   $\sigma=1.4$ ;  $Mdn=2$ ;  $Mo=2$ ; Decil1 = Ninguna

\*\*  $\mu=2.2$ ;  $\sigma=1.4$ ;  $Mdn=2$ ;  $Mo=2$ ; Decil1 = 1

\*\*\*  $\mu=2.0$ ;  $\sigma=1.4$ ;  $Mdn=2$ ;  $Mo=1$ ; Decil1 = ninguna

**Cuadro 31. Total de drogas ilícitas consumidas en los últimos 30 días  
(No incluye ni alcohol ni tabaco)**

	General*		Hombres**		Mujeres***	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Ninguna	3,426	29.0	2,684	27.9	742	33.8
1 sustancia	6,006	50.9	4,939	51.4	1,067	48.6
2 sustancias	1,619	13.7	1,360	14.2	259	11.8
3 sustancias	490	4.2	407	4.2	83	3.8
4 sustancias	184	1.6	157	1.6	27	1.2
5 sustancias	47	0.4	36	0.4	11	0.5
6 sustancias	21	0.2	18	0.2	3	0.1
7 sustancias	3	0.0	1	0.0	2	0.1
8 sustancias	5	0.0	5	0.1	0	0.0
9 sustancias	1	0.0	1	0.0	0	0.0
10 sustancias	1	0.0	0	0.0	1	0.0
11-12 sustancias	1	0.0	1	0.0	0	0.0
<b>Total</b>	<b>11,804</b>	<b>100.0</b>	<b>9,609</b>	<b>100.0</b>	<b>2,195</b>	<b>100.0</b>

\*  $\mu= 1.0$ ;  $\sigma = 0.9$ ;  $Mdn= 1$ ;  $Mo= 1$ ; Decil1 = ninguna

\*\*  $\mu= 1.0$ ;  $\sigma = 0.9$ ;  $Mdn= 1$ ;  $Mo= 1$ ; Decil1 = ninguna

\*\*\*  $\mu= 0.9$ ;  $\sigma = 0.9$ ;  $Mdn= 1$ ;  $Mo= 1$ ; Decil1 = ninguna

**Cuadro 32. Consumo de drogas en los últimos 30 días por sustancia**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
<b>Tabaco</b>	<b>7,122</b>	<b>60.3</b>	<b>5,923</b>	<b>61.6</b>	<b>1,199</b>	<b>54.6</b>
<b>Alcohol</b>	<b>6,202</b>	<b>52.5</b>	<b>5,148</b>	<b>53.6</b>	<b>1,054</b>	<b>48.0</b>
<b>Cannabis</b>	<b>6,374</b>	<b>54.0</b>	<b>5,380</b>	<b>56.0</b>	<b>994</b>	<b>45.3</b>
Mariguana	6,370	54.0	5,376	55.9	994	45.3
Hachís	124	1.1	109	1.1	15	0.7
<b>Cocaína</b>	<b>1,468</b>	<b>12.4</b>	<b>1,257</b>	<b>13.1</b>	<b>211</b>	<b>9.6</b>
Polvo blanco	955	8.1	799	8.3	156	7.1
<i>Crack</i>	704	6.0	618	6.4	86	3.9
Otra presentación de cocaína	11	0.1	9	0.1	2	0.1
<b>Inhalables</b>	<b>1,418</b>	<b>12.0</b>	<b>1,143</b>	<b>11.9</b>	<b>275</b>	<b>12.5</b>
Solventes o removedores	998	8.5	811	8.4	187	8.5
Pegamentos	308	2.6	255	2.7	53	2.4
Esmaltes o pinturas	191	1.6	144	1.5	47	2.1
Otros inhalables	27	0.2	23	0.2	4	0.2
<b>Depresores</b>	<b>604</b>	<b>5.1</b>	<b>426</b>	<b>4.4</b>	<b>178</b>	<b>8.1</b>
Benzodiacepinas	588	5.0	413	4.3	175	8.0
<i>Rohypnol</i>	12	0.1	11	0.1	1	0.0
Otros depresores	9	0.1	4	0.0	5	0.2
<b>Estimulantes</b>	<b>1,162</b>	<b>9.8</b>	<b>943</b>	<b>9.8</b>	<b>219</b>	<b>10.0</b>
Anfetamina	52	0.4	38	0.4	14	0.6
Metanfetaminas	1,036	8.8	846	8.8	190	8.7
<i>Éxtasis (MDMA)</i> y Metanfetaminas alucinógenas	96	0.8	72	0.7	24	1.1
Otros estimulantes	8	0.1	7	0.1	1	0.0
<b>Drogas alucinógenas y disociativas</b>	<b>129</b>	<b>1.1</b>	<b>101</b>	<b>1.1</b>	<b>28</b>	<b>1.3</b>
LSD	109	0.9	84	0.9	25	1.1
Plantas alucinógenas y derivados	28	0.2	23	0.2	5	0.2
Otras drogas alucinógenas y disoc.	4	0.0	4	0.0	0	0.0
<b>Opiáceos</b>	<b>194</b>	<b>1.6</b>	<b>167</b>	<b>1.7</b>	<b>27</b>	<b>1.2</b>
Heroína	163	1.4	146	1.5	17	0.8
Opiáceos Sintéticos	24	0.2	16	0.2	8	0.4
Opio y otros opiáceos	10	0.1	7	0.1	3	0.1
<b>Otras sustancias de abuso</b>	<b>76</b>	<b>0.6</b>	<b>49</b>	<b>0.5</b>	<b>27</b>	<b>1.2</b>
Con utilidad médica	23	0.2	16	0.2	7	0.3
Otras sustancias de abuso	53	0.4	33	0.3	20	0.9

**Cuadro 33. Frecuencia de episodios de abuso del consumo de tabaco<sup>1</sup> en los últimos 30 días**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Ni una vez	2,360	20.0	33.8	1,927	20.1	33.2	433	19.7	36.8
< de 1 vez a la semana	864	7.3	12.4	733	7.6	12.6	131	6.0	11.1
1 o 2 veces a la semana	790	6.7	11.3	651	6.8	11.2	139	6.3	11.8
Cada tercer día	458	3.9	6.6	370	3.9	6.4	88	4.0	7.5
Diario	2,512	21.3	36.0	2,126	22.1	36.6	386	17.6	32.8
No consumió en los últimos 30 días	4,682	39.7	Se omite	3,686	38.4	Se omite	996	45.4	Se omite
Sin información	138	1.2	Se omite	116	1.2	Se omite	22	1.0	Se omite
<b>Total</b>	<b>11,804</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>9,609</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>2,195</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

<sup>1</sup> Consumo de seis o más cigarrillos en un solo día.

**Cuadro 34. Frecuencia de episodios de abuso del consumo de alcohol<sup>1</sup> en los últimos 30 días**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Ni una vez	1,155	9.8	19.0	932	9.7	18.5	223	10.2	21.5
< de 1 vez a la semana	2,272	19.2	37.4	1,888	19.6	37.5	384	17.5	37.1
1 o 2 veces a la semana	1,829	15.5	30.1	1,536	16.0	30.5	293	13.3	28.3
Cada tercer día	467	4.0	7.7	392	4.1	7.8	75	3.4	7.2
Diario	349	3.0	5.7	289	3.0	5.7	60	2.7	5.8
No consumió en los últimos 30 días	5,602	47.5	Se omite	4,461	46.4	Se omite	1,141	52.0	Se omite
Sin información	130	1.1	Se omite	111	1.2	Se omite	19	0.9	Se omite
<b>Total</b>	<b>11,804</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>9,609</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>2,195</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

<sup>1</sup> Consumo de más de cuatro copas en un día para los hombres y de más de tres copas en un día para las mujeres.

**Cuadro 35. Frecuencia de episodios de abuso del consumo de drogas ilícitas<sup>1</sup> en los últimos 30 días**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
< de 1 vez a la semana	1,859	15.7	26.3	1,450	15.1	24.6	409	18.6	34.3
1 o 2 veces a la semana	1,463	12.4	20.7	1,236	12.9	21.0	227	10.3	19.0
Cada tercer día	1,131	9.6	16.0	963	10.0	16.4	168	7.7	14.1
Diario	2,622	22.2	37.1	2,234	23.2	38.0	388	17.7	32.6
No consumió en los últimos 30 días	3,426	29.0	Se omite	2,684	27.9	Se omite	742	33.8	Se omite
Sin información	1,303	11.0	Se omite	1,042	10.8	Se omite	261	11.9	Se omite
<b>Total</b>	<b>11,804</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>9,609</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>2,195</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

<sup>1</sup> Consumo de cualquier dosis.

## GLOSARIO

<b>Droga ilícita de inicio</b>	Es la sustancia ilegal que el usuario refirió como la droga con la cual inicio el consumo de sustancias. No incluye el inicio del consumo con alcohol o tabaco.
<b>Droga de mayor impacto en los últimos 12 meses</b>	Sustancia que el propio usuario de drogas solicitante de tratamiento refiere como la que más problemas le ha ocasionado en los ámbitos de salud, personal, familiar, escolar, laboral o social, en el transcurso del último año.
<b>Droga de preferencia en los últimos 12 meses</b>	Sustancia que el propio usuario solicitante de tratamiento ha elegido o preferido consumir en el transcurso del último año.
<b>Estrato social</b>	Estimación que hace el terapeuta, según su percepción, del estrato al que pertenece el usuario de drogas, considerando aspectos como lugar de residencia, escolaridad, empleo y características manifiestas como higiene y aliño, calidad del vestido, expresión verbal y vocabulario, etc.
<b>Tipo de consumo de drogas ilícitas</b>	Características de consumo de sustancias ilegales según motivo, frecuencia y problemas asociados. No incluye el uso de alcohol y/o tabaco y se clasifica como: experimental, social u ocasional, funcional, disfuncional y en remisión.
<b>Total de drogas consumidas</b>	Número de drogas consumidas (se incluyen las 26 sustancias de seguimiento) en las siguientes categorías: alguna vez en la vida, en el último año y en los últimos 30 días.
<b>Uso combinado de drogas en los últimos 12 meses</b>	Consumo de dos o más sustancias (incluyendo alcohol y cualquier droga ilícita o de uso médico, utilizada sin prescripción, pero excluyendo tabaco) en el transcurso de un mismo día, en el año previo a la solicitud de tratamiento en CIJ.