

**SALUD**

SECRETARÍA DE SALUD



**Centros de  
Integración  
Juvenil, A.C.**

*SISTEMA DE INFORMACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DEL  
CONSUMO DE DROGAS*

**CONSUMO DE SUSTANCIAS EN PACIENTES  
DE PRIMER INGRESO A TRATAMIENTO.  
SEGUNDO SEMESTRE DEL 2015.  
USUARIOS DE DROGAS ILÍCITAS**

**Valeriano Raúl García Aurrecoechea**

**Alma Delia Gutiérrez López**

**Dirección de Investigación y Enseñanza**

**Subdirección de Investigación**

**México, marzo de 2016**

**SIECD**

**Informe de Investigación 16-01a**



## **DIRECTORIO**

---

**PRESIDENTE HONORARIO VITALICIO DEL PATRONATO NACIONAL**

Dr. Jesús Kumate Rodríguez

**PRESIDENTE DEL PATRONATO NACIONAL**

Dr. Roberto Tapia Conyer

**FUNDADORA DE CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL, A.C.**

**Y VICEPRESIDENTA VITALICIA DEL PATRONATO NACIONAL**

Sra. Kena Moreno

**DIRECTORA GENERAL**

Lic. Carmen Fernández Cáceres

**DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE OPERACIÓN Y PATRONATOS**

Dr. José Ángel Prado García

**DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE NORMATIVIDAD**

Dr. Ricardo Sánchez Huesca

**DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA**

Dr. Jaime Arturo Quintanilla Bendek

**SUBDIRECTOR DE INVESTIGACIÓN**

Mtro. David Bruno Díaz Negrete

**JEFA DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA Y EPIDEMIOLÓGICA**

Dra. Solveig Eréndira Rodríguez Kuri

<b>CONTENIDO</b>	<b>PÁG.</b>
ANTECEDENTES	5
MÉTODO	6
CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS	8
FACTORES ASOCIADOS A LA DEMANDA DE TRATAMIENTO	11
CONSUMO DE DROGAS	14
REFERENCIAS	24
CUADROS	27
GLOSARIO	51

## ÍNDICE DE CUADROS

PÁG.

Cuadro 1	Pacientes de primer ingreso a tratamiento por unidad de atención (CIJ)	28
Cuadro 2	Sexo	31
Cuadro 3	Persona que proporciona la información	31
Cuadro 4	Edad de ingreso a tratamiento	31
Cuadro 5	Estado civil	32
Cuadro 6	Escolaridad	32
Cuadro 7	Ocupación	33
Cuadro 8	Estrato social	33
Cuadro 9	Motivos de consulta	34
Cuadro 10	Condicionantes de la solicitud de tratamiento	34
Cuadro 11	Antecedentes de acciones contra el consumo de sustancias	35
Cuadro 12	Problemas asociados al consumo de sustancias	35
Cuadro 13	Edad de inicio del consumo de tabaco	36
Cuadro 14	Edad de inicio del consumo de alcohol	36
Cuadro 15	Edad de inicio del consumo de drogas ilícitas	37
Cuadro 16	Drogas ilícitas de inicio	38
Cuadro 17	Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de tabaco y el ingreso a tratamiento a CIJ	39
Cuadro 18	Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de alcohol y el ingreso a tratamiento a CIJ	39
Cuadro 19	Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de drogas ilícitas y el ingreso a tratamiento a CIJ	40
Cuadro 20	Tipo de consumo de drogas ilícitas	40
Cuadro 21	Total de drogas consumidas alguna vez en la vida (incluye alcohol o tabaco)	41
Cuadro 22	Total de drogas ilícitas consumidas alguna vez en la vida (no incluye ni alcohol ni tabaco)	41
Cuadro 23	Consumo de drogas alguna vez en la vida por sustancia	42
Cuadro 24	Total de drogas consumidas en el último año (incluye alcohol o tabaco)	43
Cuadro 25	Total de drogas ilícitas consumidas en el último año (no incluye ni alcohol ni tabaco)	43
Cuadro 26	Consumo de drogas en los últimos 12 meses por sustancia	44
Cuadro 27	Droga de preferencia en los últimos 12 meses, según menciones	45
Cuadro 28	Droga de mayor impacto en los últimos 12 meses, según menciones	46
Cuadro 29	Uso combinado de drogas en los últimos 12 meses (no incluye tabaco)	47
Cuadro 30	Total de drogas consumidas en los últimos 30 días (incluye alcohol o tabaco)	47
Cuadro 31	Total de drogas ilícitas consumidas en los últimos 30 días (no incluye ni alcohol ni tabaco)	48
Cuadro 32	Consumo de drogas en los últimos 30 días por sustancia	49
Cuadro 33	Frecuencia de episodios de abuso del consumo de Tabaco en los últimos 30 días	50
Cuadro 34	Frecuencia de episodios de abuso del consumo de Alcohol en los últimos 30 días	50
Cuadro 35	Frecuencia de episodios de abuso del consumo de drogas ilícitas en los últimos 30 días	50

## RESUMEN

El informe se realizó con base en 10,862 registros clínicos de la entrevista inicial de usuarios de sustancias psicoactivas que reportaron consumo de al menos una droga ilícita y que acudieron por primera vez a consulta a Centros de Integración Juvenil entre julio y diciembre de 2015. Los objetivos del estudio son: a) actualizar la información del perfil sociodemográfico de los pacientes, de los factores asociados a la demanda de tratamiento y del patrón de consumo de sustancias; b) contribuir a retroalimentar sistemas nacionales de información del consumo de drogas; c) generar información que oriente el desarrollo de estudios con pacientes o consumidores(as) de drogas en México; y d) contribuir al desarrollo, diseño y ajuste de los servicios institucionales de prevención y tratamiento del consumo de drogas.

Los datos que se presentan en este informe permiten ver que el uso de drogas ilícitas continúa siendo un trastorno que afecta en mayor proporción a la población masculina que solicita tratamiento, en una proporción de 4.5 hombres por cada mujer. La edad media de ingreso a tratamiento fue de 22.4 años. En promedio, los hombres ingresaron a tratamiento a mayor edad que las mujeres (22.7 y 21.2 años, respectivamente). La edad promedio del inicio tanto del consumo de tabaco fue a los 14.3 años, la del alcohol a los 14.4 años y la de drogas ilícitas a los 15.9 años. Tanto hombres como mujeres iniciaron el consumo de estas sustancias alrededor de las edades mencionadas, lo que muestra que la edad de inicio no presenta diferencias relevantes por sexo.

Las drogas de mayor consumo alguna vez en la vida fueron *cannabis* (88.1%), alcohol (86.2%), tabaco (84.5%), cocaína/*crack* (39.3%), inhalables (29.7%), estimulantes (27.1%, principalmente metanfetaminas: 22.2% y *éxtasis*: 5.8%), depresores (15.1%), drogas alucinógenas y disociativas (9.9%) y opiáceos (3.9%). En cuanto al consumo en el mes previo al ingreso a tratamiento, las sustancias más utilizadas fueron tabaco (63.0%), alcohol (55.0%), *cannabis* (54.4%), inhalables (12.4%) y cocaína/*crack* (12.7%) y estimulantes (12.3%). Las sustancias de mayor impacto fueron marihuana (45.6%), alcohol (12.4%), metanfetaminas (11.7%), tabaco (6.6%), solventes y removedores (6.3%), *crack* (4.9%) y cocaína en polvo (3.5%). Con respecto a los semestres anteriores, se observa un incremento en el consumo de metanfetaminas, con mayor proporción en las mujeres.

En cuanto a los factores asociados a la demanda de tratamiento se observó que los usuarios de drogas acudieron principalmente por condicionamiento o recomendación de la familia (44.9%) o por iniciativa propia (37.0%); que solicitaron atención debido a su consumo de drogas ilícitas (89.1%), de alcohol (41.6%) y de tabaco (38.8%); que previo al tratamiento algunos de ellos (31.2%) intentaron interrumpir de manera voluntaria y sin apoyo el consumo y otros (25.3%) no habían tomado ninguna medida contra el problema; y que entre los problemas más frecuentemente asociados al consumo se reconocieron los de tipo familiar (79.7%), los escolares (41.7%), los de salud (41.4%) y los psicológicos (41.0%).

## ANTECEDENTES

Centros de Integración Juvenil ha reportado información epidemiológica del consumo de drogas de los solicitantes de tratamiento desde 1976<sup>1</sup>. En 1983 inicia la aplicación de una cédula homogénea a los pacientes de nuevo ingreso<sup>2</sup>, aunque no es sino a partir de 1990 que la recolección de datos se realiza en forma sistemática<sup>3</sup>, implementándose posteriormente el *Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas* (SIECD), el cual se ha ido consolidando a través de los años y ha realizado el seguimiento oportuno de un conjunto de variables, con las cuales ha podido contribuir en la toma de decisiones del diseño y ajuste de servicios institucionales, además de aportar conocimientos sobre la forma y tendencias del uso de drogas y de aportar información a los Sistemas Epidemiológicos de las Adicciones en el país, como es el caso del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA)<sup>4</sup> de la Secretaría de Salud, del Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas (SRID) –perteneciente al Instituto Nacional de Psiquiatría “*Ramón de la Fuente*” (INP)<sup>5</sup>–, del Observatorio Epidemiológico en Drogas de la Secretaría Salud<sup>6</sup>.

El SIECD, también ha apoyado en el desarrollo de diferentes estudios epidemiológicos especializados, con temas que van desde el perfil de usuarios de drogas y su trayectoria de consumo<sup>7</sup>, el consumo de drogas en las mujeres<sup>8</sup>, en la población infantil<sup>9</sup> o de acuerdo con las etapas de la vida<sup>10</sup>, hasta llegar a los estudios de tendencias<sup>11,12,13,14</sup>. Toda esta información ha facilitado el enfrentamiento oportuno de las problemáticas generadas por el creciente consumo de estimulantes y simultáneamente ha sido de utilidad para apoyar el diseño eficaz de estudios sobre características particulares de los consumidores de estos alcaloides<sup>15,16</sup>.

Por otro lado, la información reportada ha permitido el desarrollo de estudios epidemiológicos particulares enfocados en profundizar en las características del consumo de drogas legales de pacientes atendidos. Así, desde el año 2006, el SIECD genera un informe por separado de las características de los pacientes consumidores de tabaco y alcohol<sup>17</sup>, con lo cual se ha logrado identificar una emergencia epidemiológica del consumo de alcohol entre las pacientes atendidas con relación a los años anteriores<sup>18</sup>; suceso que ha dado pie a CIJ para profundizar en esta problemática<sup>19</sup> y que también ha sido reportado por la Encuesta Nacional de Adicciones (ENA), sobre todo para el caso de las mujeres jóvenes<sup>20</sup>.

Adicionalmente, es importante destacar que la información generada por el SIECD durante el lapso de más de dos décadas ha sido consistente con la de las Encuestas Nacionales de Adicciones (ENA) de este periodo, ya sea en el nivel nacional o en el regional<sup>21</sup> y también ha sido referente para el desarrollo de metodologías de investigación en variados estudios clínicos, psicosociales y evaluativos de la Institución, como es el caso de diversos *Estudios de la Comunidad Objetivo (EBCO)*<sup>22</sup> realizados por los CIJ a lo largo y ancho del país.

El presente informe se elaboró con base en la información obtenida por el SIECD durante el segundo semestre de 2015 y tiene el objetivo de proporcionar datos actualizados sobre las características sociodemográficas, factores asociados a la demanda de tratamiento y del patrón de consumo de drogas de los solicitantes de tratamiento, de manera que se aporten elementos para apoyar el diseño, planeación y ajuste de los programas institucionales de prevención, tratamiento y rehabilitación, además de colaborar con otros sistemas de información en drogas y de aportar elementos para el diseño y elaboración de investigaciones en el campo de las adicciones.

## MÉTODO

**Diseño del estudio:** Censo epidemiológico descriptivo semestral.

**Población:** 10,862 usuarios de drogas ilícitas procedentes de 107 unidades de CIJ, que acudieron por primera vez a consulta entre julio y diciembre de 2015 y que proporcionaron personalmente la información (cuadro 1. Anexo).

**Fuente de información:** Formato de Entrevista Inicial, aplicado en la primera consulta por parte del personal médico-técnico responsable del ingreso de pacientes a tratamiento, que forma parte del expediente clínico en cualquiera de sus dos versiones: formato electrónico (base de datos recuperada el día 15 de febrero 2016 a las 15:55 hrs., con 10,574 registros capturados por los/as terapeutas responsables de realizar la entrevista inicial) o formato impreso (288 registros capturados por personal del departamento de Investigación Clínica y Epidemiológica mediante el programa *Control de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas* desarrollado por CIJ).

**Variables de estudio:** Las características sociodemográficas estudiadas comprenden: persona que proporciona la información, sexo, edad de ingreso a tratamiento, estado civil, escolaridad, ocupación y estrato social; las variables de factores asociados a la demanda de tratamiento incluyen: motivo(s) de consulta, condicionante(s) de la solicitud

de tratamiento, antecedente(s) de acciones tomadas frente al uso de sustancias y problema(s) asociado(s) al mismo; y las variables de patrón de consumo: edad de inicio, tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de sustancias y el ingreso a tratamiento, consumo alguna vez en la vida, en el último año y en los últimos 30 días; drogas de preferencia y de mayor impacto en el último año (estas dos últimas variables de acuerdo con el punto de vista del paciente), uso combinado de sustancias, tipo de consumo de drogas ilícitas, episodios de abuso y total de drogas consumidas.

La información sobre el consumo de drogas se presenta categorizada en diez grupos de sustancias que a su vez desagrega a 26 categorías de drogas:

Grupo de Sustancias	Drogas en seguimiento
Tabaco	Cigarrillos
Alcohol	Bebidas alcohólicas
<i>Cannabis</i>	Mariguana y hachís
Cocaína	Cocaína en polvo, <i>crack</i> y otra presentación de cocaína
Inhalables	Solventes y removedores, pegamentos, esmaltes y pinturas y otros inhalables
Depresores	Benzodiacepinas, <i>Rohypnol</i> y otros depresores
Estimulantes	Anfetaminas, metanfetaminas ( <i>crystal</i> o <i>ICE</i> ), MDMA ( <i>éxtasis</i> ) y metanfetaminas alucinógenas; y otros estimulantes
Drogas alucinógenas y disociativas	Ácido lisérgico (LSD), plantas alucinógenas y derivados y otros alucinógenos (PCP y ketamina)
Opiáceos	Heroína, opiáceos sintéticos y opio, y otros opioides
Otras sustancias de abuso	Sustancias con utilidad médica y otras sustancias no identificadas

**Procesamiento de datos.** Para el procesamiento estadístico de la información se utilizó el programa SPSS v.15.

Los resultados se presentan tanto en forma general como desglosada por sexo y en porcentajes válidos, excluyendo los casos “*sin información*” y aquellos que no cumplieron con las condiciones requeridas para el análisis en cada variable de estudio.

## CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS<sup>a</sup>

**Sexo.** La población se conformó por 8,893 hombres y 1,969 mujeres, lo que en porcentaje representa a un 81.9% y un 18.1%, respectivamente. Dando así una proporción aproximada de cuatro hombres (4.5) por cada mujer.

**Persona que proporciona la información.** 52.9% de los pacientes acudieron en compañía de familiares u otras personas (tanto en hombres como en mujeres), mientras que en 37.6% lo hicieron solos (tanto en hombres como en mujeres).

**Edad de ingreso a tratamiento.** Se observa un rango de edad de 8 a 80 años, con un promedio de 22.4 años y una desviación estándar de diez punto seis; es decir que cerca del 84% de las personas atendidas (9,130) se encontró entre los 12 y 32 años de edad; la edad mediana de la población fue de 18 años (47.8% de los casos fueron menores de edad; 5,193 sujetos), mientras que la moda se ubicó en 16 años (1,255 personas atendidas).

**Figura 1. Edad de ingreso según sexo**


	 Años	 Años	
<b>Rango</b>	8 a 80	10 a 76	<b><i>Las mujeres ingresaron a tratamiento a menor edad</i></b>
<b>Media</b>	22.7	21.2	
<b>Desviación estándar</b>	10.6	10.4	
<b>Mediana</b>	18	17	
<b>Moda</b>	16	14	

<sup>a</sup> Cfr., Cuadros 1 a 8.

**Estado civil.** La mayor parte de la población refirió ser soltera (74.6%), mientras que 9.9% indicó que vivía en unión libre y 8.7% estaba casada, con leves diferencias entre los sexos.


**Figura 2. Estado civil según sexo**

*Es ligeramente mayor el porcentaje de mujeres solteras y, en contraparte, es mayor el de hombres que contaba con relación de pareja*



**Escolaridad.** 42.6% cursaba o había cursado algún grado de educación secundaria, 38.3% al menos algún grado de bachillerato, 7.6% contaba con algún grado escolar de nivel primaria y 8.6% de nivel superior o posgrado.


**Figura 3. Escolaridad según sexo**



*El nivel de escolaridad es ligeramente mayor en hombres que en mujeres*

**Ocupación.** 40.2% se dedicaba a estudiar, 30.5% desempeñaba alguna actividad laboral y 21% estaba desempleado.


**Figura 4. Principal ocupación según sexo**



**Estrato social.** Según la percepción de los terapeutas la mitad de los pacientes (49.2%) se ubicaban en el estrato medio bajo, 23.3% en un nivel bajo y 21.21% en el estrato medio.


**Figura 5. Estrato social según sexo**

*Según la percepción de los terapeutas tanto hombres como mujeres presentaron condiciones sociales similares, predominando el estrato medio bajo*




## FACTORES ASOCIADOS A LA DEMANDA DE TRATAMIENTO<sup>b</sup>

**Motivos de consulta.** 45.5% de las personas atendidas reportó más de un motivo para acudir a tratamiento (uso de alcohol, tabaco o drogas), mientras que 1.2% no expresó ninguno. El 89.1% de los pacientes acudió por consumo de drogas ilícitas, 41.6% por uso de bebidas alcohólicas y 38.8% por uso de tabaco.




**Condicionantes de la solicitud de tratamiento.** 25.6% de los casos expresó dos o más condicionantes para acudir a tratamiento; 44.9% acudió por recomendación de la familia, 37.0% por iniciativa propia, 22.3% por condicionamiento o recomendación escolar, 8.2% por condicionamiento legal y 8.6% por indicación médica.



<sup>b</sup> Cfr. Cuadros 9 a 12.

**Antecedentes de acciones contra el consumo de sustancias.** 31.2% de los pacientes expresó que antes de acudir a CIJ había intentado interrumpir el consumo por voluntad propia, 11.4% señaló que previamente había estado internado en algún anexo, 7.1% había acudido a grupos de autoayuda, 5.2% lo había hecho por medio de juramento y 5.7% acudió a algún tipo de tratamiento psiquiátrico o psicoterapéutico. Cabe señalar que 11.6% reportó haber intentado al menos dos formas distintas de acciones para abandonar el consumo de drogas, en tanto que 25.3% expresó que hasta el momento de la solicitud de tratamiento no había tomado ninguna medida en contra del consumo de drogas.


**Figura 8. Antecedentes de acciones contra el consumo de sustancias según sexo**



*Un mayor porcentaje de mujeres ingresaron a CIJ sin haber realizado acciones previas mientras que los hombres intentaron en mayor proporción que las mujeres dejar el consumo voluntariamente, participando en grupos de autoayuda, por medio de juramento o internándose en un anexo*

**Problemas asociados al consumo de sustancias.** 79.7% de los pacientes señaló problemas de tipo familiar, 41.7% escolares, 41.4% de salud, 41.0% psicológicos, 20.6% laborales, 20.5% legales, 15.4% de conducta antisocial o delictiva y 12.6% accidentes o lesiones. Cabe señalar que 77.6% de las personas atendidas mencionaron dos o más problemas asociados al consumo de sustancias, mientras que 4.6% no reportó ninguno.

**Figura 9. Problemas asociados al consumo de sustancias según sexo**



## CONSUMO DE DROGAS<sup>c</sup>

**Edad de inicio del consumo de sustancias.** La edad promedio de inicio del consumo de tabaco se situó en 14.3 años ( $\sigma=3.3$  años), la mediana en 14 años y la moda en 14 años, mientras que la edad promedio de inicio del consumo de alcohol se ubicó en 14.4 años ( $\sigma=3.0$  años) con una mediana de 14 años y una moda de 15 años. Por su parte, la edad promedio de inicio en el abuso de drogas ilícitas (incluyendo sustancias de uso médico sin prescripción) fue de 15.9 años ( $\sigma=5.2$  años), con una mediana de 15 años y la moda fue de 15 años. Por otra parte, al considerar el primer decil como indicador de las edades de inicio más tempranas, se observa que el consumo de tabaco y de alcohol aparece a los 11 años, mientras que el de drogas ilícitas se presenta un año después.

**Figura 10. Edad de inicio del consumo de sustancias según sexo**

	 Años			 Años		
	Tabaco	Alcohol	Drogas ilícitas	Tabaco	Alcohol	Drogas ilícitas
<b>Promedio</b>	14.2	14.4	15.7	14.3	14.4	16.5
<b>Desviación estándar</b>	3.2	2.9	4.7	3.4	3.5	6.7
<b>Mediana</b>	14	14	15	14	14	15
<b>Moda</b>	14	15	15	13	15	13


**No se aprecian diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a la edad de inicio del consumo de drogas**

**Drogas ilícitas de inicio.** Las sustancias de inicio más reportadas fueron: en primer lugar la cannabis, principalmente en forma de marihuana (75.1%); en segundo lugar los inhalables (10.1%), mayormente en forma de solventes y removedores (6.8%); después la cocaína (8.6%), tanto en forma de polvo blanco (6.7%) como *crack* (1.9); en cuarto lugar aparecen los estimulantes (3.6%), donde destacan las metanfetaminas (2.7%); después aparecen los depresores con utilidad médica (1.6%) siendo las

<sup>c</sup> Cfr., Cuadros 13 a 35

benzodiazepinas las más reportadas (1.6%); y en sexto lugar se ubican los opiáceos (0.3%), entre los cuales sobresale la heroína (24 casos).

**Figura 11. Principales drogas ilícitas de inicio según sexo**




**Lapso transcurrido entre el inicio del consumo de sustancias y el ingreso a tratamiento en CIJ.** El promedio de años entre el inicio de consumo y la solicitud de tratamiento se situó de la siguiente manera: tabaco de 8.4 años ( $\sigma=10.1$  años), alcohol de 8.6 años ( $\sigma=9.8$  años) y drogas ilícitas de 6.5 años ( $\sigma=9.0$  años). Sin embargo, la mitad de los usuarios dejó pasar cuatro años desde el momento en que se inició el consumo de tabaco o alcohol y el momento de acudir a solicitar tratamiento, mientras que la el 56% de los usuarios dejaron pasar tres años desde el inicio de drogas ilegales.

**Figura 12. Lapso transcurrido entre el inicio del consumo de sustancias y el ingreso a tratamiento en CIJ según sexo**

	 Años			 Años		
	Tabaco	Alcohol	Drogas ilícitas	Tabaco	Alcohol	Drogas ilícitas
<b>Promedio</b>	8.7	8.7	6.9	7.0	6.7	4.7
<b>Desviación estándar</b>	10.2	10.1	9.0	9.3	8.8	7.2
<b>Mediana</b>	4	5	3	3	3	2
<b>Moda</b>	1	1	1	1	1	< un año

**Las mujeres solicitaron tratamiento en forma más oportuna**

**Tipo de consumo de drogas ilícitas.** De acuerdo con los terapeutas, 53.8% de los solicitantes de tratamiento fue diagnosticado con consumo funcional, 17.1% con consumo disfuncional, 15.5% con consumo social u ocasional, 11.0% con consumo experimental y 2.6% presentaba remisión del consumo.




**Las mujeres presentaron patrones de consumo de menor gravedad que los hombres**

**Total de drogas consumidas.** El promedio de sustancias utilizadas alguna vez en la vida, incluyendo alcohol o tabaco, fue de 4.1 drogas (94.1% reportó el uso de dos o más sustancias); en el último año fue de 3.4 drogas (88.6% consumió dos o más sustancias); y en los últimos 30 días fue de 2.1 drogas (65.3% reportó haber utilizado dos o más sustancias).

El promedio de sustancias utilizadas alguna vez en la vida, sin incluir alcohol y tabaco, fue de 2.4 drogas (55.4 % reportó el uso de dos o más sustancias); en el último año fue de 1.8 drogas (42.0% consumió dos o más sustancias); y en los últimos 30 días fue de 2.2 (67.7% reportó haber utilizado dos o más sustancias).

**Figura 14. Promedio de drogas consumidas según sexo**




*Mujeres y hombres consumieron, en promedio, un número similar de drogas*

**Consumo de drogas alguna vez en la vida.**<sup>d</sup> Las proporciones de consumo alguna vez en la vida de los diez grupos de sustancias fueron: *cannabis* (88.1%), alcohol (86.2%), tabaco (84.5%), cocaína (39.3%), inhalables (29.7%), estimulantes (27.1%), depresores (15.1%), drogas alucinógenas y disociativas (9.9%), opiáceos (3.9%) y otras sustancias de abuso (1.8%).

En cuanto al uso de sustancias específicas (contenidas en alguno de los diez grupos antes mencionados) sobresalen: marihuana (88.1%), cocaína en polvo (33.8%) solventes y removedores (20.7%), *crack* (17.1%), metanfetaminas (22.2%) y benzodiacepinas (14.5%); en menor proporción los pegamentos (8.6%), LSD (6.8%) y *éxtasis* y otras metanfetaminas alucinógenas (5.8%).

**Figura 15. Consumo de drogas alguna vez en la vida según sexo**




<sup>d</sup> Los casos pudieron haber reportado el consumo de dos o más sustancias, por lo que el total de los porcentajes no suma 100%.

**Consumo de drogas en los últimos 12 meses.** 92.5% de las personas reportaron haber consumido alguna sustancia en el año previo a su ingreso a tratamiento en CIJ. Las proporciones de consumo de los diez grupos de sustancias utilizadas en este lapso fueron: alcohol (78.9%), tabaco (76.6%), *cannabis* (75.9%), cocaína (27.8%), inhalables (22.3%), estimulantes (21.8%), depresores (10.9%), drogas alucinógenas y disociativas (6.1%); opiáceos (3.0%) y otras sustancias de abuso (1.3%).

En cuanto al consumo de sustancias específicas contenidas en alguno de los grupos anteriores destacaron: marihuana (75.9%), cocaína en polvo (21.9%), solventes y removedores (15.7%), metanfetaminas (18.5%) y *crack* (12.4%); en menor proporción se refieren a las benzodiacepinas (10.6%) y los pegamentos (5.6%).


**Figura 16. Consumo de drogas en los últimos 12 meses según sexo**



***Las drogas más consumidas en el último año por ambos sexos fueron alcohol, tabaco y cannabis; las mujeres usaron en mayor proporción benzodiacepinas y éxtasis, los hombres reportaron mayor proporción el uso de cannabis, cocaína en polvo y crack***


**Droga de preferencia en los últimos 12 meses.** Entre las sustancias más frecuentemente referidas se encontraron: cannabis (48.3%), alcohol (14.7%), tabaco (11.4%), inhalables (6.0%) y metanfetaminas (7.9%). En menores proporciones aparecieron: crack (3.8%), cocaína en polvo (2.5%) y heroína (1.8%).

**Figura 17. Droga de preferencia en los últimos 12 meses según sexo**




**Droga de mayor impacto en los últimos 12 meses.** Las principales sustancias a cuyo consumo los pacientes atribuyeron los mayores daños en la salud, en el bienestar personal y familiar o en el desempeño escolar, laboral o social y por las que pudieron haber solicitado tratamiento se encuentran: *cannabis* (45.8%), alcohol (12.4%), metanfetaminas (9.8%), inhalables (9.1%), tabaco (6.6%), *crack* (4.9%) y cocaína en polvo (3.5%).

**Figura 18. Droga de mayor impacto en los últimos 12 meses según sexo**



**Uso combinado de drogas en los últimos 12 meses.<sup>e</sup>** Al menos en una ocasión en el transcurso del último año y sin tomar en cuenta el consumo de tabaco, poco menos de la mitad de la población (44.1%) reportó el consumo en un mismo día de dos o más sustancias.

**Figura 19. Uso combinado de droga en los últimos 12 meses según sexo**




<sup>e</sup> No se toman en cuenta 2,314 casos (21.3%) que no cumplieron los criterios de inclusión de esta variable; 20.7% de los hombres y 24.2% de las mujeres (ver anexo).

**Consumo de drogas en los últimos 30 días.** Incluyendo alcohol y tabaco, 90.9% de los casos reportaron consumo de sustancias en el mes anterior al ingreso a tratamiento.

Las proporciones de consumo de los diez grupos de sustancias utilizadas en este lapso fueron: tabaco (63.0%), alcohol (55.0%), *cannabis* (54.4%), inhalables (12.4%), cocaína (12.7%), estimulantes (12.3%), depresores (5.4%), opiáceos (2.1%), drogas alucinógenas y disociativas (1.3%) y otras sustancias de abuso (0.8%).

En cuanto al consumo de sustancias específicas destacó el de marihuana con 54.4%, le siguen: solventes/removedores (8.8%), metanfetaminas (11.0%), cocaína en polvo (8.2%) y crack (6.3%); en menor proporción se registra el consumo de benzodiacepinas (5.2%) y pegamentos (2.6%).


**Figura 20. Consumo de drogas en los últimos 30 días según sexo**



***Hombres y mujeres consumieron predominantemente tabaco, alcohol y cannabis -los hombres en mayor proporción. Las mujeres reportaron mayor consumo de benzodiacepinas, metanfetaminas y alucinógenos***

**Frecuencia de episodios de abuso en los últimos 30 días.** 36.3% de quienes reportaron consumo de tabaco en los últimos 30 días aceptó fumar seis o más cigarrillos diariamente. Así mismo, entre quienes consumieron alcohol, la mayor parte (35.7%) reportó consumo abusivo menos de una vez a la semana y una o dos veces a la semana (32.7%). Por otra parte, 40.2% de los usuarios de drogas ilícitas durante el último mes reportaron consumirlas todos los días, 23.6% menos de una vez a la semana y 20.6% una a dos veces a la semana.

**Figura 21. Frecuencia de episodios de abuso en los últimos 30 días según sexo**



*La frecuencia de episodios de abuso de tabaco y alcohol es similar entre los sexos; pero los hombres consumieron en mayor proporción drogas ilícitas diario que las mujeres*

## REFERENCIAS

1. Sánchez-Huesca, R. y López Granados, L. (1985). ***Características demográficas y patrones de inicio en el consumo de drogas en asistentes a los Centros Locales; recuperación de los archivos de siete años (1976-1982)***. México: Centros de Integración Juvenil, A.C. (reporte interno).
2. Clarac Rengade, P. y Wagner Echeagaray, F. (1987). Análisis de algunas variables en una muestra de pacientes farmacodependientes (1986). En F. Wagner Echeagaray y R. Ortiz Mondragón (Comp.) (1990). ***Estudios acerca de la farmacodependencia en México realizados por Paule Clarac***. México: Centros de Integración Juvenil, A. C. (pp. 111-126).
3. García Aurrecochea, R., Diaz Negrete, B., Balanzario, M. C., Gutiérrez-López, A. Castillo-Franco, I. (1999). Características sociodemográficas y de consumo de drogas en pacientes atendidos entre 1990 y 1997. México: Centros de Integración Juvenil, A.C., Dirección de Promoción Institucional. ***Informe de investigación 98-12***.
4. Secretaría de Salud, Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, Dirección General de Epidemiología. Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (***SISVEA***) ***Informe 2009***. México.
5. Ortiz, A., Martínez, R., Meza, D. (2014) Grupo Interinstitucional para el desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. ***Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas"***. *Tendencias en el área metropolitana No. 55*. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.
6. Diaz, D. B., Balanzario, M. C., Castillo, I., Gutiérrez, A. y García, R. (2001). Uso de drogas entre pacientes de primer ingreso en Centros de Integración Juvenil. En Secretaría de Salud. ***Observatorio Epidemiológico en drogas. El fenómeno de las adicciones en México 2001***. México: Secretaría de Salud (pp. 66-71) (ISBN: 970-721-008-7). [http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/publicaciones/obs2001\\_cap4.pdf](http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/publicaciones/obs2001_cap4.pdf)
7. García-Aurrecochea, R., Diaz-Negrete, B., Balanzario, M. C., Castillo-Franco, I. (1998). ***Perfil y trayectoria del consumo de drogas en pacientes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil en 1996***. En CD: B. D. Diaz Negrete, J. Arellanez, M. C. Balanzario y R. Sánchez Huesca, *Once años de estudios del consumo de drogas en México, Investigaciones realizadas en Centros de Integración Juvenil entre 1997 y 2007*. México: Centros de Integración Juvenil.

8. Castillo Franco, P. I., Gutiérrez López, A. D. (2008). Consumo de drogas en mujeres asistentes a centros de tratamiento especializado en la Ciudad de México. **Salud Mental 31 (5)**, 351-359. <http://scielo.unam.mx/pdf/sm/v31n5/v31n5a3.pdf>
9. Gracia Gutiérrez de Velasco, S. E. y Balanzario Lorenzana, M. C. (2003). El consumo de drogas en menores de 12 años en Centros de Integración Juvenil en el año 2002. México: Centros de Integración Juvenil, A.C., Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación. **Informe de Investigación 03-17**.
10. García Aurrecoechea, R., Castillo Franco, P. I. y Guerrero Huesca, J. A. (2003). El consumo de drogas en pacientes atendidos en Centros de Integración Juvenil según la etapa de vida correspondiente al ingreso a tratamiento. México: Centros de Integración Juvenil, A.C., Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación. **Informe de Investigación 03-13**.
11. García Aurrecoechea, R., Díaz Negrete, B., Balanzario, M. C. (2001). Tendencias del consumo de drogas en pacientes de primer ingreso a tratamiento en CIJ entre 1990 y 1999. México: Centros de Integración Juvenil, A.C., Dirección de Promoción Institucional. **Informe de investigación 2000-06**.
12. Gutiérrez López, AD. (2015). Tendencias del consumo de drogas alguna vez en la vida en Centros de Integración Juvenil. Segundo semestre de 2004 – Segundo semestre de 2014 (Nivel Nacional y Entidades Federativas). México: Centros de Integración Juvenil, A.C., Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación. **Informe de Investigación 15-02e**. <http://www.cij.gob.mx/Programas/Investigacion/pdf/15-02e.pdf>
13. Gutiérrez López, AD. (2015). Tendencias del consumo de drogas en los últimos 30 días en Centros de Integración Juvenil. Segundo semestre de 2004 - Segundo semestre de 2014 (Nivel Nacional y Entidades Federativas). México: Centros de Integración Juvenil, A.C., Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación. **Informe de Investigación 15-02f**. <http://www.cij.gob.mx/Programas/Investigacion/pdf/15-02f.pdf>
14. Gutiérrez López, A. D. (2015). Droga de mayor impacto reportada por usuarios de drogas ilícitas en el año previo a la solicitud de tratamiento en Centros de Integración Juvenil. Segundo semestre de 2004 - Segundo semestre de 2014 (Nivel Nacional y Entidades Federativa). México: Centros de Integración Juvenil, A.C., Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación. **Informe de Investigación 15-02g**. <http://www.cij.gob.mx/Programas/Investigacion/pdf/15-02g.pdf>

15. Jiménez Silvestre K., García Aurrecochea, V. R. y González Sánchez, J. D. (2005). Patrón de Consumo de Cocaína y Crack en pacientes que ingresan a Tratamiento. México: Centros de Integración Juvenil, A.C., Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación. **Informe de investigación 05-07.**
16. Jiménez-Silvestre, K. y Castillo-Vite N.L. Factores de reincidencia en usuarios de cocaína, crack y metanfetaminas en fase de recuperación. México: Centros de Integración Juvenil, A.C., Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación. **Informe de Investigación 04-14.**
17. Gutiérrez López, A. D. y Castillo Franco, P. I. (2007). Características sociodemográficas y de consumo en usuarios de tabaco y alcohol de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil en 2006. México: Centros de Integración Juvenil, A.C., Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación. **Informe de Investigación 07-13.** <http://www.cij.gob.mx/Especialistas/pdf/07-13.pdf>
18. Gutiérrez López, A. D. (2015). Consumo de sustancias en pacientes de primer ingreso a tratamiento. Segundo semestre del 2014. Usuarios de tabaco y alcohol. México: Centros de Integración Juvenil, A.C., Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación. **Informe de Investigación 15-02d.** <http://www.cij.gob.mx/Programas/Investigacion/pdf/15-02d.pdf>
19. Moreno, K. (Coord.) (2010). **Los jóvenes y el alcohol en México. Un problema emergente en mujeres.** México: Centros de Integración Juvenil, A.C.
20. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz; Instituto Nacional de Salud Pública; Secretaría de Salud (2012). **Encuesta Nacional de Adicciones 2011: Reporte de Alcohol.** Medina-Mora ME, Villatoro JA, Fleiz C, Téllez MM, Mendoza LR, Romero M, Gutiérrez JP, Castro M, Hernández M, Tena C, Alvear C y Guisa V. México: INPRFM.
21. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz; Instituto Nacional de Salud Pública; Secretaría de Salud (2012). **Encuesta Nacional de Adicciones 2011: Reporte de Drogas.** Villatoro JA, Medina Mora ME, Fleiz C, Téllez MM, Mendoza LR, Romero M, Gutiérrez JP, Castro M, Hernández M, Tena C, Alvear C y Guisa V. México: INPRFM.
22. CD: **EBCO 2007-2008. Estudio Básico de Comunidad Objetivo Vol. 1 y 2.** México: Centros de Integración Juvenil, A.C., Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación.

---

## CUADROS

---

**CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS USUARIOS DE DROGAS DE PRIMER INGRESO A TRATAMIENTO A CIJ EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2015**

**Cuadro 1. Pacientes de primer ingreso por unidad de atención (CIJ, UH y UTH)**

CIJ	General		Hombres		Mujeres		Razón H:M
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	
Álvaro Obregón Norte	65	0.6	56	0.6	9	0.5	6.2 : 1
Álvaro Obregón Oriente	46	0.4	39	0.4	7	0.4	5.6 : 1
Azcapotzalco	132	1.2	110	1.2	22	1.1	5.0 : 1
Benito Juárez	78	0.7	65	0.7	13	0.7	5.0 : 1
Chalco	141	1.3	118	1.3	23	1.2	5.1 : 1
Coyoacán	96	0.9	77	0.9	19	1.0	4.1 : 1
Cuajimalpa	94	0.9	72	0.8	22	1.1	3.3 : 1
Cuauhtémoc Oriente	106	1.0	74	0.8	32	1.6	2.3 : 1
Cuauhtémoc Poniente	145	1.3	105	1.2	40	2.0	2.6 : 1
Ecatepec	224	2.1	187	2.1	37	1.9	5.1 : 1
Gustavo A. Madero Oriente	11	0.1	8	0.1	3	0.2	2.7 : 1
Gustavo A. Madero Aragón	167	1.5	151	1.7	16	0.8	9.4 : 1
Gustavo A. Madero Norte	128	1.2	106	1.2	22	1.1	4.8 : 1
Iztapalapa Oriente	404	3.7	341	3.8	63	3.2	5.4 : 1
Iztapalapa Poniente	110	1.0	83	0.9	27	1.4	3.1 : 1
Miguel Hidalgo	78	0.7	63	0.7	15	0.8	4.2 : 1
Naucalpan	145	1.3	125	1.4	20	1.0	6.3 : 1
Nezahualcóyotl	238	2.2	196	2.2	42	2.1	4.7 : 1
Texcoco	126	1.2	106	1.2	20	1.0	5.3 : 1
Tlalnepantla	158	1.5	132	1.5	26	1.3	5.1 : 1
Tlalpan	140	1.3	114	1.3	26	1.3	4.4 : 1
Venustiano Carranza	126	1.2	108	1.2	18	0.9	6.0 : 1
Xochimilco	21	0.2	16	0.2	5	0.3	3.2 : 1
UH Ecatepec	69	0.6	67	0.8	2	0.1	33.5 : 1
UH Iztapalapa	77	0.7	64	0.7	13	0.7	4.9 : 1
UH Naucalpan	45	0.4	38	0.4	7	0.4	5.4 : 1
Acapulco	140	1.3	111	1.2	29	1.5	3.8 : 1
Aguascalientes	171	1.6	137	1.5	34	1.7	4.0 : 1
Apodaca	62	0.6	56	0.6	6	0.3	9.3 : 1
Cancún	166	1.5	140	1.6	26	1.3	5.4 : 1
Cd. del Carmen	43	0.4	33	0.4	10	0.5	3.3 : 1
Cd. Juárez Norte	93	0.9	66	0.7	27	1.4	2.4 : 1
Cd. Victoria	27	0.2	25	0.3	2	0.1	12.5 : 1
Celaya	202	1.9	178	2.0	24	1.2	7.4 : 1
Chetumal	47	0.4	40	0.4	7	0.4	5.7 : 1

*(Continúa)*

**Cuadro 1. Pacientes de primer ingreso a tratamiento por Unidad de atención (CIJ, UH y UTUH)**  
(Continuación)

CIJ	General		Hombres		Mujeres		Razón H:M
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	
Chihuahua	276	2.5	230	2.6	46	2.3	5.0 : 1
Chilpancingo	52	0.5	37	0.4	15	0.8	2.5 : 1
Colima	189	1.7	156	1.8	33	1.7	4.7 : 1
Cozumel	66	0.6	50	0.6	16	0.8	3.1 : 1
Cuernavaca	78	0.7	66	0.7	12	0.6	5.5 : 1
Culiacán	143	1.3	131	1.5	12	0.6	10.9 : 1
Durango	79	0.7	59	0.7	20	1.0	3.0 : 1
Escuinapa	48	0.4	42	0.5	6	0.3	7.0 : 1
Fresnillo	47	0.4	33	0.4	14	0.7	2.4 : 1
Guadalajara Centro	197	1.8	158	1.8	39	2.0	4.1 : 1
Guadalajara Sur	116	1.1	91	1.0	25	1.3	3.6 : 1
Guadalupe	92	0.8	75	0.8	17	0.9	4.4 : 1
Guamúchil	66	0.6	60	0.7	6	0.3	10.0 : 1
Guasave	89	0.8	82	0.9	7	0.4	11.7 : 1
Hermosillo	152	1.4	126	1.4	26	1.3	4.8 : 1
Huatulco	22	0.2	16	0.2	6	0.3	2.7 : 1
Ixtapa Zihuatanejo	43	0.4	36	0.4	7	0.4	5.1 : 1
La Paz	91	0.8	69	0.8	22	1.1	3.1 : 1
La Piedad	51	0.5	38	0.4	13	0.7	2.9 : 1
Laguna Durango	74	0.7	60	0.7	14	0.7	4.3 : 1
León	200	1.8	175	2.0	25	1.3	7.0 : 1
Los Cabos	38	0.3	31	0.3	7	0.4	4.4 : 1
Los Mochis	43	0.4	33	0.4	10	0.5	3.3 : 1
Manzanillo	47	0.4	37	0.4	10	0.5	3.7 : 1
Mazatlán	116	1.1	93	1.0	23	1.2	4.0 : 1
Mérida	55	0.5	41	0.5	14	0.7	2.9 : 1
Mexicali	207	1.9	158	1.8	49	2.5	3.2 : 1
Monterrey	146	1.3	126	1.4	20	1.0	6.3 : 1
Morelia	82	0.8	74	0.8	8	0.4	9.3 : 1
Nogales	113	1.0	91	1.0	22	1.1	4.1 : 1
Oaxaca	105	1.0	92	1.0	13	0.7	7.1 : 1
Pachuca	153	1.4	116	1.3	37	1.9	3.1 : 1
Playa del Carmen	48	0.4	34	0.4	14	0.7	2.4 : 1
Poza Rica	39	0.4	31	0.3	8	0.4	3.9 : 1
Puebla	127	1.2	104	1.2	23	1.2	4.5 : 1
Puerto Vallarta	101	0.9	75	0.8	26	1.3	2.9 : 1
Querétaro	128	1.2	99	1.1	29	1.5	3.4 : 1
Reynosa	14	0.1	12	0.1	2	0.1	6.0 : 1

(Continúa)

**Cuadro 1. Pacientes de primer ingreso a tratamiento por Unidad de atención (CIJ, UH y UTUH)**  
(Continuación)

CIJ	General		Hombres		Mujeres		Razón H:M
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	
Salamanca	119	1.1	102	1.1	17	0.9	6.0 : 1
Saltillo	234	2.2	184	2.1	50	2.5	3.7 : 1
San Luis Potosí	150	1.4	111	1.2	39	2.0	2.8 : 1
San Nicolás de los Garza	85	0.8	72	0.8	13	0.7	5.5 : 1
Tampico	104	1.0	88	1.0	16	0.8	5.5 : 1
Tapachula	34	0.3	26	0.3	8	0.4	3.3 : 1
Tecomán	66	0.6	57	0.6	9	0.5	6.3 : 1
Tehuacán	58	0.5	54	0.6	4	0.2	13.5 : 1
Tepic	46	0.4	33	0.4	13	0.7	2.5 : 1
Tijuana Guaycura	181	1.7	129	1.5	52	2.6	2.5 : 1
Tijuana Soler	184	1.7	147	1.7	37	1.9	4.0 : 1
Tlaquepaque	188	1.7	161	1.8	27	1.4	6.0 : 1
Tlaxcala	23	0.2	20	0.2	3	0.2	6.7 : 1
Toluca	217	2.0	187	2.1	30	1.5	6.2 : 1
Torreón	35	0.3	33	0.4	2	0.1	16.5 : 1
Torreón Oriente	151	1.4	116	1.3	35	1.8	3.3 : 1
Tuxtla Gutiérrez	64	0.6	52	0.6	12	0.6	4.3 : 1
Villahermosa	66	0.6	54	0.6	12	0.6	4.5 : 1
Xalapa	96	0.9	78	0.9	18	0.9	4.3 : 1
Yucatán	79	0.7	59	0.7	20	1.0	3.0 : 1
Zacatecas	118	1.1	92	1.0	26	1.3	3.5 : 1
Zamora	104	1.0	82	0.9	22	1.1	3.7 : 1
Zapopan Norte	204	1.9	164	1.8	40	2.0	4.1 : 1
UH Ciudad Juárez	19	0.2	15	0.2	4	0.2	3.8 : 1
UH Culiacán	29	0.3	29	0.3	0	0.0	---
UH Ixbalanqué	11	0.1	8	0.1	3	0.2	2.7 : 1
UH Jerez	59	0.5	51	0.6	8	0.4	6.4 : 1
UH Nuevo León	51	0.5	44	0.5	7	0.4	6.3 : 1
UH Punta Diamante	34	0.3	29	0.3	5	0.3	5.8 : 1
UH Tijuana	51	0.5	43	0.5	8	0.4	5.4 : 1
UH Zapopan	22	0.2	18	0.2	4	0.2	4.5 : 1
UH Zapotlán el Grande	17	0.2	17	0.2	0	0.0	---
UTUH Cd. Juárez	69	0.6	58	0.7	11	0.6	5.3 : 1
UTUH Tijuana	40	0.4	36	0.4	4	0.2	9.0 : 1
<b>Total</b>	<b>10,862</b>	<b>100.0</b>	<b>8,893</b>	<b>100.0</b>	<b>1,969</b>	<b>100.0</b>	<b>4.5 : 1</b>

UH=Unidad de Hospitalización

UTUH=Unidad de Tratamiento para Usuarios de Heroína

**Cuadro 2. Sexo**

	Frec.	%	Razón H:M
Hombres	8,893	81.9	
Mujeres	1,969	18.1	4.5 : 1
<b>Total</b>	<b>10,872</b>	<b>100.0</b>	

**Cuadro 3. Persona que proporciona la información**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Usuario de drogas	4,067	37.4	41.4	3,346	37.6	41.6	721	36.6	40.9
Usuario de drogas y familiares u otras personas	5,748	52.9	58.6	4,706	52.9	58.4	1,042	52.9	59.1
<i>Sin Información</i>	1,047	9.6	<i>Se omite</i>	841	9.5	<i>Se omite</i>	206	10.5	<i>Se omite</i>
<b>Total</b>	<b>10,872</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>8,893</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>1,969</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

**Cuadro 4. Edad de ingreso a tratamiento**

	General*			Hombres**			Mujeres***		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Hasta 9 años	3	0.0	0.0	3	0.0	0.0	0	0.0	0.0
10 a 14 años	1,724	15.9	15.9	1,257	14.1	14.1	467	23.7	23.7
15 a 19 años	4,577	42.1	42.1	3,788	42.6	42.6	789	40.1	40.1
20 a 24 años	1,487	13.7	13.7	1,247	14.0	14.0	240	12.2	12.2
25 a 29 años	905	8.3	8.3	748	8.4	8.4	157	8.0	8.0
30 a 34 años	694	6.4	6.4	599	6.7	6.7	95	4.8	4.8
35 a 39 años	467	4.3	4.3	406	4.6	4.6	61	3.1	3.1
40 a 44 años	391	3.6	3.6	343	3.9	3.9	48	2.4	2.4
45 años y más	613	5.6	5.6	502	5.6	5.6	111	5.6	5.6
<i>Sin información</i>	1	0.0	<i>Se omite</i>	0.0	0.0	<i>Se omite</i>	1	0.1	<i>Se omite</i>
<b>Total</b>	<b>10,862</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>8,893</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>1,969</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

\*  $\mu = 22.4$ ;  $\sigma = 10.6$ ;  $Mdn = 18$ ;  $Mo = 16$ ; Decil1 = 14

\*\*  $\mu = 22.7$ ;  $\sigma = 10.6$ ;  $Mdn = 18$ ;  $Mo = 16$ ; Decil1 = 14

\*\*\*  $\mu = 21.2$ ;  $\sigma = 10.4$ ;  $Mdn = 17$ ;  $Mo = 14$ ; Decil1 = 13

**Cuadro 5. Estado civil**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Soltero	8,094	74.5	74.6	6,588	74.1	74.2	1,506	76.5	76.5
Casado	941	8.7	8.7	824	9.3	9.3	117	5.9	5.9
Unión libre	1,077	9.9	9.9	886	10.0	10.0	191	9.7	9.7
Separado	583	5.4	5.4	468	5.3	5.3	115	5.8	5.8
Divorciado	119	1.1	1.1	97	1.1	1.1	22	1.1	1.1
Viudo	37	0.3	0.3	20	0.2	0.2	17	0.9	0.9
<i>Sin información</i>	11	0.1	<i>Se omite</i>	10	0.1	<i>Se omite</i>	1	0.1	<i>Se omite</i>
<b>Total</b>	<b>10,862</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>8,893</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>1,969</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

**Cuadro 6. Escolaridad**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Ninguna (no sabe leer ni escribir)	39	0.4	0.4	35	0.4	0.4	4	0.2	0.2
Ninguna (sabe leer y escribir)	31	0.3	0.3	23	0.3	0.3	8	0.4	0.4
Primaria incompleta	313	2.9	2.9	269	3.0	3.0	44	2.2	2.2
Primaria completa	514	4.7	4.7	414	4.7	4.7	100	5.1	5.1
Secundaria incompleta	2,992	27.5	27.5	2,346	26.4	26.4	646	32.8	32.8
Secundaria completa	1,635	15.1	15.1	1,377	15.5	15.5	258	13.1	13.1
Estudios técnicos o comerciales incompletos	172	1.6	1.6	140	1.6	1.6	32	1.6	1.6
Estudios técnicos o comerciales completos	74	0.7	0.7	56	0.6	0.6	18	0.9	0.9
Bachillerato incompleto	3,387	31.2	31.2	2,830	31.8	31.8	557	28.3	28.3
Bachillerato completo	771	7.1	7.1	645	7.3	7.3	126	6.4	6.4
Estudios superiores incompletos	659	6.1	6.1	543	6.1	6.1	116	5.9	5.9
Estudios superiores completos	246	2.3	2.3	197	2.2	2.2	49	2.5	2.5
Estudios de posgrado incompletos	10	0.1	0.1	7	0.1	0.1	3	0.2	0.2
Estudios de posgrado completos	18	0.2	0.2	10	0.1	0.1	8	0.4	0.4
<i>Sin información</i>	1	0.0	<i>Se omite</i>	1	0.0	<i>Se omite</i>	0.0	0.0	<i>Se omite</i>
<b>Total</b>	<b>10,862</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>8,893</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>1,969</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

**Cuadro 7. Ocupación**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Desempleado(a)	2,276	21.0	21.0	1,892	21.3	21.3	384	19.5	19.5
Estudiante	4,366	40.2	40.2	3,445	38.7	38.7	921	46.8	46.8
Estudiante que trabaja	517	4.8	4.8	448	5.0	5.0	69	3.5	3.5
Trabaja	3,308	30.5	30.5	2,969	33.4	33.4	339	17.2	17.2
Tareas del hogar	337	3.1	3.1	91	1.0	1.0	246	12.5	12.5
Pensionado	56	0.5	0.5	46	0.5	0.5	10	0.5	0.5
<i>Sin información</i>	2	0.0	<i>Se omite</i>	2	0.0	<i>Se omite</i>	0.0	0.0	<i>Se omite</i>
<b>Total</b>	<b>10,862</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>8,893</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>1,969</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

**Cuadro 8. Estrato social**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Alto	50	0.5	0.5	42	0.5	0.5	8	0.4	0.4
Medio alto	551	5.1	5.1	448	5.0	5.0	103	5.2	5.2
Medio	2,297	21.1	21.2	1,861	20.9	21.0	436	22.1	22.2
Medio bajo	5,338	49.1	49.2	4,362	49.0	49.1	976	49.6	49.6
Bajo	2,529	23.3	23.3	2,103	23.6	23.7	426	21.6	21.6
Pobreza extrema o marginación	80	0.7	0.7	61	0.7	0.7	19	1.0	1.0
<i>Sin información</i>	17	0.2	<i>Se omite</i>	16	0.2	<i>Se omite</i>	1	0.1	<i>Se omite</i>
<b>Total</b>	<b>10,862</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>8,893</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>1,969</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

**FACTORES ASOCIADOS A LA DEMANDA DE TRATAMIENTO EN PACIENTES DE PRIMER INGRESO A TRATAMIENTO EN CIJ EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2015**

**Cuadro 9. Motivos de consulta**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Consumo de drogas ilícitas	9,678	89.1	7,993	89.9	1,685	85.6
Consumo de bebidas alcohólicas	4,514	41.6	3,718	41.8	796	40.4
Consumo de tabaco	4,211	38.8	3,441	38.7	770	39.1
Otro motivo	182	1.7	141	1.6	41	2.1
<i>Ningún motivo específico reportado</i>	131	1.2	92	1.0	39	2.0
<i>Usuarios que reportaron dos o más motivos de consulta</i>	4,944	45.5	4,063	45.7	881	44.7

**Cuadro 10. Condicionantes de la solicitud de tratamiento**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Por propia iniciativa	4,020	37.0	3,287	37.0	733	37.2
Por condicionamiento o recomendación familiar	4,879	44.9	3,996	44.9	883	44.8
Por recomendación de pares	177	1.6	140	1.6	37	1.9
Por condicionamiento o recomendación escolar	2,421	22.3	1,995	22.4	426	21.6
Por condicionamiento legal	887	8.2	756	8.5	131	6.7
Por condicionamiento o recomendación laboral	194	1.8	184	2.1	10	0.5
Por indicación médica	935	8.6	725	8.2	210	10.7
Por solicitud de novia(o)	31	0.3	26	0.3	60	3.0
Otros condicionantes de solicitud de tratamiento	300	2.8	240	2.7	5	0.3
<i>Ningún condicionante reportado</i>	167	1.5	128	1.4	39	2.0
<i>Pacientes que reportaron dos o más condicionantes de la solicitud de tratamiento</i>	2,786	25.6	2,286	25.7	500	25.4

**Cuadro 11. Antecedentes de acciones contra el consumo de sustancias**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Juramento	561	5.2	508	5.7	53	2.7
Grupo de autoayuda	767	7.1	678	7.6	89	4.5
Internamiento en anexo	1,243	11.4	1,093	12.3	150	7.6
Intervención de emergencia	58	0.5	51	0.6	7	0.4
Programa de mantenimiento	123	1.1	101	1.1	22	1.1
Tratamiento médico no especializado	72	0.7	58	0.7	14	0.7
Tratamiento psiquiátrico o psicoterapéutico ambulatorio	623	5.7	509	5.7	114	5.8
Tratamiento psiquiátrico o psicoterapéutico residencial	187	1.7	152	1.7	35	1.8
Medicina tradicional o alternativa	34	0.3	24	0.3	10	0.5
Intento de interrupción voluntaria del consumo, sin apoyo	3,392	31.2	2,811	31.6	581	29.5
Otras acciones	2,812	25.9	2,265	25.5	547	27.8
<i>Ninguna acción previa reportada</i>	<i>2,747</i>	<i>25.3</i>	<i>2,182</i>	<i>24.5</i>	<i>565</i>	<i>28.7</i>
<i>Pacientes que reportaron dos o más acciones contra el consumo de sustancias antes de solicitar tratamiento en CIJ</i>	<i>1,263</i>	<i>11.6</i>	<i>1,093</i>	<i>12.3</i>	<i>170</i>	<i>8.6</i>

**Cuadro 12. Problemas asociados al consumo de sustancias**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Problemas de salud	4,493	41.4	3,631	40.8	862	43.8
Accidentes o lesiones	1,373	12.6	1,184	13.3	189	9.6
Problemas familiares	8,662	79.7	7,105	79.9	1,557	79.1
Problemas escolares	4,526	41.7	3,645	41.0	881	44.7
Problemas laborales	2,233	20.6	2,020	22.7	213	10.8
Problemas psicológicos	4,455	41.0	3,569	40.1	886	45.0
Problemas legales	2,230	20.5	1,992	22.4	238	12.1
Conducta antisocial o delictiva	1,676	15.4	1,455	16.4	221	11.2
Otros problemas	442	4.1	367	4.1	75	3.8
<i>Ningún problema asociado reportado</i>	<i>499</i>	<i>4.6</i>	<i>406</i>	<i>4.6</i>	<i>93</i>	<i>4.7</i>
<i>Pacientes que reportaron dos o más problemas asociados</i>	<i>8,429</i>	<i>77.6</i>	<i>6,905</i>	<i>77.6</i>	<i>1,524</i>	<i>77.4</i>

**CARACTERÍSTICAS DEL CONSUMO DE DROGAS EN PACIENTES DE PRIMER INGRESO A TRATAMIENTO EN CIJ EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2015**

**Cuadro 13. Edad de inicio del consumo de tabaco**

	General*			Hombres**			Mujeres***		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Hasta 9 años	339	3.1	3.7	295	3.3	3.9	44	2.2	2.7
10 a 14 años	5,047	46.5	55.0	4,101	46.1	54.4	946	48	57.8
15 a 19 años	3,395	31.3	37.0	2,834	31.9	37.6	561	28.5	34.3
20 a 24 años	262	2.4	2.9	213	2.4	2.8	49	2.5	3.0
25 a 29 años	79	0.7	.9	53	0.6	0.7	26	1.3	1.6
30 años y más	52	0.5	0.5	31	0.5	0.5	11	0.6	0.7
No consumió	1,684	15.5	Se omite	1,352	15.2	Se omite	332	16.9	Se omite
Sin información	4	0.0	Se omite	4	0.0	Se omite	0.0	0.0	Se omite
<b>Total</b>	<b>10,862</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>8,893</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>1,969</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

\*  $\mu = 14.3$ ;  $\sigma = 3.3$ ;  $Mdn = 14$ ;  $Mo = 14$ ; Decil1 = 11

\*\*  $\mu = 14.2$ ;  $\sigma = 3.2$ ;  $Mdn = 14$ ;  $Mo = 14$ ; Decil1 = 11

\*\*\*  $\mu = 14.3$ ;  $\sigma = 3.4$ ;  $Mdn = 14$ ;  $Mo = 13$ ; Decil1 = 11

**Cuadro 14. Edad de inicio del consumo de alcohol**

	General*			Hombres**			Mujeres***		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Hasta 9 años	376	3.5	4.0	315	3.5	4.1	61	3.1	3.7
10 a 14 años	4,610	42.4	49.3	3,726	41.9	48.4	884	44.9	53.3
15 a 19 años	4,021	37.0	43.0	3,394	38.2	44.1	627	31.8	37.8
20 a 24 años	266	2.4	2.8	210	2.4	2.7	56	2.8	3.4
25 a 29 años	51	0.5	0.5	36	0.4	0.5	15	0.8	0.9
30 a 34 años	20	0.2	0.2	12	0.1	0.2	8	0.4	0.5
35 a 39 años	6	0.1	0.1	3	0.0	0.0	3	0.2	0.2
40 a 44 años	2	0.0	0.0	1	0.0	0.0	1	0.1	0.1
45 años y más	3	0.0	0.0	1	0.0	0.0	2	0.1	0.1
No consumió	1,500	13.8	Se omite	1,190	13.4	Se omite	310	15.7	Se omite
Sin información	7	0.1	Se omite	5	0.1	Se omite	2	0.1	Se omite
<b>Total</b>	<b>10,862</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>8,893</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>1,969</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

\*  $\mu = 14.4$ ;  $\sigma = 3.0$ ;  $Mdn = 14$ ;  $Mo = 15$ ; Decil1 = 11

\*\*  $\mu = 14.4$ ;  $\sigma = 2.9$ ;  $Mdn = 14$ ;  $Mo = 15$ ; Decil1 = 11

\*\*\*  $\mu = 14.4$ ;  $\sigma = 3.5$ ;  $Mdn = 14$ ;  $Mo = 15$ ; Decil1 = 12

**Cuadro 15. Edad de inicio del consumo de drogas ilícitas**

	General*			Hombres**			Mujeres***		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Hasta 9 años	98	0.9	0.9	88	1	1	10	0.5	0.5
10 a 14 años	4,881	44.9	45.0	3,955	44.5	44.5	926	47	47
15 a 19 años	4,627	42.6	42.6	3,880	43.6	43.7	747	37.9	37.9
20 a 24 años	640	5.9	5.9	529	5.9	6	111	5.6	5.6
25 a 29 años	288	2.7	2.7	214	2.4	2.4	74	3.8	3.8
30 a 34 años	135	1.2	1.2	104	1.2	1.2	31	1.6	1.6
35 a 39 años	73	0.7	0.7	47	0.5	0.5	26	1.3	1.3
40 a 44 años	49	0.5	0.5	35	0.4	0.4	14	0.7	0.7
45 años y más	63	0.6	0.6	33	0.4	0.4	30	1.5	1.5
<i>Sin información</i>	8	0.1	<i>Se omite</i>	8	.1	<i>Se omite</i>	0	0.0	<i>Se omite</i>
<b>Total</b>	<b>10,862</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>8,893</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>1,969</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

\*  $\mu = 15.9$ ;  $\sigma = 5.2$ ;  $Mdn = 15$ ;  $Mo = 15$ ; Decil1 = 12

\*\*  $\mu = 15.7$ ;  $\sigma = 4.7$ ;  $Mdn = 15$ ;  $Mo = 15$ ; Decil1 = 12

\*\*\*  $\mu = 16.5$ ;  $\sigma = 6.7$ ;  $Mdn = 15$ ;  $Mo = 13$ ; Decil1 = 12

**Cuadro 16. Drogas ilícitas de inicio**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
<b>Cannabis</b>	<b>8,167</b>	<b>75.2</b>	<b>6,776</b>	<b>76.2</b>	<b>1,391</b>	<b>70.6</b>
Mariguana	8,159	75.1	6,769	76.1	1,390	70.6
Hachís	8	0.1	7	0.1	1	0.1
<b>Cocaína</b>	<b>932</b>	<b>8.6</b>	<b>808</b>	<b>9.1</b>	<b>124</b>	<b>6.3</b>
Polvo blanco	724	6.7	634	7.1	90	4.6
<i>Crack</i>	206	1.9	172	1.9	34	1.7
Otra presentación	2	0.0	2	0.0	0	0.0
<b>Inhalables</b>	<b>1,100</b>	<b>10.1</b>	<b>883</b>	<b>9.9</b>	<b>217</b>	<b>11.0</b>
Solventes o removedores	740	6.8	603	6.8	137	7.0
Pegamentos	196	1.8	171	1.9	25	1.3
Esmaltes o pinturas	143	1.3	95	1.1	48	2.4
Otros	21	0.2	14	0.2	7	0.4
<b>Depresores</b>	<b>179</b>	<b>1.6</b>	<b>83</b>	<b>0.9</b>	<b>96</b>	<b>4.9</b>
Benzodiacepinas	172	1.6	77	0.9	95	4.8
<i>Rohypnol</i> <sup>®</sup>	2	0.0	2	0.0	0	0.0
Otros	5	0.0	4	0.0	1	0.1
<b>Estimulantes</b>	<b>387</b>	<b>3.6</b>	<b>277</b>	<b>3.1</b>	<b>110</b>	<b>5.6</b>
Anfetamina	49	0.5	43	0.5	6	0.3
Metanfetaminas	295	2.7	204	2.3	91	4.6
Éxtasis (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas	27	0.2	17	0.2	10	0.5
Otros	16	0.1	13	0.1	3	0.2
<b>Drogas alucinógenas y disociativas</b>	<b>33</b>	<b>0.3</b>	<b>26</b>	<b>0.3</b>	<b>7</b>	<b>0.4</b>
LSD	9	0.1	6	0.1	3	0.2
Plantas alucinógenas y derivados	21	0.2	17	0.2	4	0.2
Otras	3	0.0	3	0.0	0	0.0
<b>Opiáceos</b>	<b>36</b>	<b>0.3</b>	<b>28</b>	<b>0.3</b>	<b>8</b>	<b>0.4</b>
Heroína	24	0.2	20	0.2	4	0.2
Opiáceos Sintéticos	6	0.1	4	0.0	2	0.1
Opio y otros opiáceos	6	0.1	4	0.0	2	0.1
<b>Otras sustancias de abuso</b>	<b>28</b>	<b>0.3</b>	<b>12</b>	<b>0.1</b>	<b>16</b>	<b>0.8</b>
Con utilidad médica	11	0.1	4	0.0	7	0.4
Otras	17	0.2	8	0.1	9	0.5
<b>Total</b>	<b>10,862</b>	<b>100.0</b>	<b>8,893</b>	<b>100.0</b>	<b>1,969</b>	<b>100.0</b>

**Cuadro 17. Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de tabaco y el ingreso a tratamiento en CIJ**

	General*			Hombres**			Mujeres***		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
< de un año	748	6.9	8.2	571	6.4	7.6	177	9.0	10.8
1 a 5 años	4,484	41.3	48.9	3,622	40.7	48.1	862	43.8	52.7
6 a 10 años	1,438	13.2	15.7	1,199	13.5	15.9	239	12.1	14.6
11 a 15 años	801	7.4	8.7	671	7.5	8.9	130	6.6	7.9
16 a 20 años	616	5.7	6.7	532	6.0	7.1	84	4.3	5.1
21 a 25 años	359	3.3	3.9	311	3.5	4.1	48	2.4	2.9
26 o más años	728	6.7	7.9	631	7.1	8.4	97	4.9	5.9
No consumió	1,684	15.5	Se omite	1,352	15.2	Se omite	332	16.9	Se omite
Sin información	4	0.0	Se omite	4	0.0	Se omite	0	0.0	Se omite
<b>Total</b>	<b>10,862</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>8,893</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>1,969</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

\*  $\mu=8.4$ ;  $\sigma=10.1$ ;  $Mdn=4$ ;  $Mo=1$ ; Decil1 = 1

\*\*  $\mu=8.7$ ;  $\sigma=10.2$ ;  $Mdn=4$ ;  $Mo=1$ ; Decil1 = 1

\*\*\*  $\mu=7.0$ ;  $\sigma=9.3$ ;  $Mdn=3$ ;  $Mo=1$ ; Decil1 = < un año

**Cuadro 18. Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de alcohol y el ingreso a tratamiento en CIJ**

	General*			Hombres**			Mujeres***		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
< de un año	721	6.6	7.7	540	6.1	7.0	181	9.2	10.9
1 a 5 años	4,473	41.2	47.8	3,614	40.6	46.9	859	43.6	51.9
6 a 10 años	1,537	14.2	16.4	1,281	14.4	16.6	256	13.0	15.5
11 a 15 años	885	8.1	9.5	752	8.5	9.8	133	6.8	8.0
16 a 20 años	569	5.2	6.1	493	5.5	6.4	76	3.9	4.6
21 a 25 años	399	3.7	4.3	348	3.9	4.5	51	2.6	3.1
26 o más años	770	7.1	8.2	670	7.5	8.7	100	5.1	6.0
No consumió	1,500	13.8	Se omite	1,190	13.4	Se omite	310	15.7	Se omite
Sin información	8	0.1	Se omite	5	0.1	Se omite	3	0.2	Se omite
<b>Total</b>	<b>10,862</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>8,893</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>1,969</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

\*  $\mu=8.6$ ;  $\sigma=9.8$ ;  $Mdn=4$ ;  $Mo=1$ ; Decil1 = 1

\*\*  $\mu=8.7$ ;  $\sigma=10.1$ ;  $Mdn=5$ ;  $Mo=1$ ; Decil1 = 1

\*\*\*  $\mu=6.7$ ;  $\sigma=8.8$ ;  $Mdn=3$ ;  $Mo=1$ ; Decil1 = < un año

**Cuadro 19. Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de drogas ilícitas y el ingreso a tratamiento en CIJ**

	General*			Hombres**			Mujeres***		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
< de un año	1,776	16.4	16.4	1,320	14.8	14.9	456	23.2	23.2
1 a 5 años	5,420	49.9	49.9	4,392	49.4	49.4	1,028	52.2	52.2
6 a 10 años	1,410	13.0	13.0	1,184	13.3	13.3	226	11.5	11.5
11 a 15 años	780	7.2	7.2	672	7.6	7.6	108	5.5	5.5
16 a 20 años	530	4.9	4.9	479	5.4	5.4	51	2.6	2.6
21 a 25 años	363	3.3	3.3	326	3.7	3.7	37	1.9	1.9
26 o más años	574	5.3	5.3	512	5.8	5.8	62	3.1	3.2
<i>Sin información</i>	9	0.1	<i>Se omite</i>	8	0.1	<i>Se omite</i>	1	0.1	<i>Se omite</i>
<b>Total</b>	<b>10,862</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>8,893</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>1,969</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

\*  $\mu=6.5$ ;  $\sigma=8.8$ ;  $Mdn=3$ ;  $Mo=1$ ; Decil1 = < un año

\*\*  $\mu=6.9$ ;  $\sigma=9.0$ ;  $Mdn=3$ ;  $Mo=1$ ; Decil1 = < un año

\*\*\*  $\mu=4.7$ ;  $\sigma=7.2$ ;  $Mdn=2$ ;  $Mo=<$  un año; Decil1 = < un año

**Cuadro 20. Tipo de consumo de drogas ilícitas**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Experimental	1,193	11.0	11.0	872	9.8	9.8	321	16.3	16.3
Social u ocasional	1,676	15.4	15.5	1,317	14.8	14.8	359	18.2	18.3
Funcional	5,838	53.7	53.8	4,897	55.1	55.1	941	47.8	47.9
Disfuncional	1,859	17.1	17.1	1,563	17.6	17.6	296	15.0	15.1
En remisión	278	2.6	2.6	231	2.6	2.6	47	2.4	2.4
<i>Sin información</i>	18	0.2	<i>Se omite</i>	13	0.1	<i>Se omite</i>	5	0.3	<i>Se omite</i>
<b>Total</b>	<b>10,862</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>8,893</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>1,969</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

**Cuadro 21. Total de drogas consumidas alguna vez en la vida  
(Incluye alcohol o tabaco)**

	General*		Hombres**		Mujeres***	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
1 sustancia	642	5.9	502	5.6	140	7.1
2 sustancias	1,103	10.2	885	10.0	218	11.1
3 sustancias	3,329	30.6	2,696	30.3	633	32.1
4 sustancias	2,170	20.0	1,761	19.8	409	20.8
5 sustancias	1,390	12.8	1,143	12.9	247	12.5
6 sustancias	886	8.2	737	8.3	149	7.6
7 sustancias	523	4.8	452	5.1	71	3.6
8 sustancias	345	3.2	297	3.3	48	2.4
9 sustancias	211	1.9	194	2.2	17	0.9
10 sustancias	99	0.9	83	0.9	16	0.8
11-19 sustancias	164	1.5	143	1.6	21	1.1
<b>Total</b>	<b>10,862</b>	<b>100.0</b>	<b>8,893</b>	<b>100.0</b>	<b>1,969</b>	<b>100.0</b>

\*  $\mu = 4.1$ ;  $\sigma = 2.1$ ;  $Mdn = 4$ ;  $Mo = 3$ ; Decil1 = 2

\*\*  $\mu = 4.2$ ;  $\sigma = 2.1$ ;  $Mdn = 4$ ;  $Mo = 3$ ; Decil1 = 2

\*\*\*  $\mu = 3.9$ ;  $\sigma = 1.9$ ;  $Mdn = 3$ ;  $Mo = 3$ ; Decil1 = 2

**Cuadro 22. Total de drogas ilícitas consumidas alguna vez en la vida  
(No incluye ni alcohol ni tabaco)**

	General*		Hombres**		Mujeres***	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
1 sustancia	4,585	42.2	3,686	41.4	899	45.7
2 sustancias	2,488	22.9	2,013	22.6	475	24.1
3 sustancias	1,491	13.7	1,228	13.8	263	13.4
4 sustancias	922	8.5	771	8.7	151	7.7
5 sustancias	543	5.0	468	5.3	75	3.8
6 sustancias	351	3.2	301	3.4	50	2.5
7 sustancias	212	2.0	194	2.2	18	0.9
8 sustancias	104	1.0	88	1.0	16	0.8
9 sustancias	80	0.7	67	0.8	13	0.7
10 sustancias	48	0.4	41	0.5	7	0.4
11-17 sustancias	38	0.3	36	0.4	2	0.1
<b>Total</b>	<b>10,862</b>	<b>100.0</b>	<b>8,893</b>	<b>100.0</b>	<b>1,969</b>	<b>100.0</b>

\*  $\mu = 2.4$ ;  $\sigma = 1.9$ ;  $Mdn = 2$ ;  $Mo = 1$ ; Decil1 = 1

\*\*  $\mu = 2.5$ ;  $\sigma = 1.9$ ;  $Mdn = 2$ ;  $Mo = 1$ ; Decil1 = 1

\*\*\*  $\mu = 2.2$ ;  $\sigma = 1.7$ ;  $Mdn = 2$ ;  $Mo = 1$ ; Decil1 = 1

**Cuadro 23. Consumo de drogas alguna vez en la vida por sustancia**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
<b>Tabaco</b>	<b>9,178</b>	<b>84.5</b>	<b>7,541</b>	<b>84.8</b>	<b>1,637</b>	<b>83.1</b>
<b>Alcohol</b>	<b>9,362</b>	<b>86.2</b>	<b>7,703</b>	<b>86.6</b>	<b>1,659</b>	<b>84.3</b>
<b>Cannabis</b>	<b>9,566</b>	<b>88.1</b>	<b>7,923</b>	<b>89.1</b>	<b>1,643</b>	<b>83.4</b>
Mariguana	9,566	88.1	7,923	89.1	1,643	83.4
Hachís	527	4.9	443	5.0	84	4.3
<b>Cocaína</b>	<b>4,273</b>	<b>39.3</b>	<b>3,657</b>	<b>41.1</b>	<b>616</b>	<b>31.3</b>
Polvo blanco	3,673	33.8	3,148	35.4	525	26.7
Crack	1,858	17.1	1,636	18.4	222	11.3
Otra presentación de cocaína	46	0.4	39	0.4	7	0.4
<b>Inhalables</b>	<b>3,231</b>	<b>29.7</b>	<b>2,697</b>	<b>30.3</b>	<b>534</b>	<b>27.1</b>
Solventes o removedores	2,247	20.7	1,902	21.4	345	17.5
Pegamentos	937	8.6	799	9.0	138	7.0
Esmaltes o pinturas	540	5.0	422	4.7	118	6.0
Otros inhalables	141	1.3	114	1.3	27	1.4
<b>Depresores</b>	<b>1,637</b>	<b>15.1</b>	<b>1,293</b>	<b>14.5</b>	<b>344</b>	<b>17.5</b>
Benzodiacepinas	1,576	14.5	1,240	13.9	336	17.1
Rohypnol	102	0.9	92	1.0	10	0.5
Otros depresores	29	0.3	23	0.3	6	0.3
<b>Estimulantes</b>	<b>2,947</b>	<b>27.1</b>	<b>2,412</b>	<b>27.1</b>	<b>535</b>	<b>27.2</b>
Anfetamina	215	2.0	179	2.0	36	1.8
Metanfetaminas	2,408	22.2	1,994	22.4	414	21.0
Éxtasis (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas	633	5.8	497	5.6	136	6.9
Otros estimulantes	49	0.5	42	0.5	7	0.4
<b>Drogas alucinógenas y disociativas</b>	<b>1,075</b>	<b>9.9</b>	<b>898</b>	<b>10.1</b>	<b>177</b>	<b>9.0</b>
LSD	742	6.8	605	6.8	137	7.0
Plantas alucinógenas y derivados	545	5.0	471	5.3	74	3.8
Otras drogas alucinógenas y disoc.	46	0.4	42	0.5	4	0.2
<b>Opiáceos</b>	<b>424</b>	<b>3.9</b>	<b>368</b>	<b>4.1</b>	<b>56</b>	<b>2.8</b>
Heroína	368	3.4	321	3.6	47	2.4
Opiáceos Sintéticos	39	0.4	31	0.3	8	0.4
Opio y otros opiáceos	43	0.4	36	0.4	7	0.4
<b>Otras sustancias de abuso</b>	<b>194</b>	<b>1.8</b>	<b>142</b>	<b>1.6</b>	<b>52</b>	<b>2.6</b>
Con utilidad médica	49	0.5	33	0.4	16	0.8
Otras sustancias de abuso	147	1.4	111	1.2	36	1.8

**Cuadro 24. Total de drogas consumidas en el último año  
(Incluye alcohol o tabaco)**

	General*		Hombres**		Mujeres***	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Ninguna	120	1.1	100	1.1	20	1.0
1 sustancia	1,116	10.3	896	10.1	220	11.2
2 sustancias	1,988	18.3	1,585	17.8	403	20.5
3 sustancias	3,478	32.0	2,868	32.3	610	31.0
4 sustancias	1,928	17.7	1,580	17.8	348	17.7
5 sustancias	999	9.2	829	9.3	170	8.6
6 sustancias	573	5.3	481	5.4	92	4.7
7 sustancias	289	2.7	237	2.7	52	2.6
8 sustancias	185	1.7	159	1.8	26	1.3
9 sustancias	96	0.9	82	0.9	14	0.7
10 sustancias	45	0.4	39	0.4	6	0.3
11-19 sustancias	45	0.4	37	0.4	8	0.4
<b>Total</b>	<b>10,862</b>	<b>100.0</b>	<b>8,893</b>	<b>100.0</b>	<b>1,969</b>	<b>100.0</b>

\*  $\mu= 3.4$ ;  $\sigma = 1.8$ ;  $Mdn= 3$ ;  $Mo= 3$ ; Decil1 = 1

\*\*  $\mu= 3.4$ ;  $\sigma = 1.8$ ;  $Mdn= 3$ ;  $Mo= 3$ ; Decil1 = 1

\*\*\*  $\mu= 3.3$ ;  $\sigma = 1.8$ ;  $Mdn= 3$ ;  $Mo= 3$ ; Decil1 = 1

**Cuadro 25. Total de drogas ilícitas consumidas en el último año  
(No incluye ni alcohol ni tabaco)**

	General*		Hombres**		Mujeres***	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Ninguna	810	7.5	646	7.3	164	8.3
1 sustancia	5,221	48.1	4,255	47.8	966	49.1
2 sustancias	2,365	21.8	1,928	21.7	437	22.2
3 sustancias	1,147	10.6	957	10.8	190	9.6
4 sustancias	630	5.8	530	6.0	100	5.1
5 sustancias	302	2.8	249	2.8	53	2.7
6 sustancias	191	1.8	161	1.8	30	1.5
7 sustancias	99	0.9	85	1.0	14	0.7
8 sustancias	50	0.5	44	0.5	6	0.3
9 sustancias	29	0.3	22	0.2	7	0.4
10 sustancias	11	0.1	10	0.1	1	0.1
11-17 sustancias	7	0.1	7	0.1	1	0.1
<b>Total</b>	<b>10,862</b>	<b>100.0</b>	<b>8,893</b>	<b>100.0</b>	<b>1,969</b>	<b>100.0</b>

\*  $\mu= 1.9$ ;  $\sigma = 1.5$ ;  $Mdn= 1$ ;  $Mo= 1$ ; Decil1 = 1

\*\*  $\mu= 1.9$ ;  $\sigma = 1.5$ ;  $Mdn= 1$ ;  $Mo= 1$ ; Decil1 = 1

\*\*\*  $\mu= 1.8$ ;  $\sigma = 1.5$ ;  $Mdn= 1$ ;  $Mo= 1$ ; Decil1 = 1

**Cuadro 26. Consumo de drogas en los últimos 12 meses por sustancia**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
<b>Tabaco</b>	<b>8,322</b>	<b>76.6</b>	<b>6,830</b>	<b>76.8</b>	<b>1,492</b>	<b>75.8</b>
<b>Alcohol</b>	<b>8,575</b>	<b>78.9</b>	<b>7,053</b>	<b>79.3</b>	<b>1,522</b>	<b>77.3</b>
<b>Cannabis</b>	<b>8,247</b>	<b>75.9</b>	<b>6,836</b>	<b>76.9</b>	<b>1,411</b>	<b>71.7</b>
Mariguana	8,246	75.9	6,835	76.9	1,411	71.7
Hachís	350	3.2	282	3.2	68	3.5
<b>Cocaína</b>	<b>3,022</b>	<b>27.8</b>	<b>2,579</b>	<b>29.0</b>	<b>443</b>	<b>22.5</b>
Polvo blanco	2,383	21.9	2,020	22.7	363	18.4
Crack	1,348	12.4	1,187	13.3	161	8.2
Otra presentación de cocaína	29	0.3	22	0.2	7	0.4
<b>Inhalables</b>	<b>2,417</b>	<b>22.3</b>	<b>1,993</b>	<b>22.4</b>	<b>424</b>	<b>21.5</b>
Solventes o removedores	1,710	15.7	1,426	16.0	284	14.4
Pegamentos	606	5.6	513	5.8	93	4.7
Esmaltes o pinturas	365	3.4	275	3.1	90	4.6
Otros inhalables	65	0.6	49	0.6	16	0.8
<b>Depresores</b>	<b>1,189</b>	<b>10.9</b>	<b>909</b>	<b>10.2</b>	<b>280</b>	<b>14.2</b>
Benzodiazepinas	1,151	10.6	877	9.9	274	13.9
Rohypnol	36	0.3	31	0.3	5	0.3
Otros depresores	24	0.2	18	0.2	6	0.3
<b>Estimulantes</b>	<b>2,371</b>	<b>21.8</b>	<b>1,926</b>	<b>21.7</b>	<b>445</b>	<b>22.6</b>
Anfetamina	127	1.2	104	1.2	23	1.2
Metanfetaminas	2,007	18.5	1,652	18.6	355	18.0
Éxtasis (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas	385	3.5	291	3.3	94	4.8
Otros estimulantes	35	0.3	31	0.3	4	0.2
<b>Drogas alucinógenas y disociativas</b>	<b>659</b>	<b>6.1</b>	<b>534</b>	<b>6.0</b>	<b>125</b>	<b>6.3</b>
LSD	489	4.5	389	4.4	100	5.1
Plantas alucinógenas y derivados	260	2.4	217	2.4	43	2.2
Otras drogas alucinógenas y disoc.	23	0.2	19	0.2	4	0.2
<b>Opiáceos</b>	<b>327</b>	<b>3.0</b>	<b>285</b>	<b>3.2</b>	<b>42</b>	<b>2.1</b>
Heroína	288	2.7	252	2.8	36	1.8
Opiáceos Sintéticos	24	0.2	19	0.2	5	0.3
Opio y otros opiáceos	25	0.2	21	0.2	4	0.2
<b>Otras sustancias de abuso</b>	<b>145</b>	<b>1.3</b>	<b>104</b>	<b>1.2</b>	<b>41</b>	<b>2.1</b>
Con utilidad médica	34	0.3	23	0.3	11	0.6
Otras sustancias de abuso	111	1.0	81	0.9	30	1.5

**Cuadro 27. Droga de preferencia en los últimos 12 meses, según menciones**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
<b>Tabaco</b>	<b>1,218</b>	<b>11.2</b>	<b>11.4</b>	<b>924</b>	<b>10.4</b>	<b>10.5</b>	<b>294</b>	<b>14.9</b>	<b>15.1</b>
<b>Alcohol</b>	<b>1,572</b>	<b>14.5</b>	<b>14.7</b>	<b>1,271</b>	<b>14.3</b>	<b>14.5</b>	<b>301</b>	<b>15.3</b>	<b>15.5</b>
<b>Cannabis</b>	<b>5,178</b>	<b>47.7</b>	<b>48.3</b>	<b>4,412</b>	<b>49.6</b>	<b>50.3</b>	<b>766</b>	<b>38.9</b>	<b>39.4</b>
Mariguana	5,164	47.5	48.2	4,402	49.5	50.2	762	38.7	39.2
Hachís	14	0.1	0.1	10	0.1	0.1	4	0.2	0.2
<b>Cocaína</b>	<b>681</b>	<b>6.3</b>	<b>6.4</b>	<b>586</b>	<b>6.6</b>	<b>6.7</b>	<b>95</b>	<b>4.8</b>	<b>4.9</b>
Polvo blanco	269	2.5	2.5	228	2.6	2.6	41	2.1	2.1
Crack	409	3.8	3.8	355	4.0	4.0	54	2.7	2.8
Otra presentación de cocaína	3	0.0	0.0	3	0.0	0.0	0	0.0	0.0
<b>Inhalables</b>	<b>632</b>	<b>5.8</b>	<b>5.9</b>	<b>479</b>	<b>5.4</b>	<b>5.5</b>	<b>153</b>	<b>7.8</b>	<b>7.9</b>
Solventes o removedores	458	4.2	4.3	357	4.0	4.1	101	5.1	5.2
Pegamentos	76	0.7	0.7	62	0.7	0.7	14	0.7	0.7
Esmaltes o pinturas	75	0.7	0.7	45	0.5	0.5	30	1.5	1.5
Otros inhalables	23	0.2	0.2	15	0.2	0.2	8	0.4	0.4
<b>Estimulantes</b>	<b>937</b>	<b>8.6</b>	<b>8.7</b>	<b>734</b>	<b>8.3</b>	<b>8.4</b>	<b>203</b>	<b>10.3</b>	<b>10.4</b>
Anfetamina	45	0.4	0.4	38	0.4	0.4	7	0.4	0.4
Metanfetaminas	863	7.9	8.1	676	7.6	7.7	187	9.5	9.6
Éxtasis (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas	24	0.2	0.2	16	0.2	0.2	8	0.4	0.4
Otros estimulantes	5	0.0	0.0	4	0.0	0.0	1	0.1	0.1
<b>Drogas alucinógenas y disociativas</b>	<b>33</b>	<b>0.3</b>	<b>0.3</b>	<b>25</b>	<b>0.3</b>	<b>0.3</b>	<b>8</b>	<b>0.4</b>	<b>0.4</b>
LSD	24	0.2	0.2	17	0.2	0.2	7	0.4	0.4
Plantas alucinógenas y derivados	8	0.1	0.1	7	0.1	0.1	1	0.1	0.1
Otras drogas alucinógenas y disoc.	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0
<b>Depresores</b>	<b>118</b>	<b>1.1</b>	<b>1.1</b>	<b>56</b>	<b>0.6</b>	<b>0.6</b>	<b>62</b>	<b>3.1</b>	<b>3.2</b>
Benzodiacepinas	103	0.9	1.0	50	0.6	0.6	53	2.7	2.7
Rohypnol	3	0.0	0.0	3	0.0	0.0	0	0.0	0.0
Otros depresores	12	0.1	0.1	3	0.0	0.0	9	0.5	0.5
<b>Opiáceos</b>	<b>218</b>	<b>2.0</b>	<b>2.0</b>	<b>188</b>	<b>2.1</b>	<b>2.1</b>	<b>30</b>	<b>1.5</b>	<b>1.5</b>
Heroína	196	1.8	1.8	171	1.9	1.9	25	1.3	1.3
Opiáceos Sintéticos	13	0.1	0.1	11	0.1	0.1	2	0.1	0.1
Opio y otros opiáceos	9	0.1	0.1	6	0.1	0.1	3	0.2	0.2
<b>Otras sustancias de abuso</b>	<b>16</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>10</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>6</b>	<b>0.3</b>	<b>0.3</b>
Con utilidad médica	7	0.1	0.1	3	0.0	0.0	4	0.2	0.2
Otras sustancias de abuso	9	0.1	0.1	7	0.1	0.1	2	0.1	0.1
<b>Ninguna</b>	<b>113</b>	<b>1.0</b>	<b>1.1</b>	<b>86</b>	<b>1.0</b>	<b>1.0</b>	<b>27</b>	<b>1.4</b>	<b>1.4</b>
No consumió en el último año	120	1.1	Se omite	100	1.1	Se omite	20	1.0	Se omite
Sin Información	26	0.2	Se omite	22	0.2	Se omite	4	0.2	Se omite
<b>Total</b>	<b>10,862</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>8,893</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>1,969</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

**Cuadro 28. Droga de mayor impacto en los últimos 12 meses, según menciones**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
<b>Tabaco</b>	<b>702</b>	<b>6.5</b>	<b>6.6</b>	<b>538</b>	<b>6.0</b>	<b>6.1</b>	<b>164</b>	<b>8.3</b>	<b>8.4</b>
<b>Alcohol</b>	<b>1,329</b>	<b>12.2</b>	<b>12.4</b>	<b>1,061</b>	<b>11.9</b>	<b>12.1</b>	<b>268</b>	<b>13.6</b>	<b>13.8</b>
<b>Cannabis</b>	<b>4,904</b>	<b>45.1</b>	<b>45.8</b>	<b>4,129</b>	<b>46.4</b>	<b>47.1</b>	<b>775</b>	<b>39.4</b>	<b>39.8</b>
Mariguana	4,890	45.0	45.6	4,118	46.3	47.0	772	39.2	39.7
Hachís	14	0.1	0.1	11	0.1	0.1	3	0.2	0.2
<b>Cocaína</b>	<b>902</b>	<b>8.3</b>	<b>8.4</b>	<b>773</b>	<b>8.7</b>	<b>8.8</b>	<b>129</b>	<b>6.6</b>	<b>6.6</b>
Polvo blanco	371	3.4	3.5	312	3.5	3.6	59	3.0	3.0
Crack	524	4.8	4.9	455	5.1	5.2	69	3.5	3.5
Otra presentación de cocaína	7	0.1	0.1	6	0.1	0.1	1	0.1	0.1
<b>Inhalables</b>	<b>975</b>	<b>9.0</b>	<b>9.1</b>	<b>776</b>	<b>8.7</b>	<b>8.9</b>	<b>199</b>	<b>10.1</b>	<b>10.2</b>
Solventes o removedores	679	6.3	6.3	553	6.2	6.3	126	6.4	6.5
Pegamentos	153	1.4	1.4	130	1.5	1.5	23	1.2	1.2
Esmaltes o pinturas	107	1.0	1.0	68	0.8	0.8	39	2.0	2.0
Otros inhalables	36	0.3	0.3	25	0.3	0.3	11	0.6	0.6
<b>Depresores</b>	<b>172</b>	<b>1.6</b>	<b>1.6</b>	<b>101</b>	<b>1.1</b>	<b>1.2</b>	<b>71</b>	<b>3.6</b>	<b>3.7</b>
Benzodicepinas	154	1.4	1.4	92	1.0	1.0	62	3.1	3.2
Rohypnol	4	0.0	0.0	4	0.0	0.0			
Otros depresores	14	0.1	0.1	5	0.1	0.1	9	0.5	0.5
<b>Estimulantes</b>	<b>1,341</b>	<b>12.3</b>	<b>12.5</b>	<b>1,075</b>	<b>12.1</b>	<b>12.3</b>	<b>266</b>	<b>13.5</b>	<b>13.7</b>
Anfetamina	50	0.5	0.5	44	0.5	0.5	6	0.3	0.3
Metanfetaminas	1,251	11.5	11.7	1,002	11.3	11.4	249	12.6	12.8
Éxtasis (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas	31	0.3	0.3	23	0.3	0.3	8	0.4	0.4
Otros estimulantes	9	0.1	0.1	6	0.1	0.1	3	0.2	0.2
<b>Drogas alucinógenas y disociativas</b>	<b>55</b>	<b>0.5</b>	<b>0.5</b>	<b>40</b>	<b>0.4</b>	<b>0.5</b>	<b>15</b>	<b>0.8</b>	<b>0.8</b>
LSD	37	0.3	0.3	26	0.3	0.3	11	0.6	0.6
Plantas alucinógenas y derivados	13	0.1	0.1	9	0.1	0.1	4	0.2	0.2
Otras drogas alucinógenas y disoc.	5	0.0	0.0	5	0.1	0.1	0	0.0	0.0
<b>Opiáceos</b>	<b>236</b>	<b>2.2</b>	<b>2.2</b>	<b>205</b>	<b>2.3</b>	<b>2.3</b>	<b>31</b>	<b>1.6</b>	<b>1.6</b>
Heroína	216	2.0	2.0	190	2.1	2.2	26	1.3	1.3
Opiáceos Sintéticos	12	0.1	0.1	10	0.1	0.1	2	0.1	0.1
Opio y otros opiáceos	8	0.1	0.1	5	0.1	0.1	3	0.2	0.2
<b>Otras sustancias de abuso</b>	<b>19</b>	<b>0.2</b>	<b>0.2</b>	<b>12</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>7</b>	<b>0.4</b>	<b>0.4</b>
Con utilidad médica	8	0.1	0.1	4	0.0	0.0	4	0.2	0.2
Otras sustancias de abuso	11	0.1	0.1	8	0.1	0.1	3	0.2	0.2
<b>Ninguna</b>	<b>78</b>	<b>0.7</b>	<b>0.7</b>	<b>58</b>	<b>0.7</b>	<b>0.7</b>	<b>20</b>	<b>1.0</b>	<b>1.0</b>
No consumió en el último año	120	1.1	Se omite	100	1.1	Se omite	20	1.0	Se omite
Sin Información	29	0.3	Se omite	25	0.3	Se omite	4	0.2	Se omite
<b>Total</b>	<b>10,862</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>8,893</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>1,969</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

**Cuadro 29. Uso combinado de drogas en los últimos 12 meses  
(No incluye tabaco)**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Si combinó drogas	3,769	34.7	44.1	3,161	35.5	44.8	608	30.9	40.7
No combinó drogas	4,779	44.0	55.9	3,894	43.8	55.2	885	44.9	59.3
<i>No aplica</i>	2,314	21.3	<i>Se omite</i>	1,838	20.7	<i>Se omite</i>	476	24.2	<i>Se omite</i>
<b>Total</b>	<b>10,862</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>8,893</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>1,969</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

**Cuadro 30. Total de drogas consumidas en los últimos 30 días  
(Incluye alcohol o tabaco)**

	General*		Hombres**		Mujeres***	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Ninguna	984	9.1	797	9.0	187	9.5
1 sustancia	2,521	23.2	2,016	22.7	505	25.6
2 sustancias	2,979	27.4	2,418	27.2	561	28.5
3 sustancias	2,697	24.8	2,268	25.5	429	21.8
4 sustancias	1,052	9.7	874	9.8	178	9.0
5 sustancias	402	3.7	329	3.7	73	3.7
6 sustancias	146	1.3	126	1.4	20	1.0
7 sustancias	49	0.5	37	0.4	12	0.6
8 sustancias	21	0.2	19	0.2	2	0.1
9 sustancias	6	0.1	5	0.1	1	0.1
10 sustancias	3	0.0	3	0.0	0	0.0
11-12 sustancias	2	0.0	1	0.0	1	0.1
<b>Total</b>	<b>10,862</b>	<b>100.0</b>	<b>8,893</b>	<b>100.0</b>	<b>1,969</b>	<b>100.0</b>

\*  $\mu = 2.2$ ;  $\sigma = 1.4$ ;  $Mdn = 2$ ;  $Mo = 2$ ; Decil1 = 1

\*\*  $\mu = 2.3$ ;  $\sigma = 1.4$ ;  $Mdn = 2$ ;  $Mo = 2$ ; Decil1 = 1

\*\*\*  $\mu = 2.1$ ;  $\sigma = 1.4$ ;  $Mdn = 2$ ;  $Mo = 2$ ; Decil1 = 1

**Cuadro 31. Total de drogas ilícitas consumidas en los últimos 30 días  
(No incluye ni alcohol ni tabaco)**

	General*		Hombres**		Mujeres***	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Ninguna	3,055	28.1	2,459	27.7	596	30.3
1 sustancia	5,378	49.5	4,423	49.7	955	48.5
2 sustancias	1,611	14.8	1,334	15.0	277	14.1
3 sustancias	547	5.0	453	5.1	94	4.8
4 sustancias	182	1.7	152	1.7	30	1.5
5 sustancias	53	0.5	42	0.5	11	0.6
6 sustancias	22	0.2	18	0.2	4	0.2
7 sustancias	9	0.1	8	0.1	1	0.1
8 sustancias	3	0.0	3	0.0	0	0.0
9 sustancias	1	0.0	0	0.0	1	0.1
10 sustancias	1	0.0	1	0.0	0	0.0
<b>Total</b>	<b>10,862</b>	<b>100.0</b>	<b>8,893</b>	<b>100.0</b>	<b>1,969</b>	<b>100.0</b>

\*  $\mu = 1.1$ ;  $\sigma = 1.0$ ;  $Mdn = 1$ ;  $Mo = 1$ ; Decil1 = ninguna

\*\*  $\mu = 1.1$ ;  $\sigma = 1.0$ ;  $Mdn = 1$ ;  $Mo = 1$ ; Decil1 = ninguna

\*\*\*  $\mu = 1.0$ ;  $\sigma = 1.0$ ;  $Mdn = 1$ ;  $Mo = 1$ ; Decil1 = ninguna

**Cuadro 32. Consumo de drogas en los últimos 30 días por sustancia**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
<b>Tabaco</b>	<b>6,839</b>	<b>63.0</b>	<b>5,644</b>	<b>63.5</b>	<b>1,195</b>	<b>60.7</b>
<b>Alcohol</b>	<b>5,971</b>	<b>55.0</b>	<b>4,941</b>	<b>55.6</b>	<b>1,030</b>	<b>52.3</b>
<b>Cannabis</b>	<b>5,912</b>	<b>54.4</b>	<b>4,966</b>	<b>55.8</b>	<b>946</b>	<b>48.0</b>
Mariguana	5,909	54.4	4,964	55.8	945	48.0
Hachís	123	1.1	100	1.1	23	1.2
<b>Cocaína</b>	<b>1,376</b>	<b>12.7</b>	<b>1,163</b>	<b>13.1</b>	<b>213</b>	<b>10.8</b>
Polvo blanco	896	8.2	739	8.3	157	8.0
Crack	680	6.3	597	6.7	83	4.2
Otra presentación de cocaína	13	0.1	9	0.1	4	0.2
<b>Inhalables</b>	<b>1,342</b>	<b>12.4</b>	<b>1,094</b>	<b>12.3</b>	<b>248</b>	<b>12.6</b>
Solventes o removedores	961	8.8	795	8.9	166	8.4
Pegamentos	281	2.6	238	2.7	43	2.2
Esmaltes o pinturas	168	1.5	116	1.3	52	2.6
Otros inhalables	25	0.2	17	0.2	8	0.4
<b>Depresores</b>	<b>585</b>	<b>5.4</b>	<b>414</b>	<b>4.7</b>	<b>171</b>	<b>8.7</b>
Benzodiacepinas	569	5.2	401	4.5	168	8.5
Rohypnol	8	0.1	7	0.1	1	0.1
Otros depresores	13	0.1	11	0.1	2	0.1
<b>Estimulantes</b>	<b>1,335</b>	<b>12.3</b>	<b>1,079</b>	<b>12.1</b>	<b>256</b>	<b>13.0</b>
Anfetamina	47	0.4	35	0.4	12	0.6
Metanfetaminas	1,192	11.0	973	10.9	219	11.1
Éxtasis (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas	114	1.0	87	1.0	27	1.4
Otros estimulantes	11	0.1	9	0.1	2	0.1
<b>Drogas alucinógenas y disociativas</b>	<b>144</b>	<b>1.3</b>	<b>113</b>	<b>1.3</b>	<b>31</b>	<b>1.6</b>
LSD	110	1.0	84	0.9	26	1.3
Plantas alucinógenas y derivados	36	0.3	29	0.3	7	0.4
Otras drogas alucinógenas y disoc.	5	0.0	4	0.0	1	0.1
<b>Opiáceos</b>	<b>224</b>	<b>2.1</b>	<b>194</b>	<b>2.2</b>	<b>30</b>	<b>1.5</b>
Heroína	202	1.9	178	2.0	24	1.2
Opiáceos Sintéticos	16	0.1	12	0.1	4	0.2
Opio y otros opiáceos	9	0.1	6	0.1	3	0.2
<b>Otras sustancias de abuso</b>	<b>84</b>	<b>0.8</b>	<b>55</b>	<b>0.6</b>	<b>29</b>	<b>1.5</b>
Con utilidad médica	26	0.2	15	0.2	11	0.6
Otras sustancias de abuso	58	0.5	40	0.4	18	0.9

**Cuadro 33. Frecuencia de episodios de abuso del consumo de tabaco<sup>1</sup> en los últimos 30 días**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Ni una vez	2,200	20.3	32.7	1,817	20.4	32.7	383	19.5	32.6
< de 1 vez a la semana	819	7.5	12.2	663	7.5	11.9	156	7.9	13.3
1 o 2 veces a la semana	804	7.4	12.0	662	7.4	11.9	142	7.2	12.1
Cada tercer día	461	4.2	6.9	386	4.3	7.0	75	3.8	6.4
Diario	2,441	22.5	36.3	2,021	22.7	36.4	420	21.3	35.7
No consumió en los últimos 30 días	4,023	37.0	Se omite	3,249	36.5	Se omite	774	39.3	Se omite
Sin información	114	1.0	Se omite	95	1.1	Se omite	19	1.0	Se omite
<b>Total</b>	<b>10,862</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>8,893</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>1,969</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

<sup>1</sup> Consumo de seis o más cigarrillos en un solo día.

**Cuadro 34. Frecuencia de episodios de abuso del consumo de alcohol<sup>1</sup> en los últimos 30 días**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Ni una vez	1,033	9.5	17.6	818	9.2	16.9	215	10.9	21.2
< de 1 vez a la semana	2,091	19.3	35.7	1,732	19.5	35.8	359	18.2	35.4
1 o 2 veces a la semana	1,917	17.6	32.7	1,620	18.2	33.4	297	15.1	29.3
Cada tercer día	444	4.1	7.6	367	4.1	7.6	77	3.9	7.6
Diario	373	3.4	6.4	307	3.5	6.3	66	3.4	6.5
No consumió en los últimos 30 días	4,891	45.0	Se omite	3,952	44.4	Se omite	939	47.7	Se omite
Sin información	113	1.0	Se omite	97	1.1	Se omite	16	0.8	Se omite
<b>Total</b>	<b>10,862</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>8,893</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>1,969</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

<sup>1</sup> Consumo de más de cuatro copas en un día para los hombres y de más de tres copas en un día para las mujeres.

**Cuadro 35. Frecuencia de episodios de abuso del consumo de drogas ilícitas<sup>1</sup> en los últimos 30 días**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
< de 1 vez a la semana	1,566	14.4	23.6	1,203	13.5	21.8	363	18.4	32.2
1 o 2 veces a la semana	1,366	12.6	20.6	1,140	12.8	20.7	226	11.5	20.1
Cada tercer día	1,038	9.6	15.6	881	9.9	16.0	157	8.0	13.9
Diario	2,667	24.6	40.2	2,287	25.7	41.5	380	19.3	33.7
No consumió en los últimos 30 días	3,055	28.1	Se omite	2,459	27.7	Se omite	596	30.3	Se omite
Sin información	1,170	10.8	Se omite	923	10.4	Se omite	247	12.5	Se omite
<b>Total</b>	<b>10,862</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>8,893</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>1,969</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

<sup>1</sup> Consumo de cualquier dosis.

## GLOSARIO

<b>Droga ilícita de inicio</b>	Es la sustancia ilegal que el usuario refirió como la droga con la cual inicio el consumo de sustancias. No incluye el inicio del consumo con alcohol o tabaco.
<b>Droga de mayor impacto en los últimos 12 meses</b>	Sustancia que el propio usuario de drogas solicitante de tratamiento refiere como la que más problemas le ha ocasionado en los ámbitos de salud, personal, familiar, escolar, laboral o social, en el transcurso del último año.
<b>Droga de preferencia en los últimos 12 meses</b>	Sustancia que el propio usuario solicitante de tratamiento ha elegido o preferido consumir en el transcurso del último año.
<b>Estrato social</b>	Estimación que hace el terapeuta, según su percepción, del estrato al que pertenece el usuario de drogas, considerando aspectos como lugar de residencia, escolaridad, empleo y características manifiestas como higiene y aliño, calidad del vestido, expresión verbal y vocabulario, etc.
<b>Tipo de consumo de drogas ilícitas</b>	Características de consumo de sustancias ilegales según motivo, frecuencia y problemas asociados. No incluye el uso de alcohol y/o tabaco y se clasifica como: experimental, social u ocasional, funcional, disfuncional y en remisión.
<b>Total de drogas consumidas</b>	Número de drogas consumidas (se incluyen las 26 sustancias de seguimiento) en las siguientes categorías: alguna vez en la vida, en el último año y en los últimos 30 días.
<b>Uso combinado de drogas en los últimos 12 meses</b>	Consumo de dos o más sustancias (incluyendo alcohol y cualquier droga ilícita o de uso médico, utilizada sin prescripción, pero excluyendo tabaco) en el transcurso de un mismo día, en el año previo a la solicitud de tratamiento en CIJ.