

SALUD

SECRETARÍA DE SALUD



**Centros de
Integración
Juvenil, A.C.**

*SISTEMA DE INFORMACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DEL
CONSUMO DE DROGAS*

**CONSUMO DE SUSTANCIAS EN PACIENTES
DE PRIMER INGRESO A TRATAMIENTO.
PRIMER SEMESTRE DEL 2016.
USUARIOS DE DROGAS ILÍCITAS**

Alma Delia Gutiérrez López

**Dirección de Investigación y Enseñanza
Subdirección de Investigación
México, Septiembre de 2016**

SIECD

Informe de Investigación 16-09a



DIRECTORIO

PRESIDENTE HONORARIO VITALICIO DEL PATRONATO NACIONAL

Dr. Jesús Kumate Rodríguez

PRESIDENTE DEL PATRONATO NACIONAL

Dr. Roberto Tapia Conyer

FUNDADORA DE CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL, A.C.

Y VICEPRESIDENTA VITALICIA DEL PATRONATO NACIONAL

Sra. Kena Moreno

DIRECTORA GENERAL

Lic. Carmen Fernández Cáceres

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE OPERACIÓN Y PATRONATOS

Dr. José Ángel Prado García

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE NORMATIVIDAD

Dr. Ricardo Sánchez Huesca

DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA

Dr. Ricardo Iván Nanni Alvarado

SUBDIRECTOR DE INVESTIGACIÓN

Mtro. David Bruno Diaz Negrete

JEFA DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA Y EPIDEMIOLÓGICA

Dra. Solveig Eréndira Rodríguez Kuri

CONTENIDO	PÁG.
ANTECEDENTES	5
MÉTODO	6
CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS	8
FACTORES ASOCIADOS A LA DEMANDA DE TRATAMIENTO	11
CONSUMO DE DROGAS	14
REFERENCIAS	24
CUADROS	27
GLOSARIO	51

ÍNDICE DE CUADROS

PÁG.

Cuadro 1	Pacientes de primer ingreso a tratamiento por unidad de atención (CIJ)	28
Cuadro 2	Sexo	31
Cuadro 3	Persona que proporciona la información	31
Cuadro 4	Edad de ingreso a tratamiento	31
Cuadro 5	Estado civil	32
Cuadro 6	Escolaridad	32
Cuadro 7	Ocupación	33
Cuadro 8	Estrato social	33
Cuadro 9	Motivos de consulta	34
Cuadro 10	Condicionantes de la solicitud de tratamiento	34
Cuadro 11	Antecedentes de acciones contra el consumo de sustancias	35
Cuadro 12	Problemas asociados al consumo de sustancias	35
Cuadro 13	Edad de inicio del consumo de tabaco	36
Cuadro 14	Edad de inicio del consumo de alcohol	36
Cuadro 15	Edad de inicio del consumo de drogas ilícitas	37
Cuadro 16	Drogas ilícitas de inicio	38
Cuadro 17	Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de tabaco y el ingreso a tratamiento a CIJ	39
Cuadro 18	Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de alcohol y el ingreso a tratamiento a CIJ	39
Cuadro 19	Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de drogas ilícitas y el ingreso a tratamiento a CIJ	40
Cuadro 20	Tipo de consumo de drogas ilícitas	40
Cuadro 21	Total de drogas consumidas alguna vez en la vida (incluye alcohol o tabaco)	41
Cuadro 22	Total de drogas ilícitas consumidas alguna vez en la vida (no incluye ni alcohol ni tabaco)	41
Cuadro 23	Consumo de drogas alguna vez en la vida por sustancia	42
Cuadro 24	Total de drogas consumidas en el último año (incluye alcohol o tabaco)	43
Cuadro 25	Total de drogas ilícitas consumidas en el último año (no incluye ni alcohol ni tabaco)	43
Cuadro 26	Consumo de drogas en los últimos 12 meses por sustancia	44
Cuadro 27	Droga de preferencia en los últimos 12 meses, según menciones	45
Cuadro 28	Droga de mayor impacto en los últimos 12 meses, según menciones	46
Cuadro 29	Uso combinado de drogas en los últimos 12 meses (no incluye tabaco)	47
Cuadro 30	Total de drogas consumidas en los últimos 30 días (incluye alcohol o tabaco)	47
Cuadro 31	Total de drogas ilícitas consumidas en los últimos 30 días (no incluye ni alcohol ni tabaco)	48
Cuadro 32	Consumo de drogas en los últimos 30 días por sustancia	49
Cuadro 33	Frecuencia de episodios de abuso del consumo de Tabaco en los últimos 30 días	50
Cuadro 34	Frecuencia de episodios de abuso del consumo de Alcohol en los últimos 30 días	50
Cuadro 35	Frecuencia de episodios de abuso del consumo de drogas ilícitas en los últimos 30 días	50

RESUMEN

El informe se realizó con base en 10,934 registros clínicos de la entrevista inicial de usuarios de sustancias psicoactivas que reportaron consumo de al menos una droga ilícita y que acudieron por primera vez a consulta a Centros de Integración Juvenil entre enero y junio de 2016. Los objetivos del estudio son: a) actualizar la información del perfil sociodemográfico de los pacientes, de los factores asociados a la demanda de tratamiento y del patrón de consumo de sustancias; b) contribuir a retroalimentar sistemas nacionales de información del consumo de drogas; c) generar información que oriente el desarrollo de estudios con pacientes o consumidores(as) de drogas en México; y d) contribuir al desarrollo, diseño y ajuste de los servicios institucionales de prevención y tratamiento del consumo de drogas.

Los datos que se presentan en este informe permiten ver que el uso de drogas ilícitas continúa siendo un trastorno que afecta en mayor proporción a la población masculina que solicita tratamiento, en una proporción de 4.2 hombres por cada mujer. La edad media de ingreso a tratamiento fue de 22.3 años. En promedio, los hombres ingresaron a tratamiento a mayor edad que las mujeres (22.7 y 20.3 años, respectivamente). La edad promedio del inicio del consumo de tabaco fue a los 14.3 años, la del alcohol a los 14.4 años y la de drogas ilícitas a los 15.8 años. Tanto hombres como mujeres iniciaron el consumo de estas sustancias alrededor de las edades mencionadas, lo que muestra que la edad de inicio no presenta diferencias relevantes por sexo.

Las drogas de mayor consumo alguna vez en la vida fueron *cannabis* (87.5%), alcohol (85.0%), tabaco (83.6%), cocaína/*crack* (39.5%), inhalables (27.6%), estimulantes (28.6%, principalmente metanfetaminas: 24.1% y *éxtasis*: 5.9%), depresores (14.6%), drogas alucinógenas y disociativas (9.5%) y opiáceos (4.2%). En cuanto al consumo en el mes previo al ingreso a tratamiento, las sustancias más utilizadas fueron tabaco (60.8%), alcohol (51.5%), *cannabis* (53.0%), estimulantes (13.6%), cocaína/*crack* (13.1%) e inhalables (10.8%). Las sustancias de mayor impacto fueron marihuana (45.5%), alcohol (10.7%), metanfetaminas (13.3%), tabaco (6.5%), solventes y removedores (5.7%), *crack* (5.5%) y cocaína en polvo (3.9%).

En cuanto a los factores asociados a la demanda de tratamiento se observó que los usuarios de drogas acudieron principalmente por condicionamiento o recomendación de la familia (44.7%) o por iniciativa propia (37.5%); que solicitaron atención debido a su consumo de drogas ilícitas (90.6%), de alcohol (37.8%) y de tabaco (36.8%); que previo al tratamiento algunos de ellos (32.2%) intentaron interrumpir de manera voluntaria y sin apoyo el consumo y otros (24.9%) no habían tomado ninguna medida contra el problema; y que entre los problemas más frecuentemente asociados al consumo se reconocieron los de tipo familiar (78.6%), los escolares (42.8%), los de salud (42.1%) y los psicológicos (38.8%).

ANTECEDENTES

Existe evidencia de que Centros de Integración Juvenil ha reportado información epidemiológica del consumo de drogas de los solicitantes de tratamiento desde 1976¹. En 1983 inicia la aplicación de una cédula homogénea a los pacientes de nuevo ingreso², aunque no es sino a partir de 1990 que la recolección de datos se realiza en forma sistemática³, implementándose posteriormente el *Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas* (SIECD), el cual se ha ido consolidando a través de los años y ha realizado el seguimiento oportuno de un conjunto de variables, con las cuales ha podido contribuir en la toma de decisiones del diseño y ajuste de servicios institucionales, además de aportar conocimientos sobre la forma y tendencias del uso de drogas y de aportar información a los Sistemas Epidemiológicos de las Adicciones en el país, como es el caso del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA)⁴ de la Secretaría de Salud, del Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas (SRID) –perteneciente al Instituto Nacional de Psiquiatría “*Ramón de la Fuente Muñiz*” (INPRF)⁵–, del Observatorio Epidemiológico en Drogas de la Secretaría Salud⁶.

El SIECD, también ha apoyado en el desarrollo de diferentes estudios epidemiológicos especializados, con temas que van desde el perfil de usuarios de drogas y su trayectoria de consumo⁷, el consumo de drogas en las mujeres⁸, en la población infantil⁹ o de acuerdo con las etapas de la vida¹⁰, hasta llegar a los estudios de tendencias^{11,12,13,14}. Toda esta información ha facilitado el enfrentamiento oportuno de las problemáticas generadas por el creciente consumo de estimulantes y simultáneamente ha sido de utilidad para apoyar el diseño eficaz de estudios sobre características particulares de los consumidores de estos alcaloides^{15,16}.

Por otro lado, la información reportada ha permitido el desarrollo de estudios epidemiológicos particulares enfocados en profundizar en las características del consumo de drogas legales de pacientes atendidos. Así, desde el año 2006, el SIECD genera un informe por separado de las características de los pacientes consumidores de tabaco y alcohol¹⁷, con lo cual se ha logrado identificar una emergencia epidemiológica del consumo de alcohol entre las pacientes atendidas con relación a los años anteriores¹⁸; suceso que ha dado pie a CIJ para profundizar en esta problemática¹⁹ y que también ha sido reportado por la Encuesta Nacional de Adicciones (ENA), sobre todo para el caso de las mujeres jóvenes²⁰.

Es importante destacar que la información generada por el SIECD durante el lapso de más de dos décadas ha sido consistente con la de las Encuestas Nacionales de Adicciones (ENA) de este periodo, ya sea en el nivel nacional o en el regional²¹ y también ha sido referente para el desarrollo de metodologías de investigación en variados estudios clínicos, psicosociales y evaluativos de la Institución, como es el caso de diversos *Estudios de la Comunidad Objetivo (EBCO)*²² realizados por los CIJ a lo largo y ancho del país.

El presente informe se elaboró con base en la información obtenida por el SIECD durante el primer semestre de 2016 y tiene el objetivo de proporcionar datos actualizados sobre las características sociodemográficas, factores asociados a la demanda de tratamiento y del patrón de consumo de drogas de los solicitantes de tratamiento, de manera que se aporten elementos para apoyar el diseño, planeación y ajuste de los programas institucionales de prevención, tratamiento y rehabilitación, además de colaborar con otros sistemas de información en drogas y de aportar elementos para el diseño y elaboración de investigaciones en el campo de las adicciones.

MÉTODO

Diseño del estudio: Censo epidemiológico descriptivo semestral.

Población: 10,934 usuarios de drogas ilícitas procedentes de 107 unidades de CIJ, que acudieron por primera vez a consulta entre enero y junio de 2016 y que proporcionaron personalmente la información (cuadro 1. Anexo).

Fuente de información: Formato de Entrevista Inicial, aplicado en la primera consulta por parte del personal médico-técnico responsable del ingreso de pacientes a tratamiento, que forma parte del expediente clínico en cualquiera de sus dos versiones: formato electrónico (base de datos recuperada el día 2 de agosto de 2016 a las 12:23 hrs., con 14,025 registros capturados por los/as terapeutas responsables de realizar la entrevista inicial) o formato impreso (220 registros capturados por personal del departamento de Investigación Clínica y Epidemiológica mediante el programa *Control de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas* desarrollado por CIJ).

Variables de estudio: Las características sociodemográficas estudiadas comprenden: persona que proporciona la información, sexo, edad de ingreso a tratamiento, estado civil, escolaridad, ocupación y estrato social; las variables de factores asociados a la demanda de tratamiento incluyen: motivo(s) de consulta, condicionante(s) de la solicitud

de tratamiento, antecedente(s) de acciones tomadas frente al uso de sustancias y problema(s) asociado(s) al mismo; y las variables de patrón de consumo: edad de inicio, tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de sustancias y el ingreso a tratamiento, consumo alguna vez en la vida, en el último año y en los últimos 30 días; drogas de preferencia y de mayor impacto en el último año (estas dos últimas variables de acuerdo con el punto de vista del paciente), uso combinado de sustancias, tipo de consumo de drogas ilícitas, episodios de abuso y total de drogas consumidas.

La información sobre el consumo de drogas se presenta categorizada en diez grupos de sustancias que a su vez desagrega a 26 categorías de drogas:

Grupo de Sustancias	Drogas en seguimiento
Tabaco	Cigarrillos
Alcohol	Bebidas alcohólicas
<i>Cannabis</i>	Mariguana y hachís
Cocaína	Cocaína en polvo, <i>crack</i> y otra presentación de cocaína
Inhalables	Solventes y removedores, pegamentos, esmaltes y pinturas y otros inhalables
Depresores	Benzodiacepinas, <i>Rohypnol</i> y otros depresores
Estimulantes	Anfetaminas, metanfetaminas (<i>crystal</i> o <i>ICE</i>), MDMA (<i>éxtasis</i>) y metanfetaminas alucinógenas; y otros estimulantes
Drogas alucinógenas y disociativas	Ácido lisérgico (LSD), plantas alucinógenas y derivados y otros alucinógenos (PCP y ketamina)
Opiáceos	Heroína, opiáceos sintéticos y opio, y otros opioides
Otras sustancias de abuso	Sustancias con utilidad médica y otras sustancias no identificadas

Procesamiento de datos. Para el procesamiento estadístico de la información se utilizó el programa SPSS v.19.

Los resultados se presentan tanto en forma general como desglosada por sexo y en porcentajes válidos, excluyendo los casos “*sin información*” y aquellos que no cumplieron con las condiciones requeridas para el análisis en cada variable de estudio.

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS^a

Sexo. La población se conformó por 8,813 hombres y 2,121 mujeres, lo que en porcentaje representa a un 80.6% y un 19.4%, respectivamente. Dando así una proporción aproximada de cuatro hombres (4.2) por cada mujer.

Persona que proporciona la información. 60.1% de los pacientes acudieron en compañía de familiares u otras personas (tanto en hombres como en mujeres), mientras que en 36.2% lo hicieron solos (tanto en hombres como en mujeres).

Edad de ingreso a tratamiento. Se observa un rango de edad de 8 a 74 años, con un promedio de 22.3 años y una desviación estándar de diez punto seis; es decir que cerca del 83.6% de las personas atendidas (9,135) se encontró entre los 12 y 32 años de edad; la edad mediana de la población fue de 18 años (49.1% de los casos fueron menores de edad; 5,371 sujetos), mientras que la moda se ubicó en 15 años (1,285 personas atendidas).

Figura 1. Edad de ingreso según sexo

	 Años	 Años	
Rango	8 a 74	10 a 73	
Media	22.7	20.3	
Desviación estándar	10.7	9.7	
Mediana	18	16	
Moda	15	15	


Las mujeres ingresaron a tratamiento a menor edad (dos años menos que los hombres)

^a Cfr., Cuadros 1 a 8.

Estado civil. La mayor parte de la población refirió ser soltera (75.5%), mientras que 9.4% indicó que vivía en unión libre y 8.5% estaba casada.


Figura 2. Estado civil según sexo

Es ligeramente mayor el porcentaje de mujeres solteras y, en contraparte, es mayor el de hombres que contaba con relación de pareja (principalmente casados)



Escolaridad. 47.4% cursaba o había cursado algún grado de educación secundaria, 33.8% al menos algún grado de bachillerato, 7.4% contaba con algún grado escolar de nivel primaria y 8.4% de nivel superior o posgrado.


Figura 3. Escolaridad según sexo



El nivel de escolaridad es ligeramente mayor en hombres que en mujeres

Ocupación. 39.0% se dedicaba a estudiar, 29.5% desempeñaba alguna actividad laboral y 22.6% estaba desempleado.


Figura 4. Principal ocupación según sexo



Estrato social. Según la percepción de los terapeutas la mitad de los pacientes (50.5%) se ubicaban en el estrato medio bajo, 24.6% en un nivel bajo y 19.2% fue clasificado en el estrato medio.

Figura 5. Estrato social según sexo


Según la percepción de los terapeutas tanto hombres como mujeres presentaron condiciones sociales similares, predominando el estrato medio bajo



FACTORES ASOCIADOS A LA DEMANDA DE TRATAMIENTO^b


Motivos de consulta. 43.6% de las personas atendidas reportó más de un motivo para acudir a tratamiento (uso de alcohol, tabaco o drogas), mientras que 0.1% no expresó ninguno. 90.6% de los pacientes acudió por consumo de drogas ilícitas, 37.8% por uso de bebidas alcohólicas y 36.8% por uso de tabaco.

Figura 6. Motivos de consulta según sexo



Condicionantes de la solicitud de tratamiento. 25.2% de los casos expresó dos o más condicionantes para acudir a tratamiento; 44.7% acudió por recomendación de la familia, 37.5% por iniciativa propia, 21.7% por condicionamiento o recomendación escolar, 8.6% por condicionamiento legal y 7.9% por indicación médica.


Figura 7. Condicionantes de la solicitud de tratamiento según sexo



^b Cfr. Cuadros 9 a 12.

Antecedentes de acciones contra el consumo de sustancias. 32.2% de los pacientes expresó que antes de acudir a CIJ había intentado interrumpir el consumo por voluntad propia, 10.3% señaló que previamente había estado internado en algún anexo, 6.9% acudió a algún tipo de tratamiento psiquiátrico o psicoterapéutico, 6.5% había acudido a grupos de autoayuda y 5.5% lo había hecho por medio de juramento. Cabe señalar que 10.8% reportó haber intentado al menos dos formas distintas de acciones para abandonar el consumo de drogas, en tanto que 24.9% expresó que hasta el momento de la solicitud de tratamiento no había tomado ninguna medida en contra del consumo de drogas.


Figura 8. Antecedentes de acciones contra el consumo de sustancias según sexo



Un mayor porcentaje de mujeres ingresaron a CIJ sin haber realizado acciones previas mientras que los hombres intentaron en mayor proporción que las mujeres dejar el consumo voluntariamente, participando en grupos de autoayuda, por medio de juramento o internándose en un anexo

Problemas asociados al consumo de sustancias. 78.6% de los pacientes señaló problemas de tipo familiar, 42.8% escolares, 42.1% de salud, 38.8% psicológicos, 19.7% laborales, 19.6% legales, 14.7% de conducta antisocial o delictiva y 11.7% accidentes o lesiones. Cabe señalar que 76.4% de las personas atendidas mencionaron dos o más problemas asociados al consumo de sustancias, mientras que 4.6% no reportó ninguno.

Figura 9. Problemas asociados al consumo de sustancias según sexo



CONSUMO DE DROGAS^c

Edad de inicio del consumo de sustancias. La edad promedio de inicio del consumo de tabaco se situó en 14.3 años ($\sigma=3.4$ años), la mediana y la moda en 14 años, mientras que la edad promedio de inicio del consumo de alcohol se ubicó en 14.4 años ($\sigma=3.0$ años) con una mediana de 14 años y una moda de 15 años. Por su parte, la edad promedio de inicio en el abuso de drogas ilícitas (incluyendo sustancias de uso médico sin prescripción) fue de 15.8 años ($\sigma=5.1$ años), con una mediana de 15 años y la moda de 14 años. Por otra parte, al considerar el primer decil como indicador de las edades de inicio más tempranas, se observa que el consumo de tabaco y de alcohol aparece a los 11 años, mientras que el de drogas ilícitas se presenta un año después.

Figura 10. Edad de inicio del consumo de sustancias según sexo


	 Años			 Años		
	Tabaco	Alcohol	Drogas ilícitas	Tabaco	Alcohol	Drogas ilícitas
Promedio	14.3	14.4	15.7	14.4	14.4	16.1
Desviación estándar	3.4	2.9	4.8	3.8	3.5	6.2
Mediana	14	14	15	14	14	14
Moda	15	15	15	13	15	13

En cuanto a la edad de inicio del consumo de sustancias, no se aprecian grandes diferencias entre hombres y mujeres

Drogas ilícitas de inicio. Las sustancias de inicio más reportadas fueron: la cannabis, principalmente en forma de marihuana (75.8%); los inhalables (9.3%), mayormente en forma de solventes y removedores (6.5%); y la cocaína (8.6%), tanto en forma de polvo blanco (6.6%) como *crack* (2.0%); seguidas por los estimulantes (3.6%), donde destacan las metanfetaminas (2.9%); los depresores con utilidad médica (1.6%) siendo las benzodiacepinas las más reportadas (1.6%); y los opiáceos (0.4%), entre los cuales sobresale la heroína (39 casos).

^c Cfr., Cuadros 13 a 35

Figura 11. Principales drogas ilícitas de inicio según sexo




Lapso transcurrido entre el inicio del consumo de sustancias y el ingreso a tratamiento en CIJ. El promedio de años entre el inicio de consumo y la solicitud de tratamiento se situó de la siguiente manera: tabaco de 8.4 años ($\sigma=10.1$ años), alcohol de 8.5 años ($\sigma=9.9$ años) y drogas ilícitas de 6.5 años ($\sigma=8.8$ años). Sin embargo, la mitad de los usuarios dejó pasar cuatro años desde el momento en que se inició el consumo de tabaco o alcohol y el momento de acudir a solicitar tratamiento, mientras que 56.0% de los usuarios dejaron pasar tres años desde el inicio de drogas ilegales.

Figura 12. Lapso transcurrido entre el inicio del consumo de sustancias y el ingreso a tratamiento en CIJ según sexo

	 Años			 Años		
	Tabaco	Alcohol	Drogas ilícitas	Tabaco	Alcohol	Drogas ilícitas
Promedio	8.8	9.0	7.0	6.4	6.4	4.3
Desviación estándar	10.3	10.2	9.1	8.9	8.4	6.9
Mediana	4	5	3	3	3	2
Moda	1	1	1	1	1	< un año

Los hombres dejan pasar más tiempo que las mujeres para solicitar tratamiento, estas acuden más oportunamente

Tipo de consumo de drogas ilícitas. De acuerdo con los terapeutas, 49.6% de los solicitantes de tratamiento fue diagnosticado con consumo funcional, 18.9% con consumo disfuncional, 16.2% con consumo social u ocasional, 12.5% con consumo experimental y 2.8% presentaba remisión del consumo.




Las mujeres presentaron patrones de consumo de menor gravedad que los hombres

Total de drogas consumidas. El promedio de sustancias utilizadas alguna vez en la vida, incluyendo alcohol o tabaco, fue de 4.1 drogas (93.8% reportó el uso de dos o más sustancias); en el último año fue de 3.4 drogas (88.3% consumió dos o más sustancias); y en los últimos 30 días fue de 2.2 drogas (65.4% reportó haber utilizado dos o más sustancias).

El promedio de sustancias consumidas alguna vez en la vida, sin incluir alcohol y tabaco, fue de 2.4 drogas (56.7% reportó el uso de dos o más sustancias); en el último año fue de 1.9 drogas (44.2% consumió dos o más sustancias); y en los últimos 30 días fue de una (21.6% reportó haber utilizado dos o más sustancias).

Figura 14. Promedio de drogas consumidas según sexo




Mujeres y hombres consumieron, en promedio, un número similar de drogas

Consumo de drogas alguna vez en la vida.^d Las proporciones de consumo alguna vez en la vida de los diez grupos de sustancias en seguimiento fueron: *cannabis* (87.5%), alcohol (85.0%), tabaco (83.6%), cocaína (39.5%), inhalables (27.9%), estimulantes (28.6%), depresores (14.6%), drogas alucinógenas y disociativas (9.5%), opiáceos (4.2%) y otras sustancias de abuso (1.5%).

En cuanto al uso de sustancias específicas (contenidas en alguno de los diez grupos antes mencionados) sobresalen: marihuana (87.5%), cocaína en polvo (33.8%) metanfetaminas (24.1%), solventes y removedores (19.5%), *crack* (17.9%) y benzodiacepinas (14.1%); en menor proporción los pegamentos (7.7%), LSD (6.9%) y *éxtasis* y otras metanfetaminas alucinógenas (5.9%).

Figura 15. Consumo de drogas alguna vez en la vida según sexo



Los hombres reportaron en mayor proporción que las mujeres el consumo de alcohol, tabaco, cannabis, inhalables, cocaína, crack, metanfetaminas y heroína. Ellas reportaron mayormente el consumo de benzodiacepinas y éxtasis


^d Los casos pudieron haber reportado el consumo de dos o más sustancias, por lo que el total de los porcentajes no suma 100%.

Consumo de drogas en los últimos 12 meses. 98.6% de las personas reportaron haber consumido alguna sustancia en el año previo a su ingreso a tratamiento en CIJ.

Las proporciones de consumo de los diez grupos de sustancias utilizadas en este lapso fueron: alcohol (77.2%), tabaco (76.1%), *cannabis* (75.2%), cocaína (28.5%), estimulantes (23.8%), inhalables (20.2%), depresores (10.4%), drogas alucinógenas y disociativas (5.8%); opiáceos (3.3%) y otras sustancias de abuso (1.0%).

En cuanto al consumo de sustancias específicas contenidas en alguno de los grupos anteriores destacaron: marihuana (75.2%), cocaína en polvo (22.5%), metanfetaminas (20.7%), solventes y removedores (14.4%) y *crack* (13.1%); en menor proporción se refieren a las benzodiazepinas (10.1%), los pegamentos (4.9%) y la LSD (4.6%).


Figura 16. Consumo de drogas en los últimos 12 meses según sexo



Las drogas más consumidas en el último año por ambos sexos fueron alcohol, tabaco y cannabis; las mujeres usaron en mayor proporción benzodiazepinas, éxtasis, inhalables y drogas alucinógenas y disociativas; los hombres reportaron en mayor proporción el uso de cannabis, cocaína en polvo, crack, metanfetaminas y heroína


Droga de preferencia en los últimos 12 meses. Entre las sustancias más frecuentemente referidas se encontraron: cannabis (48.1%), alcohol (13.1%), tabaco (11.3%), inhalables (5.8%) y metanfetaminas (8.8%). En menores proporciones aparecieron: crack (4.0%), cocaína en polvo (3.2%) y heroína (2.0%).

Figura 17. Droga de preferencia en los últimos 12 meses según sexo




Droga de mayor impacto en los últimos 12 meses. Las principales sustancias a cuyo consumo los pacientes atribuyeron los mayores daños en la salud, en el bienestar personal y familiar o en el desempeño escolar, laboral o social y por las que pudieron haber solicitado tratamiento se encuentran: *cannabis* (45.7%), metanfetaminas (13.3%), alcohol (10.7%), inhalables (8.3%), tabaco (6.5%), *crack* (5.5%), cocaína en polvo (3.9%) y heroína (2.2%).

Figura 18. Droga de mayor impacto en los últimos 12 meses según sexo



Uso combinado de drogas en los últimos 12 meses.^e Al menos en una ocasión en el transcurso del último año y sin tomar en cuenta el consumo de tabaco, poco menos de la mitad de la población (42.2%) reportó el consumo de dos o más sustancias en un mismo día.

Figura 19. Uso combinado de droga en los últimos 12 meses según sexo




^e No se toman en cuenta 2,353 casos (21.5%) que no cumplieron los criterios de inclusión de esta variable; 21.1% de los hombres y 23.2% de las mujeres (ver anexo).

Consumo de drogas en los últimos 30 días. Incluyendo alcohol y tabaco, 89.7% de los casos reportaron consumo de sustancias en el mes anterior al ingreso a tratamiento.

Las proporciones de consumo de los diez grupos de sustancias utilizadas en este lapso fueron: tabaco (60.8%), alcohol (51.5%), *cannabis* (53.0%), estimulantes (13.6%), cocaína (13.1%), inhalables (10.8%), depresores (5.1%), opiáceos (2.1%), drogas alucinógenas y disociativas (1.2%) y otras sustancias de abuso (0.6%).

En cuanto al consumo de sustancias específicas destacó el de marihuana con 52.9%, le siguen: metanfetaminas (12.2%), cocaína en polvo (8.1%), solventes/removedores (7.7%) y crack (6.8%); en menor proporción se registra el consumo de benzodiazepinas (5.1%), pegamentos (2.3%) y heroína (1.9%).


Figura 20. Consumo de drogas en los últimos 30 días según sexo



Hombres y mujeres consumieron predominantemente tabaco, alcohol y cannabis –los hombres en mayor proporción–. Las mujeres reportaron mayor consumo de inhalables, benzodiazepinas, alucinógenos y éxtasis

Frecuencia de episodios de abuso en los últimos 30 días. 37.9% de quienes reportaron consumo de tabaco en los últimos 30 días aceptó fumar seis o más cigarrillos diariamente. Así mismo, entre quienes consumieron alcohol, la mayor parte (37.6%) reportó consumo abusivo menos de una vez a la semana y una o dos veces a la semana (30.2%). Por otra parte, 38.8% de los usuarios de drogas ilícitas durante el último mes reportaron consumirlas todos los días, 25.9% menos de una vez a la semana, 19.5% una a dos veces a la semana y 15.8% cada tercer día.

Figura 21. Frecuencia de episodios de abuso en los últimos 30 días según sexo



Los hombres refieren mayor frecuencia de episodios de abuso de tabaco, alcohol y drogas ilícitas que las mujeres

REFERENCIAS

1. Sánchez-Huesca, R. y López Granados, L. (1985). ***Características demográficas y patrones de inicio en el consumo de drogas en asistentes a los Centros Locales; recuperación de los archivos de siete años (1976-1982)***. México: Centros de Integración Juvenil, A.C. (reporte interno).
2. Clarac Rengade, P. y Wagner Echeagaray, F. (1987). Análisis de algunas variables en una muestra de pacientes farmacodependientes (1986). En F. Wagner Echeagaray y R. Ortiz Mondragón (Comp.) (1990). ***Estudios acerca de la farmacodependencia en México realizados por Paule Clarac***. México: Centros de Integración Juvenil, A. C. (pp. 111-126).
3. García Aurrecochea, R., Diaz Negrete, B., Balanzario, M. C., Gutiérrez-López, A. Castillo-Franco, I. (1999). Características sociodemográficas y de consumo de drogas en pacientes atendidos entre 1990 y 1997. México: Centros de Integración Juvenil, A.C., Dirección de Promoción Institucional. ***Informe de investigación 98-12***.
4. Secretaría de Salud, Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, Dirección General de Epidemiología. Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (***SISVEA***) ***Informe 2009***. México.
5. Ortiz, A., Martínez, R., Meza, D. (2014) Grupo Interinstitucional para el desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. ***Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas"***. *Tendencias en el área metropolitana No. 57*. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.
6. Diaz, D. B., Balanzario, M. C., Castillo, I., Gutiérrez, A. y García, R. (2001). Uso de drogas entre pacientes de primer ingreso en Centros de Integración Juvenil. En Secretaría de Salud. ***Observatorio Epidemiológico en drogas. El fenómeno de las adicciones en México 2001***. México: Secretaría de Salud (pp. 66-71) (ISBN: 970-721-008-7). http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/publicaciones/obs2001_cap4.pdf
7. García-Aurrecochea, R., Diaz-Negrete, B., Balanzario, M. C., Castillo-Franco, I. (1998). ***Perfil y trayectoria del consumo de drogas en pacientes de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil en 1996***. En CD: B. D. Diaz Negrete, J. Arellanez, M. C. Balanzario y R. Sánchez Huesca, *Once años de estudios del consumo de drogas en México, Investigaciones realizadas en Centros de Integración Juvenil entre 1997 y 2007*. México: Centros de Integración Juvenil.

8. Castillo Franco, P. I., Gutiérrez López, A. D. (2008). Consumo de drogas en mujeres asistentes a centros de tratamiento especializado en la Ciudad de México. **Salud Mental 31 (5)**, 351-359. <http://scielo.unam.mx/pdf/sm/v31n5/v31n5a3.pdf>
9. Gracia Gutiérrez de Velasco, S. E. y Balanzario Lorenzana, M. C. (2003). El consumo de drogas en menores de 12 años en Centros de Integración Juvenil en el año 2002. México: Centros de Integración Juvenil, A.C., Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación. **Informe de Investigación 03-17**.
10. García Aurrecoechea, R., Castillo Franco, P. I. y Guerrero Huesca, J. A. (2003). El consumo de drogas en pacientes atendidos en Centros de Integración Juvenil según la etapa de vida correspondiente al ingreso a tratamiento. México: Centros de Integración Juvenil, A.C., Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación. **Informe de Investigación 03-13**.
11. García Aurrecoechea, R., Díaz Negrete, B., Balanzario, M. C. (2001). Tendencias del consumo de drogas en pacientes de primer ingreso a tratamiento en CIJ entre 1990 y 1999. México: Centros de Integración Juvenil, A.C., Dirección de Promoción Institucional. **Informe de investigación 2000-06**.
12. Gutiérrez López, AD. (2016). Tendencias del consumo de drogas alguna vez en la vida en Centros de Integración Juvenil. Segundo semestre de 2004 – Segundo semestre de 2015 (Nivel Nacional y Entidades Federativas). México: Centros de Integración Juvenil, A.C., Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación. **Informe de Investigación 16-01e**. <http://www.cij.gob.mx/Programas/Investigacion/pdf/16-01e.pdf>
13. Gutiérrez López, AD. (2016). Tendencias del consumo de drogas en los últimos 30 días en Centros de Integración Juvenil. Segundo semestre de 2004 - Segundo semestre de 2015 (Nivel Nacional y Entidades Federativas). México: Centros de Integración Juvenil, A.C., Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación. **Informe de Investigación 15-01f**. <http://www.cij.gob.mx/Programas/Investigacion/pdf/16-01f.pdf>
14. Gutiérrez López, A. D. (2016). Tendencias de las principales drogas de mayor impacto reportadas por usuarios de drogas ilícitas en el año previo a la solicitud de tratamiento en Centros de Integración Juvenil. Segundo semestre de 2004 - Segundo semestre de 2015. Nivel nacional y entidades federativas. México: Centros de Integración Juvenil, A.C., Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación. **Informe de Investigación 16-01g**. <http://www.cij.gob.mx/Programas/Investigacion/pdf/16-01g.pdf>

15. Jiménez Silvestre K., García Aurrecochea, V. R. y González Sánchez, J. D. (2005). Patrón de Consumo de Cocaína y Crack en pacientes que ingresan a Tratamiento. México: Centros de Integración Juvenil, A.C., Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación. **Informe de investigación 05-07.**
16. Jiménez-Silvestre, K. y Castillo-Vite N.L. Factores de reincidencia en usuarios de cocaína, crack y metanfetaminas en fase de recuperación. México: Centros de Integración Juvenil, A.C., Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación. **Informe de Investigación 04-14.**
17. Gutiérrez López, A. D. y Castillo Franco, P. I. (2007). Características sociodemográficas y de consumo en usuarios de tabaco y alcohol de primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil en 2006. México: Centros de Integración Juvenil, A.C., Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación. **Informe de Investigación 07-13.** <http://www.cij.gob.mx/Especialistas/pdf/07-13.pdf>
18. García Aurrecochea, R., y Gutiérrez López, A. D. (2016). Consumo de sustancias en pacientes de primer ingreso a tratamiento. Segundo semestre del 2015. Usuarios de Tabaco y alcohol. México: Centros de Integración Juvenil, A.C., Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación. **Informe de Investigación 16-01d.** <http://www.cij.gob.mx/Programas/Investigacion/pdf/16-01d.pdf>
19. Moreno, K. (Coord.) (2010). **Los jóvenes y el alcohol en México. Un problema emergente en mujeres.** México: Centros de Integración Juvenil, A.C.
20. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz; Instituto Nacional de Salud Pública; Secretaría de Salud (2012). **Encuesta Nacional de Adicciones 2011: Reporte de Alcohol.** Medina-Mora ME, Villatoro JA, Fleiz C, Téllez MM, Mendoza LR, Romero M, Gutiérrez JP, Castro M, Hernández M, Tena C, Alvear C y Guisa V. México: INPRFM.
21. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz; Instituto Nacional de Salud Pública; Secretaría de Salud (2012). **Encuesta Nacional de Adicciones 2011: Reporte de Drogas.** Villatoro JA, Medina Mora ME, Fleiz C, Téllez MM, Mendoza LR, Romero M, Gutiérrez JP, Castro M, Hernández M, Tena C, Alvear C y Guisa V. México: INPRFM.
22. CD: **EBCO 2007-2008. Estudio Básico de Comunidad Objetivo Vol. 1 y 2.** México: Centros de Integración Juvenil, A.C., Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación.

CUADROS

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS USUARIOS DE DROGAS DE PRIMER INGRESO A TRATAMIENTO A CIJ EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2016

Cuadro 1. Pacientes de primer ingreso por unidad de atención (CIJ, UH y UTUH)

CIJ	General		Hombres		Mujeres		Razón H:M
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	
Álvaro Obregón Norte	89	0.8	72	80.9	17	19.1	4.2 : 1
Álvaro Obregón Oriente	53	0.5	45	84.9	8	15.1	5.6 : 1
Azcapotzalco	147	1.3	111	75.5	36	24.5	3.1 : 1
Benito Juárez	102	0.9	73	71.6	29	28.4	2.5 : 1
Chalco	117	1.1	99	84.6	18	15.4	5.5 : 1
Coyoacán	117	1.1	98	83.8	19	16.2	5.2 : 1
Cuajimalpa	89	0.8	80	89.9	9	10.1	8.9 : 1
Cuauhtémoc Oriente	128	1.2	95	74.2	33	25.8	2.9 : 1
Cuauhtémoc Poniente	140	1.3	104	74.3	36	25.7	2.9 : 1
Ecatepec	203	1.9	177	87.2	26	12.8	6.8 : 1
Gustavo A. Madero Oriente	25	0.2	21	84.0	4	16.0	5.3 : 1
Gustavo A. Madero Aragón	167	1.5	140	83.8	27	16.2	5.2 : 1
Gustavo A. Madero Norte	143	1.3	120	83.9	23	16.1	5.2 : 1
Iztapalapa Oriente	416	3.8	325	78.1	91	21.9	3.6 : 1
Iztapalapa Poniente	121	1.1	89	73.6	32	26.4	2.8 : 1
Miguel Hidalgo	77	0.7	65	84.4	12	15.6	5.4 : 1
Naucalpan	191	1.7	156	81.7	35	18.3	4.5 : 1
Nezahualcóyotl	220	2.0	182	82.7	38	17.3	4.8 : 1
Texcoco	75	0.7	60	80.0	15	20.0	4.0 : 1
Tlalnepantla	185	1.7	161	87.0	24	13.0	6.7 : 1
Tlalpan	146	1.3	129	88.4	17	11.6	7.6 : 1
Venustiano Carranza	119	1.1	99	83.2	20	16.8	5.0 : 1
Xochimilco	19	0.2	13	68.4	6	31.6	2.2 : 1
UH Ecatepec	47	0.4	46	97.9	1	2.1	46.0 : 1
UH Iztapalapa	66	0.6	56	84.8	10	15.2	5.6 : 1
UH Naucalpan	60	0.5	50	83.3	10	16.7	5.0 : 1
Acapulco	113	1.0	92	81.4	21	18.6	4.4 : 1
Aguascalientes	158	1.4	120	75.9	38	24.1	3.2 : 1
Apodaca	33	0.3	31	93.9	2	6.1	15.5 : 1
Cancún	164	1.5	123	75.0	41	25.0	3.0 : 1
Cd. del Carmen	36	0.3	28	77.8	8	22.2	3.5 : 1
Cd. Juárez Norte	102	0.9	77	75.5	25	24.5	3.1 : 1
Cd. Victoria	25	0.2	23	92.0	2	8.0	11.5 : 1
Celaya	229	2.1	189	82.5	40	17.5	4.7 : 1
Chetumal	51	0.5	40	78.4	11	21.6	3.6 : 1

(Continúa)

Cuadro 1. Pacientes de primer ingreso a tratamiento por Unidad de atención (CIJ, UH y UTUH)
(Continuación)

CIJ	General		Hombres		Mujeres		Razón H:M
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	
Chihuahua	309	2.8	254	82.2	55	17.8	4.6 : 1
Chilpancingo	56	0.5	47	83.9	9	16.1	5.2 : 1
Colima	197	1.8	169	85.8	28	14.2	6.0 : 1
Cozumel	60	0.5	52	86.7	8	13.3	6.5 : 1
Cuernavaca	79	0.7	62	78.5	17	21.5	3.6 : 1
Culiacán	168	1.5	144	85.7	24	14.3	6.0 : 1
Durango	90	0.8	58	64.4	32	35.6	1.8 : 1
Escuinapa	41	0.4	34	82.9	7	17.1	4.9 : 1
Fresnillo	33	0.3	21	63.6	12	36.4	1.8 : 1
Guadalajara Centro	245	2.2	198	80.8	47	19.2	4.2 : 1
Guadalajara Sur	121	1.1	89	73.6	32	26.4	2.8 : 1
Guadalupe	80	0.7	68	85.0	12	15.0	5.7 : 1
Guamúchil	34	0.3	29	85.3	5	14.7	5.8 : 1
Guasave	73	0.7	61	83.6	12	16.4	5.1 : 1
Hermosillo	164	1.5	130	79.3	34	20.7	3.8 : 1
Huatulco	30	0.3	26	86.7	4	13.3	6.5 : 1
Ixtapa Zihuatanejo	48	0.4	41	85.4	7	14.6	5.9 : 1
La Paz	67	0.6	50	74.6	17	25.4	2.9 : 1
La Piedad	69	0.6	59	85.5	10	14.5	5.9 : 1
Laguna Durango	80	0.7	61	76.3	19	23.8	3.2 : 1
León	202	1.8	157	77.7	45	22.3	3.5 : 1
Los Cabos	45	0.4	38	84.4	7	15.6	5.4 : 1
Los Mochis	122	1.1	107	87.7	15	12.3	7.1 : 1
Manzanillo	50	0.5	41	82.0	9	18.0	4.6 : 1
Mazatlán	114	1.0	89	78.1	25	21.9	3.6 : 1
Mérida	88	0.8	68	77.3	20	22.7	3.4 : 1
Mexicali	173	1.6	136	78.6	37	21.4	3.7 : 1
Monterrey	152	1.4	118	77.6	34	22.4	3.5 : 1
Morelia	49	0.4	41	83.7	8	16.3	5.1 : 1
Nogales	91	0.8	58	63.7	33	36.3	1.8 : 1
Oaxaca	122	1.1	97	79.5	25	20.5	3.9 : 1
Pachuca	132	1.2	115	87.1	17	12.9	6.8 : 1
Playa del Carmen	70	0.6	57	81.4	13	18.6	4.4 : 1
Poza Rica	51	0.5	42	82.4	9	17.6	4.7 : 1
Puebla	122	1.1	104	85.2	18	14.8	5.8 : 1
Puerto Vallarta	137	1.3	112	81.8	25	18.2	4.5 : 1
Querétaro	102	0.9	81	79.4	21	20.6	3.9 : 1
Reynosa	28	0.3	24	85.7	4	14.3	6.0 : 1

(Continúa)

Cuadro 1. Pacientes de primer ingreso a tratamiento por Unidad de atención (CIJ, UH y UTUH)
(Continuación)

CIJ	General		Hombres		Mujeres		Razón H:M
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	
Salamanca	121	1.1	105	86.8	16	13.2	6.6 : 1
Saltillo	229	2.1	175	76.4	54	23.6	3.2 : 1
San Luis Potosí	152	1.4	108	71.1	44	28.9	2.5 : 1
San Nicolás de los Garza	105	1.0	80	76.2	25	23.8	3.2 : 1
Tampico	91	0.8	71	78.0	20	22.0	3.6 : 1
Tapachula	32	0.3	26	81.3	6	18.8	4.3 : 1
Tecomán	62	0.6	57	91.9	5	8.1	11.4 : 1
Tehuacán	91	0.8	72	79.1	19	20.9	3.8 : 1
Tepic	37	0.3	28	75.7	9	24.3	3.1 : 1
Tijuana Guaycura	205	1.9	147	71.7	58	28.3	2.5 : 1
Tijuana Soler	198	1.8	149	75.3	49	24.7	3.0 : 1
Tlaquepaque	167	1.5	141	84.4	26	15.6	5.4 : 1
Tlaxcala	27	0.2	22	81.5	5	18.5	4.4 : 1
Toluca	191	1.7	155	81.2	36	18.8	4.3 : 1
Torreón	208	1.9	167	80.3	41	19.7	4.1 : 1
Torreón Oriente	65	0.6	57	87.7	8	12.3	7.1 : 1
Tuxtla Gutiérrez	54	0.5	49	90.7	5	9.3	9.8 : 1
Villahermosa	73	0.7	56	76.7	17	23.3	3.3 : 1
Xalapa	65	0.6	52	80.0	13	20.0	4.0 : 1
Yucatán	79	0.7	64	81.0	15	19.0	4.3 : 1
Zacatecas	65	0.6	50	76.9	15	23.1	3.3 : 1
Zamora	17	0.2	11	64.7	6	35.3	1.8 : 1
Zapopan Norte	115	1.1	95	82.6	20	17.4	4.8 : 1
UH Ciudad Juárez	24	0.2	16	66.7	8	33.3	2.0 : 1
UH Culiacán	35	0.3	35	100.0	0	0.0	---
UH Ixbalanqué	10	0.1	7	70.0	3	30.0	2.3 : 1
UH Jerez	50	0.5	46	92.0	4	8.0	11.5 : 1
UH Nuevo León	56	0.5	42	75.0	14	25.0	3.0 : 1
UH Punta Diamante	31	0.3	23	74.2	8	25.8	2.9 : 1
UH Tijuana	52	0.5	41	78.8	11	21.2	3.7 : 1
UH Zapopan	55	0.5	42	76.4	13	23.6	3.2 : 1
UH Zapotlán el Grande	27	0.2	27	100.0	0	0.0	---
UTUH Cd. Juárez	23	0.2	19	82.6	4	17.4	4.8 : 1
UTUH Tijuana	55	0.5	51	92.7	4	7.3	12.8 : 1
Total	10,934	100.0	8,813	80.6	2,121	19.4	4.2 : 1

UH=Unidad de Hospitalización

UTUH=Unidad de Tratamiento para Usuarios de Heroína

Cuadro 2. Sexo

	Frec.	%	Razón H:M
Hombres	8,813	80.6	4.2 : 1
Mujeres	2,121	19.4	
Total	10,934	100.0	

Cuadro 3. Persona que proporciona la información

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Usuario de drogas	3,955	36.2	39.9	3,230	36.7	40.3	725	34.2	38.1
Usuario de drogas y familiares u otras personas	5,966	54.6	60.1	4,789	54.3	59.7	1,177	55.5	61.9
<i>Sin Información</i>	<i>1,013</i>	<i>9.3</i>	<i>Se omite</i>	<i>794</i>	<i>9.0</i>	<i>Se omite</i>	<i>219</i>	<i>10.3</i>	<i>Se omite</i>
Total	10,934	100.0	100.0	8,813	100.0	100.0	2,121	100.0	100.0

Cuadro 4. Edad de ingreso a tratamiento

	General*			Hombres**			Mujeres***		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Hasta 9 años	5	0.0	0.0	5	0.1	0.1	0	0.0	0.0
10 a 14 años	1,918	17.5	17.5	1,370	15.5	15.5	548	25.8	25.8
15 a 19 años	4,506	41.2	41.2	3,614	41.0	41.0	892	42.1	42.1
20 a 24 años	1,403	12.8	12.8	1,159	13.2	13.2	244	11.5	11.5
25 a 29 años	920	8.4	8.4	775	8.8	8.8	145	6.8	6.8
30 a 34 años	681	6.2	6.2	586	6.6	6.7	95	4.5	4.5
35 a 39 años	529	4.8	4.8	464	5.3	5.3	65	3.1	3.1
40 a 44 años	394	3.6	3.6	347	3.9	3.9	47	2.2	2.2
45 años y más	576	5.3	5.3	491	5.6	5.6	85	4.0	4.0
<i>Sin información</i>	<i>2</i>	<i>0.0</i>	<i>Se omite</i>	<i>2</i>	<i>0.0</i>	<i>Se omite</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>	<i>Se omite</i>
Total	10,934	100.0	100.0	8,813	100.0	100.0	2,121	100.0	100.0

* $\mu= 22.3$ $\sigma = 10.6$; *Mdn*= 18; *Mo*= 15; Decil1 = 14

** $\mu= 22.7$; $\sigma = 10.7$; *Mdn*= 18; *Mo*= 15; Decil1 = 14

*** $\mu= 20.3$; $\sigma = 9.7$; *Mdn*= 16; *Mo*= 15; Decil1 = 13

Cuadro 5. Estado civil

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Soltero	8,245	75.4	75.5	6,542	74.2	74.3	1,703	80.3	80.4
Casado	931	8.5	8.5	838	9.5	9.5	93	4.4	4.4
Unión libre	1,023	9.4	9.4	840	9.5	9.5	183	8.6	8.6
Separado	556	5.1	5.1	454	5.2	5.2	102	4.8	4.8
Divorciado	136	1.2	1.2	111	1.3	1.3	25	1.2	1.2
Viudo	28	0.3	0.3	16	0.2	0.2	12	0.6	0.6
<i>Sin información</i>	15	0.1	<i>Se omite</i>	12	0.1	<i>Se omite</i>	3	0.1	<i>Se omite</i>
Total	10,934	100.0	100.0	8,813	100.0	100.0	2,121	100.0	100.0

Cuadro 6. Escolaridad

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Ninguna (no sabe leer ni escribir)	36	0.3	0.3	33	0.4	0.4	3	0.1	0.1
Ninguna (sabe leer y escribir)	25	0.2	0.2	19	0.2	0.2	6	0.3	0.3
Primaria incompleta	343	3.1	3.1	283	3.2	3.2	60	2.8	2.8
Primaria completa	464	4.2	4.2	390	4.4	4.4	74	3.5	3.5
Secundaria incompleta	3,545	32.4	32.4	2,689	30.5	30.5	856	40.4	40.4
Secundaria completa	1,631	14.9	14.9	1,396	15.8	15.8	235	11.1	11.1
Estudios técnicos o comerciales incompletos	158	1.4	1.4	125	1.4	1.4	33	1.6	1.6
Estudios técnicos o comerciales completos	85	0.8	0.8	65	0.7	0.7	20	0.9	0.9
Bachillerato incompleto	2,993	27.4	27.4	2,464	28.0	28.0	529	24.9	24.9
Bachillerato completo	700	6.4	6.4	579	6.6	6.6	121	5.7	5.7
Estudios superiores incompletos	702	6.4	6.4	572	6.5	6.5	130	6.1	6.1
Estudios superiores completos	215	2.0	2.0	172	2.0	2.0	43	2.0	2.0
Estudios de posgrado incompletos	17	0.2	0.2	9	0.1	0.1	8	0.4	0.4
Estudios de posgrado completos	17	0.2	0.2	14	0.2	0.2	3	0.1	0.1
<i>Sin información</i>	3	0.0	<i>Se omite</i>	3	0.0	<i>Se omite</i>	0	0.0	<i>Se omite</i>
Total	10,934	100.0	100.0	8,813	100.0	100.0	2,121	100.0	100.0

Cuadro 7. Ocupación

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Desempleado(a)	2,474	22.6	22.6	2,068	23.5	23.5	406	19.1	19.1
Estudiante	4,268	39.0	39.0	3,204	36.4	36.4	1,064	50.2	50.2
Estudiante que trabaja	551	5.0	5.0	484	5.5	5.5	67	3.2	3.2
Trabaja	3,225	29.5	29.5	2,896	32.9	32.9	329	15.5	15.5
Tareas del hogar	359	3.3	3.3	111	1.3	1.3	248	11.7	11.7
Pensionado	56	0.5	0.5	49	0.6	0.6	7	0.3	0.3
<i>Sin información</i>	1	0.0	<i>Se omite</i>	1	0.0	<i>Se omite</i>	0	0.0	<i>Se omite</i>
Total	10,934	100.0	100.0	8,813	100.0	100.0	2,121	100.0	100.0

Cuadro 8. Estrato social

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Alto	53	0.5	0.5	42	0.5	0.5	11	0.5	0.5
Medio alto	491	4.5	4.5	413	4.7	4.7	78	3.7	3.7
Medio	2,099	19.2	19.2	1,627	18.5	18.5	472	22.3	22.3
Medio bajo	5,517	50.5	50.5	4,439	50.4	50.4	1,078	50.8	50.9
Bajo	2,685	24.6	24.6	2,222	25.2	25.3	463	21.8	21.9
Pobreza extrema o marginación	72	0.7	0.7	56	0.6	0.6	16	0.8	0.8
<i>Sin información</i>	17	0.2	<i>Se omite</i>	14	0.2	<i>Se omite</i>	3	0.1	<i>Se omite</i>
Total	10,934	100.0	100.0	8,813	100.0	100.0	2,121	100.0	100.0

FACTORES ASOCIADOS A LA DEMANDA DE TRATAMIENTO EN PACIENTES DE PRIMER INGRESO A TRATAMIENTO EN CIJ EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2016

Cuadro 9. Motivos de consulta

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Consumo de drogas ilícitas	9,905	90.6	8,023	91.0	1,882	88.7
Consumo de bebidas alcohólicas	4,135	37.8	3,392	38.5	743	35.0
Consumo de tabaco	4,023	36.8	3,269	37.1	754	35.5
Otro motivo	325	3.0	253	2.9	72	3.4
<i>Ningún motivo específico reportado</i>	16	0.1	14	0.2	2	0.1
<i>Usuarios que reportaron dos o más motivos de consulta</i>	4,772	43.6	3,915	44.4	857	40.4

Cuadro 10. Condicionantes de la solicitud de tratamiento

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Por propia iniciativa	4,099	37.5	3,323	37.7	776	36.6
Por condicionamiento o recomendación familiar	4,892	44.7	3,944	44.8	948	44.7
Por recomendación de pares	143	1.3	118	1.3	25	1.2
Por condicionamiento o recomendación escolar	2,373	21.7	1,840	20.9	533	25.1
Por condicionamiento legal	939	8.6	811	9.2	128	6.0
Por condicionamiento o recomendación laboral	185	1.7	174	2.0	11	0.5
Por indicación médica	865	7.9	683	7.7	182	8.6
Por solicitud de novia(o)	38	0.3	33	0.4	5	0.2
Otros condicionantes de solicitud de tratamiento	314	2.9	226	2.6	88	4.1
<i>Ningún condicionante reportado</i>	191	1.7	161	1.8	30	1.4
<i>Pacientes que reportaron dos o más condicionantes de la solicitud de tratamiento</i>	2,753	25.2	2,215	25.1	538	25.4

Cuadro 11. Antecedentes de acciones contra el consumo de sustancias

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Juramento	606	5.5	535	6.1	71	3.3
Grupo de autoayuda	711	6.5	626	7.1	85	4.0
Internamiento en anexo	1,125	10.3	971	11.0	154	7.3
Intervención de emergencia	66	0.6	55	0.6	11	0.5
Programa de mantenimiento	92	0.8	80	0.9	12	0.6
Tratamiento médico no especializado	65	0.6	51	0.6	14	0.7
Tratamiento psiquiátrico o psicoterapéutico ambulatorio	594	5.4	467	5.3	127	6.0
Tratamiento psiquiátrico o psicoterapéutico residencial	197	1.8	165	1.9	32	1.5
Medicina tradicional o alternativa	34	0.3	25	0.3	9	0.4
Intento de interrupción voluntaria del consumo, sin apoyo	3,518	32.2	2,864	32.5	654	30.8
Otras acciones	2,818	25.8	2,225	25.2	593	28.0
<i>Ninguna acción previa reportada</i>	<i>2,723</i>	<i>24.9</i>	<i>2,135</i>	<i>24.2</i>	<i>588</i>	<i>27.7</i>
<i>Pacientes que reportaron dos o más acciones contra el consumo de sustancias antes de solicitar tratamiento en CIJ</i>	<i>1,177</i>	<i>10.8</i>	<i>1,003</i>	<i>11.4</i>	<i>174</i>	<i>8.2</i>

Cuadro 12. Problemas asociados al consumo de sustancias

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Problemas de salud	4,607	42.1	3,704	42.0	903	42.6
Accidentes o lesiones	1,279	11.7	1,079	12.2	200	9.4
Problemas familiares	8,592	78.6	6,947	78.8	1,645	77.6
Problemas escolares	4,681	42.8	3,693	41.9	988	46.6
Problemas laborales	2,153	19.7	1,962	22.3	191	9.0
Problemas psicológicos	4,239	38.8	3,343	37.9	896	42.2
Problemas legales	2,148	19.6	1,933	21.9	215	10.1
Conducta antisocial o delictiva	1,604	14.7	1,375	15.6	229	10.8
Otros problemas	435	4.0	345	3.9	90	4.2
<i>Ningún problema asociado reportado</i>	<i>501</i>	<i>4.6</i>	<i>391</i>	<i>4.4</i>	<i>110</i>	<i>5.2</i>
<i>Pacientes que reportaron dos o más problemas asociados</i>	<i>8,356</i>	<i>76.4</i>	<i>6,773</i>	<i>76.9</i>	<i>1,583</i>	<i>74.6</i>

CARACTERÍSTICAS DEL CONSUMO DE DROGAS EN PACIENTES DE PRIMER INGRESO A TRATAMIENTO EN CIJ EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2016

Cuadro 13. Edad de inicio del consumo de tabaco

	General*			Hombres**			Mujeres***		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Hasta 9 años	340	3.1	3.7	290	3.3	3.9	50	2.4	2.9
10 a 14 años	5,020	45.9	55.0	4,009	45.5	54.2	1,011	47.7	58.6
15 a 19 años	3,346	30.6	36.7	2,772	31.5	37.5	574	27.1	33.3
20 a 24 años	281	2.6	3.1	228	2.6	3.1	53	2.5	3.1
25 a 29 años	71	0.6	0.8	56	0.6	0.8	15	0.7	0.9
30 a 34 años	32	0.3	0.4	20	0.2	0.3	12	0.6	0.7
35 a 39 años	14	0.1	0.2	8	0.1	0.1	6	0.3	0.3
40 a 44 años	10	0.1	0.1	7	0.1	0.1	3	0.1	0.2
45 años y más	9	0.1	0.1	7	0.1	0.1	2	0.1	0.1
No consumió	1,798	16.4	Se omite	1,405	15.9	Se omite	393	18.5	Se omite
Sin información	13	0.1	Se omite	11	0.1	Se omite	2	0.1	Se omite
Total	10,934	100.0	100.0	8,813	100.0	100.0	2,121	100.0	100.0

* $\mu= 14.3$; $\sigma = 3.4$; $Mdn= 14$; $Mo= 14$; Decil1 = 11

** $\mu= 14.3$ $\sigma = 3.4$; $Mdn= 14$; $Mo= 15$; Decil1 = 11

*** $\mu= 14.4$ $\sigma = 3.8$; $Mdn= 14$; $Mo= 13$; Decil1 = 11

Cuadro 14. Edad de inicio del consumo de alcohol

	General*			Hombres**			Mujeres***		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Hasta 9 años	373	3.4	4.0	311	3.5	4.1	62	2.9	3.5
10 a 14 años	4,515	41.3	48.6	3,566	40.5	47.4	949	44.7	54.1
15 a 19 años	4,042	37.0	43.6	3,390	38.5	45.0	652	30.7	37.2
20 a 24 años	275	2.5	3.0	217	2.5	2.9	58	2.7	3.3
25 a 29 años	49	0.4	0.5	30	0.3	0.4	19	0.9	1.1
30 a 34 años	14	0.1	0.2	9	0.1	0.1	5	0.2	0.3
35 a 39 años	6	0.1	0.1	1	0.0	0.0	5	0.2	0.3
40 a 44 años	4	0.0	0.0	3	0.0	0.0	1	0.0	0.1
45 años y más	3	0.0	0.0	1	0.0	0.0	2	0.1	0.1
No consumió	1,641	15.0	Se omite	1,274	14.5	Se omite	367	17.3	Se omite
Sin información	12	0.1	Se omite	11	0.1	Se omite	1	0.0	Se omite
Total	10,934	100.0	100.0	8,813	100.0	100.0	2,121	100.0	100.0

* $\mu= 14.4$; $\sigma = 3.0$; $Mdn= 14$; $Mo= 15$; Decil1 = 11

** $\mu= 14.4$; $\sigma = 2.9$; $Mdn= 14$; $Mo= 15$; Decil1 = 11

*** $\mu= 14.4$; $\sigma = 3.5$; $Mdn= 14$; $Mo= 15$; Decil1 = 11

Cuadro 15. Edad de inicio del consumo de drogas ilícitas

	General*			Hombres**			Mujeres***		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Hasta 9 años	127	1.2	1.2	106	1.2	1.2	21	1.0	1.0
10 a 14 años	4,959	45.4	45.5	3,914	44.4	44.6	1,045	49.3	49.5
15 a 19 años	4,608	42.1	42.3	3,826	43.4	43.6	782	36.9	37.0
20 a 24 años	628	5.7	5.8	507	5.8	5.8	121	5.7	5.7
25 a 29 años	259	2.4	2.4	210	2.4	2.4	49	2.3	2.3
30 a 34 años	136	1.2	1.2	103	1.2	1.2	33	1.6	1.6
35 a 39 años	77	0.7	0.7	54	0.6	0.6	23	1.1	1.1
40 a 44 años	38	0.3	0.3	24	0.3	0.3	14	0.7	0.7
45 años y más	61	0.6	0.6	38	0.4	0.4	23	1.1	1.1
<i>Sin información</i>	41	0.4	<i>Se omite</i>	31	0.4	<i>Se omite</i>	10	0.5	<i>Se omite</i>
Total	10,934	100.0	100.0	8,813	100.0	100.0	2,121	100.0	100.0

* $\mu = 15.8$; $\sigma = 5.1$; *Mdn* = 15; *Mo* = 14; Decil1 = 12

** $\mu = 15.7$; $\sigma = 4.8$; *Mdn* = 15; *Mo* = 15; Decil1 = 12

*** $\mu = 16.1$; $\sigma = 6.2$; *Mdn* = 14; *Mo* = 13; Decil1 = 12

Cuadro 16. Drogas ilícitas de inicio

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Cannabis	8,293	75.8	6,798	77.1	1,495	70.5
Mariguana	8,284	75.8	6,792	77.1	1,492	70.3
Hachís	9	0.1	6	0.1	3	0.1
Cocaína	942	8.6	794	9.0	148	7.0
Polvo blanco	727	6.6	604	6.9	123	5.8
<i>Crack</i>	214	2.0	189	2.1	25	1.2
Otra presentación	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Inhalables	1,021	9.3	769	8.7	252	11.9
Solventes o removedores	713	6.5	544	6.2	169	8.0
Pegamentos	161	1.5	125	1.4	36	1.7
Esmaltes o pinturas	126	1.2	85	1.0	41	1.9
Otros	21	0.2	15	0.2	6	0.3
Depresores	180	1.6	83	0.9	97	4.6
Benzodiacepinas	171	1.6	79	0.9	92	4.3
<i>Rohypnol</i> [®]	4	0.0	3	0.0	1	0.0
Otros	5	0.0	1	0.0	4	0.2
Estimulantes	393	3.6	292	3.3	101	4.8
Anfetamina	37	0.3	31	0.4	6	0.3
Metanfetaminas	312	2.9	226	2.6	86	4.1
Éxtasis (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas	31	0.3	24	0.3	7	0.3
Otros	13	0.1	11	0.1	2	0.1
Drogas alucinógenas y disociativas	30	0.3	23	0.3	7	0.3
LSD	14	0.1	11	0.1	3	0.1
Plantas alucinógenas y derivados	16	0.1	12	0.1	4	0.2
Otras	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Opiáceos	47	0.4	38	0.4	9	0.4
Heroína	39	0.4	32	0.4	7	0.3
Opiáceos Sintéticos	7	0.1	5	0.1	2	0.1
Opio y otros opiáceos	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Otras sustancias de abuso	28	0.3	16	0.2	12	0.6
Con utilidad médica	9	0.1	3	0.0	6	0.3
Otras	19	0.2	13	0.1	6	0.3
Total	10,934	100.0	8,813	100.0	2,121	100.0

Cuadro 17. Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de tabaco y el ingreso a tratamiento en CIJ

	General*			Hombres**			Mujeres***		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
< de un año	745	6.8	8.2	531	6.0	7.2	214	10.1	12.4
1 a 5 años	4,537	41.5	49.7	3,580	40.6	48.4	957	45.1	55.4
6 a 10 años	1,326	12.1	14.5	1,114	12.6	15.1	212	10.0	12.3
11 a 15 años	792	7.2	8.7	666	7.6	9.0	126	5.9	7.3
16 a 20 años	572	5.2	6.3	493	5.6	6.7	79	3.7	4.6
21 a 25 años	407	3.7	4.5	362	4.1	4.9	45	2.1	2.6
26 o más años	744	6.8	8.2	651	7.4	8.8	93	4.4	5.4
No consumió	1,798	16.4	Se omite	1,405	15.9	Se omite	393	18.5	Se omite
Sin información	13	0.1	Se omite	11	0.1	Se omite	2	0.1	Se omite
Total	10,934	100.0	100.0	8,813	100.0	100.0	2,121	100.0	100.0

* $\mu=8.4$; $\sigma=10.1$; $Mdn=4$; $Mo=1$; Decil1 = 1

** $\mu=8.8$; $\sigma=10.3$; $Mdn=4$; $Mo=1$; Decil1 = 1

*** $\mu=6.4$; $\sigma=8.9$; $Mdn=3$; $Mo=1$; Decil1 = < un año

Cuadro 18. Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de alcohol y el ingreso a tratamiento en CIJ

	General*			Hombres**			Mujeres***		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
< de un año	766	7.0	8.3	572	6.5	7.6	194	9.1	11.1
1 a 5 años	4,417	40.4	47.6	3,473	39.4	46.1	944	44.5	53.9
6 a 10 años	1,495	13.7	16.1	1,231	14.0	16.4	264	12.4	15.1
11 a 15 años	805	7.4	8.7	676	7.7	9.0	129	6.1	7.4
16 a 20 años	611	5.6	6.6	517	5.9	6.9	94	4.4	5.4
21 a 25 años	428	3.9	4.6	381	4.3	5.1	47	2.2	2.7
26 o más años	757	6.9	8.2	676	7.7	9.0	81	3.8	4.6
No consumió	1,641	15.0	Se omite	1,274	14.5	Se omite	367	17.3	Se omite
Sin información	14	0.1	Se omite	13	0.1	Se omite	1	0.0	Se omite
Total	10,934	100.0	100.0	8,813	100.0	100.0	2,121	100.0	100.0

* $\mu=8.5$; $\sigma=9.9$; $Mdn=4$; $Mo=1$; Decil1 = 1

** $\mu=9.0$; $\sigma=10.2$; $Mdn=5$; $Mo=1$; Decil1 = 1

*** $\mu=6.4$; $\sigma=8.4$; $Mdn=3$; $Mo=1$; Decil1 = < un año

Cuadro 19. Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de drogas ilícitas y el ingreso a tratamiento en CIJ

	General*			Hombres**			Mujeres***		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
< de un año	1,976	18.1	18.1	1,435	16.3	16.3	541	25.5	25.6
1 a 5 años	5,253	48.0	48.2	4,142	47.0	47.2	1,111	52.4	52.6
6 a 10 años	1,364	12.5	12.5	1,164	13.2	13.3	200	9.4	9.5
11 a 15 años	785	7.2	7.2	673	7.6	7.7	112	5.3	5.3
16 a 20 años	583	5.3	5.4	527	6.0	6.0	56	2.6	2.7
21 a 25 años	364	3.3	3.3	326	3.7	3.7	38	1.8	1.8
26 o más años	566	5.2	5.2	513	5.8	5.8	53	2.5	2.5
<i>Sin información</i>	43	0.4	<i>Se omite</i>	33	0.4	<i>Se omite</i>	10	0.5	<i>Se omite</i>
Total	10,934	100.0	100.0	8,813	100.0	100.0	2,121	100.0	100.0

* $\mu= 6.5$; $\sigma = 8.8$; $Mdn= 3$; $Mo= 1$; Decil1 = < un año

** $\mu= 7.0$; $\sigma = 9.1$; $Mdn= 3$; $Mo= 1$; Decil1 = < un año

*** $\mu= 4.3$; $\sigma = 6.9$; $Mdn= 2$; $Mo= < un año$; Decil1 = < un año

Cuadro 20. Tipo de consumo de drogas ilícitas

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Experimental	1,366	12.5	12.5	990	11.2	11.3	376	17.7	17.8
Social u ocasional	1,763	16.1	16.2	1,339	15.2	15.2	424	20.0	20.1
Funcional	5,411	49.5	49.6	4,471	50.7	50.9	940	44.3	44.5
Disfuncional	2,058	18.8	18.9	1,741	19.8	19.8	317	14.9	15.0
En remisión	301	2.8	2.8	248	2.8	2.8	53	2.5	2.5
<i>Sin información</i>	35	0.3	<i>Se omite</i>	24	0.3	<i>Se omite</i>	11	0.5	<i>Se omite</i>
Total	10,934	100.0	100.0	8,813	100.0	100.0	2,121	100.0	100.0

**Cuadro 21. Total de drogas consumidas alguna vez en la vida
(Incluye alcohol o tabaco)**

	General*		Hombres**		Mujeres***	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
1 sustancia	674	6.2	513	5.8	161	7.6
2 sustancias	1,224	11.2	955	10.8	269	12.7
3 sustancias	3,376	30.9	2,691	30.5	685	32.3
4 sustancias	2,096	19.2	1,704	19.3	392	18.5
5 sustancias	1,363	12.5	1,127	12.8	236	11.1
6 sustancias	822	7.5	668	7.6	154	7.3
7 sustancias	545	5.0	442	5.0	103	4.9
8 sustancias	342	3.1	285	3.2	57	2.7
9 sustancias	212	1.9	185	2.1	27	1.3
10 sustancias	136	1.2	116	1.3	20	0.9
11-23 sustancias	144	1.3	127	1.4	17	0.8
Total	10,934	100.0	8,813	100.0	2,121	100.0

* $\mu = 4.1$; $\sigma = 2.1$; $Mdn = 4$; $Mo = 3$; Decil1 = 2

** $\mu = 4.2$; $\sigma = 2.2$; $Mdn = 4$; $Mo = 3$; Decil1 = 2

*** $\mu = 3.9$; $\sigma = 2.0$; $Mdn = 3$; $Mo = 3$; Decil1 = 2

**Cuadro 22. Total de drogas ilícitas consumidas alguna vez en la vida
(No incluye ni alcohol ni tabaco)**

	General*		Hombres**		Mujeres***	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
1 sustancia	4,736	43.3	3,734	42.4	1,002	47.2
2 sustancias	2,451	22.4	1,974	22.4	477	22.5
3 sustancias	1,469	13.4	1,219	13.8	250	11.8
4 sustancias	862	7.9	704	8.0	158	7.4
5 sustancias	563	5.1	453	5.1	110	5.2
6 sustancias	356	3.3	297	3.4	59	2.8
7 sustancias	213	1.9	185	2.1	28	1.3
8 sustancias	139	1.3	119	1.4	20	0.9
9 sustancias	66	0.6	58	0.7	8	0.4
10 sustancias	34	0.3	31	0.4	3	0.1
11-21 sustancias	45	0.4	39	0.4	6	0.3
Total	10,934	100.0	8,813	100.0	2,121	100.0

* $\mu = 2.4$; $\sigma = 1.9$; $Mdn = 2$; $Mo = 1$; Decil1 = 1

** $\mu = 2.5$; $\sigma = 1.9$; $Mdn = 2$; $Mo = 1$; Decil1 = 1

*** $\mu = 2.3$; $\sigma = 1.7$; $Mdn = 2$; $Mo = 1$; Decil1 = 1

Cuadro 23. Consumo de drogas alguna vez en la vida por sustancia

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Tabaco	9,136	83.6	7,408	84.1	1,728	81.5
Alcohol	9,293	85.0	7,539	85.5	1,754	82.7
Cannabis	9,572	87.5	7,795	88.4	1,777	83.8
Mariguana	9,569	87.5	7,793	88.4	1,776	83.7
Hachís	535	4.9	457	5.2	78	3.7
Cocaína	4,315	39.5	3,635	41.2	680	32.1
Polvo blanco	3,698	33.8	3,111	35.3	587	27.7
Crack	1,959	17.9	1,697	19.3	262	12.4
Otra presentación de cocaína	42	0.4	34	0.4	8	0.4
Inhalables	3,021	27.6	2,452	27.8	569	26.8
Solventes o removedores	2,132	19.5	1,744	19.8	388	18.3
Pegamentos	838	7.7	687	7.8	151	7.1
Esmaltes o pinturas	491	4.5	374	4.2	117	5.5
Otros inhalables	133	1.2	106	1.2	27	1.3
Depresores	1,601	14.6	1,233	14.0	368	17.4
Benzodiacepinas	1,539	14.1	1,182	13.4	357	16.8
Rohypnol	94	0.9	85	1.0	9	0.4
Otros depresores	26	0.2	19	0.2	7	0.3
Estimulantes	3,127	28.6	2,544	28.9	583	27.5
Anfetamina	193	1.8	156	1.8	37	1.7
Metanfetaminas	2,636	24.1	2,160	24.5	476	22.4
Éxtasis (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas	647	5.9	493	5.6	154	7.3
Otros estimulantes	42	0.4	38	0.4	4	0.2
Drogas alucinógenas y disociativas	1,038	9.5	849	9.6	189	8.9
LSD	754	6.9	612	6.9	142	6.7
Plantas alucinógenas y derivados	497	4.5	423	4.8	74	3.5
Otras drogas alucinógenas y disoc.	55	0.5	51	0.6	4	0.2
Opiáceos	455	4.2	391	4.4	64	3.0
Heroína	397	3.6	342	3.9	55	2.6
Opiáceos Sintéticos	50	0.5	41	0.5	9	0.4
Opio y otros opiáceos	31	0.3	28	0.3	3	0.1
Otras sustancias de abuso	161	1.5	118	1.3	43	2.0
Con utilidad médica	66	0.6	45	0.5	21	1.0
Otras sustancias de abuso	102	0.9	75	0.9	27	1.3

**Cuadro 24. Total de drogas consumidas en el último año
(Incluye alcohol o tabaco)**

	General*		Hombres**		Mujeres***	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Ninguna	150	1.4	123	1.4	27	1.3
1 sustancia	1,121	10.3	884	10.0	237	11.2
2 sustancias	2,076	19.0	1,649	18.7	427	20.1
3 sustancias	3,489	31.9	2,815	31.9	674	31.8
4 sustancias	1,891	17.3	1,551	17.6	340	16.0
5 sustancias	983	9.0	815	9.2	168	7.9
6 sustancias	562	5.1	441	5.0	121	5.7
7 sustancias	302	2.8	237	2.7	65	3.1
8 sustancias	156	1.4	126	1.4	30	1.4
9 sustancias	92	0.8	76	0.9	16	0.8
10 sustancias	63	0.6	56	0.6	7	0.3
11-23 sustancias	49	0.4	40	0.5	9	0.4
Total	10,934	100.0	8,813	100.0	2,121	100.0

* $\mu= 3.4$; $\sigma = 1.8$; $Mdn= 3$; $Mo= 3$; Decil1 = 1

** $\mu= 3.4$; $\sigma = 1.8$; $Mdn= 3$; $Mo= 3$; Decil1 = 1

*** $\mu= 3.3$; $\sigma = 1.8$; $Mdn= 3$; $Mo= 3$; Decil1 = 1

**Cuadro 25. Total de drogas ilícitas consumidas en el último año
(No incluye ni alcohol ni tabaco)**

	General*		Hombres**		Mujeres***	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Ninguna	811	7.4	658	7.5	153	7.2
1 sustancia	5,283	48.3	4,224	47.9	1,059	49.9
2 sustancias	2,392	21.9	1,942	22.0	450	21.2
3 sustancias	1,130	10.3	935	10.6	195	9.2
4 sustancias	604	5.5	479	5.4	125	5.9
5 sustancias	337	3.1	263	3.0	74	3.5
6 sustancias	169	1.5	137	1.6	32	1.5
7 sustancias	95	0.9	78	0.9	17	0.8
8 sustancias	62	0.6	55	0.6	7	0.3
9 sustancias	25	0.2	21	0.2	4	0.2
10 sustancias	11	0.1	9	0.1	2	0.1
11-21 sustancias	15	0.1	12	0.1	3	0.1
Total	10,934	100.0	8,813	100.0	2,121	100.0

* $\mu= 1.9$; $\sigma = 1.5$; $Mdn= 1$; $Mo= 1$; Decil1 = 1

** $\mu= 1.9$; $\sigma = 1.5$; $Mdn= 1$; $Mo= 1$; Decil1 = 1

*** $\mu= 1.8$; $\sigma = 1.5$; $Mdn= 1$; $Mo= 1$; Decil1 = 1

Cuadro 26. Consumo de drogas en los últimos 12 meses por sustancia

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Tabaco	8,318	76.1	6,733	76.4	1,585	74.7
Alcohol	8,438	77.2	6,839	77.6	1,599	75.4
Cannabis	8,221	75.2	6,673	75.7	1,548	73.0
Mariguana	8,217	75.2	6,670	75.7	1,547	72.9
Hachís	358	3.3	301	3.4	57	2.7
Cocaína	3,117	28.5	2,603	29.5	514	24.2
Polvo blanco	2,458	22.5	2,029	23.0	429	20.2
Crack	1,435	13.1	1,244	14.1	191	9.0
Otra presentación de cocaína	31	0.3	24	0.3	7	0.3
Inhalables	2,208	20.2	1,753	19.9	455	21.5
Solventes o removedores	1,577	14.4	1,268	14.4	309	14.6
Pegamentos	540	4.9	426	4.8	114	5.4
Esmaltes o pinturas	345	3.2	254	2.9	91	4.3
Otros inhalables	61	0.6	48	0.5	13	0.6
Depresores	1,138	10.4	838	9.5	300	14.1
Benzodicepinas	1,109	10.1	817	9.3	292	13.8
Rohypnol	30	0.3	26	0.3	4	0.2
Otros depresores	14	0.1	7	0.1	7	0.3
Estimulantes	2,605	23.8	2,098	23.8	507	23.9
Anfetamina	114	1.0	91	1.0	23	1.1
Metanfetaminas	2,267	20.7	1,841	20.9	426	20.1
Éxtasis (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas	416	3.8	306	3.5	110	5.2
Otros estimulantes	29	0.3	27	0.3	2	0.1
Drogas alucinógenas y disociativas	639	5.8	501	5.7	138	6.5
LSD	501	4.6	390	4.4	111	5.2
Plantas alucinógenas y derivados	245	2.2	199	2.3	46	2.2
Otras drogas alucinógenas y disoc.	16	0.1	14	0.2	2	0.1
Opiáceos	358	3.3	303	3.4	55	2.6
Heroína	314	2.9	267	3.0	47	2.2
Opiáceos Sintéticos	38	0.3	29	0.3	9	0.4
Opio y otros opiáceos	17	0.2	16	0.2	1	0.0
Otras sustancias de abuso	112	1.0	81	0.9	31	1.5
Con utilidad médica	46	0.4	31	0.4	15	0.7
Otras sustancias de abuso	71	0.6	51	0.6	20	0.9

Cuadro 27. Droga de preferencia en los últimos 12 meses, según menciones

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Tabaco	1,218	11.1	11.3	946	10.7	10.9	272	12.8	13.1
Alcohol	1,413	12.9	13.1	1157	13.1	13.3	256	12.1	12.3
Cannabis	5,173	47.3	48.1	4,275	48.5	49.3	898	42.3	43.1
Mariguana	5,164	47.2	48.0	4,267	48.4	49.2	897	42.3	43.0
Hachís	9	0.1	0.1	8	0.1	0.1	1	0.0	0.0
Cocaína	775	7.1	7.2	671	7.6	7.7	104	4.9	5.0
Polvo blanco	341	3.1	3.2	278	3.2	3.2	63	3.0	3.0
Crack	433	4.0	4.0	392	4.4	4.5	41	1.9	2.0
Otra presentación de cocaína	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0
Inhalables	626	5.7	5.8	435	4.9	5.0	191	9.0	9.2
Solventes o removedores	443	4.1	4.1	310	3.5	3.6	133	6.3	6.4
Pegamentos	109	1.0	1.0	77	0.9	0.9	32	1.5	1.5
Esmaltes o pinturas	62	0.6	0.6	39	0.4	0.4	23	1.1	1.1
Otros inhalables	12	0.1	0.1	9	0.1	0.1	3	0.1	0.1
Depresores	120	1.1	1.1	51	0.6	0.6	69	3.3	3.3
Benzodiacepinas	110	1.0	1.0	46	0.5	0.5	64	3.0	3.1
Rohypnol®	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0
Otros	9	0.1	0.1	4	0.0	0.0	5	0.2	0.2
Estimulantes	1,001	9.2	9.3	793	9.0	9.1	208	9.8	10.0
Anfetamina	21	0.2	0.2	15	0.2	0.2	6	0.3	0.3
Metanfetaminas	945	8.6	8.8	752	8.5	8.7	193	9.1	9.3
Éxtasis (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas	24	0.2	0.2	17	0.2	0.2	7	0.3	0.3
Otros	11	0.1	0.1	9	0.1	0.1	2	0.1	0.1
Drogas alucinógenas y disociativas	34	0.3	0.3	26	0.3	0.3	8	0.4	0.4
LSD	29	0.3	0.3	23	0.3	0.3	6	0.3	0.3
Plantas alucinógenas y derivados	3	0.0	0.0	1	0.0	0.0	2	0.1	0.1
Otras	2	0.0	0.0	2	0.0	0.0	0	0.0	0.0
Opiáceos	240	2.2	2.2	205	2.3	2.4	35	1.7	1.7
Heroína	219	2.0	2.0	189	2.1	2.2	30	1.4	1.4
Opiáceos Sintéticos	16	0.1	0.1	13	0.1	0.1	3	0.1	0.1
Opio y otros opiáceos	5	0.0	0.0	3	0.0	0.0	2	0.1	0.1
Otras sustancias de abuso	16	0.1	0.1	8	0.1	0.1	8	0.4	0.4
Con utilidad médica	10	0.1	0.1	3	0.0	0.0	7	0.3	0.3
Otras sustancias de abuso	6	0.1	0.1	5	0.1	0.1	1	0.0	0.0
Ninguna	136	1.2	1.3	101	1.1	1.2	35	1.7	1.7
No consumió en el último año	150	1.4	Se omite	123	1.4	Se omite	27	1.3	Se omite
Sin Información	32	0.3	Se omite	22	0.2	Se omite	10	0.5	Se omite
Total	10,934	100.0	100.0	8,813	100.0	100.0	2,121	100.0	100.0

Cuadro 28. Droga de mayor impacto en los últimos 12 meses, según menciones

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Tabaco	700	6.4	6.5	534	6.1	6.2	166	7.8	8.0
Alcohol	1,147	10.5	10.7	918	10.4	10.6	229	10.8	11.0
Cannabis	4,908	44.9	45.7	4,010	45.5	46.3	898	42.3	43.1
Mariguana	4,894	44.8	45.5	3,998	45.4	46.2	896	42.2	43.0
Hachís	14	0.1	0.1	12	0.1	0.1	2	0.1	0.1
Cocaína	1,004	9.2	9.3	879	10.0	10.1	125	5.9	6.0
Polvo blanco	415	3.8	3.9	343	3.9	4.0	72	3.4	3.5
Crack	588	5.4	5.5	535	6.1	6.2	53	2.5	2.5
Otra presentación de cocaína	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0
Inhalables	891	8.1	8.3	676	7.7	7.8	215	10.1	10.3
Solventes o removedores	614	5.6	5.7	464	5.3	5.4	150	7.1	7.2
Pegamentos	160	1.5	1.5	128	1.5	1.5	32	1.5	1.5
Esmaltes o pinturas	104	1.0	1.0	74	0.8	0.9	30	1.4	1.4
Otros inhalables	13	0.1	0.1	10	0.1	0.1	3	0.1	0.1
Depresores	172	1.6	1.6	93	1.1	1.1	79	3.7	3.8
Benzodicepinas	157	1.4	1.5	83	0.9	1.0	74	3.5	3.6
Rohypnol	3	0.0	0.0	3	0.0	0.0	0	0.0	0.0
Otros depresores	12	0.1	0.1	7	0.1	0.1	5	0.2	0.2
Estimulantes	1,514	13.8	14.1	1,227	13.9	14.2	287	13.5	13.8
Anfetamina	36	0.3	0.3	29	0.3	0.3	7	0.3	0.3
Metanfetaminas	1,427	13.1	13.3	1,160	13.2	13.4	267	12.6	12.8
Éxtasis (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas	36	0.3	0.3	25	0.3	0.3	11	0.5	0.5
Otros estimulantes	15	0.1	0.1	13	0.1	0.2	2	0.1	0.1
Drogas alucinógenas y disociativas	42	0.4	0.4	28	0.3	0.3	14	0.7	0.7
LSD	38	0.3	0.4	26	0.3	0.3	12	0.6	0.6
Plantas alucinógenas y derivados	2	0.0	0.0	0	0.0	0.0	2	0.1	0.1
Otras drogas alucinógenas y disoc.	2	0.0	0.0	2	0.0	0.0	0	0.0	0.0
Opiáceos	252	2.3	2.3	217	2.5	2.5	35	1.7	1.7
Heroína	233	2.1	2.2	202	2.3	2.3	31	1.5	1.5
Opiáceos Sintéticos	15	0.1	0.1	12	0.1	0.1	3	0.1	0.1
Opio y otros opiáceos	4	0.0	0.0	3	0.0	0.0	1	0.0	0.0
Otras sustancias de abuso	18	0.2	0.2	9	0.1	0.1	9	0.4	0.4
Con utilidad médica	12	0.1	0.1	5	0.1	0.1	7	0.3	0.3
Otras sustancias de abuso	6	0.1	0.1	4	0.0	0.0	2	0.1	0.1
Ninguna	97	0.9	0.9	71	0.8	0.8	26	1.2	1.2
<i>No consumió en el último año</i>	150	1.4	Se omite	123	1.4	Se omite	27	1.3	Se omite
<i>Sin Información</i>	39	0.4	Se omite	28	0.3	Se omite	11	0.5	Se omite
Total	10,934	100.0	100.0	8,813	100.0	100.0	2,121	100.0	100.0

**Cuadro 29. Uso combinado de drogas en los últimos 12 meses
(No incluye tabaco)**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Si combinó drogas	3,623	33.1	42.2	2,996	34.0	43.1	627	29.6	38.5
No combinó drogas	4,958	45.3	57.8	3,957	44.9	56.9	1,001	47.2	61.5
<i>No aplica</i>	2,353	21.5	<i>Se omite</i>	1,860	21.1	<i>Se omite</i>	493	23.2	<i>Se omite</i>
Total	10,934	100.0	100.0	8,813	100.0	100.0	2,121	100.0	100.0

**Cuadro 30. Total de drogas consumidas en los últimos 30 días
(Incluye alcohol o tabaco)**

	General*		Hombres**		Mujeres***	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Ninguna	1,121	10.3	870	9.9	251	11.8
1 sustancia	2,663	24.4	2,089	23.7	574	27.1
2 sustancias	2,969	27.2	2,386	27.1	583	27.5
3 sustancias	2,617	23.9	2,206	25.0	411	19.4
4 sustancias	992	9.1	811	9.2	181	8.5
5 sustancias	371	3.4	298	3.4	73	3.4
6 sustancias	132	1.2	103	1.2	29	1.4
7 sustancias	43	0.4	30	0.3	13	0.6
8 sustancias	14	0.1	10	0.1	4	0.2
9 sustancias	10	0.1	8	0.1	2	0.1
10 sustancias	2	0.0	2	0.0	0	0.0
Total	10,934	100.0	8,813	100.0	2,121	100.0

* $\mu = 2.2$; $\sigma = 1.4$; $Mdn = 2$; $Mo = 2$; Decil1 = ninguna

** $\mu = 2.2$; $\sigma = 1.4$; $Mdn = 2$; $Mo = 2$; Decil1 = 1

*** $\mu = 2.1$; $\sigma = 1.4$; $Mdn = 2$; $Mo = 2$; Decil1 = ninguna

**Cuadro 31. Total de drogas ilícitas consumidas en los últimos 30 días
(No incluye ni alcohol ni tabaco)**

	General*		Hombres**		Mujeres***	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Ninguna	3,133	28.7	2,491	28.3	642	30.3
1 sustancia	5,434	49.7	4,412	50.1	1,022	48.2
2 sustancias	1,611	14.7	1,307	14.8	304	14.3
3 sustancias	503	4.6	403	4.6	100	4.7
4 sustancias	168	1.5	135	1.5	33	1.6
5 sustancias	54	0.5	43	0.5	11	0.5
6 sustancias	17	0.2	11	0.1	6	0.3
7 sustancias	10	0.1	7	0.1	3	0.1
8 sustancias	4	0.0	4	0.0	0	0.0
Total	10,934	100.0	8,813	100.0	2,121	100.0

* $\mu= 1.0$; $\sigma = 1.0$; $Mdn= 1$; $Mo= 1$; Decil1 = ninguna

** $\mu= 1.0$; $\sigma = 1.0$; $Mdn= 1$; $Mo= 1$; Decil1 = ninguna

*** $\mu= 1.0$; $\sigma = 1.0$; $Mdn= 1$; $Mo= 1$; Decil1 = ninguna

Cuadro 32. Consumo de drogas en los últimos 30 días por sustancia

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Tabaco	6,650	60.8	5,435	61.7	1,215	57.3
Alcohol	5,629	51.5	4,641	52.7	988	46.6
Cannabis	5,792	53.0	4,756	54.0	1,036	48.8
Mariguana	5,789	52.9	4,754	53.9	1,035	48.8
Hachís	109	1.0	88	1.0	21	1.0
Cocaína	1,427	13.1	1,209	13.7	218	10.3
Polvo blanco	884	8.1	721	8.2	163	7.7
Crack	747	6.8	658	7.5	89	4.2
Otra presentación de cocaína	9	0.1	6	0.1	3	0.1
Inhalables	1,179	10.8	913	10.4	266	12.5
Solventes o removedores	844	7.7	666	7.6	178	8.4
Pegamentos	254	2.3	196	2.2	58	2.7
Esmaltes o pinturas	137	1.3	91	1.0	46	2.2
Otros inhalables	13	0.1	11	0.1	2	0.1
Depresores	563	5.1	388	4.4	175	8.3
Benzodiazepinas	553	5.1	384	4.4	169	8.0
Rohypnol	5	0.0	4	0.0	1	0.0
Otros depresores	8	0.1	2	0.0	6	0.3
Estimulantes	1,482	13.6	1,189	13.5	293	13.8
Anfetamina	42	0.4	32	0.4	10	0.5
Metanfetaminas	1,339	12.2	1,078	12.2	261	12.3
Éxtasis (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas	126	1.2	92	1.0	34	1.6
Otros estimulantes	8	0.1	7	0.1	1	0.0
Drogas alucinógenas y disociativas	136	1.2	96	1.1	40	1.9
LSD	114	1.0	80	0.9	34	1.6
Plantas alucinógenas y derivados	28	0.3	23	0.3	5	0.2
Otras drogas alucinógenas y disoc.	5	0.0	4	0.0	1	0.0
Opiáceos	225	2.1	190	2.2	35	1.7
Heroína	203	1.9	173	2.0	30	1.4
Opiáceos Sintéticos	20	0.2	14	0.2	6	0.3
Opio y otros opiáceos	7	0.1	7	0.1	0	0.0
Otras sustancias de abuso	65	0.6	46	0.5	19	0.9
Con utilidad médica	26	0.2	17	0.2	9	0.4
Otras sustancias de abuso	41	0.4	29	0.3	12	0.6

Cuadro 33. Frecuencia de episodios de abuso del consumo de tabaco¹ en los últimos 30 días

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Ni una vez	2,007	18.4	30.7	1,603	18.2	30.0	404	19.0	33.8
< de 1 vez a la semana	796	7.3	12.2	649	7.4	12.1	147	6.9	12.3
1 o 2 veces a la semana	769	7.0	11.7	619	7.0	11.6	150	7.1	12.5
Cada tercer día	496	4.5	7.6	407	4.6	7.6	89	4.2	7.4
Diario	2,478	22.7	37.9	2,071	23.5	38.7	407	19.2	34.0
No consumió en los últimos 30 días	4,284	39.2	Se omite	3,378	38.3	Se omite	906	42.7	Se omite
Sin información	104	1.0	Se omite	86	1.0	Se omite	18	0.8	Se omite
Total	10,934	100.0	100.0	8,813	100.0	100.0	2,121	100.0	100.0

¹ Consumo de seis o más cigarrillos en un solo día.

Cuadro 34. Frecuencia de episodios de abuso del consumo de alcohol¹ en los últimos 30 días

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Ni una vez	1,023	9.4	18.6	820	9.3	18.0	203	9.6	21.1
< de 1 vez a la semana	2,069	18.9	37.6	1,696	19.2	37.3	373	17.6	38.8
1 o 2 veces a la semana	1,662	15.2	30.2	1,391	15.8	30.6	271	12.8	28.2
Cada tercer día	419	3.8	7.6	348	3.9	7.7	71	3.3	7.4
Diario	335	3.1	6.1	291	3.3	6.4	44	2.1	4.6
No consumió en los últimos 30 días	5,305	48.5	Se omite	4,172	47.3	Se omite	1,133	53.4	Se omite
Sin información	121	1.1	Se omite	95	1.1	Se omite	26	1.2	Se omite
Total	10,934	100.0	100.0	8,813	100.0	100.0	2,121	100.0	100.0

¹ Consumo de más de cuatro copas en un día para los hombres y de más de tres copas en un día para las mujeres.

Cuadro 35. Frecuencia de episodios de abuso del consumo de drogas ilícitas¹ en los últimos 30 días

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
< de 1 vez a la semana	1,689	15.4	25.9	1,253	14.2	23.6	436	20.6	36.1
1 o 2 veces a la semana	1,271	11.6	19.5	1,047	11.9	19.7	224	10.6	18.5
Cada tercer día	1,031	9.4	15.8	883	10.0	16.6	148	7.0	12.2
Diario	2,525	23.1	38.8	2,124	24.1	40.0	401	18.9	33.2
No consumió en los últimos 30 días	3,133	28.7	Se omite	2,491	28.3	Se omite	642	30.3	Se omite
Sin información	1,285	11.8	Se omite	1,015	11.5	Se omite	270	12.7	Se omite
Total	10,934	100.0	100.0	8,813	100.0	100.0	2,121	100.0	100.0

¹ Consumo de cualquier dosis.

GLOSARIO

Droga ilícita de inicio	Es la sustancia ilegal que el usuario refirió como la droga con la cual inicio el consumo de sustancias. No incluye el inicio del consumo con alcohol o tabaco.
Droga de mayor impacto en los últimos 12 meses	Sustancia que el propio usuario de drogas solicitante de tratamiento refiere como la que más problemas le ha ocasionado en los ámbitos de salud, personal, familiar, escolar, laboral o social, en el transcurso del último año.
Droga de preferencia en los últimos 12 meses	Sustancia que el propio usuario solicitante de tratamiento ha elegido o preferido consumir en el transcurso del último año.
Estrato social	Estimación que hace el terapeuta, según su percepción, del estrato al que pertenece el usuario de drogas, considerando aspectos como lugar de residencia, escolaridad, empleo y características manifiestas como higiene y aliño, calidad del vestido, expresión verbal y vocabulario, etc.
Tipo de consumo de drogas ilícitas	Características de consumo de sustancias ilegales según motivo, frecuencia y problemas asociados. No incluye el uso de alcohol y/o tabaco y se clasifica como: experimental, social u ocasional, funcional, disfuncional y en remisión.
Total de drogas consumidas	Número de drogas consumidas (se incluyen las 26 sustancias de seguimiento) en las siguientes categorías: alguna vez en la vida, en el último año y en los últimos 30 días.
Uso combinado de drogas en los últimos 12 meses	Consumo de dos o más sustancias (incluyendo alcohol y cualquier droga ilícita o de uso médico, utilizada sin prescripción, pero excluyendo tabaco) en el transcurso de un mismo día, en el año previo a la solicitud de tratamiento en CIJ.