

SALUD

SECRETARÍA DE SALUD



**Centros de
Integración
Juvenil, A.C.**

*SISTEMA DE INFORMACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DEL
CONSUMO DE DROGAS*

**CONSUMO DE SUSTANCIAS EN PACIENTES
DE PRIMER INGRESO A TRATAMIENTO.
SEGUNDO SEMESTRE DEL 2016.
USUARIOS DE DROGAS ILÍCITAS**

Marina Velázquez Altamirano

Alma Delia Gutiérrez López

Dirección de Investigación y Enseñanza

Subdirección de Investigación

México, marzo de 2017

SIECD

Informe de Investigación 17-01a



DIRECTORIO

PRESIDENTE HONORARIO VITALICIO DEL PATRONATO NACIONAL

Dr. Jesús Kumate Rodríguez

PRESIDENTE DEL PATRONATO NACIONAL

Dr. Roberto Tapia Conyer

FUNDADORA DE CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL, A.C.

Y VICEPRESIDENTA VITALICIA DEL PATRONATO NACIONAL

Sra. Kena Moreno

DIRECTORA GENERAL

Mtra. Carmen Fernández Cáceres

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE OPERACIÓN Y PATRONATOS

Dr. José Ángel Prado García

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE NORMATIVIDAD

Dr. Ricardo Sánchez Huesca

DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA

Mtro. David Bruno Díaz Negrete

SUBDIRECTOR DE INVESTIGACIÓN

JEFA DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA Y EPIDEMIOLÓGICA

Dra. Solveig Eréndira Rodríguez Kuri

CONTENIDO	PÁG.
ANTECEDENTES	5
MÉTODO	6
CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS	8
FACTORES ASOCIADOS A LA DEMANDA DE TRATAMIENTO	11
CONSUMO DE DROGAS	14
REFERENCIAS	24
CUADROS	27
GLOSARIO	51

ÍNDICE DE CUADROS

	PÁG.
Cuadro 1 Pacientes de primer ingreso a tratamiento por unidad de atención (CIJ)	28
Cuadro 2 Sexo	31
Cuadro 3 Persona que proporciona la información	31
Cuadro 4 Edad de ingreso a tratamiento	31
Cuadro 5 Estado civil	32
Cuadro 6 Escolaridad	32
Cuadro 7 Ocupación	33
Cuadro 8 Estrato social	33
Cuadro 9 Motivos de consulta	34
Cuadro 10 Condicionantes de la solicitud de tratamiento	34
Cuadro 11 Antecedentes de acciones contra el consumo de sustancias	35
Cuadro 12 Problemas asociados al consumo de sustancias	35
Cuadro 13 Edad de inicio del consumo de tabaco	36
Cuadro 14 Edad de inicio del consumo de alcohol	36
Cuadro 15 Edad de inicio del consumo de drogas ilícitas	37
Cuadro 16 Drogas ilícitas de inicio	38
Cuadro 17 Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de tabaco y el ingreso a tratamiento a CIJ	39
Cuadro 18 Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de alcohol y el ingreso a tratamiento a CIJ	39
Cuadro 19 Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de drogas ilícitas y el ingreso a tratamiento a CIJ	40
Cuadro 20 Tipo de consumo de drogas ilícitas	40
Cuadro 21 Total de drogas consumidas alguna vez en la vida (incluye alcohol o tabaco)	41
Cuadro 22 Total de drogas ilícitas consumidas alguna vez en la vida (no incluye ni alcohol ni tabaco)	41
Cuadro 23 Consumo de drogas alguna vez en la vida por sustancia	42
Cuadro 24 Total de drogas consumidas en el último año (incluye alcohol o tabaco)	43
Cuadro 25 Total de drogas ilícitas consumidas en el último año (no incluye ni alcohol ni tabaco)	43
Cuadro 26 Consumo de drogas en los últimos 12 meses por sustancia	44
Cuadro 27 Droga de preferencia en los últimos 12 meses, según menciones	45
Cuadro 28 Droga de mayor impacto en los últimos 12 meses, según menciones	46
Cuadro 29 Uso combinado de drogas en los últimos 12 meses (no incluye tabaco)	47
Cuadro 30 Total de drogas consumidas en los últimos 30 días (incluye alcohol o tabaco)	47
Cuadro 31 Total de drogas ilícitas consumidas en los últimos 30 días (no incluye ni alcohol ni tabaco)	48
Cuadro 32 Consumo de drogas en los últimos 30 días por sustancia	49
Cuadro 33 Frecuencia de episodios de abuso del consumo de Tabaco en los últimos 30 días	50
Cuadro 34 Frecuencia de episodios de abuso del consumo de Alcohol en los últimos 30 días	50
Cuadro 35 Frecuencia de episodios de abuso del consumo de drogas ilícitas en los últimos 30 días	50

RESUMEN

El presente informe se realizó con base en 12,096 registros clínicos de la entrevista inicial realizada a personas que acudieron por primera vez a solicitar tratamiento por el consumo de drogas a Centros de Integración Juvenil (CIJ) entre julio y diciembre de 2016. Los objetivos del estudio son: a) actualizar información de los pacientes en cuanto al perfil sociodemográfico, acerca de los factores asociados a la demanda de tratamiento y del patrón de consumo de sustancias; b) contribuir a retroalimentar sistemas nacionales de información del consumo de drogas; c) generar información que oriente el desarrollo de estudios sobre el uso de tabaco, alcohol y otras sustancias en México; y d) contribuir al desarrollo, diseño y ajuste de los servicios institucionales de prevención y tratamiento del consumo de drogas.

Los datos que se presentan permiten ver que el uso de drogas ilícitas continúa siendo un trastorno que afecta mayormente a la población masculina, en una proporción de 4.7 hombres por cada mujer. La edad media de ingreso a tratamiento fue de 22.9 años. En promedio, los hombres ingresaron a tratamiento a mayor edad que las mujeres (23.3 y 21.3 años, respectivamente). La edad promedio del inicio del consumo de tabaco fue a los 14.4 años, la del alcohol a los 14.5 años y la de drogas ilícitas a los 16 años. La edad de inicio del consumo de sustancias no presenta diferencias importantes por sexo.

Las drogas de mayor consumo alguna vez en la vida fueron: *cannabis* (87.2%), alcohol (86.8%), tabaco (86.0%), cocaína/*crack* (43.3%), inhalables (28.2%), estimulantes (32.2%), principalmente metanfetaminas: 27.1% y éxtasis: 6.9%, depresores (14.6%), drogas alucinógenas y disociativas (11.5%) y opiáceos (4.0%). Las sustancias más utilizadas el mes previo al ingreso a tratamiento fueron: tabaco (64.0%), alcohol (54.4%), *cannabis* (52.8%), estimulantes (15.7%), cocaína/*crack* (15.5%) e inhalables (10.9%). Las sustancias reportadas como de mayor impacto en el último año son: marihuana (41.3%), alcohol (11.5%), metanfetaminas (16.1%), tabaco (5.9%), solventes y removedores (5.6%), *crack* (6.5%) y cocaína en polvo (4.4%).

En cuanto a los principales factores asociados a la demanda de tratamiento se observó que, los consultantes acudieron principalmente por recomendación de la familia (45.9%) o por iniciativa propia (39.9%); y solicitaron atención debido a su consumo de drogas ilícitas (90.7%), de alcohol (41.2%) o por el uso de tabaco (38.9%). Previo a su ingreso a tratamiento en CIJ, 31.9% de ellos(as) intentaron interrumpir de manera voluntaria el uso de sustancias, mientras que 24.9% no habían realizado alguna acción para dejar el consumo. Los problemas asociados al consumo de drogas reportados con mayor frecuencia fueron los del ámbito familiar (78.6%), escolar (42.8%), de salud (42.1%) y psicológicos (38.8%).

ANTECEDENTES

Existe evidencia de que Centros de Integración Juvenil ha reportado información epidemiológica del consumo de drogas de los solicitantes de tratamiento desde 1976¹. En 1983 inicia la aplicación de una cédula homogénea a los pacientes de nuevo ingreso², aunque no es sino a partir de 1990 que la recolección de datos se realiza en forma sistemática³, implementándose posteriormente el *Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas* (SIECD), el cual se ha ido consolidando a través de los años y ha realizado el seguimiento oportuno de un conjunto de variables, con las cuales ha podido contribuir en la toma de decisiones del diseño y ajuste de servicios institucionales, además de aportar conocimientos sobre la forma y tendencias del uso de drogas y de aportar información a los Sistemas Epidemiológicos de las Adicciones en el país, como es el caso del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA)⁴ de la Secretaría de Salud, del Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas (SRID) –perteneciente al Instituto Nacional de Psiquiatría “*Ramón de la Fuente Muñiz*” (INPRF)⁵–, del Observatorio Epidemiológico en Drogas de la Secretaría Salud⁶.

El SIECD, también ha apoyado en el desarrollo de diferentes estudios epidemiológicos especializados, con temas que van desde el perfil de usuarios de drogas y su trayectoria de consumo⁷, el consumo de drogas en las mujeres⁸, en la población infantil⁹ o de acuerdo con las etapas de la vida¹⁰, hasta llegar a los estudios de tendencias^{11,12,13,14}. Toda esta información ha facilitado el enfrentamiento oportuno de las problemáticas generadas por el creciente consumo de estimulantes y simultáneamente ha sido de utilidad para apoyar el diseño eficaz de estudios sobre características particulares de los consumidores de estos alcaloides^{15,16}.

Por otro lado, la información reportada ha permitido el desarrollo de estudios epidemiológicos particulares enfocados en profundizar en las características del consumo de drogas legales de pacientes atendidos. Así, desde el año 2006, el SIECD genera un informe por separado de las características de los pacientes consumidores de tabaco y alcohol¹⁷, con lo cual se ha logrado identificar una emergencia epidemiológica del consumo de alcohol entre las pacientes atendidas con relación a los años anteriores¹⁸; suceso que ha dado pie a CIJ para profundizar en esta problemática¹⁹ y que también ha sido reportado por la Encuesta Nacional de Adicciones (ENA), sobre todo para el caso de las mujeres jóvenes²⁰.

Es importante destacar que la información generada por el SIECD durante el lapso de más de dos décadas ha sido consistente con la de las Encuestas Nacionales de Adicciones (ENA) de este periodo, ya sea en el nivel nacional o en el regional²¹ y también ha sido referente para el desarrollo de metodologías de investigación en variados estudios clínicos, psicosociales y evaluativos de la Institución, como es el caso de diversos *Estudios de la Comunidad Objetivo (EBCO)*²² realizados por los CIJ a lo largo y ancho del país.

El presente informe se elaboró con base en la información obtenida por el SIECD durante el segundo semestre de 2016 y tiene el objetivo de proporcionar datos actualizados sobre las características sociodemográficas, factores asociados a la demanda de tratamiento y del patrón de consumo de drogas de los solicitantes de tratamiento, de manera que se aporten elementos para apoyar el diseño, planeación y ajuste de los programas institucionales de prevención, tratamiento y rehabilitación, además de colaborar con otros sistemas de información en drogas y de aportar elementos para el diseño y elaboración de investigaciones en el campo de las adicciones.

MÉTODO

Diseño del estudio: Censo epidemiológico descriptivo semestral.

Población: 12,096 usuarios de drogas ilícitas procedentes de 107 unidades de CIJ, que acudieron por primera vez a consulta entre julio y diciembre de 2016 y que proporcionaron personalmente la información (cuadro 1. Anexo).

Fuente de información: Formato de Entrevista Inicial, aplicado en la primera consulta por parte del personal médico-técnico responsable del ingreso de pacientes a tratamiento, que forma parte del expediente clínico en cualquiera de sus dos versiones: formato electrónico (base de datos recuperada el día 2 de febrero de 2017 a las 12:09 hrs., con 11,943 registros capturados por los/as terapeutas responsables de realizar la entrevista inicial) o formato impreso (153 registros capturados por personal del departamento de Investigación Clínica y Epidemiológica mediante el programa *Control de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas* desarrollado por CIJ).

Variables de estudio: Las características sociodemográficas estudiadas comprenden: persona que proporciona la información, sexo, edad de ingreso a tratamiento, estado civil, escolaridad, ocupación y estrato social; las variables de factores asociados a la demanda de tratamiento incluyen: motivo(s) de consulta, condicionante(s) de la solicitud

de tratamiento, antecedente(s) de acciones tomadas frente al uso de sustancias y problema(s) asociado(s) al mismo; y las variables de patrón de consumo: edad de inicio, tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de sustancias y el ingreso a tratamiento, consumo alguna vez en la vida, en el último año y en los últimos 30 días; drogas de preferencia y de mayor impacto en el último año (estas dos últimas variables de acuerdo con el punto de vista del paciente), uso combinado de sustancias, tipo de consumo de drogas ilícitas, episodios de abuso y total de drogas consumidas.

La información sobre el consumo de drogas se presenta categorizada en diez grupos de sustancias que a su vez desagrega a 26 categorías de drogas:

Grupo de Sustancias	Drogas en seguimiento
Tabaco	Cigarrillos
Alcohol	Bebidas alcohólicas
<i>Cannabis</i>	Mariguana y hachís
Cocaína	Cocaína en polvo, <i>crack</i> y otra presentación de cocaína
Inhalables	Solventes y removedores, pegamentos, esmaltes y pinturas y otros inhalables
Depresores	Benzodiacepinas, <i>Rohypnol</i> y otros depresores
Estimulantes	Anfetaminas, metanfetaminas (<i>crystal</i> o <i>ICE</i>), MDMA (<i>éxtasis</i>) y metanfetaminas alucinógenas; y otros estimulantes
Drogas alucinógenas y disociativas	Ácido lisérgico (LSD), plantas alucinógenas y derivados y otros alucinógenos (PCP y ketamina)
Opiáceos	Heroína, opiáceos sintéticos y opio, y otros opioides
Otras sustancias de abuso	Sustancias con utilidad médica y otras sustancias no identificadas

Procesamiento de datos. Para el procesamiento estadístico de la información se utilizó el programa SPSS v.19.

Los resultados se presentan tanto en forma general como desglosada por sexo y en porcentajes válidos, excluyendo los casos “*sin información*” y aquellos que no cumplieron con las condiciones requeridas para el análisis en cada variable de estudio.

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS^a

Sexo. La población se conformó por 9,977 hombres y 2,119 mujeres, lo que en porcentaje representa a un 82.5% y un 17.5%, respectivamente. Dando así una proporción aproximada de cuatro hombres (4.7) por cada mujer.

Persona que proporciona la información. 57.6% de los (las) pacientes acudieron en compañía de familiares u otras personas, mientras que en 42.4% lo hicieron solos(as).

Edad de ingreso a tratamiento. Se observa un rango de edad de 8 a 85 años, con un promedio de 22.9 años (D.E.= 10.5 años) y una desviación estándar de diez punto cinco; es decir que cerca del 83.9% de las personas atendidas (10,146) se encontró entre los 12 y 33 años de edad; la edad mediana de la población fue de 19 años (44.6% de los casos fueron menores de edad; 5,394 sujetos), mientras que la moda se ubicó en 16 años (1,268 personas atendidas).

Figura 1. Edad de ingreso según sexo

	 Años	 Años
Rango	8 a 85	11 a 73
Promedio (Desviación estándar)	23.3 (10.6)	21.3 (10.1)
Mediana	19	17
Moda	16	14 y 15


Las mujeres ingresaron a tratamiento a menor edad (dos años menos que los hombres).

^a Cfr., Cuadros 1 a 8.

Estado civil. La mayor parte de la población refirió ser soltera (72.1%), mientras que 11.3% indicó que vivía en unión libre y 9.1% estaba casada.


Figura 2. Estado civil según sexo

Es ligeramente mayor el porcentaje de mujeres solteras y, en contraparte, es mayor el de hombres que contaba con relación de pareja (principalmente casados).



Escolaridad. 42.1% cursaba o había cursado algún grado de educación secundaria, 38.2% al menos algún grado de bachillerato, 7.6% contaba con algún grado escolar de nivel primaria y 9.4% de nivel superior o posgrado.


Figura 3. Escolaridad según sexo



El nivel de escolaridad es ligeramente mayor en hombres que en mujeres.

Ocupación. 36.2% se dedicaba a estudiar, 32.9% desempeñaba alguna actividad laboral y 21.9% estaba desempleado.


Figura 4. Principal ocupación según sexo



Estrato social. Según la percepción de los terapeutas la mitad de los pacientes (50.8%) se ubicaban en el estrato medio bajo, 23.7% en un nivel bajo y 20.1% fue clasificado en el estrato medio.

Figura 5. Estrato social según sexo


Según la percepción de los terapeutas, tanto hombres como mujeres presentaron condiciones sociales similares, predominando el estrato medio bajo.



FACTORES ASOCIADOS A LA DEMANDA DE TRATAMIENTO^b


Motivos de consulta. 46.7% de las personas atendidas reportó más de un motivo para acudir a tratamiento (uso de alcohol, tabaco o drogas), mientras que 0.1% no expresó ninguno. 90.7% de los pacientes acudió por consumo de drogas ilícitas, 41.2% por uso de bebidas alcohólicas y 38.9% por uso de tabaco.

Figura 6. Motivos de consulta según sexo



Condicionantes de la solicitud de tratamiento. 27.6% de los casos expresó dos o más condicionantes para acudir a tratamiento; 45.9% acudió por recomendación de la familia, 39.9% por iniciativa propia, 20.0% por condicionamiento o recomendación escolar, 8.8% por condicionamiento legal y 8.9% por indicación médica.


Figura 7. Condicionantes de la solicitud de tratamiento según sexo



^b Cfr. Cuadros 9 a 12.

Antecedentes de acciones contra el consumo de sustancias. 31.9% de los pacientes expresó que antes de acudir a CIJ había intentado interrumpir el consumo por voluntad propia, 12.6% señaló que previamente había estado internado en algún anexo, 6.1% acudió a algún tipo de tratamiento psiquiátrico o psicoterapéutico, 7.6% había acudido a grupos de autoayuda y 6.6% lo había hecho por medio de juramento. Cabe señalar que 12.7% reportó haber intentado al menos dos formas distintas de acciones para abandonar el consumo de drogas, en tanto que 23.4% expresó que hasta el momento de la solicitud de tratamiento no había tomado ninguna medida en contra del consumo de drogas.


Figura 8. Antecedentes de acciones contra el consumo de sustancias según sexo



Mayor porcentaje de mujeres ingresaron a CIJ sin haber realizado acciones previas para dejar el consumo de drogas, mientras que los hombres en mayor proporción que las mujeres intentaron dejarlo de manera voluntaria, se internaron en algún anexo, participaron en grupos de autoayuda o por medio de juramento.

Problemas asociados al consumo de sustancias. 79.8% de los pacientes señaló problemas de tipo familiar, 39.5% escolares, 42.7% de salud, 40.2% psicológicos, 22.9% laborales, 20.6% legales, 16.4% de conducta antisocial o delictiva y 13.2% accidentes o lesiones. Cabe señalar que 77.1% de las personas atendidas mencionaron dos o más problemas asociados al consumo de sustancias, mientras que 4.1% no reportó ninguno.

Figura 9. Problemas asociados al consumo de sustancias según sexo



CONSUMO DE DROGAS^c

Edad de inicio del consumo de sustancias. La edad promedio de inicio del consumo de tabaco se situó en 14.4 años ($\sigma=3.6$ años), la mediana en 14 años y la moda en 15 años, mientras que la edad promedio de inicio del consumo de alcohol se ubicó en 14.5 años ($\sigma=3.0$ años) con una mediana de 14 años y una moda de 15 años. Por su parte, la edad promedio de inicio del uso de drogas ilícitas (incluyendo sustancias de uso médico sin prescripción) fue de 16 años ($\sigma=5.1$ años), con una mediana de 15 años y la moda de 15 años. Por otra parte, al considerar el primer decil como indicador de las edades de inicio más tempranas, se observa que el consumo de tabaco y de alcohol aparece a los 11 y 12 años respectivamente, mientras que el de drogas ilícitas se presenta a los 12 años.

Figura 10. Edad de inicio del consumo de sustancias según sexo

	 Años			 Años		
	Tabaco	Alcohol	Drogas ilícitas	Tabaco	Alcohol	Drogas ilícitas
Promedio (Desviación estándar)	14.4 (3.5)	14.5 (2.9)	15.9 (4.9)	14.5 (3.7)	14.5 (3.4)	16.3 (6.0)
Mediana	14	15	15	14	14	15
Moda	15	15	15	14	14	14


En cuanto a la edad de inicio del consumo de sustancias, no se aprecian diferencias considerables entre hombres y mujeres.

Drogas ilícitas de inicio. Las sustancias de inicio más reportadas fueron: la cannabis, principalmente en forma de marihuana (73.9%); los inhalables (9.6%), mayormente en forma de solventes y removedores (6.7%); y la cocaína (9.3%), tanto en forma de polvo blanco (7.3%) como *crack* (2.0%); seguidas por los estimulantes (3.9%), donde

^c Cfr., Cuadros 13 a 35

destacan las metanfetaminas (3.5%); los depresores con utilidad médica (1.4%) siendo las benzodiacepinas las más reportadas (1.4%); y los opiáceos (0.4%), entre los cuales sobresale la heroína (32 casos).

Figura 11. Principales drogas ilícitas de inicio según sexo




Lapso transcurrido entre el inicio del consumo de sustancias y el ingreso a tratamiento en CIJ. El promedio de años entre el inicio de consumo y la solicitud de tratamiento se situó de la siguiente manera: tabaco de 8.8 años ($\sigma=9.9$ años), alcohol de 8.9 años ($\sigma=9.8$ años) y drogas ilícitas de 7 años ($\sigma=8.9$ años). Sin embargo, la mitad de los usuarios dejó pasar cinco años desde el momento en que se inició el consumo de tabaco o alcohol y el momento de acudir a solicitar tratamiento, mientras que 57.8% de los usuarios dejaron pasar cuatro años desde el inicio de drogas ilegales.

Figura 12. Lapso transcurrido entre el inicio del consumo de sustancias y el ingreso a tratamiento en CIJ según sexo

	 Años			 Años		
	Tabaco	Alcohol	Drogas ilícitas	Tabaco	Alcohol	Drogas ilícitas
Promedio (Desviación estándar)	9.1 (10)	9.3 (10)	7.4 (9.1)	7 (9.1)	7.1 (8.9)	5 (7.4)
Mediana	5	5	4	3	4	2
Moda	1	1	1	1	1	< un año

Los hombres dejan pasar más tiempo que las mujeres para solicitar tratamiento.

Tipo de consumo de drogas ilícitas. De acuerdo con los terapeutas, 52.3% de los solicitantes de tratamiento fue diagnosticado con consumo funcional, 20.3% con consumo disfuncional, 13.8% con consumo social u ocasional, 10.6% con consumo experimental y 2.9% presentaba remisión del consumo.




Las mujeres presentaron patrones de consumo de menor gravedad que los hombres.

Total de drogas consumidas. El promedio de sustancias utilizadas alguna vez en la vida, incluyendo alcohol o tabaco, fue de 4.3 drogas (95.1% reportó el uso de dos o más sustancias); en el último año fue de 3.5 drogas (89.8% consumió dos o más sustancias); y en los últimos 30 días fue de 2.3 drogas (68.6% reportó haber utilizado dos o más sustancias).

El promedio de sustancias consumidas alguna vez en la vida, sin incluir alcohol y tabaco, fue de 2.6 drogas (61.2% reportó el uso de dos o más sustancias); en el último año fue de 1.9 drogas (47.6% consumió dos o más sustancias); y en los últimos 30 días fue de una (24.3% reportó haber utilizado dos o más sustancias).

Figura 14. Promedio de drogas consumidas según sexo




Mujeres y hombres consumieron un promedio similar de drogas.

Consumo de drogas alguna vez en la vida.^d Las proporciones de consumo alguna vez en la vida de los diez grupos de sustancias en seguimiento fueron: *cannabis* (87.2%), alcohol (86.8%), tabaco (86.0%), cocaína (43.3%), estimulantes (32.2%), inhalables (28.2%), depresores (14.6%), drogas alucinógenas y disociativas (11.5%), opiáceos (4.0%) y otras sustancias de abuso (1.5%).

En cuanto al uso de sustancias específicas (contenidas en alguno de los diez grupos antes mencionados) sobresalen: marihuana (87.2%), cocaína en polvo (36.9%) metanfetaminas (27.1%), solventes y removedores (20.4%), *crack* (20.3%) y benzodiacepinas (14.2%); en menor proporción la LSD (8.7%), los pegamentos (7.9%), así como el *éxtasis* y otras metanfetaminas alucinógenas (6.9%).

Figura 15. Consumo de drogas alguna vez en la vida según sexo




Los hombres reportaron en mayor proporción que las mujeres el consumo de tabaco, alcohol, cannabis, inhalables, cocaína, crack, metanfetaminas y heroína. Ellas reportaron mayormente el consumo de benzodiacepinas y éxtasis. Ambos consumieron inhalables en la misma proporción.

^d Los casos pudieron haber reportado el consumo de dos o más sustancias, por lo que el total de los porcentajes no suma 100%.

Consumo de drogas en los últimos 12 meses. 93.1% de las personas reportaron haber consumido alguna sustancia en el año previo a su ingreso a tratamiento en CIJ. Las proporciones de consumo de los diez grupos de sustancias utilizadas en este lapso fueron: alcohol (79.3%), tabaco (78.5%), *cannabis* (74.3%), cocaína (31.5%), estimulantes (26.9%), inhalables (20.3%), depresores (10.2%), drogas alucinógenas y disociativas (7.1%); opiáceos (3.1%) y otras sustancias de abuso (1.1%).

En cuanto al consumo de sustancias específicas contenidas en alguno de los grupos anteriores destacaron: marihuana (74.3%), cocaína en polvo (24.7%), metanfetaminas (23.3%), solventes y removedores (14.9%) y *crack* (14.9%); en menor proporción se refieren a las benzodiazepinas (10%), los pegamentos (5%) y la LSD (5.7%).


Figura 16. Consumo de drogas en los últimos 12 meses según sexo



Las drogas más consumidas en el último año por ambos sexos fueron alcohol, tabaco y cannabis; las mujeres usaron en mayor proporción benzodiazepinas, éxtasis y drogas alucinógenas; los hombres reportaron en mayor proporción el uso de cannabis, cocaína en polvo, crack, metanfetaminas y heroína.

Droga de preferencia en los últimos 12 meses. Entre las sustancias más frecuentemente referidas se encontraron: cannabis (45.9%), alcohol (13.6%), tabaco (10.8%), inhalables (5.1%) y metanfetaminas (11.3%). En menores proporciones aparecieron: crack (4.8%), cocaína en polvo (3.4%) y heroína (1.9%).


Figura 17. Droga de preferencia en los últimos 12 meses según sexo



Los hombres reconocieron mayor preferencia por el uso de cannabis, crack, alcohol y heroína; mientras que en las mujeres la preferencia fue mayor por los inhalables, tabaco, metanfetaminas y benzodiacepinas.

Droga de mayor impacto en los últimos 12 meses. Las principales sustancias a cuyo consumo los pacientes atribuyeron los mayores daños en la salud, en el bienestar personal y familiar o en el desempeño escolar, laboral o social y por las que pudieron haber solicitado tratamiento se encuentran: *cannabis* (41.4%), metanfetaminas (16.1%), alcohol (11.5%), inhalables (7.8%), tabaco (5.9%), *crack* (6.5%), cocaína en polvo (4.4%) y heroína (1.9%) [Figura 18].


Figura 18. Droga de mayor impacto en los últimos 12 meses según sexo



Hombres y Mujeres acuden a tratamiento principalmente por malestares físicos, psicológicos y sociales atribuidos al consumo de marihuana. Con mayor frecuencia ellos también acuden por los efectos asociados al consumo de crack, metanfetaminas y heroína; mientras que ellas por los del uso de alcohol, tabaco, inhalables y benzodíacepinas.

Uso combinado de drogas en los últimos 12 meses.^e Al menos en una ocasión en el transcurso del último año y sin tomar en cuenta el consumo de tabaco, poco menos de la mitad de la población (45.5%) reportó el consumo de dos o más sustancias en un mismo día.

Figura 19. Uso combinado de droga en los últimos 12 meses según sexo



Los hombres combinaron con mayor frecuencia dos o más drogas que las mujeres (no se incluyó el consumo de tabaco).


^e No se toman en cuenta 2,433 casos (20.1%) que no cumplieron los criterios de inclusión de esta variable; 19.5% de los hombres y 23.1% de las mujeres (ver anexo).

Consumo de drogas en los últimos 30 días. Incluyendo alcohol y tabaco, 91.0% de los casos reportaron consumo de sustancias en el mes anterior al ingreso a tratamiento.

Las proporciones de consumo de los diez grupos de sustancias utilizadas en este lapso fueron: tabaco (64.0%), alcohol (54.4%), *cannabis* (52.8%), estimulantes (15.7%), cocaína (15.5%), inhalables (10.9%), depresores (4.7%), opiáceos (2%), drogas alucinógenas y disociativas (1.7%) y otras sustancias de abuso (0.6%).

En cuanto al consumo de sustancias específicas destacó el de marihuana con 52.7%, le siguen: metanfetaminas (14.5%), cocaína en polvo (9.7%), solventes/removedores (8.1%) y crack (8%); en menor proporción se registra el consumo de benzodiazepinas (4.6%), pegamentos (2.1%) y heroína (1.9%).


Figura 20. Consumo de drogas en los últimos 30 días según sexo



Hombres y mujeres consumieron predominantemente tabaco, alcohol y cannabis –los hombres en mayor proporción–. Las mujeres reportaron mayor consumo de inhalables, benzodiazepinas, alucinógenos y éxtasis.

Frecuencia de episodios de abuso en los últimos 30 días. 38% de quienes reportaron consumo de tabaco en los últimos 30 días aceptó fumar seis o más cigarrillos diariamente. Así mismo, entre quienes consumieron alcohol, la mayor parte (36.2%) reportó consumo abusivo menos de una vez a la semana y una o dos veces a la semana (30.7%). Por otra parte, 41.0% de los usuarios de drogas ilícitas durante el último mes reportaron consumirlas todos los días, 22.4% menos de una vez a la semana, 20.4% una a dos veces a la semana y 16.2% cada tercer día.

Figura 21. Frecuencia de episodios de abuso en los últimos 30 días según sexo



REFERENCIAS

1. Sánchez-Huesca, R. y López, L. M. (1985). *Características demográficas y patrones de inicio en el consumo de drogas en asistentes a los Centros Locales; recuperación de los archivos de siete años (1976-1982)*. México: Centros de Integración Juvenil, A.C.
2. Clarac, P. y Wagner, F. (1987). Análisis de algunas variables en una muestra de pacientes farmacodependientes (1986). En Wagner, F. y Ortiz, R. (1990). *Estudios acerca de la farmacodependencia en México realizados por Paule Clarac*. México: Centros de Integración Juvenil, A. C. (pp. 111-126).
3. García V. R., Díaz, D. B., Balanzario, M. C., Gutiérrez, A. D y Castillo, P. I. (1999). *Características sociodemográficas y de consumo de drogas en pacientes atendidos entre 1990 y 1997* (Informe de investigación 98-12). México: Centros de Integración Juvenil, A.C.
4. Secretaria de Salud. *Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA)*. México. Dirección General de Epidemiología. Recuperado de http://www.epidemiologia.salud.gob.mx/dgae/infoepid/inf_sisvea.html
5. Ortiz, A., Martínez, R., Meza, D. (2016). *Grupo Interinstitucional para el desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas* (Tendencias en el área metropolitana no. 58 junio, 2015). México: Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Recuperado de http://www.inprf.gob.mx/opencms/export/sites/INPRFM/psicosociales/archivos/sri_d/rep_58_pdf.pdf
6. Díaz, D. B., Balanzario, M. C., Castillo, P. I., Gutiérrez, A. D. y García, V. R. (2001). Uso de drogas entre pacientes de primer ingreso en Centros de Integración Juvenil. En Secretaría de Salud. *Observatorio Epidemiológico en drogas. El fenómeno de las adicciones en México 2001*. México: Secretaría de Salud (pp. 66-71). Recuperado de http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/publicaciones/obs2001_cap4.pdf
7. García-Aurrecochea, V. R., Díaz-Negrete, D. B., Balanzario, M. C. y Castillo-Franco, P. I. (1998). *Perfil y trayectoria del consumo de drogas en pacientes de*

- primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil en 1996*. En CD: D. B. Diaz, J. L. Arellanez, M. C. Balanzario y R. Sánchez, *Once años de estudios del consumo de drogas en México, Investigaciones realizadas en Centros de Integración Juvenil entre 1997 y 2007*. México: Centros de Integración Juvenil, A. C.
8. Castillo, P. I., Gutiérrez, A. D. (2008). Consumo de drogas en mujeres asistentes a centros de tratamiento especializado en la Ciudad de México. *Salud Mental* 31 (5), 351-359. Recuperado de <http://scielo.unam.mx/pdf/sm/v31n5/v31n5a3.pdf>
 9. Gracia, S. E. y Balanzario, M. C. (2003). *El consumo de drogas en menores de 12 años en Centros de Integración Juvenil en el año 2002* (Informe de Investigación 03-17). México: Centros de Integración Juvenil, A. C.
 10. García, V. R., Castillo, P. I. y Guerrero, J. A. (2003). *El consumo de drogas en pacientes atendidos en Centros de Integración Juvenil según la etapa de vida correspondiente al ingreso a tratamiento* (Informe de Investigación 03-13). México: Centros de Integración Juvenil, A. C.
 11. García, V. R., Diaz, D. B. y Balanzario, M. C. (2001). *Tendencias del consumo de drogas en pacientes de primer ingreso a tratamiento en CIJ entre 1990 y 1999* (Informe de investigación 2000-06). México: Centros de Integración Juvenil, A.C.
 12. Gutiérrez López, AD. (2016). *Tendencias del consumo de drogas alguna vez en la vida en Centros de Integración Juvenil. Segundo semestre de 2004 – Primer semestre de 2016 (Nivel Nacional y Entidades Federativas)* [Informe de Investigación 16-09e]. México: Centros de Integración Juvenil, A. C. Recuperado de <http://www.cij.gob.mx/Programas/Investigacion/pdf/16-09e.pdf>
 13. Gutiérrez, A. D. (2016). *Tendencias del consumo de drogas en los últimos 30 días en Centros de Integración Juvenil. Segundo semestre de 2004 - Primer semestre de 2016 (Nivel Nacional y Entidades Federativas)* [Informe de Investigación 16-09f]. México: Centros de Integración Juvenil, A. C. Recuperado de <http://www.cij.gob.mx/Programas/Investigacion/pdf/16-09f.pdf>
 14. Gutiérrez, A. D. (2016). *Tendencias de las principales drogas de mayor impacto reportadas por usuarios de drogas ilícitas en el año previo a la solicitud de tratamiento en Centros de Integración Juvenil. Segundo semestre de 2004 -*

- Primer semestre de 2016. (Nivel nacional y entidades federativas)* [Informe de Investigación 16-09g]. México: Centros de Integración Juvenil, A. C. Recuperado de <http://www.cij.gob.mx/Programas/Investigacion/pdf/16-09g.pdf>
15. Jiménez, K., García, V. R. y González, J. D. (2005). *Patrón de consumo de cocaína y crack en pacientes que ingresan a tratamiento* (Informe de investigación 05-07). México: Centros de Integración Juvenil, A. C.
 16. Jiménez, K. y Castillo, N. L. (2014). *Factores de reincidencia en usuarios de cocaína, crack y metanfetaminas en fase de recuperación* (Informe de Investigación 04-14). México: Centros de Integración Juvenil, A. C.
 17. Gutiérrez, A. D. y Castillo, P. I. (2007). *Estudio epidemiológico del consumo de alcohol y tabaco en pacientes usuarios de estas sustancias solicitantes de tratamiento en CIJ en 2006* (Informe de Investigación 07-13). México: Centros de Integración Juvenil, A. C. Recuperado de <http://www.cij.gob.mx/Programas/Investigacion/pdf/07-13.pdf>
 18. Gutiérrez, A. D. (2016). *Consumo de sustancias en pacientes de primer ingreso a tratamiento. Primer semestre del 2016. Usuarios de Tabaco y alcohol* (Informe de Investigación 16-09d). México: Centros de Integración Juvenil, A. C. Recuperado de <http://www.cij.gob.mx/Programas/Investigacion/pdf/16-09d.pdf>
 19. Moreno, K. (2010). *Los jóvenes y el alcohol en México. Un problema emergente en mujeres*. México: Centros de Integración Juvenil, A.C.
 20. Medina-Mora, M. E. Villatoro J. A., Fleiz, C., Téllez, M. M., Mendoza, L. R., Romero, M., Gutiérrez, J. P., Castro, M., Hernández, M., Tena, C., Alvear, C. y Guisa, V. (2012). *Encuesta Nacional de Adicciones 2011: Reporte de Alcohol*. México: Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.
 21. Medina-Mora, M. E. Villatoro J. A., Fleiz, C., Téllez, M. M., Mendoza, L. R., Romero, M., Gutiérrez, J. P., Castro, M., Hernández, M., Tena, C., Alvear, C. y Guisa, V. (2012). *Encuesta Nacional de Adicciones 2011: Reporte de Drogas*. México: Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.
 22. Díaz, D. B., Chacón, J. L., Castillo, N. L., Castillo, P. I. y Arellanez, J. L. (2013). *Estudio Básico de Comunidad Objetivo Vol. 1 y 2*. México: Centros de Integración Juvenil, A. C. Recuperado de <http://www.cij.gob.mx/ebco2013/index.html>

CUADROS

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS USUARIOS DE DROGAS DE PRIMER INGRESO A TRATAMIENTO A CIJ EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2016

Cuadro 1. Pacientes de primer ingreso por unidad de atención (CIJ, UH y UTH)

CIJ	General		Hombres		Mujeres		Razón H:M
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	
Álvaro Obregón Norte	73	0.6	64	87.7	9	12.3	7.1 : 1
Álvaro Obregón Oriente	54	0.5	44	81.5	10	18.5	4.4 : 1
Azcapotzalco	138	0.5	116	84.1	22	15.9	5.3 : 1
Benito Juárez	91	1.8	73	80.2	18	19.8	4.1 : 1
Chalco	122	2.3	106	86.9	16	13.1	6.6 : 1
Coyoacán	150	1.5	122	81.3	28	18.7	4.4 : 1
Cuajimalpa	129	1.0	105	81.4	24	18.6	4.4 : 1
Cuauhtémoc Oriente	111	0.5	85	76.6	26	23.4	3.3 : 1
Cuauhtémoc Poniente	139	0.5	105	75.5	34	24.5	3.1 : 1
Ecatepec	239	0.2	210	87.9	29	12.1	7.2 : 1
Gustavo A. Madero Oriente	7	0.7	6	85.7	1	14.3	6.0 : 1
Gustavo A. Madero Aragón	194	1.0	174	89.7	20	10.3	8.7 : 1
Gustavo A. Madero Norte	158	0.5	140	88.6	18	11.4	7.8 : 1
Iztapalapa Oriente	428	1.0	349	81.5	79	18.5	4.4 : 1
Iztapalapa Poniente	125	2.0	110	88.0	15	12.0	7.3 : 1
Miguel Hidalgo	76	0.4	61	80.3	15	19.7	4.1 : 1
Naucalpan	179	1.5	152	84.9	27	15.1	5.6 : 1
Nezahualcóyotl	270	0.6	221	81.9	49	18.1	4.5 : 1
Texcoco	134	0.2	116	86.6	18	13.4	6.4 : 1
Tlalnepantla	223	0.4	196	87.9	27	12.1	7.3 : 1
Tlalpan	159	2.2	138	86.8	21	13.2	6.6 : 1
Venustiano Carranza	153	0.3	123	80.4	30	19.6	4.1 : 1
Xochimilco	7	0.9	5	71.4	2	28.6	2.5 : 1
UH Ecatepec	68	0.8	66	97.1	2	2.9	33.0 : 1
UH Iztapalapa	75	0.6	65	86.7	10	13.3	6.5 : 1
UH Naucalpan	77	1.1	60	77.9	17	22.1	3.5 : 1
Acapulco	124	0.9	98	79.0	26	21.0	3.8 : 1
Aguascalientes	183	1.1	158	86.3	25	13.7	6.3 : 1
Apodaca	4	1.1	3	75.0	1	25.0	3.0 : 1
Cancún	166	1.8	129	77.7	37	22.3	3.5 : 1
Cd. del Carmen	58	0.7	41	70.7	17	29.3	2.4 : 1
Cd. Juárez Norte	125	0.3	98	78.4	27	21.6	3.6 : 1
Cd. Victoria	24	1.8	18	75.0	6	25.0	3.0 : 1
Celaya	230	0.7	189	82.2	41	17.8	4.6 : 1
Chetumal	43	1.5	37	86.0	6	14.0	6.2 : 1

(Continúa)

Cuadro 1. Pacientes de primer ingreso a tratamiento por Unidad de atención (CIJ, UH y UTUH)
(Continuación)

CIJ	General		Hombres		Mujeres		Razón H:M
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	
Chihuahua	341	1.3	280	82.1	61	17.9	4.6 : 1
Chilpancingo	46	0.8	32	69.6	14	30.4	2.3 : 1
Colima	213	1.8	182	85.4	31	14.6	5.9 : 1
Cozumel	66	0.7	57	86.4	9	13.6	6.3 : 1
Cuernavaca	118	1.4	97	82.2	21	17.8	4.6 : 1
Culiacán	147	1.3	129	87.8	18	12.2	7.2 : 1
Durango	105	2.1	79	75.2	26	24.8	3.0 : 1
Escuinapa	48	1.0	45	93.8	3	6.3	15.0 : 1
Fresnillo	41	1.1	32	78.0	9	22.0	3.6 : 1
Guadalajara Centro	284	0.1	223	78.5	61	21.5	3.7 : 1
Guadalajara Sur	117	1.2	88	75.2	29	24.8	3.0 : 1
Guadalupe	120	0.6	104	86.7	16	13.3	6.5 : 1
Guamúchil	70	1.1	63	90.0	7	10.0	9.0 : 1
Guasave	85	0.8	75	88.2	10	11.8	7.5 : 1
Hermosillo	173	1.2	139	80.3	34	19.7	4.1 : 1
Huatulco	42	0.6	29	69.0	13	31.0	2.2 : 1
Ixtapa Zihuatanejo	46	0.5	35	76.1	11	23.9	3.2 : 1
La Paz	80	1.0	68	85.0	12	15.0	5.7 : 1
La Piedad	46	1.1	45	97.8	1	2.2	45.0 : 1
Laguna Durango	67	0.2	54	80.6	13	19.4	4.2 : 1
León	184	1.5	140	76.1	44	23.9	3.2 : 1
Los Cabos	28	1.8	27	96.4	1	3.6	27.0 : 1
Los Mochis	103	0.1	86	83.5	17	16.5	5.1 : 1
Manzanillo	62	1.5	50	80.6	12	19.4	4.2 : 1
Mazatlán	132	0.1	94	71.2	38	28.8	2.5 : 1
Mérida	78	0.6	69	88.5	9	11.5	7.7 : 1
Mexicali	184	0.0	145	78.8	39	21.2	3.7 : 1
Monterrey	163	0.5	135	82.8	28	17.2	4.8 : 1
Morelia	84	1.1	68	81.0	16	19.0	4.3 : 1
Nogales	88	0.6	68	77.3	20	22.7	3.4 : 1
Oaxaca	113	1.0	97	85.8	16	14.2	6.1 : 1
Pachuca	167	1.4	137	82.0	30	18.0	4.6 : 1
Playa del Carmen	52	1.3	41	78.8	11	21.2	3.7 : 1
Poza Rica	55	0.6	46	83.6	9	16.4	5.1 : 1
Puebla	147	0.5	124	84.4	23	15.6	5.4 : 1
Puerto Vallarta	136	1.9	117	86.0	19	14.0	6.2 : 1
Querétaro	138	0.4	111	80.4	27	19.6	4.1 : 1
Reynosa	24	1.3	21	87.5	3	12.5	7.0 : 1

(Continúa)

Cuadro 1. Pacientes de primer ingreso a tratamiento por Unidad de atención (CIJ, UH y UTUH)
(Continuación)

CIJ	General		Hombres		Mujeres		Razón H:M
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	
Salamanca	145	1.8	118	81.4	27	18.6	4.4 : 1
Saltillo	218	0.2	172	78.9	46	21.1	3.7 : 1
San Luis Potosí	178	1.6	135	75.8	43	24.2	3.1 : 1
San Nicolás de los Garza	121	0.2	96	79.3	25	20.7	3.8 : 1
Tampico	93	0.7	82	88.2	11	11.8	7.5 : 1
Tapachula	49	0.4	41	83.7	8	16.3	5.1 : 1
Tecomán	69	0.4	61	88.4	8	11.6	7.6 : 1
Tehuacán	84	0.2	79	94.0	5	6.0	15.8 : 1
Tepic	51	0.3	41	80.4	10	19.6	4.1 : 1
Tijuana Guaycura	221	1.9	172	77.8	49	22.2	3.5 : 1
Tijuana Soler	218	0.6	178	81.7	40	18.3	4.5 : 1
Tlaquepaque	214	1.0	168	78.5	46	21.5	3.7 : 1
Tlaxcala	43	0.1	34	79.1	9	20.9	3.8 : 1
Toluca	228	0.4	193	84.6	35	15.4	5.5 : 1
Torreón Oriente	260	0.9	210	80.8	50	19.2	4.2 : 1
Tuxtla Gutiérrez	78	0.4	68	87.2	10	12.8	6.8 : 1
Villahermosa	68	0.4	55	80.9	13	19.1	4.2 : 1
Xalapa	107	0.6	89	83.2	18	16.8	4.9 : 1
Yucatán	99	3.5	76	76.8	23	23.2	3.3 : 1
Zacatecas	90	0.4	69	76.7	21	23.3	3.3 : 1
Zamora	71	0.6	59	83.1	12	16.9	4.9 : 1
Zapopan Norte	14	1.2	9	64.3	5	35.7	1.8 : 1
Zapopan Kena Moreno	189	2.8	158	83.6	31	16.4	5.1 : 1
UH Ciudad Juárez	36	0.9	22	61.1	14	38.9	1.6 : 1
UH Culiacán	50	1.0	50	100.0	0	0.0	---
UH Ixbalanqué	11	0.6	11	100.0	0	0.0	---
UH Jerez	30	0.4	27	90.0	3	10.0	9.0 : 1
UH Nuevo León	59	0.4	45	76.3	14	23.7	3.2 : 1
UH Punta Diamante	47	1.4	43	91.5	4	8.5	10.8 : 1
UH Tijuana	58	0.7	49	84.5	9	15.5	5.4 : 1
UH Zapopan	59	0.9	52	88.1	7	11.9	7.4 : 1
UH Zapotlán el Grande	25	0.4	25	100.0	0	0.0	---
UTUH Cd. Juárez	24	1.2	22	91.7	2	8.3	11.0 : 1
UTUH Tijuana	60	1.6	53	88.3	7	11.7	7.6 : 1
Total	12,096	100.0	9,977	82.5	2,119	17.5	4.7 : 1

UH=Unidad de Hospitalización

UTUH=Unidad de Tratamiento para Usuarios de Heroína

Cuadro 2. Sexo

	Frec.	%	Razón H:M
Hombres	9,977	82.5	4.7 : 1
Mujeres	2,119	17.5	
Total	12,096	100.0	

Cuadro 3. Persona que proporciona la información

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Usuario de drogas	4,692	38.8	42.4	3,885	38.9	42.5	807	38.1	41.9
Usuario de drogas y familiares u otras personas	6,375	52.7	57.6	5,258	52.7	57.5	1,117	52.7	58.1
<i>Sin Información</i>	1,029	8.5	<i>Se omite</i>	834	8.4	<i>Se omite</i>	195	9.2	<i>Se omite</i>
Total	12,096	100.0	100.0	9,977	100.0	100.0	2,119	100.0	100.0

Cuadro 4. Edad de ingreso a tratamiento

	General*			Hombres**			Mujeres***		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Hasta 9 años	2	0.0	0.0	2	0.0	0.0	0	0.0	0.0
10 a 14 años	1,795	14.8	14.8	1,354	13.6	13.6	441	20.8	20.8
15 a 19 años	4,742	39.2	39.2	3,874	38.8	38.8	868	41.0	41.0
20 a 24 años	1,723	14.2	14.2	1,441	14.4	14.4	282	13.3	13.3
25 a 29 años	1,217	10.1	10.1	1,016	10.2	10.2	201	9.5	9.5
30 a 34 años	865	7.2	7.2	761	7.6	7.6	104	4.9	4.9
35 a 39 años	636	5.3	5.3	568	5.7	5.7	68	3.2	3.2
40 a 44 años	469	3.9	3.9	408	4.1	4.1	61	2.9	2.9
45 años y más	647	5.3	5.3	553	5.5	5.5	94	4.4	4.4
<i>Sin información</i>	0	0.0	<i>Se omite</i>	0	0.0	<i>Se omite</i>	0	0.0	<i>Se omite</i>
Total	12,096	100.0	100.0	9,977	100.0	100.0	2,119	100.0	100.0
Media (DE)	22.9 (10.5) años			23.3 (10.6) años			21.3 (10.1) años		
Mediana	19 años			19 años			17 años		
Moda	16 años			16 años			14 y 15 años		
Decil1	14 años			14 años			14 años		

DE= Desviación Estándar

Cuadro 5. Estado civil

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Soltero	8,696	71.9	72.1	7,086	71.0	71.2	1,610	76.0	76.2
Casado	1,101	9.1	9.1	994	10.0	10.0	107	5.0	5.1
Unión libre	1,368	11.3	11.3	1,138	11.4	11.4	230	10.9	10.9
Separado	720	6.0	6.0	596	6.0	6.0	124	5.9	5.9
Divorciado	136	1.1	1.1	114	1.1	1.1	22	1.0	1.0
Viudo	46	0.4	0.4	27	0.3	0.3	19	0.9	0.9
<i>Sin información</i>	29	0.2	<i>Se omite</i>	22	0.2	<i>Se omite</i>	7	0.3	<i>Se omite</i>
Total	12,096	100.0	100.0	9,977	100.0	100.0	2,119	100.0	100.0

Cuadro 6. Escolaridad

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Ninguna (no sabe leer ni escribir)	31	0.3	0.3	22	0.2	0.2	9	0.4	0.4
Ninguna (sabe leer y escribir)	25	0.2	0.2	22	0.2	0.2	3	0.1	0.1
Primaria incompleta	361	3.0	3.0	304	3.0	3.1	57	2.7	2.7
Primaria completa	555	4.6	4.6	468	4.7	4.7	87	4.1	4.1
Secundaria incompleta	3,087	25.5	25.6	2,457	24.6	24.7	630	29.7	29.7
Secundaria completa	1,991	16.5	16.5	1,696	17.0	17.0	295	13.9	13.9
Estudios técnicos o comerciales incompletos	163	1.3	1.4	127	1.3	1.3	36	1.7	1.7
Estudios técnicos o comerciales completos	98	0.8	0.8	74	0.7	0.7	24	1.1	1.1
Bachillerato incompleto	3,700	30.6	30.7	3,087	30.9	31.0	613	28.9	28.9
Bachillerato completo	919	7.6	7.6	786	7.9	7.9	133	6.3	6.3
Estudios superiores incompletos	819	6.8	6.8	668	6.7	6.7	151	7.1	7.1
Estudios superiores completos	280	2.3	2.3	210	2.1	2.1	70	3.3	3.3
Estudios de posgrado incompletos	12	0.1	0.1	9	0.1	0.1	3	0.1	0.1
Estudios de posgrado completos	27	0.2	0.2	19	0.2	0.2	8	0.4	0.4
<i>Sin información</i>	28	0.2	<i>Se omite</i>	28	0.3	<i>Se omite</i>	0	0.0	<i>Se omite</i>
Total	12,096	100.0	100.0	9,977	100.0	100.0	2,119	100.0	100.0

Cuadro 7. Ocupación

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Desempleado(a)	2,645	21.9	21.9	2,231	22.4	22.4	953	45.0	45.0
Estudiante	4,382	36.2	36.2	3,429	34.4	34.4	64	3.0	3.0
Estudiante que trabaja	621	5.1	5.1	557	5.6	5.6	388	18.3	18.3
Trabaja	3,975	32.9	32.9	3,587	36.0	36.0	414	19.5	36.0
Tareas del hogar	405	3.3	3.3	112	1.1	1.1	293	13.8	13.8
Pensionado	66	0.5	0.5	59	0.6	0.6	7	0.3	0.3
<i>Sin información</i>	2	0.0	<i>Se omite</i>	2	0.0	<i>Se omite</i>	0	0.0	<i>Se omite</i>
Total	12,096	100.0	100.0	9,977	100.0	100.0	2,119	100.0	100.0

Cuadro 8. Estrato social

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Alto	42	0.3	0.3	31	0.3	0.3	11	0.5	0.5
Medio alto	543	4.5	4.5	437	4.4	4.4	106	5.0	5.0
Medio	2,427	20.1	20.1	1,963	19.7	19.7	464	21.9	21.9
Medio bajo	6,133	50.7	50.8	5,093	51.0	51.1	1,040	49.1	49.1
Bajo	2,862	23.7	23.7	2,384	23.9	23.9	478	22.6	22.6
Pobreza extrema o marginación	71	0.6	0.6	52	0.5	0.5	19	0.9	0.9
<i>Sin información</i>	18	0.1	<i>Se omite</i>	17	0.2	<i>Se omite</i>	1	0.0	<i>Se omite</i>
Total	12,096	100.0	100.0	9,977	100.0	100.0	2,119	100.0	100.0

FACTORES ASOCIADOS A LA DEMANDA DE TRATAMIENTO EN PACIENTES DE PRIMER INGRESO A TRATAMIENTO EN CIJ EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2016

Cuadro 9. Motivos de consulta

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Consumo de drogas ilícitas	10,971	90.7	9,121	91.4	1,850	87.3
Consumo de bebidas alcohólicas	4,981	41.2	4,191	42.0	790	37.3
Consumo de tabaco	4,700	38.9	3,909	39.2	791	37.3
Otro motivo	319	2.6	247	2.5	72	3.4
<i>Ningún motivo específico reportado</i>	12	0.1	9	0.1	3	0.1
<i>Usuarios que reportaron dos o más motivos de consulta</i>	5,644	46.7	4,754	47.6	890	42.0

Cuadro 10. Condicionantes de la solicitud de tratamiento

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Por propia iniciativa	4,830	39.9	3,983	39.9	847	40.0
Por condicionamiento o recomendación familiar	5,551	45.9	4,567	45.8	984	46.4
Por recomendación de pares	183	1.5	155	1.6	28	1.3
Por condicionamiento o recomendación escolar	2,417	20.0	1,988	19.9	429	20.2
Por condicionamiento legal	1,063	8.8	906	9.1	157	7.4
Por condicionamiento o recomendación laboral	250	2.1	239	2.4	11	0.5
Por indicación médica	1,082	8.9	868	8.7	214	10.1
Por solicitud de novia(o)	42	0.3	33	0.3	9	0.4
Otros condicionantes de solicitud de tratamiento	310	2.6	246	2.5	64	3.0
<i>Ningún condicionante reportado</i>	178	1.5	139	1.4	39	1.8
<i>Pacientes que reportaron dos o más condicionantes de la solicitud de tratamiento</i>	3,336	27.6	2,766	27.7	570	26.9

Cuadro 11. Antecedentes de acciones contra el consumo de sustancias

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Juramento	796	6.6	708	7.1	88	4.2
Grupo de autoayuda	921	7.6	806	8.1	115	5.4
Internamiento en anexo	1,520	12.6	1,353	13.6	167	7.9
Intervención de emergencia	92	0.8	71	0.7	21	1.0
Programa de mantenimiento	89	0.7	76	0.8	13	0.6
Tratamiento médico no especializado	94	0.8	75	0.8	19	0.9
Tratamiento psiquiátrico o psicoterapéutico ambulatorio	732	6.1	603	6.0	129	6.1
Tratamiento psiquiátrico o psicoterapéutico residencial	236	2.0	193	1.9	43	2.0
Medicina tradicional o alternativa	64	0.5	51	0.5	13	0.6
Intento de interrupción voluntaria del consumo, sin apoyo	3,862	31.9	3,207	32.1	655	30.9
Otras acciones	3,063	25.3	2,445	24.5	618	29.2
<i>Ninguna acción previa reportada</i>	<i>2,827</i>	<i>23.4</i>	<i>2,273</i>	<i>22.8</i>	<i>554</i>	<i>26.1</i>
<i>Pacientes que reportaron dos o más acciones contra el consumo de sustancias antes de solicitar tratamiento en CIJ</i>	<i>1,535</i>	<i>12.7</i>	<i>1,299</i>	<i>13.0</i>	<i>236</i>	<i>11.1</i>

Cuadro 12. Problemas asociados al consumo de sustancias

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Problemas de salud	5,160	42.7	4,207	42.2	953	45.0
Accidentes o lesiones	1,599	13.2	1,370	13.7	229	10.8
Problemas familiares	9,653	79.8	7,944	79.6	1,709	80.7
Problemas escolares	4,775	39.5	3,898	39.1	877	41.4
Problemas laborales	2,775	22.9	2,525	25.3	250	11.8
Problemas psicológicos	4,867	40.2	3,865	38.7	1,002	47.3
Problemas legales	2,486	20.6	2,221	22.3	265	12.5
Conducta antisocial o delictiva	1,979	16.4	1,720	17.2	259	12.2
Otros problemas	505	4.2	414	4.1	91	4.3
<i>Ningún problema asociado reportado</i>	<i>490</i>	<i>4.1</i>	<i>402</i>	<i>4.0</i>	<i>88</i>	<i>4.2</i>
<i>Pacientes que reportaron dos o más problemas asociados</i>	<i>9,320</i>	<i>77.1</i>	<i>7,725</i>	<i>77.4</i>	<i>1,595</i>	<i>75.3</i>

CARACTERÍSTICAS DEL CONSUMO DE DROGAS EN PACIENTES DE PRIMER INGRESO A TRATAMIENTO EN CIJ EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2016

Cuadro 13. Edad de inicio del consumo de tabaco

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Hasta 9 años	407	3.4	3.9	346	3.5	4.0	61	2.9	3.5
10 a 14 años	5,451	45.1	52.4	4,494	45.0	52.0	957	45.2	54.3
15 a 19 años	4,014	33.2	38.6	3,376	33.8	39.1	638	30.1	36.2
20 a 24 años	339	2.8	3.3	277	2.8	3.2	62	2.9	3.5
25 a 29 años	107	0.9	1.0	84	0.8	1.0	23	1.1	1.3
30 a 34 años	43	0.4	0.4	34	0.3	0.4	9	0.4	0.5
35 a 39 años	19	0.2	0.2	13	0.1	0.2	6	0.3	0.3
40 a 44 años	18	0.1	0.2	12	0.1	0.1	6	0.3	0.3
45 años y más	8	0.1	0.1	8	0.1	0.1	0	0.0	0.0
No consumió	1,689	14.0	Se omite	1,332	13.4	Se omite	357	16.8	Se omite
Sin información	1	0.0	Se omite	1	0.0	Se omite	0	0.0	Se omite
Total	12,096	100.0	100.0	9,977	100.0	100.0	2,119	100.0	100.0
Media (DE)	14.4 (3.6) años			14.4 (3.5) años			14.5 (3.7) años		
Mediana	14 años			14 años			14 años		
Moda	15 años			15 años			14 años		
Decil1	11 años			11 años			11 años		

DE= Desviación Estándar

Cuadro 14. Edad de inicio del consumo de alcohol

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Hasta 9 años	397	3.3	3.8	324	3.2	3.7	73	3.4	4.0
10 a 14 años	4,904	40.5	46.7	3,999	40.1	46.0	905	42.7	50.1
15 a 19 años	4,762	39.4	45.4	4,033	40.4	46.4	729	34.4	40.4
20 a 24 años	331	2.7	3.2	261	2.6	3.0	70	3.3	3.9
25 a 29 años	75	0.6	0.7	59	0.6	0.7	16	0.8	0.9
30 a 34 años	18	0.1	0.2	12	0.1	0.1	6	0.3	0.3
35 a 39 años	6	0.0	0.1	3	0.0	0.0	3	0.1	0.2
40 a 44 años	4	0.0	0.0	1	0.0	0.0	3	0.1	0.2
45 años y más	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
No consumió	1,597	13.2	Se omite	1,283	12.9	Se omite	314	14.8	Se omite
Sin información	2	0.0	Se omite	2	0.0	Se omite	0	0.0	Se omite
Total	12,096	100.0	100.0	9,977	100.0	100.0	2,119	100.0	100.0
Media (DE)	14.5 (3.0) años			14.5 (2.9) años			14.5 (3.4) años		
Mediana	14 años			15 años			14 años		
Moda	15 años			15 años			14 años		
Decil1	12 años			12 años			11 años		

DE= Desviación Estándar

Cuadro 15. Edad de inicio del consumo de drogas ilícitas

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Hasta 9 años	151	1.2	1.2	130	1.3	1.3	21	1.0	1.0
10 a 14 años	5,212	43.1	43.1	4,234	42.4	42.5	978	46.2	46.2
15 a 19 años	5,194	42.9	43.0	4,393	44.0	44.1	801	37.8	37.8
20 a 24 años	834	6.9	6.9	680	6.8	6.8	154	7.3	7.3
25 a 29 años	348	2.9	2.9	280	2.8	2.8	68	3.2	3.2
30 a 34 años	152	1.3	1.3	119	1.2	1.2	33	1.6	1.6
35 a 39 años	93	0.8	0.8	64	0.6	0.6	29	1.4	1.4
40 a 44 años	52	0.4	0.4	35	0.4	0.4	17	0.8	0.8
45 años y más	54	0.4	0.4	37	0.4	0.4	17	0.8	0.8
<i>Sin información</i>	6	0.0	<i>Se omite</i>	5	0.1	<i>Se omite</i>	1	0.0	<i>Se omite</i>
Total	12,096	100.0	100.0	9,977	100.0	100.0	2,119	100.0	100.0
Media (DE)	16 (5.1) años			15.9 (4.9) años			16.3 (6.0) años		
Mediana	15 años			15 años			15 años		
Moda	15 años			15 años			14 años		
Decil1	12 años			12 años			12 años		

Cuadro 16. Drogas ilícitas de inicio

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.		Frec.		Frec.	
Cannabis	8,955	74.0	7,480	75.0	1,475	69.6
Mariguana	8,944	73.9	7,472	74.9	1,472	69.5
Hachís	11	0.1	8	0.1	3	0.1
Cocaína	1,128	9.3	976	9.8	152	7.2
Polvo blanco	883	7.3	760	7.6	123	5.8
<i>Crack</i>	245	2.0	216	2.2	29	1.4
Otra presentación	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Inhalables	1,165	9.6	904	9.1	261	12.3
Solventes o removedores	814	6.7	626	6.3	188	8.9
Pegamentos	200	1.7	163	1.6	37	1.7
Esmaltes o pinturas	132	1.1	98	1.0	34	1.6
Otros	19	0.2	17	0.2	2	0.1
Depresores	173	1.4	101	1.0	72	3.4
Benzodiacepinas	166	1.4	96	1.0	70	3.3
<i>Rohypnol</i> [®]	5	0.0	4	0.0	1	0.0
Otros	2	0.0	1	0.0	1	0.0
Estimulantes	475	3.9	444	4.5	118	5.6
Anfetamina	87	0.7	81	0.8	6	0.3
Metanfetaminas	420	3.5	320	3.2	100	4.7
Éxtasis (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas	43	0.4	32	0.3	11	0.5
Otros	12	0.1	11	0.1	1	0.0
Drogas alucinógenas y disociativas	30	0.2	25	0.0	5	0.2
LSD	13	0.1	10	0.1	3	0.1
Plantas alucinógenas y derivados	16	0.1	14	0.1	2	0.1
Otras	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Opiáceos	44	0.4	32	0.3	12	0.6
Heroína	32	0.3	27	0.3	5	0.2
Opiáceos Sintéticos	9	0.1	5	0.1	4	0.2
Opio y otros opiáceos	3	0.0	0	0.0	3	0.1
Otras sustancias de abuso	39	0.3	15	0.2	24	1.1
Con utilidad médica	18	0.1	4	0.0	14	0.7
Otras	21	0.2	11	0.1	10	0.5
Total	12,096	100.0	9,977	100.0	2,119	100.0

Cuadro 17. Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de tabaco y el ingreso a tratamiento en CIJ

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
< de un año	721	6.0	6.9	546	5.5	6.3	175	8.3	9.9
1 a 5 años	4,923	40.7	47.3	3,984	39.9	46.1	939	44.3	53.3
6 a 10 años	1,662	13.7	16.0	1,409	14.1	16.3	253	11.9	14.4
11 a 15 años	1,056	8.7	10.1	898	9.0	10.4	158	7.5	9.0
16 a 20 años	692	5.7	6.7	603	6.0	7.0	89	4.2	5.1
21 a 25 años	548	4.5	5.3	494	5.0	5.7	54	2.5	3.1
26 o más años	803	6.6	7.7	709	7.1	8.2	94	4.4	5.3
No consumió	1,689	14.0	Se omite	1,332	13.4	Se omite	357	16.8	Se omite
Sin información	2	0.0	Se omite	2	0.0	Se omite	0	0.0	Se omite
Total	12,096	100.0	100.0	9,977	100.0	100.0	2,119	100.0	100.0
Media (DE)	8.8 (9.9) años			9.1 (10) años			7 (9.1) años		
Mediana	5 años			5 años			3 años		
Moda	1 año			1 año			1 año		
Decil1	1 año			1 año			1 año		

DE= Desviación Estándar

Cuadro 18. Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de alcohol y el ingreso a tratamiento en CIJ

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
< de un año	797	6.6	7.6	624	6.3	7.2	173	8.2	9.6
1 a 5 años	4,680	38.7	44.6	3,764	37.7	43.3	916	43.2	50.7
6 a 10 años	1,797	14.9	17.1	1,493	15.0	17.2	304	14.3	16.8
11 a 15 años	1,086	9.0	10.3	916	9.2	10.5	170	8.0	9.4
16 a 20 años	739	6.1	7.0	652	6.5	7.5	87	4.1	4.8
21 a 25 años	562	4.6	5.4	502	5.0	5.8	60	2.8	3.3
26 o más años	836	6.9	8.0	741	7.4	8.5	95	4.5	5.3
No consumió	1,597	13.2	Se omite	1,283	12.9	Se omite	314	14.8	Se omite
Sin información	2	0.0	Se omite	2	0.0	Se omite	0	0.0	Se omite
Total	12,096	100.0	100.0	9,977	100.0	100.0	2,119	100.0	100.0
Media (DE)	8.9 (9.8) años			9.3 (10) años			7.1 (8.9) años		
Mediana	5 años			5 años			4 años		
Moda	1 año			1 año			1 año		
Decil1	1 año			1 año			1 año		

DE= Desviación Estándar

Cuadro 19. Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de drogas ilícitas y el ingreso a tratamiento en CIJ

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
< de un año	1,851	15.3	15.3	1,400	14.0	14.0	451	21.3	21.3
1 a 5 años	5,686	47.0	47.0	4,590	46.0	46.0	1,096	51.7	51.7
6 a 10 años	1,766	14.6	14.6	1,496	15.0	15.0	270	12.7	12.7
11 a 15 años	1,000	8.3	8.3	867	8.7	8.7	133	6.3	6.3
16 a 20 años	699	5.8	5.8	638	6.4	6.4	61	2.9	2.9
21 a 25 años	456	3.8	3.8	418	4.2	4.2	38	1.8	1.8
26 o más años	630	5.2	5.2	561	5.6	5.6	69	3.3	3.3
<i>Sin información</i>	8	0.1	<i>Se omite</i>	7	0.1	<i>Se omite</i>	1	0.0	<i>Se omite</i>
Total	12,096	100.0	100.0	9,977	100.0	100.0	2,119	100.0	100.0
Media (DE)	7.0 (8.9) años			7.4 (9.1) años			5 (7.4) años		
Mediana	3 años			4 años			2 años		
Moda	1 año			1 año			< un año		
Decil1	< un año			< un año			< un año		

DE= Desviación Estándar

Cuadro 20. Tipo de consumo de drogas ilícitas

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Experimental	1,282	10.6	10.6	959	9.6	9.6	323	15.2	15.2
Social u ocasional	1,672	13.8	13.8	1,321	13.2	13.3	351	16.6	16.6
Funcional	6,325	52.3	52.3	5,307	53.2	53.2	1,018	48.0	48.0
Disfuncional	2,453	20.3	20.3	2,080	20.8	20.9	373	17.6	17.6
En remisión	355	2.9	2.9	301	3.0	3.0	54	2.5	2.5
<i>Sin información</i>	9	0.1	<i>Se omite</i>	9	0.1	<i>Se omite</i>	0	0.0	<i>Se omite</i>
Total	12,096	100.0	100.0	9,977	100.0	100.0	2,119	100.0	100.0

**Cuadro 21. Total de drogas consumidas alguna vez en la vida
(Incluye alcohol o tabaco)**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
1 sustancia	594	4.9	466	4.7	128	6.0
2 sustancias	1,173	9.7	922	9.2	251	11.8
3 sustancias	3,464	28.6	2,841	28.5	623	29.4
4 sustancias	2,509	20.7	2,072	20.8	437	20.6
5 sustancias	1,663	13.7	1,395	14.0	268	12.6
6 sustancias	1,024	8.5	875	8.8	149	7.0
7 sustancias	652	5.4	542	5.4	110	5.2
8 sustancias	371	3.1	306	3.1	65	3.1
9 sustancias	271	2.2	231	2.3	40	1.9
10 sustancias	165	1.4	147	1.5	18	0.8
11-22 sustancias	210	1.7	180	1.8	30	1.4
Total	12,096	100.0	9,977	100.0	2,119	100.0
Media (DE)	4.3 (2.2) drogas		4.3 (2.2) drogas		4.1 (2.1) drogas	
Mediana	4 drogas		4 drogas		4 drogas	
Moda	3 drogas		3 drogas		3 drogas	
Decil1	2 drogas		2 drogas		2 drogas	

DE= Desviación Estándar

**Cuadro 22. Total de drogas ilícitas consumidas alguna vez en la vida
(No incluye ni alcohol ni tabaco)**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
1 sustancia	4,692	38.8	3,783	37.9	909	42.9
2 sustancias	2,813	23.3	2,320	23.3	493	23.3
3 sustancias	1,819	15.0	1,534	15.4	285	13.4
4 sustancias	1,069	8.8	910	9.1	159	7.5
5 sustancias	669	5.5	551	5.5	118	5.6
6 sustancias	377	3.1	311	3.1	66	3.1
7 sustancias	277	2.3	237	2.4	40	1.9
8 sustancias	169	1.4	150	1.5	19	0.9
9 sustancias	108	0.9	94	0.9	14	0.7
10 sustancias	47	0.4	39	0.4	8	0.4
11-20 sustancias	56	0.5	48	0.5	8	0.4
Total	12,096	100.0	9,977	100.0	2,119	100.0
Media (DE)	2.6 (2.0) drogas		2.6 (2.0) drogas		2.4 (1.9) drogas	
Mediana	2 drogas		2 drogas		2 drogas	
Moda	1 droga		1 droga		1 droga	
Decil1	1 droga		1 droga		1 droga	

DE= Desviación Estándar

Cuadro 23. Consumo de drogas alguna vez en la vida por sustancia

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Tabaco	10,407	86.0	8,645	86.6	1,762	83.2
Alcohol	10,499	86.8	8,694	87.1	1,805	85.2
Cannabis	10,546	87.2	8,792	88.1	1,754	82.8
Mariguana	10,543	87.2	8,790	88.1	1,753	82.7
Hachís	714	5.9	608	6.1	106	5.0
Cocaína	5,243	43.3	4,465	44.8	778	36.7
Polvo blanco	4,459	36.9	3,786	37.9	673	31.8
Crack	2,457	20.3	2,145	21.5	312	14.7
Otra presentación de cocaína	77	0.6	64	0.6	13	0.6
Inhalables	3,406	28.2	2,809	28.2	597	28.2
Solventes o removedores	2,465	20.4	2,033	20.4	432	20.4
Pegamentos	954	7.9	806	8.1	148	7.0
Esmaltes o pinturas	505	4.2	402	4.0	103	4.9
Otros inhalables	160	1.3	132	1.3	28	1.3
Depresores	1,770	14.6	1,431	14.3	339	16.0
Benzodiazepinas	1,716	14.2	1,388	13.9	328	15.5
Rohypnol	111	0.9	98	1.0	13	0.6
Otros depresores	21	0.2	16	0.2	5	0.2
Estimulantes	3,900	32.2	3,250	32.6	650	30.7
Anfetamina	283	2.3	239	2.4	44	2.1
Metanfetaminas	3,284	27.1	2,758	27.6	526	24.8
Éxtasis (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas	835	6.9	652	6.5	183	8.6
Otros estimulantes	56	0.5	47	0.5	9	0.4
Drogas alucinógenas y disociativas	1,391	11.5	1,153	11.6	238	11.2
LSD	1,049	8.7	860	8.6	189	8.9
Plantas alucinógenas y derivados	626	5.2	531	5.3	95	4.5
Otras drogas alucinógenas y disoc.	63	0.5	52	0.5	11	0.5
Opiáceos	487	4.0	404	4.0	83	3.9
Heroína	420	3.5	356	3.6	64	3.0
Opiáceos Sintéticos	56	0.5	40	0.4	16	0.8
Opio y otros opiáceos	47	0.4	37	0.4	10	0.5
Otras sustancias de abuso	179	1.5	119	1.2	60	2.8
Con utilidad médica	72	0.6	41	0.4	31	1.5
Otras sustancias de abuso	109	0.9	80	0.8	29	1.4

**Cuadro 24. Total de drogas consumidas en el último año
(Incluye alcohol o tabaco)**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Ninguna	153	1.3	120	1.2	33	1.6
1 sustancia	1,085	9.0	864	8.7	221	10.4
2 sustancias	2,130	17.6	1,710	17.1	420	19.8
3 sustancias	3,715	30.7	3,130	31.4	585	27.6
4 sustancias	2,289	18.9	1,903	19.1	386	18.2
5 sustancias	1,231	10.2	1,019	10.2	212	10.0
6 sustancias	679	5.6	559	5.6	120	5.7
7 sustancias	371	3.1	312	3.1	59	2.8
8 sustancias	194	1.6	157	1.6	37	1.7
9 sustancias	113	0.9	89	0.9	24	1.1
10 sustancias	65	0.5	56	0.6	9	0.4
11-23 sustancias	71	0.6	58	0.6	13	0.6
Total	12,096	100.0	9,977	100.0	2,119	100.0
Media (DE)	3.5 (1.9) drogas		3.5 (1.9) drogas		3.5 (1.9) drogas	
Mediana	3 drogas		3 drogas		3 drogas	
Moda	3 drogas		3 drogas		3 drogas	
Decil1	1 droga		2 drogas		1 droga	

DE= Desviación Estándar

**Cuadro 25. Total de drogas ilícitas consumidas en el último año
(No incluye ni alcohol ni tabaco)**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Ninguna	840	6.9	666	6.7	174	8.2
1 sustancia	5,497	45.4	4,534	45.4	963	45.4
2 sustancias	2,767	22.9	2,304	23.1	463	21.8
3 sustancias	1,402	11.6	1,161	11.6	241	11.4
4 sustancias	738	6.1	611	6.1	127	6.0
5 sustancias	390	3.2	326	3.3	64	3.0
6 sustancias	205	1.7	165	1.7	40	1.9
7 sustancias	113	0.9	90	0.9	23	1.1
8 sustancias	73	0.6	62	0.6	11	0.5
9 sustancias	38	0.3	30	0.3	8	0.4
10 sustancias	16	0.1	13	0.1	3	0.1
11-21 sustancias	17	0.1	15	0.2	2	0.1
Total	12,096	100.0	9,977	100.0	2,119	100.0
Media (DE)	1.9 (1.6) drogas		1.9 (1.6) drogas		1.9 (1.6) drogas	
Mediana	1 droga		1 droga		1 droga	
Moda	1 droga		1 droga		1 droga	
Decil1	1 droga		1 droga		1 droga	

DE= Desviación Estándar

Cuadro 26. Consumo de drogas en los últimos 12 meses por sustancia

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Tabaco	9,496	78.5	7,886	79.0	1,610	76.0
Alcohol	9,591	79.3	7,949	79.7	1,642	77.5
Cannabis	8,993	74.3	7,485	75.0	1,508	71.2
Mariguana	8,985	74.3	7,481	75.0	1,504	71.0
Hachís	463	3.8	377	3.8	86	4.1
Cocaína	3,805	31.5	3,201	32.1	604	28.5
Polvo blanco	2,983	24.7	2,491	25.0	492	23.2
Crack	1,802	14.9	1,557	15.6	245	11.6
Otra presentación de cocaína	49	0.4	41	0.4	8	0.4
Inhalables	2,456	20.3	1,985	19.9	471	22.2
Solventes o removedores	1,797	14.9	1,457	14.6	340	16.0
Pegamentos	603	5.0	504	5.1	99	4.7
Esmaltes o pinturas	330	2.7	247	2.5	83	3.9
Otros inhalables	81	0.7	66	0.7	15	0.7
Depresores	1,238	10.2	984	9.9	254	12.0
Benzodiacepinas	1,209	10.0	961	9.6	248	11.7
Rohypnol	41	0.3	38	0.4	3	0.1
Otros depresores	17	0.1	12	0.1	5	0.2
Estimulantes	3,254	26.9	2,716	27.2	538	25.4
Anfetamina	187	1.5	160	1.6	27	1.3
Metanfetaminas	2,819	23.3	2,368	23.7	451	21.3
Éxtasis (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas	507	4.2	393	3.9	114	5.4
Otros estimulantes	41	0.3	34	0.3	7	0.3
Drogas alucinógenas y disociativas	862	7.1	686	6.9	176	8.3
LSD	687	5.7	544	5.5	143	6.7
Plantas alucinógenas y derivados	303	2.5	248	2.5	55	2.6
Otras drogas alucinógenas y disoc.	32	0.3	24	0.2	8	0.4
Opiáceos	374	3.1	302	3.0	72	3.4
Heroína	325	2.7	270	2.7	55	2.6
Opiáceos Sintéticos	41	0.3	27	0.3	14	0.7
Opio y otros opiáceos	25	0.2	18	0.2	7	0.3
Otras sustancias de abuso	134	1.1	82	0.8	52	2.5
Con utilidad médica	54	0.4	27	0.3	27	1.3
Otras sustancias de abuso	81	0.7	56	0.6	25	1.2

Cuadro 27. Droga de preferencia en los últimos 12 meses, según menciones

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Tabaco	1,291	10.7	10.8	1,010	10.1	10.3	281	13.3	13.5
Alcohol	1,616	13.4	13.6	1,309	13.1	13.3	307	14.5	14.7
Cannabis	5,468	45.2	45.9	4,655	46.7	47.3	813	38.4	39.0
Mariguana	5,450	45.1	45.7	4,641	46.5	47.2	809	38.2	38.9
Hachís	18	0.1	0.2	14	0.1	0.1	4	0.2	0.2
Cocaína	973	8.0	8.2	839	8.4	8.5	134	6.3	6.4
Polvo blanco	400	3.3	3.4	329	3.3	3.3	71	3.4	3.4
Crack	569	4.7	4.8	507	5.1	5.2	62	2.9	3.0
Otra presentación de cocaína	4	0.0	0.0	3	0.0	0.0	1	0.0	0.0
Inhalables	603	5.0	5.1	440	4.4	4.5	163	7.7	7.8
Solventes o removedores	437	3.6	3.7	319	3.2	3.2	118	5.6	5.7
Pegamentos	106	0.9	0.9	85	0.9	0.9	21	1.0	1.0
Esmaltes o pinturas	49	0.4	0.4	29	0.3	0.3	20	0.9	1.0
Otros inhalables	11	0.1	0.1	7	0.1	0.1	4	0.2	0.2
Depresores	104	0.9	0.9	56	0.6	0.6	48	2.3	2.3
Benzodiacepinas	93	0.8	0.8	49	0.5	0.5	44	2.1	2.1
Rohypnol®	2	0.0	0.0	2	0.0	0.0	0	0.0	0.0
Otros	9	0.1	0.1	5	0.1	0.1	4	0.2	0.2
Estimulantes	1,442	11.9	12.1	1,201	12.0	12.2	241	11.4	11.6
Anfetamina	58	0.5	0.5	52	0.5	0.5	6	0.3	0.3
Metanfetaminas	1,351	11.2	11.3	1,125	11.3	11.4	226	10.7	10.9
Éxtasis (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas	26	0.2	0.2	19	0.2	0.2	7	0.3	0.3
Otros	7	0.1	0.1	5	0.1	0.1	2	0.1	0.1
Drogas alucinógenas y disociativas	33	0.3	0.3	24	0.2	0.2	9	0.4	0.4
LSD	27	0.2	0.2	19	0.2	0.2	8	0.4	0.4
Plantas alucinógenas y derivados	4	0.0	0.0	3	0.0	0.0	1	0.0	0.0
Otras	2	0.0	0.0	2	0.0	0.0	0	0.0	0.0
Opiáceos	240	2.0	2.0	200	2.0	2.0	40	1.9	1.9
Heroína	221	1.8	1.9	187	1.9	1.9	34	1.6	1.6
Opiáceos Sintéticos	10	0.1	0.1	7	0.1	0.1	3	0.1	0.1
Opio y otros opiáceos	9	0.1	0.1	6	0.1	0.1	3	0.1	0.1
Otras sustancias de abuso	32	0.3	0.3	13	0.1	0.1	19	0.9	0.9
Con utilidad médica	20	0.2	0.2	7	0.1	0.1	13	0.6	0.6
Otras sustancias de abuso	12	0.1	0.1	6	0.1	0.1	6	0.3	0.3
Ninguna	117	1.0	1.0	90	0.9	0.9	27	1.3	1.3
No consumió en el último año	153	1.3	Se omite	120	1.2	Se omite	33	1.6	Se omite
Sin Información	24	0.2	Se omite	20	0.2	Se omite	4	0.2	Se omite
Total	12,096	100.0	100.0	9,977	100.0	100.0	2,119	100.0	100.0

Cuadro 28. Droga de mayor impacto en los últimos 12 meses, según menciones

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Tabaco	706	5.8	5.9	559	5.6	5.7	147	6.9	7.1
Alcohol	1,371	11.3	11.5	1,107	11.1	11.3	264	12.5	12.7
Cannabis	4,938	40.8	41.4	4,162	41.7	42.3	776	36.6	37.3
Mariguana	4,919	40.7	41.3	4,144	41.5	42.1	775	36.6	37.2
Hachís	19	0.2	0.2	18	0.2	0.2	1	0.0	0.0
Cocaína	1,308	10.8	11.0	1,133	11.4	11.5	175	8.3	8.4
Polvo blanco	526	4.3	4.4	435	4.4	4.4	91	4.3	4.4
Crack	773	6.4	6.5	691	6.9	7.0	82	3.9	3.9
Otra presentación de cocaína	9	0.1	0.1	7	0.1	0.1	2	0.1	0.1
Inhalables	924	7.6	7.8	694	7.0	7.1	230	10.9	11.0
Solventes o removedores	667	5.5	5.6	504	5.1	5.1	163	7.7	7.8
Pegamentos	147	1.2	1.2	117	1.2	1.2	30	1.4	1.4
Esmaltes o pinturas	87	0.7	0.7	57	0.6	0.6	30	1.4	1.4
Otros inhalables	23	0.2	0.2	16	0.2	0.2	7	0.3	0.3
Depresores	178	1.5	1.5	118	1.2	1.2	60	2.8	2.9
Benzodiacepinas	164	1.4	1.4	107	1.1	1.1	57	2.7	2.7
Rohypnol	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0
Otros depresores	13	0.1	0.1	10	0.1	0.1	3	0.1	0.1
Estimulantes	2,041	16.9	17.1	1,708	17.1	17.4	333	15.7	16.0
Anfetamina	78	0.6	0.7	72	0.7	0.7	6	0.3	0.3
Metanfetaminas	1,915	15.8	16.1	1,599	16.0	16.3	316	14.9	15.2
Éxtasis (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas	37	0.3	0.3	28	0.3	0.3	9	0.4	0.4
Otros estimulantes	11	0.1	0.1	9	0.1	0.1	2	0.1	0.1
Drogas alucinógenas y disociativas	64	0.5	0.5	50	0.5	0.5	14	0.7	0.7
LSD	45	0.4	0.4	32	0.3	0.3	13	0.6	0.6
Plantas alucinógenas y derivados	13	0.1	0.1	12	0.1	0.1	1	0.0	0.0
Otras drogas alucinógenas y disoc.	6	0.0	0.1	6	0.1	0.1	0	0.0	0.0
Opiáceos	249	2.1	2.1	208	2.1	2.1	41	1.9	2.0
Heroína	229	1.9	1.9	194	1.9	2.0	35	1.7	1.7
Opiáceos Sintéticos	10	0.1	0.1	8	0.1	0.1	2	0.1	0.1
Opio y otros opiáceos	10	0.1	0.1	6	0.1	0.1	4	0.2	0.2
Otras sustancias de abuso	39	0.3	0.3	18	0.2	0.2	21	1.0	1.0
Con utilidad médica	26	0.2	0.2	11	0.1	0.1	15	0.7	0.7
Otras sustancias de abuso	13	0.1	0.1	7	0.1	0.1	6	0.3	0.3
Ninguna	98	0.8	0.8	77	0.8	0.8	21	1.0	1.0
No consumió en el último año	153	1.3	Se omite	120	1.2	Se omite	33	1.6	Se omite
Sin Información	27	0.2	Se omite	23	0.2	Se omite	4	0.2	Se omite
Total	12,096	100.0	100.0	9,977	100.0	100.0	2,119	100.0	100.0

**Cuadro 29. Uso combinado de drogas en los últimos 12 meses
(No incluye tabaco)**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Si combinó drogas	4,394	36.3	45.5	3,738	37.5	46.5	656	31.0	40.2
No combinó drogas	5,269	43.6	54.5	4,295	43.0	53.5	974	46.0	59.8
<i>No aplica</i>	2,433	20.1	<i>Se omite</i>	1,944	19.5	<i>Se omite</i>	489	23.1	<i>Se omite</i>
Total	12,096	100.0	100.0	9,977	100.0	100.0	2,119	100.0	100.0

**Cuadro 30. Total de drogas consumidas en los últimos 30 días
(Incluye alcohol o tabaco)**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Ninguna	1,091	9.0	839	8.4	252	11.9
1 sustancia	2,712	22.4	2,198	22.0	514	24.3
2 sustancias	3,267	27.0	2,710	27.2	557	26.3
3 sustancias	2,977	24.6	2,517	25.2	460	21.7
4 sustancias	1,350	11.2	1,144	11.5	206	9.7
5 sustancias	435	3.6	356	3.6	79	3.7
6 sustancias	164	1.4	133	1.3	31	1.5
7 sustancias	61	0.5	52	0.5	9	0.4
8 sustancias	26	0.2	19	0.2	7	0.3
9 sustancias	7	0.1	4	0.0	3	0.1
10 sustancias	3	0.0	2	0.0	1	0.0
11-13 sustancias	3	0.0	3	0.0	0	0.0
Total	12,096	100.0	9,977	100.0	2,119	100.0
Media (DE)	2.3 (1.4) drogas		2.3 (1.4) drogas		2.2 (1.5) drogas	
Mediana	2 drogas		2 drogas		2 drogas	
Moda	2 drogas		2 drogas		2 drogas	
Decil1	1 droga		1 droga		1 droga	

DE= Desviación Estándar

**Cuadro 31. Total de drogas ilícitas consumidas en los últimos 30 días
(No incluye ni alcohol ni tabaco)**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Ninguna	3,305	27.3	2,649	26.6	656	31.0
1 sustancia	5,854	48.4	4,886	49.0	968	45.7
2 sustancias	2,015	16.7	1,688	16.9	327	15.4
3 sustancias	592	4.9	484	4.9	108	5.1
4 sustancias	214	1.8	177	1.8	37	1.7
5 sustancias	71	0.6	62	0.6	9	0.4
6 sustancias	28	0.2	19	0.2	9	0.4
7 sustancias	11	0.1	7	0.1	4	0.2
8 sustancias	3	0.0	2	0.0	1	0.0
9 sustancias	1	0.0	1	0.0	0	0.0
10-13 sustancias	2	0.0	2	0.0	0	0.0
Total	12,096	100.0	9,977	100.0	2,119	100.0
Media (DE)	1.1 (1) droga		1.1 (1) droga		1.1 (1) droga	
Mediana	1 droga		1 droga		1 drogas	
Moda	1 droga		1 droga		1 drogas	
Decil1	Ninguna		Ninguna		Ninguna	

DE= Desviación Estándar

Cuadro 32. Consumo de drogas en los últimos 30 días por sustancia

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Tabaco	7,746	64.0	6,493	65.1	1,253	59.1
Alcohol	6,582	54.4	5,495	55.1	1,087	51.3
Cannabis	6,384	52.8	5,409	54.2	975	46.0
Mariguana	6,377	52.7	5,405	54.2	972	45.9
Hachís	164	1.4	132	1.3	32	1.5
Cocaína	1,872	15.5	1,580	15.8	292	13.8
Polvo blanco	1,170	9.7	961	9.6	209	9.9
Crack	967	8.0	846	8.5	121	5.7
Otra presentación de cocaína	19	0.2	16	0.2	3	0.1
Inhalables	1,315	10.9	1,051	10.5	264	12.5
Solventes o removedores	976	8.1	790	7.9	186	8.8
Pegamentos	259	2.1	214	2.1	45	2.1
Esmaltes o pinturas	146	1.2	103	1.0	43	2.0
Otros inhalables	25	0.2	23	0.2	2	0.1
Depresores	563	4.7	424	4.2	139	6.6
Benzodicepinas	551	4.6	415	4.2	136	6.4
Rohypnol	6	0.0	5	0.1	1	0.0
Otros depresores	10	0.1	7	0.1	3	0.1
Estimulantes	1,898	15.7	1,578	15.8	320	15.1
Anfetamina	53	0.4	43	0.4	10	0.5
Metanfetaminas	1,750	14.5	1,465	14.7	285	13.4
Éxtasis (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas	139	1.1	99	1.0	40	1.9
Otros estimulantes	14	0.1	10	0.1	4	0.2
Drogas alucinógenas y disociativas	208	1.7	156	1.6	52	2.5
LSD	169	1.4	124	1.2	45	2.1
Plantas alucinógenas y derivados	47	0.4	38	0.4	9	0.4
Otras drogas alucinógenas y disoc.	7	0.1	4	0.0	3	0.1
Opiáceos	247	2.0	202	2.0	45	2.1
Heroína	224	1.9	188	1.9	36	1.7
Opiáceos Sintéticos	23	0.2	14	0.1	9	0.4
Opio y otros opiáceos	4	0.0	3	0.0	1	0.0
Otras sustancias de abuso	72	0.6	38	0.4	34	1.6
Con utilidad médica	33	0.3	16	0.2	17	0.8
Otras sustancias de abuso	40	0.3	23	0.2	17	0.8

Cuadro 33. Frecuencia de episodios de abuso del consumo de tabaco¹ en los últimos 30 días

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Ni una vez	2,415	20.0	31.6	2,021	20.3	31.6	394	18.6	31.9
< de 1 vez a la semana	871	7.2	11.4	721	7.2	11.3	150	7.1	12.1
1 o 2 veces a la semana	868	7.2	11.4	732	7.3	11.4	136	6.4	11.0
Cada tercer día	582	4.8	7.6	497	5.0	7.8	85	4.0	6.9
Diario	2,902	24.0	38.0	2,432	24.4	38.0	470	22.2	38.1
No consumió en los últimos 30 días	4,350	36.0	Se omite	3,484	34.9	Se omite	866	40.9	Se omite
Sin información	108	0.9	Se omite	90	0.9	Se omite	18	0.8	Se omite
Total	12,096	100.0	100.0	9,977	100.0	100.0	2,119	100.0	100.0

¹ Consumo de seis o más cigarrillos en un solo día.

Cuadro 34. Frecuencia de episodios de abuso del consumo de alcohol¹ en los últimos 30 días

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Ni una vez	1,202	9.9	18.6	0	0.0	0.0	231	10.9	21.7
< de 1 vez a la semana	2,339	19.3	36.2	1,282	12.8	20.8	402	19.0	37.7
1 o 2 veces a la semana	1,984	16.4	30.7	1,265	12.7	20.5	310	14.6	29.1
Cada tercer día	528	4.4	8.2	1,024	10.3	16.6	81	3.8	7.6
Diario	411	3.4	6.4	2,585	25.9	42.0	41	1.9	3.8
No consumió en los últimos 30 días	5,514	45.6	Se omite	2,649	26.6	Se omite	1,032	48.7	Se omite
Sin información	118	1.0	Se omite	1,172	11.7	Se omite	22	1.0	Se omite
Total	12,096	100.0	100.0	9,977	100.0	100.0	2,119	100.0	100.0

¹ Consumo de más de cuatro copas en un día para los hombres y de más de tres copas en un día para las mujeres.

Cuadro 35. Frecuencia de episodios de abuso del consumo de drogas ilícitas¹ en los últimos 30 días

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
< de 1 vez a la semana	1,648	13.6	22.4	1,282	12.8	20.8	366	17.3	30.3
1 o 2 veces a la semana	1,501	12.4	20.4	1,265	12.7	20.5	236	11.1	19.6
Cada tercer día	1,191	9.8	16.2	1,024	10.3	16.6	167	7.9	13.8
Diario	3,022	25.0	41.0	2,585	25.9	42.0	437	20.6	36.2
No consumió en los últimos 30 días	3,305	27.3	Se omite	2,649	26.6	Se omite	656	31.0	Se omite
Sin información	1,429	11.8	Se omite	1,172	11.7	Se omite	257	12.1	Se omite
Total	12,096	100.0	100.0	9,977	100.0	100.0	2,119	100.0	100.0

¹ Consumo de cualquier dosis.

GLOSARIO

Droga ilícita de inicio	Es la sustancia ilegal que el usuario refirió como la droga con la cual inicio el consumo de drogas. No incluye el inicio del consumo con alcohol o tabaco.
Droga de mayor impacto en los últimos 12 meses	Sustancia por la que acuden los pacientes a tratamiento, a cuyo consumo los pacientes le atribuyen problemas personales, de salud, familiares, escolares, laborales o sociales, en el transcurso del último año.
Droga de preferencia en los últimos 12 meses	Sustancia que el propio usuario solicitante de tratamiento ha elegido o preferido consumir en el transcurso del último año.
Estrato social	Estimación que hace el terapeuta, según su percepción, del estrato al que pertenece el usuario de drogas, considerando aspectos como lugar de residencia, escolaridad, empleo y características manifiestas como higiene y aliño, calidad del vestido, expresión verbal y vocabulario, etc.
Tipo de consumo de drogas ilícitas	Características de consumo de sustancias ilegales según motivo, frecuencia y problemas asociados. No incluye el uso de alcohol y/o tabaco y se clasifica como: experimental, social u ocasional, funcional, disfuncional y en remisión.
Total de drogas consumidas	Número de drogas consumidas (se incluyen las 26 sustancias de seguimiento) en las siguientes categorías: alguna vez en la vida, en el último año y en los últimos 30 días.
Uso combinado de drogas en los últimos 12 meses	Consumo de dos o más sustancias (incluyendo alcohol y cualquier droga ilícita o de uso médico, utilizada sin prescripción, pero excluyendo tabaco) en el transcurso de un mismo día, en el año previo a la solicitud de tratamiento en CIJ.