

*SISTEMA DE INFORMACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DEL  
CONSUMO DE DROGAS*

**CONSUMO DE SUSTANCIAS EN USUARIOS  
DE DROGAS ILÍCITAS SOLICITANTES DE  
TRATAMIENTO EN CENTROS DE  
INTEGRACIÓN JUVENIL EN EL PRIMER  
SEMESTRE DE 2017.  
USUARIOS DE DROGAS ILÍCITAS**

**Alma Delia Gutiérrez López**

**Dirección de Investigación y Enseñanza  
Subdirección de Investigación  
México, septiembre de 2017**



## **DIRECTORIO**

---

**PRESIDENTE HONORARIO VITALICIO DEL PATRONATO NACIONAL**

Dr. Jesús Kumate Rodríguez

**PRESIDENTE DEL PATRONATO NACIONAL**

Dr. Roberto Tapia Conyer

**FUNDADORA DE CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL, A.C.**

**Y VICEPRESIDENTA VITALICIA DEL PATRONATO NACIONAL**

Sra. Kena Moreno

**DIRECTORA GENERAL**

Mtra. Carmen Fernández Cáceres

**DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE OPERACIÓN Y PATRONATOS**

Dr. José Ángel Prado García

**DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE NORMATIVIDAD**

Dr. Ricardo Sánchez Huesca

**DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA**

Mtro. David Bruno Díaz Negrete

**SUBDIRECTORA DE INVESTIGACIÓN**

Dra. Solveig Eréndira Rodríguez Kuri

**JEFE DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA Y EPIDEMIOLÓGICA**

Dr. Valeriano Raúl García Aurrecoechea

<b>CONTENIDO</b>	<b>PÁG.</b>
ANTECEDENTES	5
MÉTODO	6
CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS	8
FACTORES ASOCIADOS A LA DEMANDA DE TRATAMIENTO	11
CONSUMO DE DROGAS	14
REFERENCIAS	24
CUADROS	27
GLOSARIO	51

## ÍNDICE DE CUADROS

	PÁG.
Cuadro 1 Pacientes de primer ingreso a tratamiento por unidad de atención (CIJ)	28
Cuadro 2 Sexo	31
Cuadro 3 Persona que proporciona la información	31
Cuadro 4 Edad de ingreso a tratamiento	31
Cuadro 5 Estado civil	32
Cuadro 6 Escolaridad	32
Cuadro 7 Ocupación	33
Cuadro 8 Estrato social	33
Cuadro 9 Motivos de consulta	34
Cuadro 10 Condicionantes de la solicitud de tratamiento	34
Cuadro 11 Antecedentes de acciones contra el consumo de sustancias	35
Cuadro 12 Problemas asociados al consumo de sustancias	35
Cuadro 13 Edad de inicio del consumo de tabaco	36
Cuadro 14 Edad de inicio del consumo de alcohol	36
Cuadro 15 Edad de inicio del consumo de drogas ilícitas	37
Cuadro 16 Drogas ilícitas de inicio	38
Cuadro 17 Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de tabaco y el ingreso a tratamiento a CIJ	39
Cuadro 18 Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de alcohol y el ingreso a tratamiento a CIJ	39
Cuadro 19 Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de drogas ilícitas y el ingreso a tratamiento a CIJ	40
Cuadro 20 Tipo de consumo de drogas ilícitas	40
Cuadro 21 Total de drogas consumidas alguna vez en la vida (incluye alcohol o tabaco)	41
Cuadro 22 Total de drogas ilícitas consumidas alguna vez en la vida (no incluye ni alcohol ni tabaco)	41
Cuadro 23 Consumo de drogas alguna vez en la vida por sustancia	42
Cuadro 24 Total de drogas consumidas en el último año (incluye alcohol o tabaco)	43
Cuadro 25 Total de drogas ilícitas consumidas en el último año (no incluye ni alcohol ni tabaco)	43
Cuadro 26 Consumo de drogas en los últimos 12 meses por sustancia	44
Cuadro 27 Droga de preferencia en los últimos 12 meses, según menciones	45
Cuadro 28 Droga de mayor impacto en los últimos 12 meses, según menciones	46
Cuadro 29 Uso combinado de drogas en los últimos 12 meses (no incluye tabaco)	47
Cuadro 30 Total de drogas consumidas en los últimos 30 días (incluye alcohol o tabaco)	47
Cuadro 31 Total de drogas ilícitas consumidas en los últimos 30 días (no incluye ni alcohol ni tabaco)	48
Cuadro 32 Consumo de drogas en los últimos 30 días por sustancia	49
Cuadro 33 Frecuencia de episodios de abuso del consumo de Tabaco en los últimos 30 días	50
Cuadro 34 Frecuencia de episodios de abuso del consumo de Alcohol en los últimos 30 días	50
Cuadro 35 Frecuencia de episodios de abuso del consumo de drogas ilícitas en los últimos 30 días	50

## RESUMEN

El presente informe se realizó con base en 11,811 registros clínicos de la entrevista inicial realizada a personas que acudieron por primera vez a solicitar tratamiento por el consumo de drogas a Centros de Integración Juvenil (CIJ) entre enero y junio de 2017. Los objetivos del estudio son: a) actualizar información de los pacientes en cuanto al perfil sociodemográfico, acerca de los factores asociados a la demanda de tratamiento y del patrón de consumo de sustancias; b) contribuir a retroalimentar sistemas nacionales de información del consumo de drogas; c) generar información que oriente el desarrollo de estudios sobre el uso de tabaco, alcohol y otras sustancias en México; y d) contribuir al desarrollo, diseño y ajuste de los servicios institucionales de prevención y tratamiento del consumo de drogas.

Los datos que se presentan permiten ver que el uso de drogas ilícitas continúa siendo un trastorno que afecta mayormente a la población masculina, en una proporción de 4.4 hombres por cada mujer. La edad media de ingreso a tratamiento fue de 22.7 años. En promedio, los hombres ingresaron a tratamiento a mayor edad que las mujeres (23.0 y 21.2 años, respectivamente). La edad promedio del inicio del consumo de tabaco fue a los 14.4 años, la del alcohol a los 14.5 años y la de drogas ilícitas a los 16 años. La edad de inicio del consumo de sustancias no presenta diferencias importantes por sexo.

Las drogas de mayor consumo alguna vez en la vida fueron: *cannabis* (86.9%), alcohol (86.4%), tabaco (85.2%), cocaína/*crack* (42.7%), estimulantes (32.3%), principalmente metanfetaminas: 27.9% y *éxtasis*: 6.2%, inhalables (27.2%), depresores (14.4%), drogas alucinógenas y disociativas (11.7%) y opiáceos (3.5%). Las sustancias más utilizadas el mes previo al ingreso a tratamiento fueron: tabaco (62.0%), alcohol (54.0%), *cannabis* (52.1%), estimulantes (15.3%), cocaína/*crack* (15.0%) e inhalables (9.9%). Las sustancias reportadas como de mayor impacto fueron: marihuana (41.7%), metanfetaminas (16.6%), alcohol (11.1%), tabaco (5.8%), *crack* (6.7%), solventes y removedores (5.1%) y cocaína (4.6%).

En cuanto a los principales factores asociados a la demanda de tratamiento se observó que, los consultantes acudieron principalmente por recomendación de la familia (46.5%) o por iniciativa propia (38.3%); y solicitaron atención debido a su consumo de drogas ilícitas (90.6%), de alcohol (40.1%) o por el uso de tabaco (37.4%). Previo a su ingreso a tratamiento en CIJ, 30.0% de los solicitantes de tratamiento intentaron interrumpir de manera voluntaria el uso de sustancias, mientras que 25.9% no habían realizado alguna acción para dejar el consumo. Los problemas asociados al consumo de drogas reportados con mayor frecuencia fueron los del ámbito familiar (79.5%), de salud (42.5%), psicológicos (41.8%) y escolar (41.0%).

## ANTECEDENTES

Centros de Integración Juvenil ha reportado información epidemiológica del consumo de drogas de los solicitantes de tratamiento desde 1976<sup>1</sup>. En 1983 inicia la aplicación de una cédula homogénea a los pacientes de nuevo ingreso<sup>2</sup>, aunque no es sino a partir de 1990 que la recolección de datos se realiza en forma sistemática<sup>3</sup>, implementándose posteriormente el *Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas* (SIECD), el cual se ha ido consolidando a través de los años y ha realizado el seguimiento oportuno de un conjunto de variables, con las cuales ha podido contribuir en la toma de decisiones del diseño y ajuste de servicios institucionales, además de aportar conocimientos sobre la forma y tendencias del uso de drogas y de aportar información a los Sistemas Epidemiológicos de las Adicciones en el país, como es el caso del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA)<sup>4</sup> de la Secretaría de Salud, del Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas (SRID) –perteneciente al Instituto Nacional de Psiquiatría “*Ramón de la Fuente Muñiz*” (INPRF)<sup>5</sup>–, del Observatorio Epidemiológico en Drogas de la Secretaría Salud<sup>6</sup>.

El SIECD, ha apoyado en el desarrollo de diferentes estudios epidemiológicos especializados, con temas que van desde el perfil de usuarios de drogas y su trayectoria de consumo<sup>7</sup>, el consumo de drogas en las mujeres<sup>8</sup>, en la población infantil<sup>9</sup> o de acuerdo con las etapas de la vida<sup>10</sup>, hasta llegar a los estudios de tendencias<sup>11,12,13,14</sup>. Toda esta información ha facilitado el enfrentamiento oportuno de las problemáticas generadas por el creciente consumo de estimulantes y simultáneamente ha sido de utilidad para apoyar el diseño eficaz de estudios sobre características particulares de los consumidores de estos alcaloides<sup>15,16</sup>.

La información reportada a través del Sistema ha permitido el desarrollo de estudios epidemiológicos particulares enfocados en profundizar en las características del consumo de drogas legales de pacientes atendidos. Así, desde el año 2006, el SIECD genera un informe por separado de las características de los pacientes consumidores de tabaco y alcohol<sup>17</sup>, con lo cual se ha logrado identificar una emergencia epidemiológica del consumo de alcohol entre las pacientes atendidas con relación a los años anteriores<sup>18</sup>; suceso que ha dado pie a CIJ para profundizar en esta problemática<sup>19</sup> y que también ha sido reportado por la Encuesta Nacional de Adicciones (ENA), sobre todo para el caso de las mujeres jóvenes<sup>20</sup>.

Cabe destacar que la información generada por el SIECD durante el lapso de más de dos décadas ha sido consistente con la de las Encuestas Nacionales de Adicciones (ENA) de este periodo, ya sea en el nivel nacional o en el regional<sup>21</sup> y también ha sido referente para el desarrollo de metodologías de investigación en variados estudios clínicos, psicosociales y evaluativos de la Institución, como es el caso de diversos *Estudios de la Comunidad Objetivo (EBCO)*<sup>22</sup> realizados por los CIJ a lo largo y ancho del país.

El presente informe se elaboró con base en la información obtenida por el SIECD durante el primer semestre de 2017 y tiene el objetivo de proporcionar datos actualizados sobre las características sociodemográficas, factores asociados a la demanda de tratamiento y del patrón de consumo de drogas de los solicitantes de tratamiento, de manera que se aporten elementos para apoyar el diseño, planeación y ajuste de los programas institucionales de prevención, tratamiento y rehabilitación, además de colaborar con otros sistemas de información en drogas y de aportar elementos para el diseño y elaboración de investigaciones en el campo de las adicciones.

## MÉTODO

**Diseño del estudio:** Censo epidemiológico descriptivo semestral.

**Población:** 11,811 usuarios de drogas ilícitas procedentes de 105 unidades de CIJ, que acudieron por primera vez a consulta entre enero y junio de 2017 y que proporcionaron personalmente la información (cuadro 1. Anexo).

**Fuente de información:** Formato de Entrevista Inicial, aplicado en la primera consulta por parte del personal médico-técnico responsable del ingreso de pacientes a tratamiento, que forma parte del expediente clínico en cualquiera de sus dos versiones: formato electrónico (base de datos recuperada el día 12 de Julio de 2017 a las 12:55 hrs., con 11,726 registros capturados por los/as terapeutas responsables de realizar la entrevista inicial) o formato impreso (85 registros capturados por personal del departamento de Investigación Clínica y Epidemiológica mediante el programa *Control de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas* desarrollado por CIJ).

**Variables de estudio:** Las características sociodemográficas estudiadas comprenden: persona que proporciona la información, sexo, edad de ingreso a tratamiento, estado civil, escolaridad, ocupación y estrato social; las variables de factores asociados a la demanda de tratamiento incluyen: motivo(s) de consulta, condicionante(s) de la solicitud

de tratamiento, antecedente(s) de acciones tomadas frente al uso de sustancias y problema(s) asociado(s) al mismo; y las variables de patrón de consumo: edad de inicio, tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de sustancias y el ingreso a tratamiento, consumo alguna vez en la vida, en el último año y en los últimos 30 días; drogas de preferencia y de mayor impacto en el último año (estas dos últimas variables de acuerdo con el punto de vista del paciente), uso combinado de sustancias, tipo de consumo de drogas ilícitas, episodios de abuso y total de drogas consumidas.

La información sobre el consumo de drogas se presenta categorizada 26 categorías de drogas y que en algunos casos (consumo alguna vez en la vida, en el último año y en el último mes) se proporciona además la información concentrada en diez grupos:

Grupo de Sustancias	Drogas en seguimiento
Tabaco	Cigarrillos
Alcohol	Bebidas alcohólicas
<i>Cannabis</i>	Mariguana y hachís
Cocaína	Cocaína en polvo, <i>crack</i> y otra presentación de cocaína
Inhalables	Solventes y removedores, pegamentos, esmaltes y pinturas y otros inhalables
Depresores	Benzodiacepinas, <i>Rohypnol</i> y otros depresores
Estimulantes	Anfetaminas, metanfetaminas ( <i>crystal</i> o <i>ICE</i> ), MDMA ( <i>éxtasis</i> ) y metanfetaminas alucinógenas; y otros estimulantes
Drogas alucinógenas y disociativas	Ácido lisérgico (LSD), plantas alucinógenas y derivados y otros alucinógenos (PCP y ketamina)
Opiáceos	Heroína, opiáceos sintéticos y opio, y otros opioides
Otras sustancias de abuso	Sustancias con utilidad médica y otras sustancias no identificadas

**Procesamiento de datos.** Para el procesamiento estadístico de la información se utilizó el programa SPSS v.19.

Los resultados se presentan tanto en forma general como desglosada por sexo y en porcentajes válidos, excluyendo los casos “*sin información*” y aquellos que no cumplieron con las condiciones requeridas para el análisis en cada variable de estudio.

## CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS<sup>a</sup>

**Sexo.** La población se conformó por 9,634 hombres y 2,177 mujeres, lo que en porcentaje representa a un 81.6% y un 18.4%, respectivamente. Dando así una proporción aproximada de cuatro hombres (4.4) por cada mujer.

**Persona que proporciona la información.** 54.2% de los casos acudieron en compañía de familiares u otras personas, mientras que en 45.8% lo hicieron solos.

**Edad de ingreso a tratamiento.** Se observa un rango de edad de 8 a 78 años, con un promedio de 22.7 años (DE= 10.4 años); es decir, 9,949 de los usuarios de drogas tenía entre los 12 y 33 años de edad (alrededor del 84% de las personas atendidas); la edad mediana de la población fue de 18 años (45.5% de los casos fueron menores de edad; 5,370 sujetos), mientras que la moda se ubicó en 15 años (1,240 atendidas).


**Figura 1. Edad de ingreso según sexo**

	 Años	 Años	Las mujeres ingresaron a tratamiento a menor edad (en promedio, dos años menos que los hombres).
<b>Rango</b>	8 a 78	11 a 72	
<b>Promedio (Desviación estándar)</b>	23.0 (10.5)	21.2 (9.8)	
<b>Mediana</b>	19	17	
<b>Moda</b>	15	15	
<b>Decil<sub>1</sub></b>	14	14	

<sup>a</sup> Cfr., Cuadros 1 a 8.


**Estado civil.** La mayor parte de la población refirió ser soltera (72.6%), mientras que 11.0% indicó que vivía en unión libre y 9.1% estaba casada.

**Figura 2. Estado civil según sexo**




**Escolaridad.** 45.0% cursaba o había cursado algún grado de educación secundaria, 36.1% al menos algún grado de bachillerato, 6.9% contaba con algún grado escolar de nivel primaria y 9.4% de nivel superior o posgrado.

**Figura 3. Escolaridad según sexo**



**Ocupación.** 36.2% se dedicaba a estudiar, 32.1% desempeñaba alguna actividad laboral y 22.4% estaba desempleado.


**Figura 4. Principal ocupación según sexo**



**Estrato social.** Según la percepción de los terapeutas la mitad de los pacientes (50.6%) se ubicaban en el estrato medio bajo, 24.9% en un nivel bajo y 19.6% fue clasificado en el estrato medio.

**Figura 5. Estrato social según sexo**


Según la percepción de los terapeutas, tanto hombres como mujeres presentaron condiciones sociales similares, predominando el estrato medio bajo.



## FACTORES ASOCIADOS A LA DEMANDA DE TRATAMIENTO<sup>b</sup>


**Motivos de consulta.** 45.4% de las personas atendidas reportó más de un motivo para acudir a tratamiento (uso de alcohol, tabaco o drogas), mientras que 0.1% no expresó ninguno. 90.6% de los pacientes acudió por consumo de drogas ilícitas, 40.1% por uso de bebidas alcohólicas y 37.4% por uso de tabaco.

**Figura 6. Motivos de consulta según sexo**



**Condicionantes de la solicitud de tratamiento.** 27.2% de los casos expresó dos o más condicionantes para acudir a tratamiento; 46.5% acudió por recomendación de la familia, 38.3% por iniciativa propia, 20.5% por condicionamiento o recomendación escolar, 8.6% por condicionamiento legal y 8.4% por indicación médica.


**Figura 7. Condicionantes de la solicitud de tratamiento según sexo**



<sup>b</sup> Cfr. Cuadros 9 a 12.

**Antecedentes de acciones contra el consumo de sustancias.** 30.0% de los pacientes expresó que antes de acudir a CIJ había intentado interrumpir el consumo por voluntad propia, 11.9% señaló que previamente había estado internado en algún anexo, 6.3% acudió a algún tipo de tratamiento psiquiátrico o psicoterapéutico de tipo ambulatorio, 7.2% había acudido a grupos de autoayuda o de ayuda mutua y 6.6% lo había hecho por medio de juramento. Cabe señalar que 12.3% reportó haber intentado al menos dos formas distintas de acciones para abandonar el consumo de drogas, en tanto que 25.9% expresó que hasta el momento de la solicitud de tratamiento no había tomado ninguna medida en contra del consumo de drogas.


**Figura 8. Antecedentes de acciones contra el consumo de sustancias según sexo**



Mayor porcentaje de mujeres ingresaron a CIJ sin haber realizado acciones previas para dejar el consumo de drogas, mientras que los hombres en mayor proporción que las mujeres intentaron dejarlo de manera voluntaria, se internaron en algún anexo, participaron en grupos de autoayuda o por medio de juramento.

**Problemas asociados al consumo de sustancias.** 79.5% de los pacientes señaló problemas de tipo familiar, 42.5% de salud, 41.8% psicológicos, 41.0% escolares, 23.5% laborales, 20.1% legales, 14.8% de conducta antisocial o delictiva y 12.6% accidentes o lesiones. Cabe señalar que 77.1% de las personas atendidas mencionaron dos o más problemas asociados al consumo de sustancias, mientras que 4.8% no reportó ninguno.

**Figura 9. Problemas asociados al consumo de sustancias según sexo**



## CONSUMO DE DROGAS<sup>c</sup>

**Edad de inicio del consumo de sustancias.** La edad promedio de inicio del consumo de tabaco se situó en 14.4 años (DE =3.5 años), la mediana en 14 años y la moda en 15 años, mientras que la edad promedio de inicio del consumo de alcohol se ubicó en 14.5 años (DE =3.1 años) con una mediana de 14 años y una moda de 15 años. Por su parte, la edad promedio de inicio del uso de drogas ilícitas (incluyendo sustancias de uso médico sin prescripción) fue de 16 años (DE =5.1 años), con una mediana y una moda de 15 años. Por otra parte, al considerar el primer decil como indicador de las edades de inicio más tempranas, se observa que el consumo de tabaco y de alcohol aparece a los 11 años, mientras que el de drogas ilícitas se presenta a los 12 años.

**Figura 10. Edad de inicio del consumo de sustancias según sexo**

	 <b>Años</b>			 <b>Años</b>		
	<b>Tabaco</b>	<b>Alcohol</b>	<b>Drogas ilícitas</b>	<b>Tabaco</b>	<b>Alcohol</b>	<b>Drogas ilícitas</b>
<b>Promedio</b> (Desviación estándar)	14.4 (3.5)	14.5 (2.9)	15.9 (4.8)	14.5 (3.8)	14.5 (3.9)	16.4 (6.3)
<b>Mediana</b>	14	15	15	14	14	15
<b>Moda</b>	15	15	15	13	15	14
<b>Decil<sub>1</sub></b>	11	11	12	12	12	12


En cuanto a la edad de inicio del consumo de sustancias, no se aprecian diferencias considerables entre hombres y mujeres.

**Drogas ilícitas de inicio.** Las sustancias de inicio más reportadas fueron: la cannabis, principalmente en forma de marihuana (75.0%); los inhalables (8.8%), mayormente en forma de solventes y removedores (6.0%); y la cocaína (9.3%), tanto en forma de polvo

<sup>c</sup> Cfr., Cuadros 13 a 35

blanco (7.2%) como *crack* (2.1%); seguidas por los estimulantes (4.3%), donde destacan las metanfetaminas (3.3%); los depresores con utilidad médica (1.6%) siendo las benzodiacepinas las más reportadas (1.5%); y los opiáceos (0.3%), entre los cuales sobresale la heroína (22 casos).

**Figura 11. Principales drogas ilícitas de inicio según sexo**




**Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de sustancias y el ingreso a tratamiento en CIJ.** El promedio de años entre el inicio de consumo y la solicitud de tratamiento se situó de la siguiente manera: tabaco de 8.5 años (DE=9.7 años), alcohol de 8.7 años (DE =9.7 años) y drogas ilícitas de 6.7 años (DE =8.6 años). No obstante, la mitad de los usuarios dejó pasar cinco años desde el momento en que se inició el consumo de tabaco o alcohol y el momento de acudir a solicitar tratamiento, mientras que 53.0% de los usuarios dejaron pasar tres años desde el inicio de drogas ilegales.

**Figura 12. Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de sustancias y el ingreso a tratamiento en CIJ según sexo**

	 <b>Años</b>			 <b>Años</b>		
	<b>Tabaco</b>	<b>Alcohol</b>	<b>Drogas ilícitas</b>	<b>Tabaco</b>	<b>Alcohol</b>	<b>Drogas ilícitas</b>
<b>Promedio</b> (Desviación estándar)	8.9 (9.8)	9.1 (9.9)	7.2 (8.9)	7 (8.9)	7 (8.6)	4.8 (7)
<b>Mediana</b>	5	5	3	3	3	2
<b>Moda</b>	1	1	1	1	1	1
<b>Decil<sub>1</sub></b>	1	1	< un año	< un año	< un año	< un año

Los hombres dejan pasar más tiempo que las mujeres para solicitar tratamiento.

**Tipo de consumo de drogas ilícitas.** De acuerdo con los terapeutas, 52.0% de los solicitantes de tratamiento fue diagnosticado con consumo funcional, 20.1% con consumo disfuncional, 13.8% con consumo social u ocasional, 11.2% con consumo experimental y 2.8% presentaba remisión del consumo.




Las mujeres presentaron patrones de consumo de menor gravedad que los hombres.

**Total de drogas consumidas.** El promedio de sustancias utilizadas alguna vez en la vida, incluyendo alcohol o tabaco, fue de 4.3 drogas (94.6% reportó el uso de dos o más sustancias); en el último año fue de 3.5 drogas (89.0% consumió dos o más sustancias); y en los últimos 30 días fue de 2.2 drogas (67.3% reportó haber utilizado dos o más sustancias).

El promedio de sustancias consumidas alguna vez en la vida, sin incluir alcohol y tabaco, fue de 2.5 drogas (59.9% reportó el uso de dos o más sustancias); en el último año fue de 1.9 drogas (47.0% consumió dos o más sustancias); y en los últimos 30 días fue de 1.1 droga (22.8% reportó haber utilizado dos o más sustancias).

**Figura 14. Promedio de drogas consumidas según sexo**




Mujeres y hombres consumieron un promedio similar de drogas.

**Consumo de drogas alguna vez en la vida.** <sup>d</sup> Las proporciones de consumo alguna vez en la vida de los diez grupos de sustancias en seguimiento fueron: *cannabis* (86.9%), alcohol (86.4%), tabaco (85.2%), cocaína (42.7%), estimulantes (32.3%), inhalables (27.2%), depresores (14.4%), drogas alucinógenas y disociativas (11.7%), opiáceos (3.5%) y otras sustancias de abuso (1.7%).

En cuanto al uso de sustancias específicas (contenidas en alguno de los diez grupos antes mencionados) sobresalen: marihuana (86.9%), cocaína en polvo (36.3%) metanfetaminas (27.9%), *crack* (19.9%), solventes y removedores (19.6%) y benzodiacepinas (13.7%); en menor proporción la LSD (9.3%), los pegamentos (7.0%), así como el *éxtasis* y otras metanfetaminas alucinógenas (6.2%) y el hachís (6.2%).

**Figura 15. Consumo de drogas alguna vez en la vida según sexo**




Los hombres reportaron en mayor proporción que las mujeres el consumo de tabaco, alcohol, cannabis, inhalables, cocaína, crack y heroína. Ellas reportaron mayormente el consumo de metanfetaminas, benzodiacepinas y éxtasis. Ambos consumieron alucinógenos en la misma proporción.

<sup>d</sup> Los casos pudieron haber reportado el consumo de dos o más sustancias, por lo que el total de los porcentajes no suma 100%.

**Consumo de drogas en los últimos 12 meses.** 98.4% de las personas reportaron haber consumido alguna sustancia en el año previo a su ingreso a tratamiento en CIJ. Las proporciones de consumo de los diez grupos de sustancias utilizadas en este lapso fueron: alcohol (78.8%), tabaco (77.2%), *cannabis* (74.2%), cocaína (31.3%), estimulantes (27.3%), inhalables (19.3%), depresores (10.2%), drogas alucinógenas y disociativas (7.6%); opiáceos (2.6%) y otras sustancias de abuso (1.3%).

En cuanto al consumo de sustancias específicas contenidas en alguno de los grupos anteriores destacaron: mariguana (74.1%), cocaína en polvo (24.4%), metanfetaminas (24.1%), *crack* (14.9%) y solventes y removedores (13.8%); en menor proporción se refieren a las benzodiazepinas (9.9%) y la LSD (6.3%).


**Figura 16. Consumo de drogas en los últimos 12 meses según sexo**



Las drogas más consumidas en el último año por ambos sexos fueron alcohol, tabaco y cannabis; las mujeres usaron en mayor proporción benzodiazepinas, metanfetaminas, éxtasis, drogas alucinógenas e inhalables; los hombres reportaron en mayor proporción el uso de cannabis, cocaína en polvo y crack.

**Droga de preferencia en los últimos 12 meses.** Entre las sustancias más frecuentemente referidas se encontraron: cannabis (45.9%), alcohol (13.8%), tabaco (10.8%), metanfetaminas (11.3%) e inhalables (5.0%). En menores proporciones aparecieron crack (4.8%) y cocaína en polvo (3.5%).


**Figura 17. Droga de preferencia en los últimos 12 meses según sexo**



Los hombres reconocieron mayor preferencia que las mujeres por el uso de cannabis y crack; mientras que en las mujeres la preferencia fue mayor que en los hombres por el tabaco, alcohol, inhalables, metanfetaminas y benzodiacepinas. No obstante, cabe resaltar que la cannabis es la droga preferida por hombres y mujeres.

**Droga de mayor impacto en los últimos 12 meses.** Las principales sustancias a cuyo consumo los pacientes atribuyeron los mayores daños en la salud, en el bienestar personal y familiar o en el desempeño escolar, laboral o social y por las que pudieron haber solicitado tratamiento se encuentran: *cannabis* (41.9%), metanfetaminas (16.6%), alcohol (11.1%), inhalables (7.2%), *crack* (6.7%), tabaco (5.8%), solventes y removedores (5.1%) y cocaína en polvo (4.6%) [Figura 18].


**Figura 18. Droga de mayor impacto en los últimos 12 meses según sexo**



Hombres y mujeres acuden a tratamiento principalmente por el consumo de marihuana. Con mayor frecuencia ellos también acuden por los efectos asociados al consumo de crack; mientras que ellas por los del uso de tabaco, alcohol, inhalables, metanfetaminas, benzodiazepinas y alucinógenos.

**Uso combinado de drogas en los últimos 12 meses.<sup>e</sup>** Al menos en una ocasión en el transcurso del último año y sin tomar en cuenta el consumo de tabaco, poco menos de la mitad de la población (44.9%) reportó el consumo de dos o más sustancias en un mismo día.

**Figura 19. Uso combinado de droga en los últimos 12 meses según sexo**



Los hombres y las mujeres combinaron de manera similar dos o más drogas (no se incluyó el consumo de tabaco).


<sup>e</sup> No se toman en cuenta 2,394 casos (20.3%) que no cumplieron los criterios de inclusión de esta variable; 20.3% de los hombres y 20.2% de las mujeres (ver anexo).

**Consumo de drogas en los últimos 30 días.** Incluyendo alcohol y tabaco, 90.2% de los casos reportaron consumo de sustancias en el mes anterior al ingreso a tratamiento.

Las proporciones de consumo de los diez grupos de sustancias utilizadas en este lapso fueron: tabaco (62.0%), alcohol (54.0%), *cannabis* (52.1%), estimulantes (15.3%), cocaína (15.0%), inhalables (9.9%), depresores (4.5%), opiáceos (1.6%), drogas alucinógenas y disociativas (1.6%) y otras sustancias de abuso (0.7%).

En cuanto al consumo de sustancias específicas destacó el de marihuana con 52.1%, le siguen: metanfetaminas (14.4%), cocaína en polvo (9.1%), crack (8.0%) y solventes/removedores (7.1%); en menor proporción se registra el consumo de benzodiazepinas (4.4%) y pegamentos (2.0%).


**Figura 20. Consumo de drogas en los últimos 30 días según sexo**



Hombres y mujeres consumieron predominantemente tabaco, alcohol y cannabis –los hombres en mayor proporción–. Las mujeres reportaron mayor consumo de inhalables, benzodiazepinas, alucinógenos y éxtasis.

**Frecuencia de episodios de abuso en los últimos 30 días.** 36.3% de quienes reportaron consumo de tabaco en los últimos 30 días aceptó fumar seis o más cigarrillos diariamente. Así mismo, entre quienes consumieron alcohol, la mayor parte (36.7%) reportó consumo abusivo menos de una vez a la semana y una o dos veces a la semana (30.1%). Por otra parte, 40.4% de los usuarios de drogas ilícitas durante el último mes reportaron consumirlas todos los días, 23.6% menos de una vez a la semana, 20.5% una a dos veces a la semana y 15.5% cada tercer día.

**Figura 21. Frecuencia de episodios de abuso en los últimos 30 días según sexo**



Los hombres refieren mayor frecuencia de episodios de abuso de drogas ilícitas que las mujeres. Ambos sexos abusan del consumo de tabaco y del alcohol de manera similar.

## REFERENCIAS

1. Sánchez-Huesca, R. y López, L. M. (1985). *Características demográficas y patrones de inicio en el consumo de drogas en asistentes a los Centros Locales; recuperación de los archivos de siete años (1976-1982)*. México: Centros de Integración Juvenil, A.C.
2. Clarac, P. y Wagner, F. (1987). Análisis de algunas variables en una muestra de pacientes farmacodependientes (1986). En Wagner, F. y Ortiz, R. (1990). *Estudios acerca de la farmacodependencia en México realizados por Paule Clarac*. México: Centros de Integración Juvenil, A. C. (pp. 111-126).
3. García V. R., Díaz, D. B., Balanzario, M. C., Gutiérrez, A. D y Castillo, P. I. (1999). *Características sociodemográficas y de consumo de drogas en pacientes atendidos entre 1990 y 1997* (Informe de investigación 98-12). México: Centros de Integración Juvenil, A.C.
4. Secretaria de Salud. *Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA)*. México. Dirección General de Epidemiología. Recuperado de [http://www.epidemiologia.salud.gob.mx/dgae/infoepid/inf\\_sisvea.html](http://www.epidemiologia.salud.gob.mx/dgae/infoepid/inf_sisvea.html)
5. Ortiz, A., Martínez, R., Meza, D. (2016). *Grupo Interinstitucional para el desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas* (Tendencias en el área metropolitana no. 58 junio, 2015). México: Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Recuperado de [http://www.inprf.gob.mx/opencms/export/sites/INPRFM/psicosociales/archivos/srid/rep\\_58\\_pdf.pdf](http://www.inprf.gob.mx/opencms/export/sites/INPRFM/psicosociales/archivos/srid/rep_58_pdf.pdf)
6. Díaz, D. B., Balanzario, M. C., Castillo, P. I., Gutiérrez, A. D. y García, V. R. (2001). Uso de drogas entre pacientes de primer ingreso en Centros de Integración Juvenil. En Secretaría de Salud. *Observatorio Epidemiológico en drogas. El fenómeno de las adicciones en México 2001*. México: Secretaría de Salud (pp. 66-71). Recuperado de [http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/publicaciones/obs2001\\_cap4.pdf](http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/publicaciones/obs2001_cap4.pdf)
7. García-Aurrecochea, V. R., Díaz-Negrete, D. B., Balanzario, M. C. y Castillo-Franco, P. I. (1998). *Perfil y trayectoria del consumo de drogas en pacientes de*

- primer ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil en 1996*. En CD: D. B. Diaz, J. L. Arellanez, M. C. Balanzario y R. Sánchez, *Once años de estudios del consumo de drogas en México, Investigaciones realizadas en Centros de Integración Juvenil entre 1997 y 2007*. México: Centros de Integración Juvenil, A. C.
8. Castillo, P. I., Gutiérrez, A. D. (2008). Consumo de drogas en mujeres asistentes a centros de tratamiento especializado en la Ciudad de México. *Salud Mental* 31 (5), 351-359. Recuperado de <http://scielo.unam.mx/pdf/sm/v31n5/v31n5a3.pdf>
  9. Gracia, S. E. y Balanzario, M. C. (2003). *El consumo de drogas en menores de 12 años en Centros de Integración Juvenil en el año 2002* (Informe de Investigación 03-17). México: Centros de Integración Juvenil, A. C.
  10. García, V. R., Castillo, P. I. y Guerrero, J. A. (2003). *El consumo de drogas en pacientes atendidos en Centros de Integración Juvenil según la etapa de vida correspondiente al ingreso a tratamiento* (Informe de Investigación 03-13). México: Centros de Integración Juvenil, A. C.
  11. García, V. R., Diaz, D. B. y Balanzario, M. C. (2001). *Tendencias del consumo de drogas en pacientes de primer ingreso a tratamiento en CIJ entre 1990 y 1999* (Informe de investigación 2000-06). México: Centros de Integración Juvenil, A.C.
  12. Gutiérrez López, AD. (2017). *Tendencias del consumo de drogas alguna vez en la vida en Centros de Integración Juvenil. Primer semestre de 2005 – Segundo semestre de 2016. (Nivel Nacional y Entidades Federativas)* [Informe de Investigación 17-01e]. México: Centros de Integración Juvenil, A. C. Recuperado de <http://www.cij.gob.mx/Programas/Investigacion/pdf/17-01e.pdf>
  13. Gutiérrez, A. D. (2017). *Tendencias del consumo de drogas en los últimos 30 días en Centros de Integración Juvenil. Primer semestre de 2005 – Segundo semestre de 2016. (Nivel Nacional y Entidades Federativas)* [Informe de Investigación 17-01f]. México: Centros de Integración Juvenil, A. C. Recuperado de <http://www.cij.gob.mx/Programas/Investigacion/pdf/17-01f.pdf>
  14. Gutiérrez, A. D. (2017). *Tendencias de las principales drogas de mayor impacto reportadas por usuarios de drogas ilícitas en el año previo a la solicitud de tratamiento en Centros de Integración Juvenil. Primer semestre de 2005 –*

- Segundo semestre de 2016. (Nivel nacional y entidades federativas)* [Informe de Investigación 17-01g]. México: Centros de Integración Juvenil, A. C. Recuperado de <http://www.cij.gob.mx/Programas/Investigacion/pdf/17-01g.pdf>
15. Jiménez, K., García, V. R. y González, J. D. (2005). *Patrón de consumo de cocaína y crack en pacientes que ingresan a tratamiento* (Informe de investigación 05-07). México: Centros de Integración Juvenil, A. C.
  16. Jiménez, K. y Castillo, N. L. (2014). *Factores de reincidencia en usuarios de cocaína, crack y metanfetaminas en fase de recuperación* (Informe de Investigación 04-14). México: Centros de Integración Juvenil, A. C.
  17. Gutiérrez, A. D. y Castillo, P. I. (2007). *Estudio epidemiológico del consumo de alcohol y tabaco en pacientes usuarios de estas sustancias solicitantes de tratamiento en CIJ en 2006* (Informe de Investigación 07-13). México: Centros de Integración Juvenil, A. C. Recuperado de <http://www.cij.gob.mx/Programas/Investigacion/pdf/07-13.pdf>
  18. Velázquez, M. (2017). *Consumo de sustancias en pacientes de primer ingreso a tratamiento. Segundo semestre del 2016. Usuarios de Tabaco y alcohol* (Informe de Investigación 17-01d). México: Centros de Integración Juvenil, A. C. Recuperado de <http://www.cij.gob.mx/Programas/Investigacion/pdf/17-01d.pdf>
  19. Moreno, K. (2010). *Los jóvenes y el alcohol en México. Un problema emergente en mujeres*. México: Centros de Integración Juvenil, A.C.
  20. Medina-Mora, M. E. Villatoro J. A., Fleiz, C., Téllez, M. M., Mendoza, L. R., Romero, M., Gutiérrez, J. P., Castro, M., Hernández, M., Tena, C., Alvear, C. y Guisa, V. (2012). *Encuesta Nacional de Adicciones 2011: Reporte de Alcohol*. México: Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.
  21. Medina-Mora, M. E. Villatoro J. A., Fleiz, C., Téllez, M. M., Mendoza, L. R., Romero, M., Gutiérrez, J. P., Castro, M., Hernández, M., Tena, C., Alvear, C. y Guisa, V. (2012). *Encuesta Nacional de Adicciones 2011: Reporte de Drogas*. México: Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.
  22. Díaz, D. B., Chacón, J. L., Castillo, N. L., Castillo, P. I. y Arellanez, J. L. (2013). *Estudio Básico de Comunidad Objetivo Vol. 1 y 2*. México: Centros de Integración Juvenil, A. C. Recuperado de <http://www.cij.gob.mx/ebco2013/index.html>

---

# CUADROS

---

**CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS USUARIOS DE DROGAS ILÍCITAS DE PRIMER INGRESO A TRATAMIENTO A CIJ EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2017**

**Cuadro 1. Pacientes de primer ingreso por unidad de atención (CIJ, UH y UTH)**

CIJ	General		Hombres		Mujeres		Razón H:M
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	
Álvaro Obregón Norte	79	0.7	67	0.7	12	0.6	5.6 : 1
Álvaro Obregón Oriente	56	0.5	48	0.5	8	0.4	6.0 : 1
Atizapán	22	0.2	20	0.2	2	0.1	10.0 : 1
Azcapotzalco	130	1.1	111	1.2	19	0.9	5.8 : 1
Benito Juárez	135	1.1	98	1.0	37	1.7	2.6 : 1
Chalco	144	1.2	125	1.3	19	0.9	6.6 : 1
Coyoacán	147	1.2	112	1.2	35	1.6	3.2 : 1
Cuajimalpa	117	1.0	92	1.0	25	1.1	3.7 : 1
Cuauhtémoc Oriente	134	1.1	112	1.2	22	1.0	5.1 : 1
Cuauhtémoc Poniente	159	1.3	123	1.3	36	1.7	3.4 : 1
Ecatepec	241	2.0	215	2.2	26	1.2	8.3 : 1
Gustavo A. Madero Aragón	257	2.2	227	2.4	30	1.4	7.6 : 1
Gustavo A. Madero Norte	160	1.4	132	1.4	28	1.3	4.7 : 1
Gustavo A. Madero Oriente	20	0.2	12	0.1	8	0.4	1.5 : 1
Iztapalapa Oriente	415	3.5	350	3.6	65	3.0	5.4 : 1
Iztapalapa Poniente	112	0.9	98	1.0	14	0.6	7.0 : 1
Miguel Hidalgo	88	0.7	70	0.7	18	0.8	3.9 : 1
Naucalpan	182	1.5	153	1.6	29	1.3	5.3 : 1
Nezahualcóyotl	255	2.2	217	2.3	38	1.7	5.7 : 1
Texcoco	101	0.9	88	0.9	13	0.6	6.8 : 1
Tlalnepantla	180	1.5	153	1.6	27	1.2	5.7 : 1
Tlalpan	235	2.0	198	2.1	37	1.7	5.4 : 1
Venustiano Carranza	158	1.3	122	1.3	36	1.7	3.4 : 1
UH Ecatepec	61	0.5	60	0.6	1	0.0	60.0 : 1
UH Iztapalapa	74	0.6	63	0.7	11	0.5	5.7 : 1
UH Naucalpan	61	0.5	50	0.5	11	0.5	4.5 : 1
Acapulco	138	1.2	112	1.2	26	1.2	4.3 : 1
Aguascalientes	187	1.6	144	1.5	43	2.0	3.3 : 1
Cancún	144	1.2	123	1.3	21	1.0	5.9 : 1
Cd. del Carmen	52	0.4	42	0.4	10	0.5	4.2 : 1
Cd. Juárez Norte	110	0.9	86	0.9	24	1.1	3.6 : 1
Cd. Victoria	24	0.2	20	0.2	4	0.2	5.0 : 1
Celaya	230	1.9	197	2.0	33	1.5	6.0 : 1
Chetumal	41	0.3	36	0.4	5	0.2	7.2 : 1

*(Continúa)*

**Cuadro 1. Pacientes de primer ingreso a tratamiento por unidad de atención (CIJ, UH y UTUH)**  
(Continuación)

CIJ	General		Hombres		Mujeres		Razón H:M
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	
Chihuahua	262	2.2	208	2.2	54	2.5	3.9 : 1
Chilpancingo	61	0.5	46	0.5	15	0.7	3.1 : 1
Colima	145	1.2	116	1.2	29	1.3	4.0 : 1
Cozumel	78	0.7	60	0.6	18	0.8	3.3 : 1
Cuernavaca	116	1.0	101	1.0	15	0.7	6.7 : 1
Culiacán	142	1.2	127	1.3	15	0.7	8.5 : 1
Durango	109	0.9	84	0.9	25	1.1	3.4 : 1
Escuinapa	54	0.5	40	0.4	14	0.6	2.9 : 1
Fresnillo	40	0.3	35	0.4	5	0.2	7.0 : 1
Guadalajara Centro	265	2.2	209	2.2	56	2.6	3.7 : 1
Guadalajara Sur	128	1.1	104	1.1	24	1.1	4.3 : 1
Guadalupe	116	1.0	94	1.0	22	1.0	4.3 : 1
Guamúchil	51	0.4	44	0.5	7	0.3	6.3 : 1
Guasave	98	0.8	89	0.9	9	0.4	9.9 : 1
Hermosillo	196	1.7	165	1.7	31	1.4	5.3 : 1
Huatulco	24	0.2	18	0.2	6	0.3	3.0 : 1
Ixtapa Zihuatanejo	30	0.3	25	0.3	5	0.2	5.0 : 1
La Paz	84	0.7	70	0.7	14	0.6	5.0 : 1
La Piedad	63	0.5	47	0.5	16	0.7	2.9 : 1
Laguna Durango	75	0.6	63	0.7	12	0.6	5.3 : 1
León	200	1.7	157	1.6	43	2.0	3.7 : 1
Los Cabos	39	0.3	34	0.4	5	0.2	6.8 : 1
Los Mochis	100	0.8	85	0.9	15	0.7	5.7 : 1
Manzanillo	59	0.5	46	0.5	13	0.6	3.5 : 1
Mazatlán	105	0.9	71	0.7	34	1.6	2.1 : 1
Mérida	92	0.8	73	0.8	19	0.9	3.8 : 1
Mexicali	153	1.3	125	1.3	28	1.3	4.5 : 1
Monterrey	147	1.2	118	1.2	29	1.3	4.1 : 1
Morelia	91	0.8	71	0.7	20	0.9	3.6 : 1
Nogales	89	0.8	63	0.7	26	1.2	2.4 : 1
Oaxaca	119	1.0	96	1.0	23	1.1	4.2 : 1
Pachuca	164	1.4	140	1.5	24	1.1	5.8 : 1
Playa del Carmen	45	0.4	37	0.4	8	0.4	4.6 : 1
Poza Rica	44	0.4	39	0.4	5	0.2	7.8 : 1
Puebla	139	1.2	115	1.2	24	1.1	4.8 : 1
Puerto Vallarta	118	1.0	90	0.9	28	1.3	3.2 : 1
Querétaro	159	1.3	135	1.4	24	1.1	5.6 : 1
Reynosa	30	0.3	26	0.3	4	0.2	6.5 : 1

(Continúa)

**Cuadro 1. Pacientes de primer ingreso a tratamiento por unidad de atención (CIJ, UH y UTUH)**  
(Continuación)

CIJ	General		Hombres		Mujeres		Razón H:M
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	
Salamanca	94	0.8	81	0.8	13	0.6	6.2 : 1
Saltillo	237	2.0	192	2.0	45	2.1	4.3 : 1
San Luis Potosí	187	1.6	142	1.5	45	2.1	3.2 : 1
San Nicolás de los Garza	144	1.2	122	1.3	22	1.0	5.5 : 1
Tampico	112	0.9	86	0.9	26	1.2	3.3 : 1
Tapachula	35	0.3	31	0.3	4	0.2	7.8 : 1
Tecomán	74	0.6	64	0.7	10	0.5	6.4 : 1
Tehuacán	90	0.8	77	0.8	13	0.6	5.9 : 1
Tepic	27	0.2	22	0.2	5	0.2	4.4 : 1
Tijuana Guaycura	248	2.1	181	1.9	67	3.1	2.7 : 1
Tijuana Soler	199	1.7	148	1.5	51	2.3	2.9 : 1
Tlaquepaque	204	1.7	167	1.7	37	1.7	4.5 : 1
Tlaxcala	37	0.3	24	0.2	13	0.6	1.8 : 1
Toluca	193	1.6	165	1.7	28	1.3	5.9 : 1
Torreón Oriente	260	2.2	200	2.1	60	2.8	3.3 : 1
Tuxtla Gutiérrez	60	0.5	52	0.5	8	0.4	6.5 : 1
Villahermosa	89	0.8	78	0.8	11	0.5	7.1 : 1
Xalapa	109	0.9	87	0.9	22	1.0	4.0 : 1
Yucatán	83	0.7	69	0.7	14	0.6	4.9 : 1
Zacatecas	56	0.5	38	0.4	18	0.8	2.1 : 1
Zamora	74	0.6	49	0.5	25	1.1	2.0 : 1
Zapopan Kena Moreno	11	0.1	6	0.1	5	0.2	1.2 : 1
Zapopan Norte	140	1.2	102	1.1	38	1.7	2.7 : 1
UH Ciudad Juárez	27	0.2	21	0.2	6	0.3	3.5 : 1
UH Culiacán	39	0.3	39	0.4	0	0.0	---
UH Ixbalanqué	11	0.1	9	0.1	2	0.1	4.5 : 1
UH Nuevo León	63	0.5	53	0.6	10	0.5	5.3 : 1
UH Punta Diamante	38	0.3	32	0.3	6	0.3	5.3 : 1
UH Tijuana	57	0.5	44	0.5	13	0.6	3.4 : 1
UH Zapopan	65	0.6	53	0.6	12	0.6	4.4 : 1
UH Zapotlán el Grande	11	0.1	11	0.1	0	0.0	---
UTUH Cd. Juárez	26	0.2	22	0.2	4	0.2	5.5 : 1
UTUH Tijuana	32	0.3	25	0.3	7	0.3	3.6 : 1
<b>Total</b>	<b>11,811</b>	<b>100.0</b>	<b>9,634</b>	<b>100.0</b>	<b>2,177</b>	<b>100.0</b>	<b>4.4 : 1</b>

UH=Unidad de Hospitalización  
UTUH=Unidad de Tratamiento para Usuarios de Heroína

**Cuadro 2. Sexo**

	Frec.	%	Razón H:M
Hombres	9,634	81.6	
Mujeres	2,177	18.4	<b>4.4 : 1</b>
<b>Total</b>	<b>11,811</b>	<b>100.0</b>	

**Cuadro 3. Persona que proporciona la información**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Usuario de drogas	4,372	37.0	37.0	3,558	36.9	36.9	814	37.4	37.4
Usuario de drogas y familiares u otras personas	6,401	54.2	54.2	5,251	54.5	54.5	1,150	52.8	52.8
<i>Sin Información</i>	1,038	8.8	8.8	825	8.6	8.6	213	9.8	9.8
<b>Total</b>	<b>11,811</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>9,634</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>2,177</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

**Cuadro 4. Edad de ingreso a tratamiento**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Hasta 9 años	4	0.0	0.0	4	0.0	0.0	0	0.0	0.0
10 a 14 años	1,870	15.8	15.8	1,399	14.5	14.5	471	21.6	21.6
15 a 19 años	4,634	39.2	39.2	3,745	38.9	38.9	889	40.8	40.8
20 a 24 años	1,686	14.3	14.3	1,403	14.6	14.6	283	13.0	13.0
25 a 29 años	1,137	9.6	9.6	957	9.9	9.9	180	8.3	8.3
30 a 34 años	787	6.7	6.7	675	7.0	7.0	112	5.1	5.1
35 a 39 años	652	5.5	5.5	557	5.8	5.8	95	4.4	4.4
40 a 44 años	434	3.7	3.7	383	4.0	4.0	51	2.3	2.3
45 años y más	607	5.1	5.1	511	5.3	5.3	96	4.4	4.4
<b>Total</b>	<b>11,811</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>9,634</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>2,177</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
Media (DE)	22.7 (10.4) años			23.0 (10.5) años			21.2 (9.8) años		
Mediana	18 años			19 años			17 años		
Moda	15 años			15 años			15 años		
Decil1	14 años			14 años			14 años		

DE= Desviación Estándar

**Cuadro 5. Estado civil**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Soltero	8,556	72.4	72.6	6,893	71.5	71.6	1,663	76.4	76.6
Casado	1,073	9.1	9.1	967	10.0	10.0	106	4.9	4.9
Unión libre	1,303	11.0	11.0	1,082	11.2	11.2	221	10.2	10.2
Separado	694	5.9	5.9	555	5.8	5.8	139	6.4	6.4
Divorciado	129	1.1	1.1	108	1.1	1.1	21	1.0	1.0
Viudo	38	0.3	0.3	17	0.2	0.2	21	1.0	1.0
<i>Sin información</i>	18	0.2	<i>Se omite</i>	12	0.1	<i>Se omite</i>	6	0.3	<i>Se omite</i>
<b>Total</b>	<b>11,811</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>9,634</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>2,177</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

**Cuadro 6. Escolaridad**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Ninguna (no sabe leer ni escribir)	36	0.3	0.3	26	0.3	0.3	10	0.5	0.5
Ninguna (sabe leer y escribir)	32	0.3	0.3	25	0.3	0.3	7	0.3	0.3
Primaria incompleta	331	2.8	2.8	272	2.8	2.8	59	2.7	2.7
Primaria completa	481	4.1	4.1	392	4.1	4.1	89	4.1	4.1
Secundaria incompleta	3,396	28.8	28.8	2,678	27.8	27.8	718	33.0	33.0
Secundaria completa	1,910	16.2	16.2	1,605	16.7	16.7	305	14.0	14.0
Estudios técnicos o comerciales incompletos	124	1.0	1.1	109	1.1	1.1	15	0.7	0.7
Estudios técnicos o comerciales completos	113	1.0	1.0	83	0.9	0.9	30	1.4	1.4
Bachillerato incompleto	3,385	28.7	28.7	2,780	28.9	28.9	605	27.8	27.8
Bachillerato completo	879	7.4	7.4	741	7.7	7.7	138	6.3	6.3
Estudios superiores incompletos	796	6.7	6.7	655	6.8	6.8	141	6.5	6.5
Estudios superiores completos	292	2.5	2.5	238	2.5	2.5	54	2.5	2.5
Estudios de posgrado incompletos	14	0.1	0.1	11	0.1	0.1	3	0.1	0.1
Estudios de posgrado completos	15	0.1	0.1	12	0.1	0.1	3	0.1	0.1
<i>Sin información</i>	7	0.1	<i>Se omite</i>	7	0.1	<i>Se omite</i>	0	0.0	<i>Se omite</i>
<b>Total</b>	<b>11,811</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>9,634</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>2,177</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

**Cuadro 7. Ocupación**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Desempleado(a)	2,650	22.4	22.4	2,173	22.6	22.6	477	21.9	21.9
Estudiante	4,279	36.2	36.2	3,321	34.5	34.5	958	44.0	44.0
Estudiante que trabaja	630	5.3	5.3	554	5.8	5.8	76	3.5	3.5
Trabaja	3,793	32.1	32.1	3,406	35.4	35.4	387	17.8	17.8
Tareas del hogar	406	3.4	3.4	137	1.4	1.4	269	12.4	12.4
Pensionado	53	0.4	0.4	43	0.4	0.4	10	0.5	0.5
<b>Total</b>	<b>11,811</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>9,634</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>2,177</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

**Cuadro 8. Estrato social**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Alto	30	0.3	0.3	23	0.2	0.2	7	0.3	0.3
Medio alto	471	4.0	4.0	397	4.1	4.1	74	3.4	3.4
Medio	2,311	19.6	19.6	1,844	19.1	19.2	467	21.5	21.5
Medio bajo	5,970	50.5	50.6	4,888	50.7	50.8	1,082	49.7	49.9
Bajo	2,940	24.9	24.9	2,416	25.1	25.1	524	24.1	24.1
Pobreza extrema o marginación	66	0.6	0.6	50	0.5	0.5	16	0.7	0.7
<i>Sin información</i>	23	0.2	<i>Se omite</i>	16	0.2	<i>Se omite</i>	7	0.3	<i>Se omite</i>
<b>Total</b>	<b>11,811</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>9,634</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>2,177</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

**FACTORES ASOCIADOS A LA DEMANDA DE TRATAMIENTO EN PACIENTES DE PRIMER INGRESO A TRATAMIENTO EN CIJ EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2017**

**Cuadro 9. Motivos de consulta**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Consumo de drogas ilícitas	10,703	90.6	8,780	91.1	1,923	88.3
Consumo de bebidas alcohólicas	4,738	40.1	3,834	39.8	904	41.5
Consumo de tabaco	4,422	37.4	3,569	37.0	853	39.2
Otro motivo	319	2.7	242	2.5	77	3.5
<i>Ningún motivo específico reportado</i>	10	0.1	6	0.1	4	0.2
<i>Usuarios que reportaron dos o más motivos de consulta</i>	5,358	45.4	4,359	45.2	999	45.9

**Cuadro 10. Condicionantes de la solicitud de tratamiento**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Por propia iniciativa	4,529	38.3	3,684	38.2	845	38.8
Por condicionamiento o recomendación familiar	5,496	46.5	4,558	47.3	938	43.1
Por recomendación de pares	183	1.5	146	1.5	37	1.7
Por condicionamiento o recomendación escolar	2,421	20.5	1,964	20.4	457	21.0
Por condicionamiento legal	1,011	8.6	857	8.9	154	7.1
Por condicionamiento o recomendación laboral	257	2.2	243	2.5	14	0.6
Por indicación médica	989	8.4	776	8.1	213	9.8
Por solicitud de novia(o)	57	0.5	47	0.5	10	0.5
Otros condicionantes de solicitud de tratamiento	324	2.7	239	2.5	85	3.9
<i>Ningún condicionante reportado</i>	222	1.9	167	1.7	55	2.5
<i>Pacientes que reportaron dos o más condicionantes de la solicitud de tratamiento</i>	3,210	27.2	2,651	27.5	559	25.7

**Cuadro 11. Antecedentes de acciones contra el consumo de sustancias**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Juramento	782	6.6	701	7.3	81	3.7
Grupo de autoayuda	848	7.2	740	7.7	108	5.0
Internamiento en anexo	1,400	11.9	1,216	12.6	184	8.5
Intervención de emergencia	79	0.7	62	0.6	17	0.8
Programa de mantenimiento	76	0.6	66	0.7	10	0.5
Tratamiento médico no especializado	93	0.8	76	0.8	17	0.8
Tratamiento psiquiátrico o psicoterapéutico ambulatorio	743	6.3	588	6.1	155	7.1
Tratamiento psiquiátrico o psicoterapéutico residencial	229	1.9	178	1.8	51	2.3
Medicina tradicional o alternativa	46	0.4	38	0.4	8	0.4
Intento de interrupción voluntaria del consumo, sin apoyo	3,540	30.0	2,918	30.3	622	28.6
Otras acciones	2,956	25.0	2,399	24.9	557	25.6
<i>Ninguna acción previa reportada</i>	3,062	25.9	2,425	25.2	637	29.3
<i>Pacientes que reportaron dos o más acciones contra el consumo de sustancias antes de solicitar tratamiento en CIJ</i>	1,457	12.3	1,248	13.0	209	9.6

**Cuadro 12. Problemas asociados al consumo de sustancias**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Problemas de salud	5,025	42.5	4,082	42.4	943	43.3
Accidentes o lesiones	1,494	12.6	1,215	12.6	279	12.8
Problemas familiares	9,384	79.5	7,634	79.2	1,750	80.4
Problemas escolares	4,844	41.0	3,892	40.4	952	43.7
Problemas laborales	2,778	23.5	2,474	25.7	304	14.0
Problemas psicológicos	4,935	41.8	3,889	40.4	1,046	48.0
Problemas legales	2,379	20.1	2,081	21.6	298	13.7
Conducta antisocial o delictiva	1,745	14.8	1,477	15.3	268	12.3
Otros problemas	519	4.4	408	4.2	111	5.1
<i>Ningún problema asociado reportado</i>	563	4.8	448	4.7	115	5.3
<i>Pacientes que reportaron dos o más problemas asociados</i>	9,107	77.1	7,419	77.0	1,688	77.5

**CARACTERÍSTICAS DEL CONSUMO DE DROGAS EN PACIENTES DE PRIMER INGRESO A TRATAMIENTO EN CIJ EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2017**

**Cuadro 13. Edad de inicio del consumo de tabaco**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Hasta 9 años	327	2.8	3.3	276	2.9	3.3	51	2.3	2.8
10 a 14 años	5,360	45.4	53.3	4,350	45.2	52.8	1,010	46.4	55.6
15 a 19 años	3,850	32.6	38.3	3,205	33.3	38.9	645	29.6	35.5
20 a 24 años	324	2.7	3.2	260	2.7	3.2	64	2.9	3.5
25 a 29 años	104	0.9	1.0	80	0.8	1.0	24	1.1	1.3
30 a 34 años	58	0.5	0.6	45	0.5	0.5	13	0.6	0.7
35 a 39 años	18	0.2	0.2	12	0.1	0.1	6	0.3	0.3
40 a 44 años	10	0.1	0.1	8	0.1	0.1	2	0.1	0.1
45 años y más	9	0.1	0.1	7	0.1	0.1	2	0.1	0.1
No consumió	1,748	14.8	Se omite	1,389	14.4	Se omite	359	16.5	Se omite
Sin información	3	0.0	Se omite	2	0.0	Se omite	1	0.0	Se omite
<b>Total</b>	<b>11,811</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>9,634</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>2,177</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
Media (DE)	14.4 (3.5) años			14.4 (3.5) años			14.5 (3.8) años		
Mediana	14 años			14 años			14 años		
Moda	15 años			15 años			13 años		
Decil1	11 años			11 años			12 años		

DE= Desviación Estándar

**Cuadro 14. Edad de inicio del consumo de alcohol**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Hasta 9 años	399	3.4	3.9	328	3.4	3.9	71	3.3	3.8
10 a 14 años	4,793	40.6	47.0	3,841	39.9	46.0	952	43.7	51.3
15 a 19 años	4,617	39.1	45.2	3,877	40.2	46.4	740	34.0	39.8
20 a 24 años	294	2.5	2.9	241	2.5	2.9	53	2.4	2.9
25 a 29 años	70	0.6	0.7	48	0.5	0.6	22	1.0	1.2
30 a 34 años	13	0.1	0.1	8	0.1	0.1	5	0.2	0.3
35 a 39 años	9	0.1	0.1	3	0.0	0.0	6	0.3	0.3
40 a 44 años	6	0.1	0.1	2	0.0	0.0	4	0.2	0.2
45 años y más	4	0.0	0.0	0	0.0	0.0	4	0.2	0.2
No consumió	1,602	13.6	Se omite	1,283	13.3	Se omite	319	14.7	Se omite
Sin información	4	0.0	Se omite	3	0.0	Se omite	1	0.0	Se omite
<b>Total</b>	<b>11,811</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>9,634</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>2,177</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
Media (DE)	14.5 (3.1) años			14.5 (2.9) años			14.5 (3.9) años		
Mediana	14 años			15 años			14 años		
Moda	15 años			15 años			15 años		
Decil1	11 años			11 años			12 años		

DE= Desviación Estándar

**Cuadro 15. Edad de inicio del consumo de drogas ilícitas**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Hasta 9 años	129	1.1	1.1	110	1.1	1.1	19	0.9	0.9
10 a 14 años	5,151	43.6	43.7	4,152	43.1	43.2	999	45.9	46.0
15 a 19 años	5,064	42.9	43.0	4,207	43.7	43.8	857	39.4	39.4
20 a 24 años	771	6.5	6.5	649	6.7	6.7	122	5.6	5.6
25 a 29 años	320	2.7	2.7	254	2.6	2.6	66	3.0	3.0
30 a 34 años	160	1.4	1.4	116	1.2	1.2	44	2.0	2.0
35 a 39 años	80	0.7	0.7	59	0.6	0.6	21	1.0	1.0
40 a 44 años	43	0.4	0.4	24	0.2	0.2	19	0.9	0.9
45 años y más	70	0.6	0.6	44	0.5	0.5	26	1.2	1.2
<i>Sin información</i>	23	0.2	<i>Se omite</i>	19	0.2	<i>Se omite</i>	4	0.2	<i>Se omite</i>
<b>Total</b>	<b>11,811</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>9,634</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>2,177</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
Media (DE)	16.0 (5.1) años			15.9 (4.8) años			16.4 (6.3) años		
Mediana	15 años			15 años			15 años		
Moda	15 años			15 años			14 años		
Decil1	12 años			12 años			12 años		

DE= Desviación Estándar

**Cuadro 16. Drogas ilícitas de inicio, según menciones**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Mariguana	8,849	74.9	7,335	76.1	1,514	69.5
Hachís	6	0.1	5	0.1	1	0.0
Cocaína (Clorhidrato)	850	7.2	731	7.6	119	5.5
<i>Crack</i>	247	2.1	217	2.3	30	1.4
Otra presentación de cocaína	3	0.0	0	0.0	3	0.1
Solventes o removedores	710	6.0	560	5.8	150	6.9
Pegamentos	172	1.5	140	1.5	32	1.5
Esmaltes o pinturas	133	1.1	92	1.0	41	1.9
Otros inhalables	24	0.2	19	0.2	5	0.2
Benzodiazepinas	174	1.5	81	0.8	93	4.3
<i>Rohypnol</i> <sup>®</sup>	6	0.1	6	0.1	0	0.0
Otros depresores del SNC	4	0.0	0	0.0	4	0.2
Anfetamina	83	0.7	72	0.7	11	0.5
Metanfetaminas	387	3.3	258	2.7	129	5.9
Éxtasis (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas	30	0.3	20	0.2	10	0.5
Otros estimulantes del SNC	11	0.1	9	0.1	2	0.1
LSD	18	0.2	13	0.1	5	0.2
Plantas alucinógenas y derivados	21	0.2	18	0.2	3	0.1
Otras drogas alucinógenas y disociativas	2	0.0	2	0.0	0	0.0
Heroína	22	0.2	18	0.2	4	0.2
Opiáceos Sintéticos	10	0.1	6	0.1	4	0.2
Opio y otros opiáceos	5	0.0	2	0.0	3	0.1
Sustancias con utilidad médica	16	0.1	5	0.1	11	0.5
Otras sustancias de abuso	28	0.2	25	0.3	3	0.1
<b>Total</b>	<b>11,811</b>	<b>100.0</b>	<b>9,634</b>	<b>100.0</b>	<b>2,177</b>	<b>100.0</b>

**Cuadro 17. Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de tabaco y el ingreso a tratamiento en CIJ**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
< de un año	769	6.5	7.6	587	6.1	7.1	182	8.4	10.0
1 a 5 años	4,782	40.5	47.5	3,796	39.4	46.1	986	45.3	54.3
6 a 10 años	1,628	13.8	16.2	1,373	14.3	16.7	255	11.7	14.0
11 a 15 años	940	8.0	9.3	805	8.4	9.8	135	6.2	7.4
16 a 20 años	688	5.8	6.8	591	6.1	7.2	97	4.5	5.3
21 a 25 años	512	4.3	5.1	451	4.7	5.5	61	2.8	3.4
26 o más años	741	6.3	7.4	640	6.6	7.8	101	4.6	5.6
No consumió	1,748	14.8	Se omite	1,389	14.4	Se omite	359	16.5	Se omite
Sin información	3	0.0	Se omite	2	0.0	Se omite	1	0.0	Se omite
<b>Total</b>	<b>11,811</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>9,634</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>2,177</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
Media (DE)	8.5 (9.7) años			8.9 (9.8) años			7.0 (8.9) años		
Mediana	5 años			5 años			3 años		
Moda	1 año			1 año			1 año		
Decil1	1 año			1 año			< un año		

DE= Desviación Estándar

**Cuadro 18. Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de alcohol y el ingreso a tratamiento en CIJ**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
< de un año	788	6.7	7.7	593	6.2	7.1	195	9.0	10.5
1 a 5 años	4,624	39.1	45.3	3,673	38.1	44.0	951	43.7	51.2
6 a 10 años	1,769	15.0	17.3	1,467	15.2	17.6	302	13.9	16.3
11 a 15 años	994	8.4	9.7	847	8.8	10.1	147	6.8	7.9
16 a 20 años	685	5.8	6.7	593	6.2	7.1	92	4.2	5.0
21 a 25 años	583	4.9	5.7	503	5.2	6.0	80	3.7	4.3
26 o más años	762	6.5	7.5	672	7.0	8.0	90	4.1	4.8
No consumió	1,602	13.6	Se omite	1,283	13.3	Se omite	319	14.7	Se omite
Sin información	4	0.0	Se omite	3	0.0	Se omite	1	0.0	Se omite
<b>Total</b>	<b>11,811</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>9,634</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>2,177</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
Media (DE)	8.7 (9.7) años			9.1 (9.9) años			7.0 (8.6) años		
Mediana	5 años			5 años			3 años		
Moda	1 año			1 año			1 año		
Decil1	1 año			1 año			< un año		

DE= Desviación Estándar

**Cuadro 19. Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de drogas ilícitas y el ingreso a tratamiento en CIJ**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
< de un año	1,909	16.2	16.2	1,443	15.0	15.0	466	21.4	21.4
1 a 5 años	5,634	47.7	47.8	4,485	46.6	46.6	1,149	52.8	52.9
6 a 10 años	1,595	13.5	13.5	1,365	14.2	14.2	230	10.6	10.6
11 a 15 años	935	7.9	7.9	795	8.3	8.3	140	6.4	6.4
16 a 20 años	686	5.8	5.8	604	6.3	6.3	82	3.8	3.8
21 a 25 años	459	3.9	3.9	411	4.3	4.3	48	2.2	2.2
26 o más años	570	4.8	4.8	512	5.3	5.3	58	2.7	2.7
<i>Sin información</i>	23	0.2	<i>Se omite</i>	19	0.2	<i>Se omite</i>	4	0.2	<i>Se omite</i>
<b>Total</b>	<b>11,811</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>9,634</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>2,177</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
Media (DE)	6.7 (8.6) años			7.2 (8.9) años			4.8 (7.0) años		
Mediana	3 años			3 años			2 años		
Moda	1 año			1 año			1 año		
Decil1	< un año			< un año			< un año		

DE= Desviación Estándar

**Cuadro 20. Tipo de consumo de drogas ilícitas**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Experimental	1,324	11.2	11.2	993	10.3	10.3	331	15.2	15.3
Social u ocasional	1,622	13.7	13.8	1,271	13.2	13.2	351	16.1	16.2
Funcional	6,127	51.9	52.0	5,111	53.1	53.2	1,016	46.7	46.8
Disfuncional	2,373	20.1	20.1	1,953	20.3	20.3	420	19.3	19.4
En remisión	331	2.8	2.8	279	2.9	2.9	52	2.4	2.4
<i>Sin información</i>	34	0.3	<i>Se omite</i>	27	0.3	<i>Se omite</i>	7	0.3	<i>Se omite</i>
<b>Total</b>	<b>11,811</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>9,634</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>2,177</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

**Cuadro 21. Total de drogas consumidas alguna vez en la vida  
(Incluye alcohol o tabaco)**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
1 sustancia	633	5.4	494	5.1	139	6.4
2 sustancias	1,205	10.2	973	10.1	232	10.7
3 sustancias	3,435	29.1	2,802	29.1	633	29.1
4 sustancias	2,302	19.5	1,851	19.2	451	20.7
5 sustancias	1,628	13.8	1,361	14.1	267	12.3
6 sustancias	997	8.4	812	8.4	185	8.5
7 sustancias	629	5.3	526	5.5	103	4.7
8 sustancias	424	3.6	348	3.6	76	3.5
9 sustancias	225	1.9	187	1.9	38	1.7
10 sustancias	147	1.2	122	1.3	25	1.1
11-20 sustancias	186	1.6	158	1.6	28	1.3
<b>Total</b>	<b>11,811</b>	<b>100.0</b>	<b>9,634</b>	<b>100.0</b>	<b>2,177</b>	<b>100.0</b>
Media (DE)	4.3 (2.2) drogas		4.3 (2.2) drogas		4.1 (2.1) drogas	
Mediana	4 drogas		4 drogas		4 drogas	
Moda	3 drogas		3 drogas		3 drogas	
Decil1	2 drogas		2 drogas		2 drogas	

DE= Desviación Estándar

**Cuadro 22. Total de drogas ilícitas consumidas alguna vez en la vida  
(No incluye ni alcohol ni tabaco)**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
1 sustancia	4,738	40.1	3,835	39.8	903	41.5
2 sustancias	2,646	22.4	2,129	22.1	517	23.7
3 sustancias	1,746	14.8	1,461	15.2	285	13.1
4 sustancias	1,025	8.7	830	8.6	195	9.0
5 sustancias	651	5.5	546	5.7	105	4.8
6 sustancias	440	3.7	360	3.7	80	3.7
7 sustancias	230	1.9	191	2.0	39	1.8
8 sustancias	148	1.3	124	1.3	24	1.1
9 sustancias	91	0.8	77	0.8	14	0.6
10 sustancias	40	0.3	32	0.3	8	0.4
11-18 sustancias	56	0.5	49	0.5	7	0.3
<b>Total</b>	<b>11,811</b>	<b>100.0</b>	<b>9,634</b>	<b>100.0</b>	<b>2,177</b>	<b>100.0</b>
Media (DE)	2.5 (1.9) drogas		2.6 (1.9) drogas		2.4 (1.8) drogas	
Mediana	2 drogas		2 drogas		2 drogas	
Moda	1 droga		1 droga		1 droga	
Decil1	1 droga		1 droga		1 droga	

DE= Desviación Estándar

**Cuadro 23. Consumo de drogas alguna vez en la vida por sustancia**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
<b>Tabaco</b>	<b>10,063</b>	<b>85.2</b>	<b>8,245</b>	<b>85.6</b>	<b>1,818</b>	<b>83.5</b>
<b>Alcohol</b>	<b>10,209</b>	<b>86.4</b>	<b>8,351</b>	<b>86.7</b>	<b>1,858</b>	<b>85.3</b>
<b>Cannabis</b>	<b>10,259</b>	<b>86.9</b>	<b>8,466</b>	<b>87.9</b>	<b>1,793</b>	<b>82.4</b>
Mariguana	10,259	86.9	8,466	87.9	1,793	82.4
Hachís	738	6.2	629	6.5	109	5.0
<b>Cocaína</b>	<b>5,048</b>	<b>42.7</b>	<b>4,260</b>	<b>44.2</b>	<b>788</b>	<b>36.2</b>
Cocaína (Clorhidrato)	4,288	36.3	3,603	37.4	685	31.5
Crack	2,346	19.9	2,030	21.1	316	14.5
Otra presentación de cocaína	70	0.6	56	0.6	14	0.6
<b>Inhalables</b>	<b>3,211</b>	<b>27.2</b>	<b>2,638</b>	<b>27.4</b>	<b>573</b>	<b>26.3</b>
Solventes o removedores	2,310	19.6	1,909	19.8	401	18.4
Pegamentos	830	7.0	689	7.2	141	6.5
Esmaltes o pinturas	504	4.3	394	4.1	110	5.1
Otros inhalables	158	1.3	136	1.4	22	1.0
<b>Depresores</b>	<b>1,698</b>	<b>14.4</b>	<b>1,306</b>	<b>13.6</b>	<b>392</b>	<b>18.0</b>
Benzodiacepinas	1,620	13.7	1,240	12.9	380	17.5
Rohypnol	102	0.9	92	1.0	10	0.5
Otros depresores	33	0.3	26	0.3	7	0.3
<b>Estimulantes</b>	<b>3,811</b>	<b>32.3</b>	<b>3,038</b>	<b>31.5</b>	<b>773</b>	<b>35.5</b>
Anfetamina	226	1.9	191	2.0	35	1.6
Metanfetaminas	3,290	27.9	2,622	27.2	668	30.7
Éxtasis (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas	733	6.2	558	5.8	175	8.0
Otros estimulantes	59	0.5	51	0.5	8	0.4
<b>Drogas alucinógenas y disociativas</b>	<b>1,379</b>	<b>11.7</b>	<b>1,124</b>	<b>11.7</b>	<b>255</b>	<b>11.7</b>
LSD	1,103	9.3	886	9.2	217	10.0
Plantas alucinógenas y derivados	567	4.8	476	4.9	91	4.2
Otras drogas alucinógenas y disoc.	63	0.5	55	0.6	8	0.4
<b>Opiáceos</b>	<b>413</b>	<b>3.5</b>	<b>341</b>	<b>3.5</b>	<b>72</b>	<b>3.3</b>
Heroína	334	2.8	282	2.9	52	2.4
Opiáceos Sintéticos	48	0.4	33	0.3	15	0.7
Opio y otros opiáceos	51	0.4	42	0.4	9	0.4
<b>Otras sustancias de abuso</b>	<b>206</b>	<b>1.7</b>	<b>147</b>	<b>1.5</b>	<b>59</b>	<b>2.7</b>
Con utilidad médica	67	0.6	42	0.4	25	1.1
Otras sustancias de abuso	145	1.2	107	1.1	38	1.7

**Cuadro 24. Total de drogas consumidas en el último año  
(Incluye alcohol o tabaco)**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Ninguna	185	1.6	155	1.6	30	1.4
1 sustancia	1,107	9.4	879	9.1	228	10.5
2 sustancias	2,099	17.8	1,721	17.9	378	17.4
3 sustancias	3,619	30.6	2,981	30.9	638	29.3
4 sustancias	2,180	18.5	1,771	18.4	409	18.8
5 sustancias	1,170	9.9	980	10.2	190	8.7
6 sustancias	637	5.4	499	5.2	138	6.3
7 sustancias	365	3.1	289	3.0	76	3.5
8 sustancias	214	1.8	173	1.8	41	1.9
9 sustancias	108	0.9	86	0.9	22	1.0
10 sustancias	67	0.6	51	0.5	16	0.7
11-20 sustancias	60	0.5	49	0.5	11	0.5
<b>Total</b>	<b>11,811</b>	<b>100.0</b>	<b>9,634</b>	<b>100.0</b>	<b>2,177</b>	<b>100.0</b>
Media (DE)	3.5 (1.9) drogas		3.5 (1.9) drogas		3.5 (1.9) drogas	
Mediana	3 drogas		3 drogas		3 drogas	
Moda	3 drogas		3 drogas		3 drogas	
Decil1	1 droga		1 drogas		1 droga	

DE= Desviación Estándar

**Cuadro 25. Total de drogas ilícitas consumidas en el último año  
(No incluye ni alcohol ni tabaco)**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Ninguna	841	7.1	690	7.2	151	6.9
1 sustancia	5,421	45.9	4,433	46.0	988	45.4
2 sustancias	2,672	22.6	2,172	22.5	500	23.0
3 sustancias	1,337	11.3	1,120	11.6	217	10.0
4 sustancias	678	5.7	534	5.5	144	6.6
5 sustancias	394	3.3	313	3.2	81	3.7
6 sustancias	224	1.9	180	1.9	44	2.0
7 sustancias	114	1.0	90	0.9	24	1.1
8 sustancias	68	0.6	51	0.5	17	0.8
9 sustancias	34	0.3	28	0.3	6	0.3
10 sustancias	11	0.1	7	0.1	4	0.2
11-18 sustancias	17	0.1	16	0.2	1	0.0
<b>Total</b>	<b>11,811</b>	<b>100.0</b>	<b>9,634</b>	<b>100.0</b>	<b>2,177</b>	<b>100.0</b>
Media (DE)	1.9 (1.6) drogas		1.9 (1.6) drogas		2.0 (1.6) drogas	
Mediana	1 droga		1 droga		1 droga	
Moda	1 droga		1 droga		1 droga	
Decil1	1 droga		1 droga		1 droga	

DE= Desviación Estándar

**Cuadro 26. Consumo de drogas en los últimos 12 meses por sustancia**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
<b>Tabaco</b>	<b>9,117</b>	<b>77.2</b>	<b>7,468</b>	<b>77.5</b>	<b>1,649</b>	<b>75.7</b>
<b>Alcohol</b>	<b>9,302</b>	<b>78.8</b>	<b>7,588</b>	<b>78.8</b>	<b>1,714</b>	<b>78.7</b>
<b>Cannabis</b>	<b>8,762</b>	<b>74.2</b>	<b>7,221</b>	<b>75.0</b>	<b>1,541</b>	<b>70.8</b>
Mariguana	8,757	74.1	7,217	74.9	1,540	70.7
Hachís	512	4.3	433	4.5	79	3.6
<b>Cocaína</b>	<b>3,700</b>	<b>31.3</b>	<b>3,082</b>	<b>32.0</b>	<b>618</b>	<b>28.4</b>
Cocaína (Clorhidrato)	2,878	24.4	2,371	24.6	507	23.3
Crack	1,760	14.9	1,509	15.7	251	11.5
Otra presentación de cocaína	49	0.4	38	0.4	11	0.5
<b>Inhalables</b>	<b>2,281</b>	<b>19.3</b>	<b>1,838</b>	<b>19.1</b>	<b>443</b>	<b>20.3</b>
Solventes o removedores	1,630	13.8	1,327	13.8	303	13.9
Pegamentos	529	4.5	425	4.4	104	4.8
Esmaltes o pinturas	326	2.8	242	2.5	84	3.9
Otros inhalables	94	0.8	80	0.8	14	0.6
<b>Depresores</b>	<b>1,201</b>	<b>10.2</b>	<b>884</b>	<b>9.2</b>	<b>317</b>	<b>14.6</b>
Benzodiacepinas	1,165	9.9	856	8.9	309	14.2
Rohypnol	39	0.3	33	0.3	6	0.3
Otros depresores	21	0.2	15	0.2	6	0.3
<b>Estimulantes</b>	<b>3,230</b>	<b>27.3</b>	<b>2,551</b>	<b>26.5</b>	<b>679</b>	<b>31.2</b>
Anfetamina	149	1.3	129	1.3	20	0.9
Metanfetaminas	2,848	24.1	2,257	23.4	591	27.1
Éxtasis (MDMA) y	456	3.9	322	3.3	134	6.2
Metanfetaminas alucinógenas						
Otros estimulantes	42	0.4	35	0.4	7	0.3
<b>Drogas alucinógenas y disociativas</b>	<b>893</b>	<b>7.6</b>	<b>707</b>	<b>7.3</b>	<b>186</b>	<b>8.5</b>
LSD	746	6.3	579	6.0	167	7.7
Plantas alucinógenas y derivados	272	2.3	225	2.3	47	2.2
Otras drogas alucinógenas y disoc.	22	0.2	18	0.2	4	0.2
<b>Opiáceos</b>	<b>303</b>	<b>2.6</b>	<b>242</b>	<b>2.5</b>	<b>61</b>	<b>2.8</b>
Heroína	241	2.0	196	2.0	45	2.1
Opiáceos Sintéticos	37	0.3	27	0.3	10	0.5
Opio y otros opiáceos	34	0.3	27	0.3	7	0.3
<b>Otras sustancias de abuso</b>	<b>152</b>	<b>1.3</b>	<b>108</b>	<b>1.1</b>	<b>44</b>	<b>2.0</b>
Con utilidad médica	50	0.4	31	0.3	19	0.9
Otras sustancias de abuso	107	0.9	79	0.8	28	1.3

**Cuadro 27. Droga de preferencia en los últimos 12 meses, según menciones**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Tabaco	1,247	10.6	10.8	1,003	10.4	10.6	244	11.2	11.4
Alcohol	1,603	13.6	13.8	1,279	13.3	13.5	324	14.9	15.1
Mariguana	5,306	44.9	45.8	4,482	46.5	47.4	824	37.9	38.5
Hachís	22	0.2	0.2	18	0.2	0.2	4	0.2	0.2
Cocaína (Clorhidrato)	404	3.4	3.5	334	3.5	3.5	70	3.2	3.3
<i>Crack</i>	556	4.7	4.8	507	5.3	5.4	49	2.3	2.3
Otra presentación de cocaína	2	0.0	0.0	2	0.0	0.0	0	0.0	0.0
Solventes o removedores	430	3.6	3.7	322	3.3	3.4	108	5.0	5.0
Pegamentos	78	0.7	0.7	57	0.6	0.6	21	1.0	1.0
Esmaltes o pinturas	54	0.5	0.5	34	0.4	0.4	20	0.9	0.9
Otros inhalables	16	0.1	0.1	11	0.1	0.1	5	0.2	0.2
Benzodiacepinas	98	0.8	0.8	39	0.4	0.4	59	2.7	2.8
<i>Rohypnol</i> <sup>®</sup>	2	0.0	0.0	2	0.0	0.0	0	0.0	0.0
Otros depresores del SNC	8	0.1	0.1	3	0.0	0.0	5	0.2	0.2
Anfetamina	45	0.4	0.4	39	0.4	0.4	6	0.3	0.3
Metanfetaminas	1,314	11.1	11.3	1,006	10.4	10.6	308	14.1	14.4
Éxtasis (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas	16	0.1	0.1	11	0.1	0.1	5	0.2	0.2
Otros estimulantes del SNC	5	0.0	0.0	5	0.1	0.1	0	0.0	0.0
LSD	34	0.3	0.3	27	0.3	0.3	7	0.3	0.3
Plantas alucinógenas y derivados	10	0.1	0.1	6	0.1	0.1	4	0.2	0.2
Otras drogas alucinógenas y disociativas	5	0.0	0.0	4	0.0	0.0	1	0.0	0.0
Heroína	150	1.3	1.3	123	1.3	1.3	27	1.2	1.3
Opiáceos Sintéticos	15	0.1	0.1	11	0.1	0.1	4	0.2	0.2
Opio y otros opiáceos	5	0.0	0.0	2	0.0	0.0	3	0.1	0.1
Sustancias con utilidad médica	13	0.1	0.1	6	0.1	0.1	7	0.3	0.3
Otras sustancias de abuso	11	0.1	0.1	7	0.1	0.1	4	0.2	0.2
Ninguna	148	1.3	1.3	116	1.2	1.2	32	1.5	1.5
<i>No consumió en el último año</i>	185	1.6	<i>Se omite</i>	155	1.6	<i>Se omite</i>	30	1.4	<i>Se omite</i>
<i>Sin Información</i>	29	0.2	<i>Se omite</i>	23	0.2	<i>Se omite</i>	6	0.3	<i>Se omite</i>
<b>Total</b>	<b>11,811</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>9,634</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>2,177</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

**Cuadro 28. Droga de mayor impacto en los últimos 12 meses, según menciones**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Tabaco	676	5.7	5.8	525	5.4	5.6	151	6.9	7.1
Alcohol	1,291	10.9	11.1	1,027	10.7	10.9	264	12.1	12.3
Mariguana	4,840	41.0	41.7	4,074	42.3	43.1	766	35.2	35.8
Hachís	19	0.2	0.2	17	0.2	0.2	2	0.1	0.1
Cocaína (Clorhidrato)	529	4.5	4.6	431	4.5	4.6	98	4.5	4.6
<i>Crack</i>	775	6.6	6.7	703	7.3	7.4	72	3.3	3.4
Otra presentación de cocaína	3	0.0	0.0	3	0.0	0.0	0	0.0	0.0
Solventes o removedores	589	5.0	5.1	466	4.8	4.9	123	5.6	5.7
Pegamentos	130	1.1	1.1	103	1.1	1.1	27	1.2	1.3
Esmaltes o pinturas	95	0.8	0.8	58	0.6	0.6	37	1.7	1.7
Otros inhalables	20	0.2	0.2	14	0.1	0.1	6	0.3	0.3
Benzodiazepinas	138	1.2	1.2	70	0.7	0.7	68	3.1	3.2
<i>Rohypnol</i> <sup>®</sup>	7	0.1	0.1	7	0.1	0.1	0	0.0	0.0
Otros depresores del SNC	14	0.1	0.1	7	0.1	0.1	7	0.3	0.3
Anfetamina	69	0.6	0.6	59	0.6	0.6	10	0.5	0.5
Metanfetaminas	1,921	16.3	16.6	1,520	15.8	16.1	401	18.4	18.7
Éxtasis (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas	26	0.2	0.2	15	0.2	0.2	11	0.5	0.5
Otros estimulantes del SNC	12	0.1	0.1	10	0.1	0.1	2	0.1	0.1
LSD	68	0.6	0.6	50	0.5	0.5	18	0.8	0.8
Plantas alucinógenas y derivados	12	0.1	0.1	8	0.1	0.1	4	0.2	0.2
Otras drogas alucinógenas y disociativas	8	0.1	0.1	7	0.1	0.1	1	0.0	0.0
Heroína	165	1.4	1.4	136	1.4	1.4	29	1.3	1.4
Opiáceos Sintéticos	16	0.1	0.1	12	0.1	0.1	4	0.2	0.2
Opio y otros opiáceos	8	0.1	0.1	4	0.0	0.0	4	0.2	0.2
Sustancias con utilidad médica	14	0.1	0.1	6	0.1	0.1	8	0.4	0.4
Otras sustancias de abuso	14	0.1	0.1	11	0.1	0.1	3	0.1	0.1
Ninguna	136	1.2	1.2	112	1.2	1.2	24	1.1	1.1
<i>No consumió en el último año</i>	185	1.6	<i>Se omite</i>	155	1.6	<i>Se omite</i>	30	1.4	<i>Se omite</i>
<i>Sin Información</i>	31	0.3	<i>Se omite</i>	24	0.2	<i>Se omite</i>	7	0.3	<i>Se omite</i>
<b>Total</b>	<b>11,811</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>9,634</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>2,177</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

**Cuadro 29. Uso combinado de drogas en los últimos 12 meses  
(No incluye tabaco)**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Si combinó drogas	4,224	35.8	44.9	3,463	35.9	45.1	761	35.0	43.8
No combinó drogas	5,193	44.0	55.1	4,217	43.8	54.9	976	44.8	56.2
<i>No aplica</i>	<i>2,394</i>	<i>20.3</i>	<i>Se omite</i>	<i>1,954</i>	<i>20.3</i>	<i>Se omite</i>	<i>440</i>	<i>20.2</i>	<i>Se omite</i>
<b>Total</b>	<b>11,811</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>9,634</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>2,177</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

**Cuadro 30. Total de drogas consumidas en los últimos 30 días  
(Incluye alcohol o tabaco)**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Ninguna	1,157	9.8	911	9.5	246	11.3
1 sustancia	2,709	22.9	2,184	22.7	525	24.1
2 sustancias	3,214	27.2	2,619	27.2	595	27.3
3 sustancias	2,899	24.5	2,438	25.3	461	21.2
4 sustancias	1,197	10.1	994	10.3	203	9.3
5 sustancias	421	3.6	327	3.4	94	4.3
6 sustancias	140	1.2	108	1.1	32	1.5
7 sustancias	52	0.4	37	0.4	15	0.7
8 sustancias	14	0.1	9	0.1	5	0.2
9 sustancias	5	0.0	4	0.0	1	0.0
10 -14 sustancias	3	0.0	3	0.0	0	0.0
<b>Total</b>	<b>11,811</b>	<b>100.0</b>	<b>9,634</b>	<b>100.0</b>	<b>2,177</b>	<b>100.0</b>
Media (DE)	2.2 (1.4) drogas		2.2 (1.4) drogas		2.2 (1.5) drogas	
Mediana	2 drogas		2 drogas		2 drogas	
Moda	2 drogas		2 drogas		2 drogas	
Decil1	1 droga		1 droga		Ninguna	

DE= Desviación Estándar

**Cuadro 31. Total de drogas ilícitas consumidas en los últimos 30 días  
(No incluye ni alcohol ni tabaco)**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Ninguna	3,312	28.0	2,661	27.6	651	29.9
1 sustancia	5,811	49.2	4,790	49.7	1,021	46.9
2 sustancias	1,861	15.8	1,541	16.0	320	14.7
3 sustancias	562	4.8	444	4.6	118	5.4
4 sustancias	173	1.5	131	1.4	42	1.9
5 sustancias	66	0.6	48	0.5	18	0.8
6 sustancias	17	0.1	11	0.1	6	0.3
7 sustancias	6	0.1	5	0.1	1	0.0
8 sustancias	1	0.0	1	0.0	0	0.0
10-13 sustancias	2	0.0	2	0.0	0	0.0
<b>Total</b>	<b>11,811</b>	<b>100.0</b>	<b>9,634</b>	<b>100.0</b>	<b>2,177</b>	<b>100.0</b>
Media (DE)	1.1 (1) droga		1.0 (0.9) droga		1.1 (1) droga	
Mediana	1 droga		1 droga		1 drogas	
Moda	1 droga		1 droga		1 drogas	
Decil1	Ninguna		Ninguna		Ninguna	

DE= Desviación Estándar

**Cuadro 32. Consumo de drogas en los últimos 30 días por sustancia**

	General		Hombres		Mujeres	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
<b>Tabaco</b>	<b>7,327</b>	<b>62.0</b>	<b>6,066</b>	<b>63.0</b>	<b>1,261</b>	<b>57.9</b>
<b>Alcohol</b>	<b>6,381</b>	<b>54.0</b>	<b>5,232</b>	<b>54.3</b>	<b>1,149</b>	<b>52.8</b>
<b>Cannabis</b>	<b>6,158</b>	<b>52.1</b>	<b>5,151</b>	<b>53.5</b>	<b>1,007</b>	<b>46.3</b>
Mariguana	6,153	52.1	5,146	53.4	1,007	46.3
Hachís	151	1.3	130	1.3	21	1.0
<b>Cocaína</b>	<b>1,770</b>	<b>15.0</b>	<b>1,476</b>	<b>15.3</b>	<b>294</b>	<b>13.5</b>
Cocaína (Clorhidrato)	1,074	9.1	862	8.9	212	9.7
Crack	940	8.0	822	8.5	118	5.4
Otra presentación de cocaína	9	0.1	6	0.1	3	0.1
<b>Inhalables</b>	<b>1,168</b>	<b>9.9</b>	<b>921</b>	<b>9.6</b>	<b>247</b>	<b>11.3</b>
Solventes o removedores	844	7.1	678	7.0	166	7.6
Pegamentos	233	2.0	177	1.8	56	2.6
Esmaltes o pinturas	128	1.1	88	0.9	40	1.8
Otros inhalables	37	0.3	29	0.3	8	0.4
<b>Depresores</b>	<b>536</b>	<b>4.5</b>	<b>360</b>	<b>3.7</b>	<b>176</b>	<b>8.1</b>
Benzodiacepinas	525	4.4	351	3.6	174	8.0
Rohypnol	7	0.1	7	0.1		
Otros depresores	11	0.1	8	0.1	3	0.1
<b>Estimulantes</b>	<b>1,811</b>	<b>15.3</b>	<b>1,421</b>	<b>14.7</b>	<b>390</b>	<b>17.9</b>
Anfetamina	33	0.3	27	0.3	6	0.3
Metanfetaminas	1,696	14.4	1,342	13.9	354	16.3
Éxtasis (MDMA) y Metanfetaminas alucinógenas	103	0.9	69	0.7	34	1.6
Otros estimulantes	15	0.1	12	0.1	3	0.1
<b>Drogas alucinógenas y disociativas</b>	<b>185</b>	<b>1.6</b>	<b>140</b>	<b>1.5</b>	<b>45</b>	<b>2.1</b>
LSD	156	1.3	116	1.2	40	1.8
Plantas alucinógenas y derivados	28	0.2	24	0.2	4	0.2
Otras drogas alucinógenas y disoc.	8	0.1	6	0.1	2	0.1
<b>Opiáceos</b>	<b>187</b>	<b>1.6</b>	<b>152</b>	<b>1.6</b>	<b>35</b>	<b>1.6</b>
Heroína	153	1.3	127	1.3	26	1.2
Opiáceos Sintéticos	22	0.2	16	0.2	6	0.3
Opio y otros opiáceos	14	0.1	11	0.1	3	0.1
<b>Otras sustancias de abuso</b>	<b>77</b>	<b>0.7</b>	<b>47</b>	<b>0.5</b>	<b>30</b>	<b>1.4</b>
Con utilidad médica	28	0.2	14	0.1	14	0.6
Otras sustancias de abuso	50	0.4	34	0.4	16	0.7

**Cuadro 33. Frecuencia de episodios de abuso del consumo de tabaco<sup>1</sup> en los últimos 30 días**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Ni una vez	2,426	20.5	33.9	2,013	20.9	33.9	413	19.0	33.5
< de 1 vez a la semana	843	7.1	11.8	687	7.1	11.6	156	7.2	12.7
1 o 2 veces a la semana	808	6.8	11.3	664	6.9	11.2	144	6.6	11.7
Cada tercer día	485	4.1	6.8	403	4.2	6.8	82	3.8	6.7
Diario	2,604	22.0	36.3	2,167	22.5	36.5	437	20.1	35.5
<i>No consumió en los últimos 30 días</i>	<i>4,484</i>	<i>38.0</i>	<i>Se omite</i>	<i>3,568</i>	<i>37.0</i>	<i>Se omite</i>	<i>916</i>	<i>42.1</i>	<i>Se omite</i>
<i>Sin información</i>	<i>161</i>	<i>1.4</i>	<i>Se omite</i>	<i>132</i>	<i>1.4</i>	<i>Se omite</i>	<i>29</i>	<i>1.3</i>	<i>Se omite</i>
<b>Total</b>	<b>11,811</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>9,634</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>2,177</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

<sup>1</sup> Consumo de seis o más cigarrillos en un solo día.

**Cuadro 34. Frecuencia de episodios de abuso del consumo de alcohol<sup>1</sup> en los últimos 30 días**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
Ni una vez	1,180	10.0	18.9	932	9.7	18.2	248	11.4	22.1
< de 1 vez a la semana	2,287	19.4	36.7	1,894	19.7	37.1	393	18.1	35.0
1 o 2 veces a la semana	1,877	15.9	30.1	1,564	16.2	30.6	313	14.4	27.9
Cada tercer día	472	4.0	7.6	376	3.9	7.4	96	4.4	8.6
Diario	414	3.5	6.6	342	3.5	6.7	72	3.3	6.4
<i>No consumió en los últimos 30 días</i>	<i>5,430</i>	<i>46.0</i>	<i>Se omite</i>	<i>4,402</i>	<i>45.7</i>	<i>Se omite</i>	<i>1,028</i>	<i>47.2</i>	<i>Se omite</i>
<i>Sin información</i>	<i>151</i>	<i>1.3</i>	<i>Se omite</i>	<i>124</i>	<i>1.3</i>	<i>Se omite</i>	<i>27</i>	<i>1.2</i>	<i>Se omite</i>
<b>Total</b>	<b>11,811</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>9,634</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>2,177</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

<sup>1</sup> Consumo de más de cuatro copas en un día para los hombres y de más de tres copas en un día para las mujeres.

**Cuadro 35. Frecuencia de episodios de abuso del consumo de drogas ilícitas<sup>1</sup> en los últimos 30 días**

	General			Hombres			Mujeres		
	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido	Frec.	%	% válido
< de 1 vez a la semana	1,663	14.1	23.6	1,308	13.6	22.6	355	16.3	28.5
1 o 2 veces a la semana	1,442	12.2	20.5	1,189	12.3	20.5	253	11.6	20.3
Cada tercer día	1,091	9.2	15.5	911	9.5	15.7	180	8.3	14.5
Diario	2,842	24.1	40.4	2,385	24.8	41.2	457	21.0	36.7
<i>No consumió en los últimos 30 días</i>	<i>3,312</i>	<i>28.0</i>	<i>Se omite</i>	<i>2,661</i>	<i>27.6</i>	<i>Se omite</i>	<i>651</i>	<i>29.9</i>	<i>Se omite</i>
<i>Sin información</i>	<i>1,461</i>	<i>12.4</i>	<i>Se omite</i>	<i>1,180</i>	<i>12.2</i>	<i>Se omite</i>	<i>281</i>	<i>12.9</i>	<i>Se omite</i>
<b>Total</b>	<b>11,811</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>9,634</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>2,177</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

<sup>1</sup> Consumo de cualquier dosis.

## GLOSARIO

<b>Droga ilícita de inicio</b>	Es la sustancia ilegal que el usuario refirió como la droga con la cual inicio el consumo de drogas. No incluye el inicio del consumo con alcohol o tabaco.
<b>Droga de mayor impacto en los últimos 12 meses</b>	Sustancia por la que acuden los pacientes a tratamiento, a cuyo consumo los pacientes le atribuyen problemas personales, de salud, familiares, escolares, laborales o sociales, en el transcurso del último año.
<b>Droga de preferencia en los últimos 12 meses</b>	Sustancia que el propio usuario solicitante de tratamiento ha elegido o preferido consumir en el transcurso del último año.
<b>Estrato social</b>	Estimación que hace el terapeuta, según su percepción, del estrato al que pertenece el usuario de drogas, considerando aspectos como lugar de residencia, escolaridad, empleo y características manifiestas como higiene y aliño, calidad del vestido, expresión verbal y vocabulario, etc.
<b>Tipo de consumo de drogas ilícitas</b>	Características de consumo de sustancias ilegales según motivo, frecuencia y problemas asociados. No incluye el uso de alcohol y/o tabaco y se clasifica como: experimental, social u ocasional, funcional, disfuncional y en remisión.
<b>Total de drogas consumidas</b>	Número de drogas consumidas (se incluyen las 26 sustancias de seguimiento) en las siguientes categorías: alguna vez en la vida, en el último año y en los últimos 30 días.
<b>Uso combinado de drogas en los últimos 12 meses</b>	Consumo de dos o más sustancias (incluyendo alcohol y cualquier droga ilícita o de uso médico, utilizada sin prescripción, pero excluyendo tabaco) en el transcurso de un mismo día, en el año previo a la solicitud de tratamiento en CIJ.

